

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



VAIPLEX 80 WP

FUNGICIDA – ETIL FOSFONATO
FOSETYL-ALUMINIUM

PRECAUCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE
ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

Uso agronómico.

Vaiplex 80 WP es un fungicida fosfónico con acción sistémica, es absorbida por el follaje y por las raíces. Es translocado vía xilema y floema. En el hongo interfiere en la síntesis de enzimas.

Equipo de aplicación: Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, o con equipo terrestre acoplado a un tractor. El volumen de aplicación es de 200 – 600 litros. Para su aplicación utilice boquillas de cono hueco. Durante la aplicación aérea el viento no puede exceder los 15 Km/h, y debe aplicarse en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación.

Forma de preparación de la mezcla: Para preparar el caldo de aplicación, en un recipiente aparte mezcle la cantidad recomendada del producto con una pequeña cantidad de agua, agite hasta obtener una pasta semilíquida, luego llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego la pasta semilíquida y termine de llenar el tanque con agua limpia. El quipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuente de agua y viviendas. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.

Recomendaciones de uso: Costa Rica.

Cultivo	Enfermedades	Dosis Recomendada	Intervalo de Aplicación
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu Polvoso <i>Peronospora destructor</i>	2.5 Kg/ha en 300 L de agua.	Inicie las aplicaciones al primer síntoma de la enfermedad. Aplique cada 15 días alternando con fungicidas sistémicos.
Cítricos <i>Citrus sp</i>	Gomosis de los Cítricos <i>Phytophthora sp</i>	4 – 5 Kg/ha en 1000 L de agua.	Aplique 2 veces durante el periodo de crecimiento vegetativo, cada 90 días.
Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i> Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> var.	Mildiu vellosa <i>Peronospora parasitica</i>	2.5 Kg/ha en 300 L de agua.	Aplique 4 – 5 veces durante el ciclo.
Fresa <i>Fragaria sp</i>	Podredumbre del Corazón <i>Phytophthora parasitica</i>	2.5 Kg/ha en 400 L de agua.	Por inmersión báñese los esquejes por 15 a 30 minutos. Aplíquese cada 30 días, 14 – 24 días después de la siembra.
Piña <i>Ananas comosus</i>	Podredumbre del Corazón <i>Phytophthora parasitica</i>	Para tratamiento de semilla: 4 – 5 Kg/ha en 3000 L de agua. Para plantaciones establecidas: 7 – 8 Kg/ha en 1400 L de agua.	Para tratamiento de semilla por inmersión, báñese las hojas antes del trasplante para una protección de 60 días. Para plantaciones establecidas aplique a inicios del establecimiento del cultivo (solo aplique una sola vez en el ciclo), cuando empiecen a aparecer los síntomas de la enfermedad.
Ornamentales	Podredumbre de las Plantas <i>Phytophthora sp</i> <i>Peronospora sp</i>	3 – 4 Kg/ha en 1500 L de agua.	En plántulas utilice las concentraciones inferiores.

Para el cultivo de cítricos, se puede aplicar vía aérea a la dosis de 5 Kg/ha con un volumen de aplicación máximo de 100 – 150 L/ha, realizar un máximo de 2 aplicaciones por ciclo del cultivo, con un intervalo de aplicaciones de 90 días. **Es necesario cumplir con las recomendaciones establecidas en el D.E.31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGSP. Reglamento para las actividades de la aviación agrícola.**

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA. Piña: 90 días. Cebolla, cítricos, brócoli, coliflor, repollo, fresa, ornamentales: 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA. Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizar el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD. No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD. Incompatible con sustancias fuertemente alcalinas como el caldo bordelés. El producto formulado es compatible con la mayoría de pesticidas, en caso de duda realice prueba previa de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Debe transportarse en envases originales bien cerrados y etiquetados. No almacenar junto o cerca de alimentos para humanos o animales. Mantenerlo en bodegas seguras y alejadas del calor o el fuego. Este producto no es inflamable ni corrosivo a los metales.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE
PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Irritación de mucosas, náuseas, vómitos, alteraciones respiratorias, irritación de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS.

Ingestión: No inducir el vómito por el riesgo de aspiración pulmonar. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel: Quite las ropas contaminadas y lávese la superficie afectada con suficiente agua y jabón.

Inhalación: Aleje a la persona del lugar contaminado a un lugar fresco y ventilado.

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con agua durante 15 minutos. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO.

El tratamiento médico debe ser sintomático y de soporte. En caso de intoxicaciones no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

Costa Rica Centro Nacional Intoxicaciones 2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON EL PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Perfore y entierre los envases vacíos a una profundidad de por lo menos 40 cm lejos de fuentes de agua, ríos, lagunas, etc. Recoja los derrames del producto con aserrín o algún otro material absorbente y entierrelo en la misma forma de los envases desechados. Los remanentes del producto deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado con su etiqueta original.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA.

El fabricante y formulador garantizan que este producto concuerda con la descripción química de la etiqueta y se ajusta apropiadamente a sus propósitos, pero al no poder controlar la aplicación y otros factores inherentes a su manejo, el fabricante, formulador no se responsabilizan de los resultados que se obtengan a consecuencia de su uso. El fabricante formulador y/o consumidor hagan del mismo, dichas personas asumen y aceptan estos riesgos.

FORMULADO POR:

SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO., LTD.

No.25 Honggou Road Zhangdian Zibo City Shandong China.
Tel:+86-533-6208811 – Fax:+86-533-6208819

DISTRIBUIDO POR:

DAC – DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Te: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
Info@agrodac.com • www.agrodac.com

PAÍS
Costa Rica

NÚMERO DE REGISTRO
8702165

FECHA DE REGISTRO
04/11/2009