

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



AMYLO-X 101.8 SC

FUNGICIDA MICROBIOLÓGICO

Bacillus amyloliquefaciens cepa D747

PRECAUCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

Densidad: 1.03 g/ml.

USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: AMYLO-X 101.8 SC es un fungicida microbiológico preventivo, de amplio espectro que ejerce control y supresión de enfermedades de suelo y follaje. Su modo de acción incluye la liberación de metabolitos que causan disrupción de las membranas y paredes celulares, también coloniza rápidamente el follaje, la rizosfera y otras superficies de la planta, donde compite con los patógenos por los espacios para colonización e infección de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor con un volumen de aplicación de 200 a 400 litros por hectárea, se puede aplicar también por vía aérea para aplicaciones en banano. Las aplicaciones aéreas deben hacerse cuando casi no se tengan vientos (máximo 10 km/hora) y las temperaturas no sean mayores a 30 °C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco de baja descarga. Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación. Utilice el siguiente equipo de protección al utilizar este producto (Botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes):



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Colocar en el tanque de mezcla la cantidad de aceite a utilizar y adicionar el emulsificante, agitar constantemente, agregar el 50 % del agua a usar, agitar hasta tener una buena emulsión, agregue el AMYLO-X manteniendo la agitación, el uso de Goma Xanthan (0.2%) puede mejorar la estabilidad de la emulsión, termine de agregar el agua. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar equipo de protección personal durante la preparación de la mezcla y durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

DOSIS: 0.25 a 0.5 Litros / Hectárea.

Usar 23 l de agua más 7 l de aceite y 1 % de emulsificante por hectárea.

CULTIVO	ENFERMEDADES	ÉPOCAS, INTERVALO DE APLICACIÓN
Banano (<i>Musa</i> spp.)	Sigatoka Negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	Aplicación aérea con volumen de caldo apropiado al equipo utilizado. Aplicar cada 6 días de acuerdo con los ciclos de emisión foliar. Puede aplicarse en mezcla con aceite y otros fungicidas sistémicos o protectores. AMYLO-X 101.8 SC debe utilizarse dentro de un programa de manejo de la enfermedad que incluya otros fungicidas con diferentes mecanismos de acción. Hacer un máximo de 6 ciclos por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. En caso necesario de reingreso al área tratada antes, use equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con químicos insecticidas o fungicida que no tenga una reacción alcalina fuerte. No mezclar con bactericidas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporta este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamento, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado de calor y lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. No almacenar a temperaturas mayores de 30°C. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo en contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato

el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	TELÉFONO	PAÍS
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	2223 1028	COSTA RICA

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan causar ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR: CERTIS USA

9145 Guilford Road, Suite 175
Columbia, Maryland 21046-1883, ESTADOS UNIDOS

DISTRIBUIDO POR: DAC – DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.

Tel: 2494-9800 · Fax: 2249-3733 · Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com · www.agrodac.com

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	M0003	14/12/2023