

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE
USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN
CIENCIAS AGRICOLAS



Serifel® 10 WP

FUNGICIDA – MICROBIOLOGICO
Bacillus amyloliquefaciens Cepa MBI 600

PRECAUCIÓN
ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTENGASE
ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

El biofungicida **Serifel® 10 WP** protege contra los patógenos presentes en el suelo. La bacteria *Bacillus amyloliquefaciens* coloniza rápidamente las superficies de las raíces, multiplicándose y creciendo conforme estas se desarrollan. Así mismo producen metabolitos que limitan preventivamente el crecimiento y el desarrollo de organismos transmisores de enfermedades.

La bacteria promotora de crecimiento vegetal. *Bacillus amyloliquefaciens* cepa MBI 600, produce una endospora que le permite soportar condiciones ambientales extremas como el calor y la desecación, proporcionando así una ventana de aplicación más flexible.

Las bacterias activas de **Serifel® 10 WP** colonizan los sistemas en desarrollo de raíces y de brotes de plantas, suprimiendo por competencia organismos transmisores de enfermedades. La protección contra patógenos presentes en raíces y en el suelo se extiende durante la temporada de cultivo conforme las bacterias crecen con las raíces. Como resultado de esta protección biológica. las plantas tratadas establecen sistemas vigorosos de raíces y de brotes que dan como resultado bases más uniformes y mayores rendimientos.

Asimismo, se ha demostrado que **Serifel® 10 WP** aumenta la cantidad de nodulación por bacterias fijadoras de nitrógeno cuando se utiliza en muchas leguminosas. Esta mejora en la nodulación es el resultado de un sistema de raíz más saludable que permite la formación de más sitios para nódulos a partir de bacterias fijadoras de nitrógeno presentes en el suelo inoculadas o de origen natural.

En el cultivo de banano y plátano **Serifel® 10 WP** presenta múltiples modos de acción para invadir y atacar bacterias y hongos fitopatógenos. *Bacillus amyloliquefaciens* cepa MBI 600 crea una zona de inhibición en la hoja, previniendo el establecimiento de patógenos, detiene el crecimiento de los patógenos por competencia de los nutrientes y espacio en la superficie de la hoja y destruye el tubo germinativo y el micelio del patógeno.

Serifel® 10 WP es compatible con fungicidas convencionales sin causar daño a los organismos no objetivo, como los nematodos u otros insectos beneficiosos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Serifel® 10 WP puede aplicarse con bomba de mochila manual con boquillas de cono relleno tipo Tee Jet de volumen convencional o de motor tipo turbina o de alta presión con sus respectivas boquillas. o con equipos de aplicación aérea con micronair o boquilla CP.

Antes de aplicar calibre el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de aspersión debe de utilizar un tazón medidor.

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular, **Serifel® 10 WP**. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

En vegetales con bomba de mochila se requieren de 400 a 800 L de caldo/Ha (280 a 560 l/mz)

En banano la cantidad del caldo de aplicación varía dependiendo del equipo de aplicación: con bomba de motor 100 L de caldo/Ha (70L de caldo /manzana), y con avión de 23 a 25 L de caldo/Ha (16.10 a 17.5 de caldo/mz).

Es muy importante después de la aplicación lavar el equipo de aplicación externamente con cepillos, agua y detergentes biodegradables para evitar la contaminación ambiental y prevenir la corrosión o deterioro de todas las artes metálicas, de plástico o de goma. También es necesario realizar un lavado interno del equipo, asegurar que el agua residual del lavado vaya a drenajes con tratamiento de aguas residuales.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

No utilizar agua e/orada para hacer la mezcla con el producto.

En vegetales:

Agregar al 50% del agua requerida la dosis necesaria de **Serifel® 10 WP** hasta obtener una suspensión uniforme. Agregue el agua restante por emplear y agite continuamente.

Si **Serifel® 10 WP** ha sido mezclado con el agua de aplicación no almacene este caldo por más de 72 horas.

En banano:

Verter en el tanque de mezcla la cantidad de aceite a utilizar, agregar el emulsificante y agitar. Seguidamente agregar el 75% del agua hasta lograr una buena emulsión, adicionar el fungicida protectante en continua agitación. Posteriormente completar la cantidad total de agua en constante agitación. Por último, agregar **Serifel® 10 WP** y agitar para mantener la emulsión. Una vez concluida la aplicación se debe lavar bien el equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO

En vegetales:

Se recomienda el uso de **Serifel® 10 WP** en el fondo de surco, en "Drench", en el riego por goteo, en sustratos o medios de cultivo y en aplicaciones foliares en cultivos a campo abierto y bajo invernadero. Se recomienda emplear las dosis más altas de **Serifel®** cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. BASF recomienda la adición del coadyuvante Break Thru® 100 SL (coadyuvante de polimetilsiloxano) al aplicar el producto. Las dosis recomendadas aplican para volúmenes de aplicación de 400 a 500 L de agua por hectárea (280 a 350 L de agua por manzana).

En banano:

Aplicar **Serifel® 10 WP** en forma preventiva o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. procurando una buena cobertura del follaje. Por lo que se recomienda la adición del coadyuvante Break Thru® 100 SL. Se debe monitorear la enfermedad y la relación con las condiciones de clima.

RECOMENDACIONES DE USO EN COSTA RICA, GUATEMALA, HONDURAS NICARAGUA PANAMA-

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADAS
Banano y plátano <i>Musa spp</i>	Sigatoka negra <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	50-1000 g/Ha. Utilizar un volumen total de agua de 24 Uha.

RECOMENDACIONES DE USO EN COSTA RICA, NICARAGUA PANAMA:

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADAS
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Papa	Aplicaciones al suelo ("Drench", fondo del surco, inmersión de	Rhizoctonia Rhizoctonia spp. Pythium spp. Fusarium Fusarium spp Alternaria	50-1000 g/Ha. (35 - 700 g/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a

Solanum tuberosum Chile (aji) Capsicum Annuum L Berenjena Solanum melongena	bandejas, via riego por goteo).	Alternaria solani	600 Uha. NI: utilizar un volumen de agua de 200 Uha. PA: utilizar un volumen de agua de 400 Uha.
	Foliar	Mildiu polvoso <i>Oidiopsis taurica</i> <i>Leveillula taurica</i> Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp. Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Bacterias <i>Xanthomonas</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp. Cercospora <i>Cercospora</i> spp. <i>A/ternaria</i> <i>A/ternaria sotani</i>	50-500 g/Ha. (35 -350 g/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 Uha. NI: utilizar un volumen de agua de 200 Uha. PA: utilizar un volumen de agua de 400 L/ha

RECOMENDACIONES DE USO EN EL SALVADOR:

CULTIVO	PLAGAS A CONTROLAR		DOSIS RECOMENDADAS
Tomate <i>Lycopersicum escutentum</i> Papa <i>Sotanum tuberosum</i> Chile(aji) <i>Capsicum annum</i> L. Berenjena <i>Sotanum metongena</i>	Bacteria <i>Xanthomonas</i> Spp. Fusarium <i>Fusarium spp.</i> Mildiu polvoso <i>Oidiopsis taurica</i> <i>Leve/ulla taurica</i> Bacterias <i>Xanthomonas spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> Alterna ria <i>A/ternaria so/ani</i>		0.40 kg/ha (0.28 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis meto</i> Sandía <i>Citrullus tanatus</i> Calabazas <i>Cucurbita moschata</i> <i>Cucurbita pepo</i>	Aplicaciones al suelo ("Drench", fondo del surco, inmersión de bandejas, via riego por goteo).	Fusarium <i>Fusarium spp</i>	0.5 – 1.0 kg-Ha (0.35 – 0.7 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.
	En Postcosecha Aspersión preventiva del producto a los frutos próximos a empaque	Fusarium <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>	10 gramos de Serifel 10 WP por litro de agua
	Foliar	Mildiu polvoso <i>Oidiopsis taurica</i> <i>Sphaerotheeca spp.</i> <i>Erysiphe spp</i>	0.30 -0.40 kg/Ha. (0.21 -0.28 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.

RECOMENDACIONES: Aplicaciones al suelo para el control de *Fusarium* sp. En la 1ra. aplicación, un día después del trasplante, tronquee a la base de las plantas con bomba de mochila manual un volumen de 40 ml de solución por planta. Las siguientes dos aplicaciones realícelas por medio del riego por goteo. utilizando un sistema de aplicación tipo venturi, el cual permite la aplicación de los productos a surcos establecidos. Realice la 2da. Aplicación, 8 días después del trasplante y la 3ra. aplicación, 25 días después del trasplante. Para las dosis indicadas utilice un volumen de agua de 333 L/ha (233.10 L/mz). si la aplicación es tronqueada y 17.55 m3/hora/ha si la aplicación es por el sistema de riego 40 ml/planta. Se recomienda que la aplicación de Serifel ® 10 WP sea la última aplicación de riego del día.

RECOMENDACIONES DE USO EN COSTA RICA, NICARAGUA, PANAMA:

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADA
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i>	Aplicaciones al suelo ("Drench", fondo del surco, inmersión de	Rhizoctonia <i>Rhizoctonia</i> spp Pythium <i>Pythium</i> spp. Fusarium	50-1000 g/Ha. (34.97 - 699.30 g/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600

Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	bandejas, via riego por goteo).	<i>Fusarium</i> spp.	L/ha.
	Foliar	Mildiu polvoso <i>Oidiopsis taurica</i> <i>Sphaerotheca</i> spp. <i>Erysiphe</i> spp. Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp.	50-500 g/Ha. (34.97 - 349.65 g/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO EN HONDURAS:

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADAS
Pepino Cucumis Sativas Melón Cucumis melo Sandía Citrullus lanatus	Aplicaciones al suelo ("Drench", fondo del surco, inmersión de bandejas, via riego por goteo). En Postcosecha Aspersión preventiva del producto a los frutos próximos a empaque.	Rhizoctonia <i>Rhizoctonia</i> spp. Pythium <i>Pythium</i> spp. Fusarium <i>Fusarium</i> spp. Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	50-1000 g/Ha. (34.97 -699.30 gtmz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha. 10 gramos de Serifel 10 WP por 1 litro de agua
	Foliar	Mildiu polvoso <i>Oidiopsis taurica</i> <i>Sphaerotheca</i> spp. <i>Erysiphe</i> spp. Antracnosis <i>Colletotrichum</i> spp.	50-500 g/Ha. (34.97 - 349.65 g/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.

RECOMENDACIONES DE USO EN GUATEMALA:

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADAS
Tomate <i>Solanum Tycopersicum</i> Papa <i>Solanum Tuberosum</i> Chile (aji) <i>Capsicum annum</i> L. Berenjena <i>Solanum Metongena</i> Ejote francés <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Arveja <i>Pisum sativum</i>	Aplicaciones al suelo ("Drench, fondo del surco, inmersión de bandejas, via riego por goteo).	Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	0.75-1.0 kg/ha (0.53 - 0.7 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.
	Foliar	Bacterias <i>Xanthomonas campestris</i> Roya <i>Uromyces appendiculatus</i>	0.40 kg/Ha. (0.28 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 Uha. 0.4 - 1.0 Kg/Ha. (0.28 -0.5 Kg/Mz) utilizar un volumen de agua de 600 L/ha.
Pepino <i>Cucumis sativus</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Calabazas <i>Cucurbita moschata</i> <i>Cucurbita pepo</i>	Aplicaciones al suelo ("Drench, fondo del surco, inmersión de bandejas, via riego por goteo).	Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	0.5 -1.0 kg/Ha. (0.35 -0.7 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.
	En Postcosecha Aspersión preventiva del producto a los frutos próximos a empaque.	Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	10 gramos de Serifel 10 WP por litro de agua.
	Foliar	Mildiu polvoso <i>Leveillula taurica</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.20 - 0.40 kg/Ha. (0.14 - 0.28 kg/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.
Brasicas: Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Itálica</i> Repollo <i>Brassica</i>	Aplicandolo a la base de la planta	Fusarium <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	0.3 a 0.5 Kg/ha utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha.

oleracea var. capitata L. Coliflor Brassica oleracea var Botrit s			
---	--	--	--

RECOMENDACIONES DE USO EN HONDURAS Y GUATEMALA:

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADA
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Aplicaciones al suelo	<i>Fusarium oxysporum f. sp. nicotianae</i>	0.5 -1.0 kg/ha utilizar un volumen de agua de 400 L/ha.

INTERVALO DE APLICACION:

En vegetales:

Al suelo: Se recomienda la primera aplicación al trasplante o la siembra de la semilla antes de tapar con tierra. Realizar la segunda aplicación entre 7 a 15 días después de trasplante o la germinación de la semilla.

Parea un control óptimo y preventivo durante todo el ciclo de cultivo utilizar **Serifel® 10 WP** cada 21-28 días para mantener el vigor y sanidad de las raíces.

Foliar: aplicar cada 7 a 10 días durante el ciclo de cultivo.

En banano:

Debe ser aplicado bajo condiciones de baja presión de enfermedad en una forma preventiva cuando se utilice solo, se recomienda para sistemas de producciones convencionales y orgánicas.

En plantaciones convencionales puede utilizarse en mezcla con fungicidas protectantes y sistémicos. Con los sistémicos bajo condiciones de mayor presión de enfermedad.

Se recomienda agregar aceite mineral agrícola a razón de 5 litros/Ha (3.5 l/mz) si hay una presión media de enfermedad. Se debe evitar lluvias después de las 8 horas de ser aplicado. Los intervalos de aplicación varían según condiciones de clima entre 5-8 días.

En tabaco:

Aplicándolo en la base de las plantas (tronqueado) al momento del trasplante y realizar una segunda aplicación a los ocho días después del trasplante.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar de acuerdo con las evaluaciones de campo que indican el comportamiento de la enfermedad y la relación con las condiciones del clima. **Serifel® 10 WP** se puede emplear en cualquier etapa del cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN y LA COSECHA: No hay restricciones (0 días).

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se puede ingresar al área tratada en cuanto se seque la solución aplicada. En caso de mezclas, guardar la recomendación dada para los otros productos.

FITOTOXICIDAD: No se ha reportado fitotoxicidad de **Serifel® 10 WP** cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y aplicación.

COMPATIBILIDAD: **Serifel® 10 WP** puede ser mezclado en un tanque con otros fungicidas, fertilizantes o insecticidas registrados. Antes de proceder, determine si son compatibles al mezclar en forma proporcional cantidades de los productos en agua. Es necesario agitar constantemente para mantener **Serifel® 10 WP** en suspensión. Se debe evitar la preparación de la mezcla en aguas doradas. Si uno o más productos no son compatibles (perjudiciales), mezcle los productos y aplíquelos de un tanque por separado.

PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS DE USO: La aplicación debe hacerse por personal adulto. No comer, fumar o beber, durante la aplicación. Debe usarse ropa de protección. Después de la aplicación hay que bañarse cuidadosamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan tenido contacto con el producto. Lave cuidadosamente el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios domésticos y forrajes. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco y seco. Conserve el **Serifel® 10 WP** en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. Lave bien su equipo de aplicación después de cada uso. Este producto no es inflamable.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación moderada de los ojos. Prácticamente no tóxico después de una ingestión oral. Prácticamente no tóxico después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: llama al Centro de control de intoxicación o a un médico para consultar el tratamiento inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL: quita la ropa contaminada y lavar las zonas afectadas inmediatamente con suficiente agua y jabón. Estás dando 1 año.

INHALACIÓN: recibe al paciente a un lugar fresco, seco y bien ventilado. Si la persona no respira, llame al médico y proporcione respiración artificial, de preferencia boca a boca.

CONTACTO CON LOS OJOS: manténgalos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua limpia de 15 a 20 minutos. Quitarse los lentes de contacto en los primeros 5 minutos y continuar enjuagando el ojo. Llamar al médico o al Centro de control de intoxicación para consultar el tratamiento.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	1-801-0029832 2230-0807
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	2232-2322 2232-2415
Centro de Información, vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	2289-4700 Ext.17
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMEI)	PANAMÁ	523-6312

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacié, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposiciones de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano, o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín, tierra o algún material absorbente y recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Limpie los pisos y objetos contaminados con agua y jabón, siguiendo las regulaciones ambientales. Los trabajos de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de **BASF**, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación. El usuario debe asumir dichos riesgos. **BASF** y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la composición de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos aquí descritos de acuerdo con las

instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN A GENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** *Los periodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales para fines de exportación el usuario debe atenerse a las en los países de destino. tolerancias establecidas*

FORMULADO POR:

BASF Corporation. 801 Dayton Avenue, Ames, Iowa, 5001 O, Estados Unidos de América. Teléfono: 515-232-5907, 1-800-232-5907; Fax 515-232-5961.

IMPORTADOR:

GUATEMALA: **BASF Guatemala**
Avenida Petapa 47-31, Zona 12. Ciudad Guatemala. Guatemala
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA: **BASF Costa Rica S. A.**
EPIC Corporate Center, Escazú.
San José. Costa Rica
Tel.: 2201-1900. Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: **Duwest El Salvador S.A.** Calle Siemens No 56 Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán La Libertad, Tel: 2521-1217
Distribuidores e importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV)
6ª Calle Ote N' 24. Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.
Técnica Universal Salvadoreña, S.A de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.

PAIS	No. REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Guatemala	78-181	01/12/2015
Nicaragua	BA-060F-2015	22/05/2015
Honduras	593-422-II	21/07/2015
El Salvador	AG.2016091139	02/09/2016
Costa Rica	M0001	23/05/2019