

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



The Chemical Company

Facet® 25 SC

HERBICIDA- ÁCIDO QUINOLINCARBOXÍLICO
QUINCLORAC

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,14 g/cm³ a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

FACET® 25 SC es un herbicida, sistémico post-emergente que es absorbido por las raíces de las malezas y por vía foliar; las malezas muestran una clorosis en las hojas jóvenes y en algunos casos decoloraciones similares a las causadas por antocianinas; seguidamente las hojas se encorvan hasta que la maleza se marchita y finalmente muere.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila, tractor o aéreo. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calíbrelo para asegurar que aplica la dosis correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora se debe utilizar un tazón medidor o recipiente calibrado.

Con equipo terrestre se recomienda un volumen de aplicación de 250 a 300 L/Ha. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. Utilice boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente, con una presión de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada y una altura del aguilón o la boquilla de 50 cm sobre el nivel del suelo.

Cuando la aplicación terrestre no sea posible, la aplicación aérea se acepta bajo el supuesto de que ocurran riesgos de deriva durante la aplicación, con un volumen de aplicación de 45 a 75 L/Ha. No aplicar con velocidades de viento superiores a las 5 millas por hora (8 km/hora) ni cuando la temperatura exceda los 32 °C o la humedad relativa sea inferior al 70%. Las aplicaciones deben realizarse uniformemente y con el avión debidamente calibrado.

Se recomienda la aplicación aérea en el cultivo de arroz (*Oryza sativa*).

Es muy importante después de la aplicación lavar el equipo de aplicación externamente con cepillos, agua y detergentes biodegradables para evitar la contaminación ambiental y prevenir la corrosión o deterioro de todas las partes metálicas, de plástico o de goma. También es necesario realizar un lavado interno del equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular **FACET® 25 SC**. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto.

De acuerdo a la dosis de **FACET® 25 SC** a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.



RECOMENDACIONES DE USO:

Detenga la irrigación 1 a 2 días antes de la aplicación. Aplique **FACET® 25 SC** al campo húmedo o saturado, riegue otra vez 1 a 3 días después de la aplicación, asegurándose que no hay salida de agua del lote. En suelos tratados con **FACET® 25 SC** se puede sembrar maíz y sorgo. Evitar por un año las siembras de algodón, soya, frijol, tabaco y cucurbitáceas. No aplicar **FACET® 25 SC** en zonas donde haya rotación con tomate, papa y zanahoria. Donde sea aplicado **FACET® 25 SC** evite el uso de aguas de drenaje en otro cultivo. Cuando utilice **FACET® 25 SC** en arroz de secano, aplicarlo después de una lluvia o con una buena humedad del suelo. Se debe dejar zona de seguridad cuando haya cultivos de hoja ancha vecinos a lotes de arroz. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión y de protección: báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarse sin ser previamente lavada.

ADVERTENCIA

En la naturaleza existen biotipos de *Echinochloa sp* tolerantes o resistentes a aplicaciones de Quinclorac y que se puede encontrar en lotes de siembras de arroz. Cuando el Quinclorac es usado solo y durante varias campañas sucesivas su control se hace más difícil. Para prevenir que esto ocurra se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Aplicar Quinclorac en mezclas con otros productos que también son recomendados para el control de *Echinochloa sp* por ejemplo Aura® 20 EC y Tetris® 20 EC, propanil, además en el sistema de producción Clearfield® se puede mezclar con los herbicidas Clearfield®.
- Rotar el uso de Quinclorac con otros herbicidas recomendados para el control de *Echinochloa sp* en la próxima siembra de arroz.
- Aplicar Quinclorac en secuencia con otros herbicidas recomendados para el control de *Echinochloa sp* por ejemplo: **FACET® 25 SC** en postemergencia temprana seguida de una aplicación Aura® 20 EC y Tetris® 20 EC. Si el control de *Echinochloa sp* con Quinclorac no es satisfactorio cuando se aplica bajo las recomendaciones de la etiqueta se debe hacer una aplicación con productos de diferente modo de acción por ejemplo Aura® 20 EC y Tetris® 20 EC.

USOS AUTORIZADOS EN BELICE, COSTA RICA, GUATEMALA,
HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA:

CULTIVO: Arroz, *Oryza sativa*

MALEZAS A CONTROLAR:

Zacate pinto, pie de gallo	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate de Agua, tuba crédito	<i>Echinochloa crus-galli</i>
Campanilla	<i>Ipomoea spp</i>
Vaina larga	<i>Cassia spp</i>
India	<i>Aeschynomene spp</i>
Acantospermo	<i>Acanthospermum hispidum</i>
Altamisa	<i>Ambrosia artemesifolia</i>
Mozote	<i>Bidens pilosa</i>
Papacuyo	<i>Galinsoga spp</i>
Malva	<i>Hibiscus trionum</i>
Branquiaria	<i>Brachiaria platyphylla</i>
Dormilón	<i>Cassia spp</i>
Pajilla blanca	<i>Digitaria sanguinalis</i>
Tamarindito	<i>Sesbania exaltata</i>

DOSIS RECOMENDADAS: 1,5 litros por hectárea para malezas de 2 a 4 hojas.

MOMENTO DE APLICACIÓN: De 8–15 días después de germinado o cuando las malezas gramíneas y de hoja ancha tengan 2–4 hojas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Después de que la aspersión se haya secado.

FITOTOXICIDAD: **FACET® 25 SC** no es fitotóxico si se aplica de acuerdo con lo indicado en este panfleto. Las plántulas de arroz germinadas superficialmente con sus raíces expuestas al herbicida pueden sufrir daños temporales en épocas tempranas de pulverización o con temperaturas altas. No aplique **FACET® 25 SC** con herbicidas hormonales.

COMPATIBILIDAD: **FACET® 25 SC** puede mezclarse con otros herbicidas como Basagrán® 48 SL, Cambio® 46 SL, Aura® 20 EC, Tetris® 20 EC, Heat® 70 WG, bentiocarbo y propanil.

FACET® 25 SC en mezclas de tanque con insecticidas fosforados y carbamatos no causan daño al cultivo. A la mezcla de **FACET® 25 SC** con propanil no se le debe añadir insecticidas fosforados o carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable, ni corrosivo. No almacene ni transporte **FACET® 25 SC** junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar ligera irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y dar a beber abundante agua. En **República Dominicana** dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado déle clara de huevo en un poquito de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica. NO inducir el vómito. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico, tratamiento sintomático (descontaminar, funciones vitales).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	2251-3560/ 2232-0735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
HOSPITAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA HOSPITAL ROSALES	EL SALVADOR	2525-5800 ext.148/149 22319262
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	2232-2322/ 2232-2415
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	22894700 ext. 17/ 87550983
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	523-4948
HOSPITAL DR. LUIS AYBAR	REPÚBLICA DOMINICANA	681-2181
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. A fin de evitar remanentes se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación, etc. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.**

FORMULADOR:

Schirm GmbH Standort Lübeck para BASF SE, Ludwigshafen, Alemania.

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:	BASF Guatemala Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S. A. Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221
EL SALVADOR:	Agroquímica Internacional (AGRINTER). Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador. Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A. Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.
REP. DOMINICANA:	BASF Dominicana S. A. Gustavo Mejía Ricart No. 11 Edificio Rogama, 3er piso Ensanche Naco, Santo Domingo Tel: 3341026; 5320088, Fax: 3341027

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
BELICE	0253-1	15/11/11
COSTA RICA	3403	11/06/93
GUATEMALA	78-89	27/09/12
HONDURAS	215-108-I	11/06/12
NICARAGUA	BA-172A-2-94	11/01/11
PANAMA	1141	04/08/09
REPUBLICA DOMINICANA	2689	01/03/11

11/2014 V3