

1. **Nombre comercial:** RAZOR® 50 SC

Registro SFE: 5083

2. **Ingredientes activos:**

a. **Nombre común:** Diurón + Ametrina

b. **Nombre IUPAC:**

Diurón: 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

Ametrina: N²-ethyl-N⁴-isopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine


3. **Fórmula molecular:**

a. **Diurón:** C₉H₁₀Cl₂N₂O


b. **Ametrina:** C₉H₁₇N₅S

4. **Fórmula estructural:**

a. **Diurón:**



b. **Ametrina:**



Ametrina

5. **Composición química:** 20% m/v Diurón + 30% m/v Ametrina

6. **Grupo químico:**

a. **Diurón:** Úrea

b. **Ametrina:** Triazina

7. **Clase del producto:** Herbicida.
8. **Tipo de formulación:** Suspensión concentrada (SC).
9. **Apariencia:** Líquido lechoso.
10. **pH:** 4,5
11. **Densidad:** 1,10 g/mL a 20 °C.
12. **Modo de acción y mecanismo de acción:** Razor® 50 SC es una mezcla de herbicidas selectivos que se usan de manera pre y pos emergente temprana en varios cultivos. Es un herbicida cuyos ingredientes activos, ametrina y diurón, actúan con diferentes mecanismos sobre las malezas.
- El diurón es un inhibidor de la fotosíntesis, es absorbido principalmente a través de raíces y en menor grado a través de follaje. Se trasloca acrópetamente (hacia arriba) a través del xilema, donde se acumula en meristemos apicales y hojas. El producto interfiere con el proceso de fotosíntesis, interrumpiendo la reacción del Hill. Por su parte, la ametrina se moviliza rápidamente a los tejidos fotosintéticos donde inhibe la reacción Hill, provocando la muerte de la planta.
13. **Forma de preparación de la mezcla:** Agitar bien el producto en su envase original, previo a la mezcla con agua. Llenar el tanque de mezcla con agua hasta la mitad, verter la dosis exacta de Razor® 50 SC y agitar bien la mezcla, hasta obtener una suspensión homogénea, terminar de llenar con agua.
14. **Equipo de aplicación:** La aplicación de Razor® 50 SC se puede efectuar con equipo terrestre, manual, de espalda o mecanizados, tractores con aguilones o boquillas (tipo abanico plano) que garantice una cobertura uniforme y total de las malezas. Para aplicaciones de bajo volumen utilice equipos de disco rotatorio que fraccionan las gotas por la fuerza centrífuga. Antes de cargarlo, se debe cerciorar que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado.
15. **Intervalo de aplicación:** Se recomienda realizar una única aplicación de Razor® 50 SC como herbicida pre-emergente o pos-emergente temprano.

16. Recomendaciones de uso: Razor® 50 SC está recomendado para el control de las siguientes malezas:

Nombre científico	Nombre común	Nombre científico	Nombre común
<i>Amaranthus</i> spp.	Bledo	<i>Ixophorus unisetus</i>	Zacate honduras
<i>Bidens pilosa</i>	Moriseco	<i>Leptochloa filiformis</i>	Cola de zorro
<i>Borreria</i> spp.	Chiquisacillo	<i>Melampodium americanum</i>	Flor amarilla
<i>Cenchrus echinatus</i>	Abrojo	<i>Setaria</i> spp.	Setaria
<i>Chenopodium</i> spp.	Apazote	<i>Sida</i> spp.	Escobilla
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaria	<i>Solanum americanum</i>	Tomatillo
<i>Drymaria cordata</i>	Cinquillo	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora
<i>Echinochloa colona</i>	Arrocillo	<i>Commelina diffusa</i>	Commelina
<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	<i>Galinsoga parviflora</i>	Mielcilla
<i>Emilia sonchifolia</i>	Pincelillo	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga

17. Recomendación de aplicación: El volumen de agua recomendado es desde 200 L/ha (140 L/mz) hasta 4.000 L/ha (2.800 L/mz).

Cultivo	Dosis	Periodo de Carencia*	Periodo de Reingreso**
Banano (<i>Musa</i> spp. Grupo AAA) Plátano (<i>Musa</i> spp. Grupo AAB)	1,5-2,5 L/ha (1-1,7 L/mz)	N.A.	24 horas
Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	4-5 L/ha (2,8-3,5 L/mz)	N.A.	24 horas
Piña (<i>Ananas Comosus</i>)	4-5 L/ha (2,8-3,5 L/mz)	N.A.	24 horas

* **Periodo de carencia:** intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

** **Periodo de reingreso al área tratada:** intervalo entre la última aplicación y el reingreso de personas o animales al área tratada.

N.A.: No aplica por la naturaleza del producto. Este herbicida se aplica al inicio del ciclo de cultivo o en estados muy tempranos. En el caso de piña, se recomienda no aplicarlo después de la inducción floral (8 meses antes de la cosecha).

18. Cuidados en la aplicación: En la aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar la ropa de protección: camisa de manga larga, pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar la llovizna de aspersión (deriva).

19. Compatibilidad con otros productos: Razor® 50 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola, pero no es compatible con productos alcalinos como sulfuro de calcio y carbonato de calcio.

20. Condiciones en que debe ser usado el producto: Agitar bien el producto en su envase original previo a la mezcla con agua. Llenar el tanque de mezcla hasta la mitad, verter la dosis exacta de Razor® 50 SC y agitar bien la mezcla para obtener una solución homogénea. Terminar de llenar con agua.

Después de cada aplicación, los utensilios empleados deben ser lavados en forma adecuada. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el sistema de alcantarillado público. Para la mezcla, aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar la ropa de protección adecuada: camisa de manga larga y pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar la llovizna de aspersión.

21. Presentaciones: 1, 2.5, 3.8, 5, 9.5, 20,-30, 60 y 200 litros.

22. Categoría toxicológica: CATEGORIA 4 (banda verde).

23. Ecotoxicología: Tóxico para peces o crustáceos.

24. Precauciones generales: No comer, beber o fumar durante la utilización de este producto. Lavarse las manos después de su manipulación o contacto. Limpiar a fondo el equipo después de utilizarlo. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el sistema de alcantarillado público.

LAQUINSA...trabajando siempre de la mano con el agricultor.