

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:
Ácido S-Abscísico 200 g/kg
Ingredientes inertes: c.s.p. 1 kilo

MODO DE ACCIÓN:

InGrain® 20 SG es un regulador de crecimiento de plantas que contiene Ácido S-abscísico (S-ABA), que incrementa el rendimiento del cultivo de arroz.

InGrain® 20 SG es un Fitorregulador de las plantas utilizado para aumentar el llenado de los granos de arroz. Actúa mejorando la translocación de carbohidratos a la panícula durante el proceso de llenado optimizando de esta forma el rendimiento de arroz cosechado por unidad de área y la calidad molinera.

CULTIVOS:

Arroz

OBJETIVO BIOLÓGICO

Incrementar el rendimiento del cultivo de arroz.

MODO Y EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda que los equipos estén, ajustados de tal forma que brinden buena cobertura y un tamaño uniforme gotas. Para un mayor efecto utilice boquillas que expulsen gotas de tamaño promedio de 200 micras o menos. Antes de utilizar el producto verifique que el equipo de aplicación este en buen estado de funcionamiento y calibrado. Al aplicar vía terrestre utilice equipo estacionario, de motor y de espalda utilizando volúmenes arriba de 200 litros/ha de agua. Al aplicar vía aérea utilice un volumen entre 12,5 a 80 litros/ha de agua.

COMPATIBILIDAD:

Si desea mezclar **InGrain® 20 SG** con algún tipo de insumo agrícola, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. **InGrain® 20 SG** es compatible con la mayoría de los productos que se utilizan como insumo agrícola en el cultivo de arroz.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos como fertilizantes, semillas, etc. Almacene y transporte este producto bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

TIPO DE FORMULACIÓN:

Gránulos Solubles - SG

MECANISMO DE ACCIÓN:

En arroz, el ácido abscísico promueve el movimiento hacia el grano de azúcares simples almacenados en forma de almidón en tallos y hojas. Esto mejora el llenado del grano, la calidad molinera y reduce el grano vano.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

TOXICOLOGÍA:

DL₅₀ Oral Aguda: >5000 mg/kg/peso/día
DL₅₀ Dermal Aguda: > 5000 mg/kg
Inhalatoria CL₅₀ > 5.33 mg/L/4H
Categoría toxicológica: 5 - Banda verde

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

No existe antídoto específico, aplicar tratamiento sintomático.

Anexos:

RECOMENDACIONES DE USO

MARCA	CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS DEL PRODUCTO		*PC DIAS	**PR HORAS
			g/ha	Kg/ha		
InGrain® 20 SG Reg. No. 5430	Arroz	Al inicio de llenado del grano.	30 – 60 Volumen de agua: Aplicación terrestre: 200 L/ha de agua	0.03 -0.06	0	0
			Aplicación aérea: 12,5 a 80 L/ha de agua			

* Periodo de carencia en días

** Periodo de Reentrada en Horas