

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

VERTIMEC® 1,8 EC
INSECTICIDA, ACARICIDA – AVERMECTINA
ABAMECTIN



DAÑO

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTES: 1-HEXANOL y 1-METIL-2-PIRROLIDONE
DENSIDAD: 0,96 g/mL a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Vertimec® 1,8 EC actúa por contacto e ingestión. Estimula la liberación del ácido Gamma-Amino butírico (GABA), en los artrópodos, inhibiendo la transmisión neuromuscular. Los insectos y ácaros sensibles a la Abamectina son paralizados y mueren.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Vertimec® 1,8 EC puede aplicarse usando bombas manuales o motorizadas de espalda o tractor, con boquillas para alto volumen, bajo volumen o ultra bajo volumen. Asegúrese que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado. Calibre usando agua antes de empezar el tratamiento. No debe aplicarse vía sistema de riego. Al equipo utilizado en la aplicación de Vertimec® 1,8 EC debe dársele el mantenimiento que el fabricante recomiende. Este producto no impone pautas de mantenimiento adicionales sobre los equipos de aplicación. Para realizar las aplicaciones se recomienda utilizar boquillas de cono lleno para lograr una buena cobertura del follaje. No tiene ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.

Además de las aplicaciones terrestres, en los cultivos de banano y plátano Vertimec® 1,8 EC también puede aplicarse vía aérea, por avión o helicóptero.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Vierta la cantidad de Vertimec® 1,8 EC necesaria en el tanque de atomización y agregue el agua hasta el volumen a preparar; agite y mantenga la agitación durante la aplicación. Atomice el cultivo totalmente, cubriendo el haz y envés del follaje. Siempre evite el goteo y las fugas incontroladas de producto. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores para líquidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos o brochas para limpiar el equipo tapado.

En los cultivos de banano y plátano se recomienda la aplicación de Vertimec® 1,8 EC en emulsión con 5 L/ha de aceite mineral y el 1% de emulsificante s/v del aceite (50 mL/ha) y agua, hasta alcanzar un volumen final de 26 L/ha. Se recomienda seguir el siguiente orden en la preparación de la mezcla:

1. Colocar el aceite mineral
2. Agregar el emulsificante y agitar durante 3 a 5 minutos
3. Agregar Vertimec® 1,8 EC y agitar durante 3 a 5 minutos
4. Agregar el agua hasta completar los 26 L/ha de volumen final de mezcla y agitar durante 5 minutos adicionales



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA	
Apio	<u>Apium graveolens</u>
Cítricos	<u>Citrus spp</u>
Fresas	<u>Fragaria spp</u>
Lechuga	<u>Lactuca sativa</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>
Banano y plátano	<u>Musa spp</u>
Ornamentales	

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR	
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>
Minadores	<u>Liriomyza sp</u>

Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Minadores	<u>Liriomyza sp</u>
Chile	<u>Capsicum spp</u>	Minadores	<u>Liriomyza sp</u>
		Paratrioza	<u>Bactericera cockerelli</u>
		Ácaro blanco	<u>Polyphagotarsonemus latus</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Melón y Sandía: Minadores: 300-400 mL/ha (210-280 mL/mz) en un volumen de agua: 400 L/ha (280 L/mz)

Tomate: Minadores: 0,5 – 1,0 L/ha (0,35 – 0,7 L/mz) en un volumen de agua de 600 L/ha (420 L/mz)

Chile: Minadores: 0,25 – 0,75 L/ha (0,18 – 0,53 L/mz). Paratrioza: 0,5 – 0,75 L/ha (0,35 – 0,53 L/mz) Acaro blanco: 0,5 – 1,0 L/ha (0,35 – 0,7 L/mz). Volumen de agua 600 L/ha (420 L/mz)

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA	
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Cucurbitáceas	
PLAGAS QUE CONTROLA	
Minadores	<u>Liriomyza sp</u>
Araña roja	<u>Tetranychus sp</u>

USOS AUTORIZADOS EN BELICE, HONDURAS, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA	
Apio	<u>Apium graveolens</u>
Cítricos	<u>Citrus spp</u>
Fresas	<u>Fragaria spp</u>
Lechuga	<u>Lactuca sativa</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>
Ornamentales	

USO AUTORIZADO EN BELICE Y HONDURAS	
Banano y plátano	<u>Musa spp</u>

PLAGAS QUE CONTROLA	
Minadores	<u>Liriomyza sp</u> <u>Phyllocnistis citrella</u>
Araña roja	<u>Tetranychus sp</u> <u>Stenotarsonemus pallidus</u>
Ácaros	<u>Oligonychus zeae</u>
Ácaro ancho	<u>Polyphagotarsonemus latus</u>
Ácaro tostador	<u>Phyllocoptruta oleivora</u>
Ácaro rojo	<u>Aculops lycopersici</u>
Gusano alfiler	<u>Keiferia sp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Melón y Sandía: Minadores: 300-400 mL/ha (210-280 mL/mz) – Volumen de agua: 400 L/ha

Pepino: Minadores: 0,3 – 1,2 L/ha – 60-100 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz – 60 mL/100 L de agua)

Apio: Minadores, Araña roja y Ácaro rojo: 0,3 – 1,2 L/ha – 60-100 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz – 60 mL/100 L de agua)

Cítricos: Ácaro ancho, Ácaro tostador y Minador de los cítricos: 0,5 – 1,5 L/ha – 20 mL/100 L de agua (0,35 – 1,05 L/mz + 0,25% de aceite mineral)

Fresas: Araña roja: 1,2 L/ha – 60 mL/100 L de agua (0,84 L/mz)

Lechuga: Minadores: 0,6 – 1,2 L/ha – 60-120 mL/ 100 L de agua (0,42 – 0,84 L/mz)

Papa: Minadores: 0,3 – 1,2 L/ha – 60 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz)

Tomate: Gusano alfiler, Ácaro rojo, Minadores y Araña roja: 0,3 – 1,2 L/ha – 60 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz – 100 mL/100 L de agua)

Ornamentales: Minadores y Araña roja: 0,5 – 1,5 L/ha – 25-50 mL / 100 L de agua (0,35 – 1,05 L/mz)

Banano y Plátano: Ácaros: 0.110 L/ha (0.077L/mz) en emulsión con 5L/ha (3.5 L/mz) de aceite mineral, para un volumen final de mezcla de 26 L/ha (18.2 L/mz)

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA			
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Minadores	<u>Liriomyza sp</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>		
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>		
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Gusano alfiler	<u>Keiferia sp</u>
		Ácaro rojo	<u>Aculops lycopersici</u>
Chayote	<u>Sechium edule</u>	Araña roja	<u>Tetranychus urticae</u>
Ornamentales		Araña roja	<u>Tetranychus urticae</u>
		Minadores	<u>Liriomyza sp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Melón y Sandía: Minadores: 0,3 – 1,2 L/ha – 60-100 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz – 60 mL/100 L de agua)

Tomate: Gusano alfiler y Ácaro rojo: 0,3 – 1,2 L/ha – 60 mL/100 L de agua (0,21 – 0,84 L/mz – 100 mL/100 L de agua)
Chayote: Araña roja: 0,2 – 0,3 L/ha – 40-60 mL / 100 L de agua (0,14 – 0,21 L/mz – 40 mL/100 L de agua)
Ornamentales: Minadores y Araña roja: 0,5 – 1,5 L/ha – 25-50 mL / 100 L de agua (0,35 – 1,05 L/mz)
Papa: Minadores: 0,2 – 0,3 L/ha (0,14 – 0,21 L/mz). Realizar las aplicaciones cuando la población supere las 3 minas/planta o se encuentren 5 adultos por planta.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Ácaros: Aplique tan pronto como aparezcan los ácaros o sus síntomas iniciales y repita aplicaciones las veces necesarias para mantener el control, sin realizar aplicaciones consecutivas.
Minadores: Aplique cuando aparezcan los adultos o sus picaduras, repita las aplicaciones las veces necesarias para mantener el control.
Gusano alfiler: Aplique cuando aparezcan los gusanos adultos o sus huevecillos y aplique las veces necesarias para mantener el control. Aplique con intervalos no menores de 7 días. Use las dosis altas recomendadas para controlar infecciones severas o cuando se trate de plantas grandes o follaje denso. Puede variar el volumen total de aplicación con el tamaño del cultivo, pero la dosis mínima (mL/100) especificada arriba, debe observarse siempre.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Apio, Lechuga, Melón, Pepino, Sandía, Chayote, Tomate, Chile y Cítricos: 7 días. **Papa:** 14 días. **Fresa:** 3 días. **Ornamentales, banano y plátano:** 0 días
Ornamentales de flor o follaje pueden cosecharse el mismo día de la aplicación, siempre que los depósitos de aspersión hayan secado.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Se puede reingresar al área tratada una vez seco el rocío de aspersión; de lo contrario, se recomienda a los encargados de aplicar el producto, usar el equipo de protección indicado.

FITOTOXICIDAD: Es seguro para los cultivos y dosis recomendadas en este panfleto. No utilice este producto en helechos del género **Adiantum spp**, ni en margaritas del género **Leucanthemum spp**. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y productos nutricionales de uso agrícola. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicina, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado del calor o del fuego. Conserve o almacene este producto en su envase original, etiquetado y debidamente cerrado. Transporte y almacene aparte de herbicidas. **Vertimec® 1,8 EC** no es inflamable ni corrosivo, pero no debe colocarse cerca de fuentes de calor intenso.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los síntomas de intoxicación incluyen midriasis (dilatación de las pupilas), ataxia (mareos) y temblores musculares.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, porque se puede producir una aspiración pulmonar. Si la persona está consciente, dé a beber de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua y llame inmediatamente a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada y expóngalo al aire fresco y ventilado.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese cuidadosamente con agua y jabón. Si continúa la molestia, busque atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No se conoce antídoto específico. El tratamiento es sintomático, administrando fluidos en abundancia si el paciente ha ingerido el producto.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560/ 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028

PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-496
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

TÓXICO PARA ABEJAS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.



AVISO DE GARANTÍA:
El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:
Syngenta Crop Protection Monthey, S.A.
CH-1870, Monthey Suiza
Tel.: 0041 24 475 2200

IMPORTADO POR:

Guatemala: Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º nivel
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice: James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel: 277-070; Fax 275-593

El Salvador: Tecunsal, S.A. de C.V.
Km 9.5 Carretera Puerto La Libertad, Antiguo Cuscatlán
La Libertad, El Salvador. Tel. 503 2121-2000

Honduras:

Nicaragua: Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua. Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica: Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría, Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret, Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá: Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987. Business Park Costa del Este. Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12. Ciudad de Panamá. República de Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana: Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana. Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo. Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-193A	23-07-12
BELICE	0260-3	28-11-16
EL SALVADOR	AG-98-10-515	08-10-13
HONDURAS	235-118-III	14-11-13
NICARAGUA	Sy-01G-2014	26-03-14
COSTA RICA	2651	04-05-93
PANAMÁ	1843	14-01-16
REPÚBLICA DOMINICANA	920	03-08-09