

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



InGrain® 20 SG

SUSTANCIA AFÍN, REGULADOR DE CRECIMIENTO - HORMONA VEGETAL
S-ABSCISIC ACID (S-ABA)

ATENCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

USO AGRONÓMICO: Regulador de crecimiento.

MODO DE ACCIÓN: InGrain 20 SG es un regulador de crecimiento de plantas que contiene Ácido S-abcísico (S-ABA), que incrementa el rendimiento del cultivo de arroz.

InGrain 20 SG es un Fitorregulador de las plantas utilizado para aumentar el llenado de los granos de arroz. Actúa mejorando la translocación de carbohidratos a la panícula durante el proceso de llenado, optimizando de esta forma el rendimiento de arroz cosechado por unidad de área y la calidad molinera.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda que los equipos estén, ajustados de tal forma que brinden buena cobertura y un tamaño uniforme gotas. Para un mayor efecto utilice boquillas que expulsen gotas de tamaño promedio de 200 micras o menos. Antes de utilizar el producto verifique que el equipo de aplicación este en buen estado de funcionamiento y calibrado. Al aplicar vía terrestre utilice equipo estacionario, de motor y de espalda utilizando volúmenes arriba de 200 litros/ha de agua. Al aplicar vía aérea utilice un volumen entre 12,5 a 80 litros/ha de agua.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: En el tanque del equipo de aplicación agregue la mitad del volumen de agua a utilizar y diluya la dosis correcta de **InGrain 20 SG**, y mezcle constantemente hasta dejarlo en suspensión, luego llene el tanque del equipo de aplicación con agua hasta completar el volumen final deseado.

El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Usar guantes, botas de hule, mascarilla, anteojos, mientras manipule, aplique, o lave el equipo. No coma, fume o beba cuando manipule el producto. Báñese y cambie de ropa después de la aspersión.

Para mejores resultados el pH del agua debe ser de 5-7.

RECOMENDACIONES DE USO:

País: Costa Rica



CULTIVO	DOSIS	INTERVALO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
ARROZ <i>(Oryza sativa)</i>	0,03 a 0,06 kg /ha (30 a 60 g/ha) Volumen de agua: Aplicación terrestre: 200 L/ha de agua Aplicación aérea: 12,5 a 80 L/ha de agua	Realice una (1) sola aplicación al follaje en la etapa de llenado temprano o grano lechoso (80-90 días después de la siembra).

CULTIVOS Y PLAGAS A CONTROLAR: Ver cuadro de recomendaciones de uso.

DOSIS: Ver cuadro de recomendaciones de uso.

INTRUCCIONES DE USO Y MÉTODOS DE APLICACIÓN: Ver cuadro de recomendaciones de uso.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Ver cuadro de recomendaciones de uso.

PERIODO DE CARENIA:

Arroz: 0 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Sin restricciones.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Si desea mezclar **InGrain 20 SG** con algún tipo de insumo agrícola, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad. InGrain 20 SG es compatible con la mayoría de los productos que se utilizan como insumo agrícola en el cultivo de arroz.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños y de los animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Posible irritación dérmica y ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).