

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



The Chemical Company

KUMULUS® 80 WG

FUNGICIDA – INORGÁNICO
AZUFRE

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

Densidad: 1,26 g/cm³ a 25 ° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE
INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A
LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

KUMULUS 80 WG es un fungicida, protectante, que inhibe
el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor.
Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise
cuidadosamente que esté en buen estado de
funcionamiento. Antes de aplicar **KUMULUS 80 WG**,
calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que
está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar
boquillas de cono hueco. Para dosificar la cantidad
correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar
un tazón medidor o balanza. Después de la aplicación lave
el equipo de aspersión, con agua y jabón, deje secarlo y
guárdelo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y
manipular **KUMULUS 80 WG**. Como con todos los
productos químicos **evite en lo posible el contacto con la
solución.**

No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de
este producto.

De acuerdo con la dosis de **KUMULUS 80 WG** a utilizar,
mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad;
seguidamente complete el volumen de agua requerido.
Agite para obtener una mezcla homogénea antes de
comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a
50 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285–570
litros de agua por hectárea. Después de la aplicación, lave
el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y
guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA Y EL SALVADOR:

Cítricos
Güicoy
Melón
Papa
Pepino
Remolacha
Rosas
Sandía
Tomate

Citrus spp
Cucurbita pepo
Cucumis melo
Solanum tuberosum
Cucumis sativus
Beta vulgaris
Rosa spp
Citrullus vulgaris
Lycopersicon esculentum

USOS AUTORIZADOS EN HONDURAS Y REP. DOMINICANA:

Arroz
Arveja
Brócoli
Chile
Cítricos
Coliflor
Frijol
Güicoy, Zapallo, Zuchini
Lechosa
Mango
Melón
Ornamentales
Papa
Pepino
Remolacha
Repollo
Rosas
Sandía
Tomate

Oryza sativa
Pisum sp
Brassica oleracea var. italica
Capsicum sp
Citrus spp
Brassica oleracea var. botrytis
Phaseolus vulgaris
Cucurbita pepo
Carica papaya
Mangifera indica
Cucumis melo

Solanum tuberosum
Cucumis sativus
Beta vulgaris
Brassica oleracea var. capitata
Rosa spp
Citrullus vulgaris
Lycopersicon esculentum

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

Arveja
Brócoli
Chile
Cítricos
Coliflor
Frijol
Mango
Melón
Ornamentales
Papa
Papaya
Pepino
Repollo
Tomate

Pisum sp
Brassica oleracea var. italica
Capsicum sp
Citrus spp
Brassica oleracea var. botrytis
Phaseolus vulgaris
Mangifera indica
Cucumis melo

Solanum tuberosum
Carica sp
Cucumis sativus
Brassica oleracea var. capitata
Lycopersicon esculentum

PLAGAS A CONTROLAR:

Acaro del arroz
Acaro del tostado
Acaro de las yemas
Mancha de hoja
Mildiu polvoriento
Oidio
Oidio
Oidio
Oidio
Acaros
Oidio
Mancha negra

Schizotetranychus paezi
Phyllocoptruta oleivora
Aceria sheldoni
Eotetranychus banski
Leveillula taurica
Erysiphe cichoracearum
Oidium caricae
Sphaerotheca fuliginea
Erysiphe cichoracearum
Leveillula lanuginosa
Phyllocoptruta oleivora
Sphaerotheca pannosa
Diplocarpon rosae

DOSIS RECOMENDADAS:

4 a 5 kilogramos por hectárea. 250 g/100 litros de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Cuando aparecen los primeros síntomas, repetir cada 15 días o de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. No aplique **KUMULUS 80 WG** cuando hayan altas temperaturas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No tiene restricción, cuando se usa solo el producto.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ninguna, cuando se usa solo.

FITOTOXICIDAD:

El azufre puede provocar quemaduras en el follaje cuando hay temperatura alta y fuerte radiación solar; por lo tanto, se recomienda utilizar las dosis más bajas cuando las temperaturas son mayores de 30°C. Se recomienda en estos casos aumentar el volumen de agua a utilizar.

COMPATIBILIDAD:

KUMULUS 80 WG puede mezclarse con otros plaguicidas de uso común en agricultura, siempre y cuando la mezcla se haga un poco antes del uso. **KUMULUS 80 WG** es incompatible con nitrofenoles y aceites.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte **KUMULUS 80 WG** junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego entierre los residuos en lugares alejados de fuentes de agua y casas de habitación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE FUERA EL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua, buscar ayuda médica.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	225-13560/ 223-20735
KARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL	BELICE	2-30778
CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, HOSPITAL San Rafael, SANTA TECLA	EL SALVADOR	222-81740/ 228-80417
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, SANIDAD VEGETAL	HONDURAS	232-6213
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	2897150 2893328
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2223-1028/ 2222-0122/ 911

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS

PANAMÁ

523-4948

HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.

REP. DOMINICANA

681-2181

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.

681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Se sugiere preparar la mezcla a utilizar durante el día. Se sugiere preparar la mezcla a utilizar durante el día.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

BASF SE, BASF Societas Europaea,
67056 Ludwigshafen,
Alemania

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:

BASF DE GUATEMALA S.A.
Av. Petapa 47-3 Zona 12, Ciudad de Guatemala
Tel: 2445-7600 Fax: 2445-7699

EL SALVADOR:

BASF DE EL SALVADOR
89 ave. Norte Edif. World Trade Center, Torre II, 3er Nivel, Local No. 313, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador.
Tel.: 2264-0770, Fax: 2264-0775

COSTA RICA:

BASF COSTA RICA S.A.
Edificio Los Balcones, Plaza Roble, Escazú,
San José de Costa Rica
Tel: 2 201-1900, Fax: 2 201-8221

PANAMA:

FERTICA Fertilizantes de Centroamérica, S.A.,
Carretera Interamericana, David, Chiriquí, Panamá
Tel: 775-2512, Fax: 775-8382

REPÚBLICA DOMINICANA:

BASF DOMINICANA
Av. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Edificio Rogama, Tercer Nivel
Santo Domingo - República Dominicana
Tel: 334 10 26, Fax: 334 10 27

DISTRIBUIDOR POR:

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-82	18-09-02
BELICE		
EL SALVADOR	AG. 96-06-345	27-06-04
HONDURAS	241-121-II	07-06-01
NICARAGUA		
COSTA RICA	2525	14-05-90
PANAMÁ	5091	18-12-07
REP. DOMINICANA	2342	28-08-03

06-octubre-2008

V1