

manvert movili-Ca

BIOESTIMULANTE

manvert movili-Ca es una mezcla sólida que contiene calcio complejo, aminoácidos libres y PACaR (Promotor de Absorción de Calcio Radicular) para aplicación radicular. PACaR es un movilizador del calcio desde la raíz al resto de la planta, así como metabolizador y sinergizador de las funciones del Ca en las células de la planta. **Consigue:**

- Disminución de frutos con cracking
- Disminución de alteración de daños en piel
- Mejora la calidad de los frutos, aumentando la dureza
- Reducción de fisiopatías de calcio
- Mayor vida post-cosecha, alargando la calidad del fruto durante más tiempo

Composición química

	%p/p
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua y complejo	18,0
Aminoácidos libres	2,0
Agente complejante: Ácido lignosulfónico	

MEJORA LA CALIDAD POSCOSECHA Y REDUCE FISIOPATÍAS DE CALCIO



MÁXIMA EFICACIA:

Tratamiento conjunto de **manvert win-Ca** + **manvert movili-Ca**

Beneficios

- > manvert movili-Ca tiene un elevado contenido del complejo PACaR (Promotores de Absorción de Calcio Radicular).
- > manvert movili-Ca **aporta calcio** asimilable al suelo y **mejora su asimilación** por parte de la raíz.
- > manvert movili-Ca **moviliza el calcio** en el interior de la planta y **acelera los procesos del metabolismo del calcio**, especialmente su incorporación a las paredes celulares.
- > manvert movili-Ca **proporciona mayor dureza de los frutos**, reduce las fisiopatías asociadas al metabolismo del calcio, como cracking y bitter-pit, redundando en una **mejor calidad de la cosecha** y facilitando una **mejor conservación** durante el transporte y almacenamiento.

Aplicaciones y recomendaciones de uso

manvert movili-Ca se aplica vía suelo al inicio del ciclo del cultivo, con especial énfasis en los periodos de máxima demanda de calcio por parte del mismo.

Realizar las aplicaciones antes del momento de máxima absorción de calcio del cultivo. Se recomienda aplicar junto con una fuente de calcio. **Frutales:** Aplicación en el momento de caída de pétalos-cuajado, 3 aplicaciones a 1,5 Kg/Ha, con una cadencia semanal. **Arándano:** 4 aplicaciones. 1ª aplicación al 5 % de floración, con una cadencia semanal. Dosis 1 Kg/Ha. **Piña:** iniciar las aplicaciones 21 días después de forzamiento (ddf), anticipándose al momento de la máxima absorción de calcio en el cultivo de la piña. Con una cadencia entre aplicaciones de 20 a 40 días, hasta completar un total de 4 aplicaciones. Dosis de 1,5 Kg/Ha.

COMO MOVILIZADOR DE CALCIO:

Aporte de calcio al inicio de ciclo para máximo aprovechamiento:

Aplicar 1,5 Kg/Ha. Aplicación en el momento de caída de pétalos-cuajado, y repetir al cabo de 7 días con un mínimo de 3 aplicaciones.

Observaciones

manvert movili-Ca es compatible con la mayoría de fertilizantes y pesticidas utilizados habitualmente en fertirrigación, excepto los de reacción alcalina y los que tienen una concentración elevada de fósforo (superior al 8 %).



Formulación
sólida



Aplicación
por irrigación



Aminoácidos

