

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

MERTECT® 50 SC

FUNGICIDA – BENZIMIDAZOL
THIABENDAZOLE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,169 g/mL a 20-25° C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:
MERTECT® 50 SC es un fungicida sistémico y de amplio espectro, con acción protectante y curativa, para uso en pre y post-cosecha en varios cultivos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
Uso en pre-cosecha: Puede ser aplicado dirigido al follaje y a la base de la planta según sea la enfermedad objetivo de control, utilizando cualquier equipo convencional terrestre asegurando una buena cobertura de aplicación.
Aplicación de la mezcla para bananos en post-cosecha: Mantenga la agitación mientras use la mezcla fungicida. La mezcla fungicida se puede aplicar por rocío, tanto en cámaras automáticas, boquillas individuales colgantes o con bombas de atomización de espalda manuales, con boquillas de cono hueco. También se puede aplicar utilizando cascadas con recirculación o por inmersión. El equipo debe estar en buenas condiciones de uso y calibrado. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
En un recipiente para 10 o más litros, mezcle la dosis de MERTECT® 50 SC en agua. Con agitación constante, agregue esta mezcla en el tanque que contendrá la mezcla final y adicione la cantidad de agua necesaria hasta alcanzar el volumen requerido. Si es para inmersión, llene el recipiente de mezcla hasta la mitad, agregue la dosis recomendada de MERTECT® 50 SC y sumerja la fruta en esta mezcla. Evite el contacto con la piel y los ojos cuando manipule el producto y antes de comer, beber o fumar. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de usarla otra vez.



RECOMENDACIONES DE USO:

Usos autorizados en Guatemala, Belice, Honduras, Panamá y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES
Banano y plátano <u>Musa spp</u>	Complejo de la pudrición del cuello, de los dedos y de la corona <u>Colletotrichum musae</u> <u>Botryodiplodia theobromae</u> <u>Fusarium semitectum</u> <u>Fusarium roseum</u> <u>Deightoniella torulosa</u> <u>Ceratocystis paradoxa</u> <u>Penicillium spp</u> <u>Verticillium theobromae</u> <u>Nigrospora spp</u> <u>Phyllostictina musarum</u>
Mango <u>Manquifera indica</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum spp</u>

Usos autorizados en Guatemala, Belice, Honduras, Panamá y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES
Melón <u>Cucumis melo</u> Otras Cucurbitáceas <u>Cucurbita spp</u> <u>Citrullus spp</u>	Mildiu polvoriento <u>Erysiphe cichoracearum</u> Gomosis <u>Mycosphaerella spp</u> Fusariosis <u>Fusarium spp</u>

Uso autorizado en Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES
Cebolla <u>Allium cepa</u>	Moho blanco <u>Sclerotium cepivorum</u> Pudrición del cuello <u>Botrytis spp</u>

Uso autorizado en Belice, Honduras y Nicaragua

CULTIVO	ENFERMEDADES
Cítricos <u>Citrus spp</u>	Pudrición de la flor: <u>Botrytis cinerea</u> <u>Penicillium spp</u> Moho azul <u>Penicillium italicum</u> Moho verde <u>Penicillium digitatum</u> Podredumbre del tallo: <u>Diplodia natalensis</u> <u>Phomopsis citri</u>

Uso autorizado en Guatemala, Belice y Honduras

CULTIVO	ENFERMEDADES
Piña <u>Ananas comosus</u>	Pudrición del fruto <u>Fusarium spp</u> <u>Ceratocystis paradoxa</u>

Uso autorizado en Nicaragua, Panamá y República Dominicana

CULTIVO	ENFERMEDADES
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Tizón <u>Pyricularia oryzae</u> Mancha castaña <u>Cercospora oryzae</u> Quemado de la vaina <u>Rhizoctonia solani</u>

Usos autorizados en Nicaragua

CULTIVO	ENFERMEDADES
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Pudrición del tubérculo <u>Rhizoctonia spp</u> <u>Phoma spp</u> <u>Fusarium spp</u>
Mango <u>Manquifera indica</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum spp</u>

Usos autorizados en Guatemala y Honduras

CULTIVO	ENFERMEDADES
Papa <u>Solanum tuberosum</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Chile <u>Capsicum spp</u>	Pudrición vascular <u>Fusarium spp</u>
Papaya <u>Carica papaya</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum spp</u>

Usos autorizados en El Salvador

CULTIVO	ENFERMEDADES
Papa <u>Solanum tuberosum</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Chile <u>Capsicum spp</u>	Pudrición vascular <u>Fusarium spp</u>

Usos autorizados en Costa Rica

CULTIVO	ENFERMEDADES
Banano <u>Musa spp</u>	Complejo de la pudrición del cuello, de los dedos y de la corona <u>Colletotrichum musae</u>

	<u>Botryodiplodia theobromae</u> <u>Fusarium semitectum</u> <u>Fusarium roseum</u> <u>Deightoniella torulosa</u> <u>Ceratocystis paradoxa</u> <u>Penicillium spp</u> <u>Verticillium theobromae</u> <u>Nigrospora spp</u> <u>Phyllostictina musarum</u>
Mango <u>Manquifera indica</u>	Antracnosis <u>Colletotrichum spp</u>
Cebolla <u>Allium cepa</u>	Moho blanco <u>Sclerotium cepivorum</u> Pudrición del cuello <u>Botrytis spp</u>
Cítricos <u>Citrus spp</u>	Pudrición de la flor <u>Botrytis cinerea</u> <u>Penicillium spp</u> Moho azul <u>Penicillium italicum</u> Moho verde <u>Penicillium digitatum</u> Podredumbre del tallo: <u>Diplodia natalensis</u> <u>Phomopsis citri</u>
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Tizón <u>Pyricularia oryzae</u> Mancha castaña <u>Cercospora oryzae</u> Quemado de la vaina <u>Rhizoctonia solani</u>
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Pudrición del tubérculo <u>Rhizoctonia spp</u> <u>Phoma spp</u> <u>Fusarium spp</u>
Remolacha <u>Beta vulgaris</u>	Mancha de la hoja <u>Cercospora beticola</u>
Soya <u>Glycine max</u>	Complejo del tallo, vaina y hojas <u>Colletotrichum spp</u> <u>Cercospora spp</u> <u>Septoria spp</u> <u>Diaphorte spp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:
Para Banano – Costa Rica y Panamá:
Pre-cosecha: 72 mL/ha
Post-cosecha: Mercado cercano: 40 mL/100 litros de agua (1 semana)
Mercado lejano: 290 mL/100 litros de agua (> 1 semana)
Para Banano y Plátano:
Pre-cosecha: 72 mL/ha
Post-cosecha: Mercado cercano: 40 mL/100 litros de agua (1 semana)
Mercado lejano: 80 mL/100 litros de agua (> 1 semana)
Para Mango:
Post-cosecha: 200 – 500 mL/100 litros de agua
Para Melón y otras Cucurbitáceas:
Pre-cosecha: 120 – 270 mL/100 litros de agua
Post-cosecha: 200 – 300 mL/100 litros de agua
Para Cebolla:
Inmersión de semillas: 180 – 360 mL/100 litros de agua
Aplicación foliar o al suelo: 2,500 – 3,600 mL/ha
Para Cítricos:
Follaje: 60 – 180 mL/100 litros de agua
Post-cosecha: 400 – 1,000 mL/100 litros de agua
Para Piña:
Post-cosecha: 500 mL/100 litros de agua
Para Arroz:
Aplicación foliar: 220 – 630 mL/ha
Para Papa:
Inmersión de semilla: 360 – 480 mL/ha (252 – 336 mL/mz)
Para Remolacha:
Pre-cosecha: 400 mL/ha
Para Soya:
Pre-cosecha: 500 mL/ha
Para Papaya:
Post-cosecha: 40 mL/100 litros de agua (200 ppm)
Para Papa, Tomate y Chile:
Aplicación drench (pre-cosecha): 400 - 500 mL/ha (280 – 350 mL/mz)

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Arroz, Tomate y Chile: 15 días
Cebolla, Remolacha y Soya: 7 días
Melón: 3 días
Banano, Plátano, Cítricos, Piña, Mango, Papaya y Papa: No hay restricción alguna.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
No hay restricción alguna.

FITOTOXICIDAD:
Este producto no es fitotóxico si se aplica conforme a las recomendaciones de este panfleto y de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD:
MERTECT® 50 SC es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comerciales utilizados en la producción bananera. Sin embargo, se recomienda, bajo la responsabilidad del usuario, hacer una prueba previa de compatibilidad, consultando las etiquetas de los productos que deseen mezclar.
MERTECT® 50 SC es incompatible con productos de cobre y agentes oxidantes tales como cloratos y nitratos. Es compatible con soluciones de alumbre de hasta 1% de concentración de alumbre. El agua dura o altamente alcalina puede causar precipitación del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transporte junto con productos de consumo animal y humano. Transportélo en su envase original bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
No se conocen síntomas de intoxicación en humanos, siempre que el producto se utilice adecuadamente y en la forma recomendada en la etiqueta y el panfleto.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No inducir el vómito. Si la persona está consciente, dar a beber cuatro (4) cucharadas de carbón activado en medio (1/2) vaso de agua. Buscar ayuda médica.
POR INHALACIÓN: Evite la inhalación del producto. En caso de indisposición, retire a la persona afectada a un área bien ventilada, protegiéndola de la hipotermia.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua limpia durante 15 minutos como mínimo. Si la molestia persiste, obtenga atención médica.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:
Syngenta, S. A.
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:

Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel.: 2312-7000. Fax: 2312-7005

Belice:
James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street, Ciudad de Belice
Tel. 277-070. Fax: 275-593

El Salvador:
Proagro, S. A.
Edificio Fertica. 5ª. Ave. Norte y 19 Calle Poniente,
San Salvador, El Salvador. Tel. 503 2234-0444

Honduras:

Nicaragua:
Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-159A	23-07-12
BELICE	0078-2	28-11-11
EL SALVADOR	AG-2013-11-974	21-11-13
HONDURAS	244-122-II	02-12-13
NICARAGUA	Sy-192A-2-92	01-06-11
COSTA RICA	2973	01-11-90
PANAMÁ	1212	26-08-09
REPÚBLICA DOMINICANA	1998	02-02-15