

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

MATCH® 5 EC

INSECTICIDA - BENZAMIDA
LUFENURON

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: CICLOHEXANONA Y
MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
DENSIDAD: 0,94 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

MATCH® 5 EC interfiere la formación de quitina en las larvas que ha penetrado el producto por vía estomacal. MATCH® 5 EC es efectivo contra las larvas grandes y pequeñas. Sin embargo, para mejores resultados, se recomienda aplicar cuando las larvas aparecen.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Para lograr una distribución adecuada del volumen de mezcla, deberá calibrarse convenientemente el equipo de aplicación. Asegúrese que dicho equipo esté en buenas condiciones. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.)



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Después de agregar la cantidad recomendada del producto en agua limpia, agite bien la mezcla y aplíquela. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



RECOMENDACIONES DE USO:

Guatemala y Honduras

CULTIVOS	INSECTOS
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Gusano soldado, Prodenia <u>Spodoptera spp</u> Falso medidor <u>Trichoplusia spp</u> Medidor <u>Pseudoplusia spp</u> Alabama <u>Alabama argillacea</u>
Maíz <u>Zea mays</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u>
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Prodenia <u>Spodoptera sunia</u> Gusano del fruto <u>Heliothis spp</u> Falso medidor <u>Trichoplusia ni</u>

El Salvador

CULTIVOS	INSECTOS
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Gusano soldado, Prodenia <u>Spodoptera spp</u> Falso medidor <u>Trichoplusia spp</u> Medidor <u>Pseudoplusia spp</u> Alabama <u>Alabama argillacea</u>
Maíz <u>Zea mays</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u>
Hortalizas	Gusano soldado <u>Spodoptera exigua</u> Prodenia <u>Spodoptera sunia</u> Palomilla dorso de diamante <u>Plutella xylostella</u> Mariposa blanca <u>Pieris rapae</u> Gusano del repollo <u>Leptophobia aripa</u> Gusano defoliador <u>Mamestra brassicae</u> Gusano del fruto <u>Heliothis spp</u> Falso medidor <u>Trichoplusia spp</u> Trips <u>Frankliniella occidentalis</u> Vaquita <u>Leptinotarsa decemlineata</u>

Nicaragua

CULTIVOS	INSECTOS
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Gusano soldado, Prodenia <u>Spodoptera spp</u> Falso medidor <u>Trichoplusia spp</u> Medidor <u>Pseudoplusia spp</u> Alabama <u>Alabama argillacea</u>
Maíz <u>Zea mays</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u>
Hortalizas Rapollo <u>Brassica oleracea</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Polilla del repollo <u>Plutella xylostella</u> Barrenador del fruto <u>Heliothis zea</u> Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>

Costa Rica

CULTIVOS	INSECTOS
Maíz <u>Zea mays</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u>
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Gusano alfiler <u>Keiferia lycopersicella</u>

Panamá

CULTIVOS	INSECTOS
Maíz <u>Zea mays</u> Sorgo <u>Sorghum vulgare</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u> Gusano de mazorca <u>Heliothis zea</u>
Hortalizas Rapollo <u>Brassica oleracea</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Polilla del repollo <u>Plutella xylostella</u> Barrenador del fruto <u>Heliothis zea</u> Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>

República Dominicana

CULTIVOS	INSECTOS
Hortalizas	Gusano soldado <u>Spodoptera exigua</u> Prodenia <u>Spodoptera sunia</u> Palomilla dorso de diamante <u>Plutella xylostella</u>

	Gusano del repollo <i>Pieris rapae</i> Gusano del repollo <i>Leptophobia aripa</i> Gusano defoliador <i>Mamestra brassicae</i> Gusano de la yema <i>Heliothis spp</i> Falso medidor <i>Trichoplusia spp</i> Trips <i>Frankliniella occidentalis</i> Vaquita <i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Gusano soldado <i>Spodoptera spp</i> Palomilla de la papa <i>Phthorimaea operculella</i> Gusano cornudo <i>Manduca sexta</i>

DOSIS RECOMENDADAS:

Algodón: 0,315 – 0,360 L/ha aplicado con equipo aéreo a 27 L/ha de agua (0,220 – 0,252 L/mz)

Maíz: 0,12 L/ha (0,08 L/mz)

Tomate: 0,25 – 0,30 L/ha (0,175- 0,21 L/mz)

Hortalizas: 0,40 – 0,50 L/ha ó 100 – 125 mL/200 litros de agua (0,28 – 0,35 L/mz)

Tabaco: 0,50 L/ha (0,35 L/mz)

Sorgo: 0,16 – 0,24 L/ha dependiendo de la intensidad del ataque y la edad del cultivo (0,11 – 0,17 L/mz)

Repollo y papa: 0,4 – 0,5 L/ha ó 100 – 125 mL en 200 litros de agua.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Algodón, maíz, tomate, hortalizas, repollo, papa y tabaco: Iniciar la aplicación con la presencia de larvas jóvenes preferiblemente.

Sorgo: Apenas aparezcan las primeras larvas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Algodón, tomate, hortalizas y tabaco: 2-3 aplicaciones como máximo, alternando con otros insecticidas.

Maíz: 7 – 14 días en rotación con otros insecticidas.

Sorgo: Repetir en 7 – 10 días, en rotación con otros insecticidas si fuera necesario.

OBSERVACIONES: Hacer las aplicaciones en horas frescas, al haber mayor actividad de la plaga. Lograr buena cobertura de toda la planta.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Algodón: Suspender la aplicación 28 días antes de la cosecha.

Tomate, papa, maíz y sorgo: Suspender la aplicación 7 días antes de la cosecha.

Tabaco: Suspender la aplicación 14 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Campos tratados pueden ser inspeccionados hasta que el depósito de la aspersión esté completamente seco.

FITOTOXICIDAD:

MATCH® 5 EC aplicado a las dosis recomendadas, no es fitotóxico a los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD:

Aunque **MATCH® 5 EC** es compatible con la mayoría de los insecticidas de reacción neutra, recomendamos hacer aplicaciones sólo con **MATCH® 5 EC** para obtener la mayor eficacia del producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

MATCH® 5 EC es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénalo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas específicos en humanos. Puede ser irritante a los ojos y a la piel. Puede causar sensibilización por contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con grandes cantidades de agua. Contacte a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y expóngala al aire fresco y ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	251-3560 y 232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	288-0417
HONDURAS	Secretaría de Agricultura y Ganadería, Sanidad Vegetal	232-6213 y 235-8424
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	289-7150, ext. 213
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.



No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta transcurrido un mes después de efectuada la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Si el producto mezclado se derrama, absórvalo con aserrín. Colóquelo luego dentro de un saco o bolsa plástica y llévelo a un sitio adecuado (lejos de fuentes de agua, cultivos o zonas habitadas, mínimo 1000 metros de éstos) para su enterrado. Proceda de la misma forma con los envases vacíos, perfórelos primero. No use de nuevo los recipientes vacíos para ningún otro propósito; especialmente no los use para alimentos, forraje o agua para beber.

Los envases vacíos deben lavarse tres veces; el agua del lavado deberá agregarse a la mezcla.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FABRICANTE:**Syngenta, S.A.**

Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.

Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:**Guatemala:****Agroinsumos, S.A.**

6ª Avenida 7-39 zona 10, Edificio Las Brisas, 5to. Nivel,

Tel. 339-8100 / Fax 339-8105

El Salvador:**TECUNSAL, S.A. de C.V.**

Boulevard Construcción y Calle San Francisco # 541, San Salvador.

Tel.: 262-4022. Fax: 262-2323

Honduras:**SEAGRO**

12 calle, 4ª avenida Suroeste, San Pedro Sula

Tel.: 552-1612. Fax: 552-7999

Nicaragua:**CISA AGRO – Comercial Internacional Agrícola, S.A.**

Km 6 1/2 , Carretera Norte, Managua

Tel.: 249-0049. Fax: 249-2090

Costa Rica:**Syngenta Costa Rica, S.A.,**

Ultrapark Edificio 7B, 3er. Piso, 1 km al noroeste del Centro Comercial

Plaza Real Cariari, La Aurora de Heredia.

Tel. 293-9500 / Fax 293-1628

Panamá:**MELO & Cia., S.A.**

Calle 11, Río Abajo, Panamá

Tel.: 293-9500. Fax: 323-6933

República Dominicana:**Syngenta Dominicana, S.A.**

Víctor Garrido Puello No. 14, Edificio Profesional Doña Ana, Local 203

Ensanche Piantini, Apartado Postal 30303 (La Fe). Santo Domingo

Tel.: 227-0414. Fax 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-189A	16-11-00
BELICE		
EL SALVADOR	AG-96-8-361	20-08-99
HONDURAS	454-228-III	10-12-01
NICARAGUA	Sy-222A-1-97	27-05-02
COSTA RICA	4354	28-05-99
PANAMÁ	1400cb	02-02-01
REPÚBLICA DOMINICANA	1499	04-07-00