



**FUNGICIDA - BENZIMIDAZOL
CARBENDAZIM**

ANTÍDOTO: NO TIENE

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"



USO AGRONÓMICO

EQUIPO DE APLICACIÓN:

DEROZIM 50 SC se aplica generalmente con bombas aspersoras de mochila convencional. Es necesario verificar que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado de funcionamiento, y libre de fugas. Previo a la aplicación es recomendable calibrar el equipo para garantizar una cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de tipo cónico 8002. Utilice el siguiente equipo de aplicación: Botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

La mezcla de aplicación se prepara haciendo primero una pre-mezcla de DEROZIM 50 SC y poca agua. Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregue la dosis correcta de DEROZIM 50 SC, agítelo bien y complete el volumen de agua. La agitación debe de ser continua para mantener el material en suspensión. No se debe dejar la mezcla para usarla otro día. DEROZIM 50 SC es de acción sistémica por lo que se recomienda que todo el tejido vegetal sea asperjado. Terminada la aplicación lave bien el equipo, evitando de no contaminar fuentes de agua, ríos, lagos o estanques. Mantenga su equipo de aplicación en buenas condiciones.



RECOMENDACIONES DE USO PARA GUATEMALA:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Trigo, (Triticum aestivum)	Tallo roto (Cercospora herpotrichoides)	0.25 L/Ha 0.18 L/Mz
ASPERJAR DESDE EL INICIO DEL AMACOLLAMIENTO HASTA QUE APAREZCA EL SEGUNDO NUDO EN LOS TALLOS.		
	Mancha hosca (Septoria hodorum)	0.25 L/Ha 0.18 L/Mz
ASPERJAR DESDE POCO ANTES DEL BOTONAMIENTO HASTA EL FINAL DE LA FLORACION.		
Arroz (Oryza sativa)	Quema (Pyricularia oryzae)	0.25-0.50 L/Ha 0.18-0.35 L/Mz
ASPERJAR CON INTERVALOS NORMALES		
	Mancha café de la hoja	0.25-0.50 L/Ha
ASPERJAR CUANDO APAREZCAN LOS PRIMEROS SINTOMAS Y TRES SEMANAS DESPUES.		
Banano (Musa sapientum)	Podredumbre apical del tallo (Botryodiplodia theobromas)	30-75 cc/100 L 30-75 cc/100 L
TRATAMIENTO POST-COSECHA. INMERSION A ASPERSION.		
	Sigatoka (Mycosphaerella musicola)	0.25-0.30 L/Ha 0.18-0.21 L/Mz
APLICACION AREA CON ACEITE (5-10 LT) Y EMULSIFICANTE. EN UNA MEZCLA TOTAL, CON AGUA DE 25 LT/HA. PUEDE SER APLICADO SOLO CON ACEITE. LOS INTERVALOS ENTRE APLICACIONES PUEDEN INCREMENTARSE CON APLICACION DE CARBENDAZIM.		
Piña (Ananas comosus)	Pudrición apical y lateral (Fusarium spp) (Geotrichum candidum)	300-500 cc/100 L
INMERSION DESPUES DE LA COSECHA		
Café (Coffea arabica)	Enfermedad de la cereza del café (Collectotrichum coffeanum) Mancha de ojo (Cercospora coffeicola)	0.75-1.0 L/Ha 0.52-0.70 L/Mz
ASPERJAR REPETIDAMENTE TAN PRONTO COMO LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD SEAN VISIBLES (500-1,600 LT/HA).		
Tomate (Lycopersicon esculentum)	Moho de la hoja (Cladosporium fulvum)	30-50 cc/100 L
ASPERJAR CON INTERVALOS DE 10-14 DIAS, LUEGO DE QUE LAS PLANTAS HAN ENRAIZADO (800-1,000 L/HA).		

INTERVALO DE APLICACIÓN: 7 - 15 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 8 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

COMPATIBILIDAD: Derozim 50 SC es normalmente miscible con la mayoría de los productos fitosanitarios con excepción del Caldo Bordeles y Caldo Sulfocálcico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicinas, ropas o equipo de uso casero o pecuario en general. Almacénese en su envase original, con la etiqueta y el panfleto. Almacénese fuera del alcance de los niños en un local fresco o bien ventilado. En caso de derrames, use algún material absorbente como aserrín sobre el derrame y recójalo con una pala, entierre el material contaminado en un agujero profundo, lejos de fuentes de agua, casa de habitación y áreas de pastoreo.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación sobre la piel y mucosas, mareos, náuseas, calambres abdominales, dolor de cabeza, sudoración excesiva, dificultada para respirar y malestar general.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: No inducir el vómito. dé a beber al paciente tres cucharadas de carbón activo en medio vaso de agua. busque atención médica inmediatamente.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite al paciente la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón. busque atención médica.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración. administre respiración artificial, si es necesario. busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados del paciente y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. busque atención médica.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, se deberá de administrar tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial	(501) 232-0735
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	(502) 2251-3560 (502) 2232-0735
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica	(503) 2231-9262
HONDURAS	Hospital Rosales	
NICARAGUA	Hospital Escuela	(504) 232-6105
	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	(505) 2289-4700 ext. 1294 Cel. (505) 8755-0983
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan)	(809) 684-3478/3672
	Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 681-2913/6922

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**ESTE PRODUCTO ES TÓXICO PARA LOS PECES Y GANADO.
NO CONTAMINE LAGOS, RÍOS O ESTANQUES.**



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que el contenido de este envase es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo con las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd
 Binhai Economic Development Area, Weifang,
 Shandong 262737, China
 Tel + 86-531-88875230, 88875231, 88875227/ +86-531-88875232, 88875224

IMPORTADO POR:

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	8702164	2/11/2009