

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

PROCLAIM® 5 SG

INSECTICIDA – AVERMECTINA
EMAMECTIN BENZOATE

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

PROCLAIM® 5 SG es un insecticida-larvicida que estimula la liberación del ácido Gamma-Aminobutírico (GABA) en los insectos, inhibiendo la transmisión neuro-muscular. PROCLAIM® 5 SG muestra fuerte actividad estomacal y alguna actividad de contacto. Es translaminar y se degrada rápidamente en la superficie de la hoja. PROCLAIM® 5 SG es efectivo en plagas resistentes a los organofosforados, piretroides y reguladores de crecimiento. PROCLAIM® 5 SG es altamente activo en larvas de Lepidópteros que se alimentan de las hojas. A dosis altas, también controla ciertos ácaros, minadores y trips.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

PROCLAIM® 5 SG puede aplicarse con cualquier equipo para aplicaciones de plaguicidas por vía terrestre. Observe que el equipo esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo utilizando agua. El equipo y los utensilios usados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar tazón medidor. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular PROCLAIM® 5 SG. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de PROCLAIM® 5 SG a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Tomate <u>Lycopersicon</u> <u>Esculentum</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Algodón <u>Gossipyum sp.</u>	Polilla del repollo	<u>Plutella xylostella</u>
	Gusano alfiler	<u>Keiferia lycopersicella</u>
	Gusano soldado	<u>Spodoptera frugiperda</u> <u>Spodoptera sunia</u>
	Gusano soldado	<u>Spodoptera frugiperda</u>

DOSIS RECOMENDADA:

Repollo: 120-160 g/ha (84-112 g/mz), en un volumen de 571 L ó 42-56 g/200 L
Tomate: 160-180 g/ha (112-126 g/mz) ó 80-90 g/200 L.
Melón: 0.120 Kg/Ha (6 g ia/Ha) con infestaciones moderadas (menores de tres larvas/guía). 0.160 Kg/Ha (8 g ia/Ha) con infestaciones superiores de larvas.
Algodón: 200 g/ha. Iniciar las aplicaciones 30 días después de la siembra (al inicio de la infectación y repetir de acuerdo al monitoreo).

Se recomienda un volumen de 400 litros de agua por hectárea (280 litros por manzana).

INTERVALO-EPOCA DE APLICACIÓN:

Asperjar cuando se aprecien las primeras larvas en el cultivo o a los 36 días después del transplante en el cultivo de Melón y Repollo y a los 50 días después del transplante en el cultivo de tomate. No hacer más de 2

aplicaciones seguidas para el control de larvas sin rotar con otro insecticida con diferente modo de acción.

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Brócoli <u>Brassica oleracea</u> var. <u>botrytis</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Sandía <u>Citrullus vulgaris</u> Cebolla <u>Allium cepa</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Maíz <u>Zea mays</u>	Polilla del repollo Gusano soldado Gusano cogollero	<u>Plutella xylostella</u> <u>Spodoptera sunia</u> <u>Spodoptera frugiperda</u> <u>Spodoptera exigua</u> <u>Heliotis sp</u> <u>Keiferia lycopersicella</u>
	Gusano nochero Gusano del fruto Gusano alfiler	
	Gusano cogollero	<u>Spodoptera frugiperda</u>

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Brócoli <u>Brassica oleracea</u> var. <u>botrytis</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Cebolla <u>Allium cepa</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Maíz <u>Zea mays</u>	Polilla del repollo Gusano soldado Gusano cogollero	<u>Plutella xylostella</u> <u>Spodoptera sunia</u> <u>Spodoptera frugiperda</u> <u>Spodoptera exigua</u> <u>Heliotis sp</u> <u>Keiferia lycopersicella</u> <u>Spodoptera frugiperda</u>
	Gusano nochero Gusano del fruto Gusano alfiler	
	Gusano cogollero	

USOS AUTORIZADOS EN BELICE:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Cebolla <u>Allium cepa</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Maíz <u>Zea mays</u>	Polilla del repollo Gusano soldado Gusano nochero Gusano del fruto Gusano alfiler	<u>Plutella xylostella</u> <u>Spodoptera sunia</u> <u>Spodoptera exigua</u> <u>Heliotis sp</u> <u>Keiferia lycopersicella</u> <u>Spodoptera frugiperda</u>
	Gusano cogollero	

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR, HONDURAS Y
REPÚBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Brócoli <u>Brassica oleracea</u> var. <u>botrytis</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Cebolla <u>Allium cepa</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Polilla del repollo Gusano soldado Gusano cogollero	<u>Plutella xylostella</u> <u>Spodoptera sunia</u> <u>Spodoptera frugiperda</u> <u>Spodoptera exigua</u> <u>Heliotis sp</u> <u>Keiferia lycopersicella</u>
	Gusano nochero Gusano del fruto Gusano alfiler	

DOSIS RECOMENDADA:

Maíz: 200 g/ha (140 g/mz)
Repollo, Brócoli, Melón, Sandía, Cebolla, Tomate: 120 a 200 g/ha (84 a 140 g/mz) de PROCLAIM® 5 SG o su equivalente 42 a 70 g en 200 L.

Se recomienda un volumen de 571 litros de agua por hectárea (400 litros por manzana).

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

CULTIVOS	INSECTOS	
Repollo <u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u> Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Polilla del repollo	<u>Plutella xylostella</u>
	Gusano alfiler	<u>Keiferia lycopersicella</u>
	Minador	<u>Pthorimae operculella</u>

DOSIS RECOMENDADA:

Repollo: 120-240 g/ha (84 – 168 g/mz).
Tomate: 160-180 g/ha (112-126 g/mz). Iniciar las aplicaciones cuando se observen las primeras larvas o a los 50 días después del transplante.
Tabaco: 0.16 – 0.2 kg/ha (0,112 – 0,14 kg/mz)

Se recomienda un volumen de 400 litros de agua por hectárea (280 litros por manzana).

INTERVALO DE APLICACIÓN: Asperjar cuando se aprecien las primeras larvas en el cultivo. No hacer más de 2 aplicaciones seguidas para el control de larvas sin rotar con otro insecticida con diferente modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:
Repollo, Brócoli, Melón, Sandía, Cebolla, Tomate: 7 días
Maíz: 3 días.
Algodón: 0 días

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Un día después de aplicarlo.

FITOTOXICIDAD:
PROCLAIM® 5 SG es seguro para los cultivos y dosis recomendadas en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD:
PROCLAIM® 5 SG es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y productos nutricionales de uso agrícola. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
PROCLAIM® 5 SG no es explosivo, no es inflamable. No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénelo bajo llave, en un lugar fresco, seco, alejado de la luz, del calor o del fuego directo. Conserve este producto en su envase original, debidamente cerrado, etiquetado y con su correspondiente panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Primeros síntomas incluyen dilatación de pupilas, inestabilidad, temblores musculares, ligera irritación de la piel y moderada irritación a los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con grandes cantidades de agua. Contacte a un médico inmediatamente.
POR INHALACIÓN: Retire al paciente del área contaminada y expóngalo al aire fresco y ventilado; protéjalo de la hipotermia.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Si la molestia persiste, contacte inmediatamente a un médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:
No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático. En caso de intoxicación sistémica, evite el uso de barbitúricos, benzodiacepinas y ácido valproico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560, 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los

derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

TÓXICO PARA ABEJAS.

PROCLAIM® 5 SG es tóxico para abejas e insectos benéficos cuando están expuestos al tratamiento directo. No aplique el producto si las abejas están activas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:
Syngenta Crop Protection LLC
3905 Highway, 75 River Road,
St. Gabriel, LA 70776, USA. Tel.: (225) 642-1100

IMPORTADO POR:

Guatemala: Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel.: 2312-7000. Fax: 2312-7005

Belice: James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice.
Tel.: 277-070; Fax: 275-593.

El Salvador: TECUNSAL, S.A. de C.V.
Km 9.5 Carretera Puerto La Libertad, Antiguo Cuscatlán
La Libertad, El Salvador.
Tel. 503 2121-2000

Honduras:

Nicaragua: Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica: Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría, calle paralela, contiguo Zona Franca Saret, Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica. Tel. (506) 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá: Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-206	23-07-12
BELICE	0348-1	27-06-13
EL SALVADOR	AG-2012-02-921	01-02-12
HONDURAS	612-11-III	13-01-12
NICARAGUA	SY-001A-6-2008	10-07-08
COSTA RICA	4771	14-12-01
PANAMÁ	6515	17-09-13
REPÚBLICA DOMINICANA	2179	15-11-11