

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ENGEO® 24,7 SC

INSECTICIDA – NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE
THIAMETHOXAM, LAMBDA-CYHALOTHRIN



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS

DENSIDAD: 1,117 g/cm³ a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: ENGEO® 24,7 SC es un insecticida neurotóxico de uso foliar, que combina la acción sistémica de tiametoxam para el control de insectos chupadores y la potente acción de contacto e ingestión de lambda-cihalotrina para controlar plagas masticadoras. Esta combinación da como resultado un insecticida de alto desempeño con un amplio espectro de control de insectos chupadores y masticadores.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila, tractor o avión. Para Costa Rica, en el caso de aplicaciones aéreas se deben seguir las siguientes medidas (según decreto 31520): Se prohíbe desechar en vuelo los remanentes de agroquímicos no utilizados. Descargar cualquier residuo líquido de la aeronave en un sistema de tratamiento debidamente aprobado por el Ministerio de Salud. Se prohíbe el lavado de cualquier equipo de aplicación en ríos, lagos y corrientes de agua. Para espolvorear y asperjar agroquímicos, los límites máximos de viento serán 10 Km/h para espolvoreo y 15 Km/h para aspersiones. Antes de aplicar ENGEO® 24,7 SC, calibre con agua limpia el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco, para equipo terrestre. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua limpia y jabón, déjelo secar y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal antes de usar y manipular ENGEO® 24,7 SC.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular ENGEO® 24,7 SC. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de ENGEO® 24,7 SC a utilizar, mézclelo en el tanque de la aspersora o barril con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión.



RECOMENDACIONES DE USO:

Costa Rica

CULTIVOS	INSECTOS
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Chinche de la espiga <u>Oebalus insularis</u> Sogata <u>Sogatodes oryzicola</u> Chinche marrón <u>Tibraca limbativentris</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera frugiperda</u>
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera frugiperda</u>
Cebolla <u>Allium cepa</u>	Trips <u>Thrips tabaci</u>
Pastos <u>Brachiaria brizantha</u>	Salivazo <u>Aenolamia spp</u> Prosapia <u>Prosapia spp.</u>
Piña <u>Ananas comosus</u>	Cochinillas <u>Dysmicoccus brevipes</u>
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate: 100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz).

Arroz – sogata y gusano defoliador: 100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz).

Arroz – chinche marrón y chinche de la espiga: 150 mL/ha (105 mL/mz) con niveles de 5 chinches/m² y 200 mL/ha (140 mL/mz) con niveles superiores de chinches. En el cultivo de arroz, se recomienda aplicación aérea.

Cebolla: 400-600 mL/ha (280 – 420 L/mz). Iniciar las aplicaciones cuando se presenten 2-4 trips por hoja. Utilizar un volumen de 600 a 800 L/ha.

Pastos: 250-300 mL/ha. Utilizar un volumen de agua de 250 a 250 L/ha

Piña: 0.5-1.0 L/ha. Utilizar la dosis alta en condiciones de alta presión de la plaga, de acuerdo al monitoreo.

Papa: 400 mL/ha. Aplicar con volumen de 400 l/ha para asegurar una buena cobertura.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se debe utilizar al inicio de la infestación, dentro de un programa preventivo antes que las poblaciones lleguen a niveles de daño. Se pueden realizar aplicaciones adicionales, según sea necesario con intervalos de 1 semana.

Pastos Iniciar las aplicaciones cuando se presenten 20 salivazos /m²

Papa: Aplicar cada 10 días dependiendo de la presión del insecto y de acuerdo al monitoreo.

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana

CULTIVOS	INSECTOS
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u> Chile <u>Capsicum sp</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano del follaje <u>Trichoplusia sp</u> Gusano del fruto <u>Heliothis sp</u> Pulgón <u>Myzus persicae</u> Chinche <u>Cyrtopeltis notata</u> Gusano alfiler <u>Keiferia lycopersicella</u> Cortador <u>Agrotis sp</u> Picudo <u>Anthonomus eugenii</u>

Guatemala y Honduras

CULTIVOS	INSECTOS
Melón <u>Cucumis melo</u> Sandía <u>Citrullus vulgaris</u> Pepino <u>Cucumis sativus</u> Zucchini <u>Cucurbita maxima</u> Calabaza <u>Cucurbita pepo</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u> Gusano del fruto <u>Diaphania sp</u>

Guatemala, Honduras y República Dominicana

CULTIVOS	INSECTOS
Ajo <u>Allium sativum</u> Cebolla <u>Allium cepa</u>	Trips <u>Trips palmi</u> Gusano cortador <u>Spodoptera sp</u>

Nicaragua

CULTIVOS	INSECTOS
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Chinche de la espiga <u>Oebalus sp</u> Sogata <u>Sogatodes oryzicola</u> Chinche marrón <u>Tibraca limbativentris</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>
Frijol <u>Phaseolus vulgaris</u>	Tortuguilla <u>Diabrotica sp</u> Mosca blanca <u>Bemisia spp</u>
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Paratrioza <u>Paratrioza cockerelly</u> Chicharrita <u>Empoasca sp</u> Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>
Pastos <u>Brachiaria spp</u>	Salivazo <u>Aeneolamia sp</u> Chinche <u>Blissus sp</u>

Panamá y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Chinche de la espiga <u>Oebalus sp</u> Sogata <u>Sogatodes oryzicola</u> Chinche marrón <u>Tibraca limbativentris</u> Minador <u>Hydrellia sp</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>

Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Caña de Azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Salivazo <u>Aeneolamia sp</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>

Guatemala, Belice y Honduras

CULTIVOS	INSECTOS
Cítricos	Pulgón <u>Aphis sp</u> Escamas <u>Coccus sp</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>

Belice, El Salvador, Honduras y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Frijol <u>Phaseolus vulgaris</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u> Tortuguilla <u>Diabrotica sp</u>

Guatemala, Honduras y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Paratrioza <u>Paratrioza cockerelly</u> Chicharrita <u>Empoasca sp.</u> Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>

Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Pastos <u>Brachiaria spp</u>	Salivazo <u>Aeneolamia sp</u> Chinche <u>Blissus sp</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u>

Guatemala

CULTIVO	INSECTOS
Frijol <u>Phaseolus vulgaris</u> Ejote francés <u>Phaseolus spp</u> Arveja <u>Pisum spp</u> Arveja china <u>Pisum spp</u> Arveja dulce <u>Pisum spp</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano defoliador <u>Spodoptera sp</u> Tortuguilla <u>Diabrotica sp</u> Trips <u>Frankiniella occidentalis</u> Trips <u>Frankiniella occidentalis</u>
Piña <u>Ananas comosus</u>	Cochinillas <u>Dysmicoccus brevipes</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate, chile, sandía, pepino, zucchini, calabaza, arroz, caña de azúcar, frijol, ejote francés, arveja, papa y pastos: 100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz).

Melón: 0,4 a 0,5 L/ha (0,28 a 0,35 L/mz)

Ajo y cebolla: Trips: 150 – 200 mL/ha (105 – 140 mL/mz). Gusano cortador: 100 – 150 mL/ha (70 – 105 mL/mz).

Cítricos: 200 – 250 mL/ha (140 – 175 mL/mz).

Arveja china y arveja dulce: 300 – 400 mL/ha (210 – 280 mL/mz).

Piña: 0,5 – 1,0 L/ha. Utilizar la dosis alta en condiciones de alta presión de la plaga, de acuerdo al monitoreo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Tomate, chile, melón, sandía, pepino, zucchini, calabaza, ajo, cebolla arveja china y arveja dulce: 4 a 7 días

Arroz, caña de azúcar, cítricos, frijol, ejote francés, arveja y papa: 7 a 10 días.

Pastos: Realizar una sola aplicación a los 3 a 7 días después de la salida del ganado o al apareamiento de las plagas.

Piña: Dependiendo del nivel de presión de la plaga, realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo. Volumen de agua 4000 L/ha

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz: 30 días

Tomate, chile, melón, sandía, pepino, zucchini, calabaza y papa: 3 días

Ajo, cebolla, caña de azúcar, cítricos, arveja, frijol, ejote francés, arveja china y arveja dulce: 14 días

Pastos: 35 días entre la aplicación y el ingreso del ganado al potrero tratado.

Piña (Costa Rica): 70 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas. En caso de duda haga una pequeña aplicación de prueba.

COMPATIBILIDAD: Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. En general, la

tolerancia del cultivo no se ve afectada por la aplicación foliar de **ENGEO® 24,7 SC**. En caso de sensibilidad o nuevas variedades, primero compruebe la compatibilidad. Se recomienda una rotación a largo plazo con insecticidas de diferente modo de acción. No rote con otros productos que contengan neonicotinoides. Sin embargo, siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: **ENGEO® 24,7 SC** no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacene este producto en bodegas seguras, alejado de materia prima, alimentos y estimulantes; protéjalo de la luz. No transporte junto con productos de consumo animal y humano. Almacénelo y téngalo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas específicos en humanos. Puede causar irritación en la piel y en los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con grandes cantidades de agua. Contacte a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona del área contaminada y llévela a una habitación bien ventilada o al aire fresco y protéjala de la hipotermia.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua limpia durante varios minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico, aplique terapia sintomática.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560 y 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Centro Nacional de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800, ext.148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso Puella	684-3478 y 684-3672 681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TOXICO PARA ABEJAS.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA: El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR: Syngenta Crop Protection LLC
3905 Highway, 75 River Road,
St. Gabriel, LA 70776, Estados Unidos de América (USA)

IMPORTADO POR:

Guatemala: Agroinsumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel. Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice: James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel.: 277-070; Fax: 275-593.

El Salvador:

Honduras: Syngenta Crop Protection – Sucursal Honduras
Residencial Las Hadas casa #2902, Tegucigalpa.
Tel. 234-7764. Fax 232-0725

Nicaragua: Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua. Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica: Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá: Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987, Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este, San Francisco, Ciudad Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana: Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana. Calle Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA - Piso 4to. Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1- 809 227 0412 / 14. Fax: 1- 809 540 9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-248A	11-08-06
BELICE	0308-2	30-06-10
EL SALVADOR	AG-2012-04-926	17-04-12
HONDURAS	739-90-III	10-12-04
NICARAGUA	Sy-347A-1-2005	10-02-05
COSTA RICA	8702107	24-08-09
PANAMÁ	1732	04-05-05
REPÚBLICA DOMINICANA	2500	02-11-09