

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

FUSILADE® 12,5 EC

HERBICIDA – PROPANOATO ARÍLICO
FLUAZIFOP-P-BUTYL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
SOLVENTE: TRIMETILBENCENO
DENSIDAD: 0,95 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: FUSILADE® 12,5 EC es un herbicida sistémico post-emergente que controla gramíneas perennes y anuales; el producto es rápidamente absorbido por las hojas y otras partes verdes de las malezas, siendo movilizadas a través de los tejidos de conducción (xilema y floema). Finalmente se acumula en los puntos de crecimiento, afecta los tejidos meristemáticos en los nudos de los tallos y las yemas de los rizomas, deteniendo el crecimiento en 48 horas. En 8 a 15 días se produce el secado total de la maleza.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar FUSILADE® 12,5 EC, calibre el equipo terrestre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Con equipo terrestre se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8001 – 8002 o su equivalente. Con avión se puede utilizar boquillas o micronair. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal antes de utilizar y manipular FUSILADE® 12,5 EC.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular FUSILADE® 12,5 EC. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor.

De acuerdo con la dosis de FUSILADE® 12,5 EC a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 285-570 litros de agua por hectárea (200-400 litros de agua por manzana).



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:	
Algodón	<u>Gossypium spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Camote	<u>Ipomoea batatas</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>

Zanahoria	<u>Daucus carota</u>
Macadamia	<u>Macadamia integrifolia</u>
Melocotón	<u>Prunus sp</u>
Durazno	<u>Prunus persica</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>
Piña	<u>Ananas comosus</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Como herbicida para los cultivos de Algodón, Soya, Cebolla, Camote, Papa, Zanahoria, Macadamia, Melocotón, Durazno, Frijol: 1 a 1,4 litros por hectárea, 75-100 cm³ por bomba de 16 litros de agua. Se recomienda asperjar FUSILADE® 12,5 EC cuando las malezas gramíneas estén en pleno desarrollo o tengan dos a cuatro hojas, o entre cuatro a seis centímetros de altura, lo que ocurre generalmente 15 ó 25 días después de la siembra o transplante.

Para piña: 1,6 a 1,8 litros por hectárea en un volumen de 1,000 litros de agua/ha. Aplicar en post-emergencia cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de dos a cinco hojas verdaderas.

Para tomate: 1,8 litros por hectárea en un volumen de 285 litros de agua/ha. Aplicar dirigido a malezas de crecimiento activo.

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:

Algodón	<u>Gossypium spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Maní	<u>Arachis hypogaea</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
Repollo	<u>Brassica oleracea var. capitata</u>
Frijol	<u>Phaseolus spp</u>
Cítricos	<u>Citrus spp</u>
Palma africana	<u>Elaeis guineensis</u>
Piña	<u>Ananas comosus</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Como herbicida para todos los cultivos: 1 a 1,4 litros por hectárea (0,7 a 1 litro por manzana), 75-100 mL por bomba de 16 litros de agua. Se recomienda asperjar FUSILADE® 12,5 EC cuando las malezas gramíneas estén en pleno desarrollo o tengan dos a cuatro hojas, o entre cuatro a seis centímetros de altura, lo que ocurre generalmente 15 ó 25 días después de la siembra o transplante.

Para piña: 1,6 - 1,8 litros/ha (1,1 - 1,3 litros/mz) en un volumen de 1,000 litros de agua/ha (700 litros de agua/mz). Aplicar en post-emergencia cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de dos a cinco hojas verdaderas.

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

CULTIVOS:	MALEZAS:
Frijol <u>Phaseolus vulgaris</u> Caña de Azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Pata de gallina <u>Eleusine indica</u> Zalea <u>Digitaria spp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Para Frijol: 1,0 – 1,5 L/ha

Como madurador de caña: Utilice 0,4 a 0,6 litros por hectárea en 26 litros por hectárea de mezcla en aplicaciones aéreas. Una sola aplicación 4-6 semanas antes del corte.

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, BELICE, HONDURAS Y PANAMÁ:

Algodón	<u>Gossypium spp</u>
Soya	<u>Glycine max</u>
Maní	<u>Arachis hypogaea</u>
Café	<u>Coffea spp</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>

Papa	<u><i>Solanum tuberosum</i></u>
Tomate	<u><i>Lycopersicon esculentum</i></u>
Repollo	<u><i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i></u>
Frijol	<u><i>Phaseolus</i> spp</u>
Cítricos	<u><i>Citrus</i> spp</u>
Caña de Azúcar	<u><i>Saccharum officinarum</i></u>
Palma africana	<u><i>Elaeis guineensis</i></u>
Piña	<u><i>Ananas comosus</i></u>
Calabaza	<u><i>Cucurbita</i> sp</u>

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:	
Tomate	<u><i>Lycopersicon esculentum</i></u>
Papa	<u><i>Solanum tuberosum</i></u>
Tabaco	<u><i>Nicotiana tabacum</i></u>
AjÍ	<u><i>Capsicum</i> sp</u>
Repollo	<u><i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i></u>
Rábano	<u><i>Raphanus</i> sp</u>
Remolacha	<u><i>Beta vulgaris</i></u>
Lechuga	<u><i>Lactuca sativa</i></u>
Habichuela	<u><i>Phaseolus vulgaris</i></u>
Maní	<u><i>Arachis hypogaea</i></u>
Gandul	<u><i>Cajanus indicus</i></u>
Cebolla	<u><i>Allium cepa</i></u>
Ajo	<u><i>Allium sativum</i></u>
Piña	<u><i>Ananas comosus</i></u>
Plátano	<u><i>Musa</i> spp</u>
Zanahoria	<u><i>Daucus carota</i></u>
Apio	<u><i>Apium graveolens</i></u>
Melón	<u><i>Cucumis melo</i></u>
Sandía	<u><i>Citrullus vulgaris</i></u>
Pepino	<u><i>Cucumis sativus</i></u>
Algodón	<u><i>Gossypium hirsutum</i></u>
Café	<u><i>Coffea arabica</i></u>
Coco	<u><i>Cocos nucifera</i></u>
Aguacate	<u><i>Persea americana</i></u>
Mango	<u><i>Mangifera indica</i></u>
Lechosa	<u><i>Carica papaya</i></u>
Cítricos	<u><i>Citrus</i> spp</u>
Yuca	<u><i>Manihot esculenta</i></u>

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR	
Bermuda	<u><i>Cynodon dactylon</i></u>
Zalea	<u><i>Digitaria</i> spp</u>
Pará	<u><i>Panicum</i> spp</u>
Gramilla, grama amarga	<u><i>Chloris</i> spp</u>
Arrocillo	<u><i>Echinochloa</i> spp</u>
Cola zorro	<u><i>Setaria</i> spp</u>
Pata de gallina	<u><i>Eleusine indica</i></u>
Mozote	<u><i>Cenchrus</i> spp</u>
Plumilla	<u><i>Leptochloa filiformis</i></u>
Zacate de leche	<u><i>Ixophorus unisetus</i></u>
Kikuyú	<u><i>Pennisetum</i> spp</u>
Gramma	<u><i>Paspalum</i> spp</u>
Caminadora	<u><i>Rottboellia</i> spp</u>
Zacate Johnson	<u><i>Sorghum halepense</i></u>
Avena loca	<u><i>Avena fatua</i></u>
Braquiaria	<u><i>Brachiaria</i> spp</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Como herbicida: 1 a 1,4 litros por hectárea, 75-100 cm³ por bomba de 16 litros de agua. Se recomienda asperjar **FUSILADE® 12,5 EC** cuando las malezas gramíneas estén en pleno desarrollo o tengan dos a cuatro hojas, o entre cuatro a seis centímetros de altura, lo que ocurre generalmente 15 ó 25 días después de la siembra o trasplante.

Como madurador de caña: Utilice 0,4 a 0,6 litros por hectárea en 26 litros por hectárea de mezcla en aplicaciones aéreas. Una sola aplicación 4-6 semanas antes del corte.

Para piña: 1,6 a 1,8 litros por hectárea en un volumen de 1,000 litros de agua/ha. Aplicar en post-emergencia cuando las malezas poáceas estén en pleno desarrollo y tengan de dos a cinco hojas verdaderas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Como herbicida: Dependerá de la re-infestación de maleza en el cultivo. Repetir la aplicación entre 50-60 días si fuera necesario.

Como madurador: Una sola aplicación 4 semanas antes del corte.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Piña: No menos de 50 días.

Otros cultivos: Ocho días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Dos horas o después que el producto se haya secado en el follaje de la maleza tratada.

FITOTOXICIDAD: En cultivos de hoja ancha es totalmente selectivo. Es nocivo o letal para todas las plantas gramíneas.

COMPATIBILIDAD: No es compatible con herbicidas hormonales, ni con propanil; se recomienda aplicar solo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: FUSILADE® 12,5 EC es inflamable. No almacene ni transporte junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede ser irritante para la piel y los ojos. Si se ingiere, puede producirse náuseas, vómitos, con dolor abdominal, diarrea y otros síntomas asociados.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No inducir el vómito. Si la persona está consciente, dar a beber cuatro (4) cucharadas de carbón activado en medio (1/2) vaso de agua. Buscar ayuda médica.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Realice lavado gástrico, teniendo cuidado de prevenir el aspirado de los contenidos gástricos. Administre tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832
		2251-3560, 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital	231-548 y 231-639
	Dr. Hurrisa Hailu	622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



No contamine fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

**AVISO DE GARANTÍA:**

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta Agro, S.A. de C.V.
San Lorenzo 1009, Col. Del Valle CP 03100, México, D. F.
Tel.: 52-55-542-26250. Fax: 52-55-568-41024

IMPORTADO POR:**Guatemala:**

Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel. 2312-7000. Fax 2312-7005

Belice:

James Brodie & Co. Ltd.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel. 277-070. Fax: 275-593

El Salvador:

Proagro, S. A.
Edificio Fertica. 5ª. Ave. Norte y 19 Calle Poniente,
San Salvador, El Salvador. Tel. 503 2234-0444

Honduras:**Nicaragua:**

Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua
Residencial Los Robles, casa L-15
Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur
Managua Nicaragua
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría,
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret,
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:

Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este,
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá.
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana.
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-225A	14-01-13
BELICE	0041-1	24-11-10
EL SALVADOR	AG-94-11-193	08-11-12
HONDURAS	124-62-I	20-01-12
NICARAGUA	Sy-074E-1-97	12-12-12
COSTA RICA	2312	27-03-95
PANAMÁ	1487	27-09-12
REPÚBLICA DOMINICANA	860	03-11-13