

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICA.

**DAC**  
Sembrando un futuro más rentable

# MATRIC 5 SC

**INSECTICIDA-DIACYLHYDROZINE**  
**CROMAFENOZIDE**

## ATENCIÓN

### ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.021 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Insecticida.

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** Es un insecticida que provoca una iniciación precoz e incompleta de la muda en las larvas de lepidópteros, de esta manera afecta las respuestas biológicas del insecto a nivel celular y molecular. Se caracteriza como un producto antagonístico de la hormona ecdysone o ecdysteroides encargada de inducir las mudas en los lepidópteros.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Puede aplicarse con tractor o aspersora de mochila. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicar utilice boquillas de cono hueco. Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Para preparar el caldo de aplicación, en un recipiente aparte disuelva la cantidad requerida de producto en un poco de agua hasta obtener una pasta semifluida, luego llene el tanque de las aspersora hasta la mitad con agua limpia poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta luego la pasta semifluida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios utilizados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar guantes y botas durante el lavado del equipo de aplicación. El pH adecuado del agua o de la mezcla a utilizar: La preparación de la mezcla permite un rango de pH de 5.5 a 8.5.



RECOMENDACIONES DE USO: Países: Costa Rica.

| CULTIVO                                                                         | PLAGA                                                           | DOSIS         | VOLUMEN DE APLICACIÓN           | ÉPOCA DE APLICACIÓN                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tomate<br><i>Lycopersicon esculentum</i><br>(syn: <i>solanum lycopersicum</i> ) | Gusano Alfiler Del Tomate<br>( <i>Keiferia lycopersicella</i> ) | 0.5-0.75 L/Ha | 200-400 litros de agua.         | 15 días después del trasplante de las plántulas. |
| Palma Aceitera<br>( <i>Elaeis guineensis</i> )                                  | Gusano Cogollero<br>( <i>Spodoptera frugiperda</i> )            | 0.150 L/Ha    | 20 litros de agua por hectárea. | En presencia de la plaga.                        |

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** TOMATE: cada 2 semanas, con un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. PALMA ACEITERA: 1 sola aplicación.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:** TOMATE: 7 días. PALMA ACEITERA: 24 horas.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** TOMATE: 24 horas. PALMA ACEITERA: 12 horas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos en las dosis recomendadas, a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con otros productos excepto Fenarimol WP, Fosetil AI.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en lugar fresco y seco, alejado del calor y llama abierta. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar. El producto no es inflamable ni corrosivo.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No se conocen casos de intoxicación en humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

**TRATAMIENTO MÉDICO:** El tratamiento médico debe ser sintomático de acuerdo al cuadro clínico que presente el paciente.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

|            |                                   |                 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|
| PAÍS       | INSTITUCIÓN                       | TELÉFONOS       |
| Costa Rica | Centro Nacional de Intoxicaciones | (506) 2223-1028 |

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO).

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** En el caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y deposítelos en un recipiente hermético; entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado de enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de empaques, entregue a éste al centro de recolección más cercano.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

**AVISO DE GARANTÍA:** Se garantiza que el producto químico contenido en este envase corresponde a lo expresado en la etiqueta. Debe usarse exclusivamente para los propósitos señalados en las instrucciones del panfleto, dentro de condiciones normales y mantenerse en su envase con su sello original. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades resultantes del almacenamiento, manejo, uso, dosificación, aplicación, daños en el cultivo por el mal uso y lucro cesante que están fuera de nuestro control.

**FORMULADOR: NIPPON KAYAKU CO., Ltd.** 1-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokio, Japón. Tel: +81-3-6731-5323. E mail : NK-AgroOverseas@nipponkayaku.co.jp

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.**  
Tel: 2494-9800 • Fax 2249-3733 • Coyoil, Alajuela, Costa Rica • info@agrodac.com • www.agrodac.com

|            |                    |
|------------|--------------------|
| PAÍS       | NÚMERO DE REGISTRO |
| COSTA RICA | 5069               |