

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

PEGASUS® 50 SC

INSECTICIDA - TIOUREA
DIAFENTHIURON



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,02 – 1,06 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

PEGASUS® 50 SC es un insecticida-acaricida que debido a su nuevo y único modo de acción, tiene bajo riesgo de producir resistencia cruzada. El ingrediente activo de PEGASUS® 50 SC, Diafenthiuron, se convierte por acción de la luz ambiental en un fluido con acción insecticida. PEGASUS® 50 SC posee una excelente acción de contacto e ingestión. Además, tiene una excelente acción translaminar que llega hasta el envés de las hojas, donde controla insectos que no fueron tocados por la aspersión.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

PEGASUS® 50 SC puede ser aplicado por vía aérea, con equipos de tractor o aspersoras (bomba/mochila). En caso de aplicaciones aéreas, el volumen de mezcla recomendado no deberá ser inferior a 22 L/H (15 L/mz o 4 galones/mz). Para aplicaciones terrestres, el volumen recomendado no deberá ser inferior a 150 L/ha (105 L/mz o 28 galones/mz) para equipos de tractor y de 400 L/ha (280 L/mz o 75 galones/mz) para aspersora manual. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo antes de usarlo e inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el producto. Asegúrese que dicho equipo esté en buenas condiciones. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.) Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

En un tanque de mezcla, agregue la cantidad recomendada de PEGASUS® 50 SC al agua limpia y agite constantemente. Esta mezcla debe ser aplicada el mismo día de su preparación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Guatemala

Tomate	<u>Solanum lycopersicum</u>
Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>

El Salvador

Tomate	<u>Solanum lycopersicum</u>
Chile	<u>Capsicum spp</u>

INSECTOS A CONTROLAR

Paratíozia	<u>Bactericera cockerelli</u>
------------	-------------------------------

DOSIS RECOMENDADA:

0,5 L/ha (0,35 L/mz)

Belice

Repollo	<u>Brassica oleracea</u> var. <u>capitata</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>
INSECTOS	
Palomilla del repollo	<u>Plutella xylostella</u>
Polilla	<u>Phthorimaea operculella</u>
Mosca blanca	<u>Bemisia tabaci</u>
Trips	<u>Thrips palmi</u>
Áfidos	<u>Aphis spp</u>
Ácaros, ácaro rojo	<u>Tetranychus spp</u>

DOSIS:

0,3 – 0,5 L/ha. 60 – 100 mL/100 litros de agua.

Honduras

Algodón	<u>Gossypium hirsutum</u>
Hortalizas	

Costa Rica

Tomate	<u>Solanum lycopersicum</u>
--------	-----------------------------

Panamá

Tomate	<u>Solanum lycopersicum</u>
Hortalizas	

República Dominicana

Hortalizas (habichuela, ajo, cebolla, papa, ají, repollo, tomate)

INSECTOS QUE CONTROLA

Mosca blanca	<u>Bemisia tabaci</u> , <u>Trialeurodes vaporariorum</u>
Trips	<u>Thrips palmi</u>
Áfidos	<u>Aphis spp</u>
Ácaros, Ácaro rojo	<u>Tetranychus spp</u>
Gusano constancero	<u>Spodoptera exigua</u>
Polilla	<u>Phthorimaea operculella</u>
Palomilla del repollo	<u>Plutella xylostella</u>
Gusano anillado	<u>Pieris spp</u>
Ácaro blanco	<u>Polyphagotarsonemus latus</u>
Áfido	<u>Myzus persicae</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate, Chile, Repollo, Coliflor, Habichuela y Papa: 0,4 a 0,5 L/ha (0,28 a 0,35 L/mz) 60 a 100 mL/100 litros de agua.

Algodón: 0,3 a 0,5 L/ha (0,21 – 0,35 L/mz)

MOMENTO DE APLICACIÓN: La primera aplicación debe realizarse al momento de alcanzar el umbral económico definido para cada zona de producción. La segunda aplicación a los 4 días después y realizar una tercera en caso de re-infestación.

INTERVALO DE APLICACIÓN: 4 días.

OBSERVACIONES: Posteriormente a las aplicaciones de este producto, si es necesario, aplicar otros insecticidas de diferente familia química y modo de acción. No hacer más de tres aplicaciones consecutivas con el producto.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tomate: 7 días

Repollo, Coliflor, Habichuela y Algodón: 14 días

Papa: 21 días

Chile: 28 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

No ingresar en áreas tratadas hasta que hayan transcurrido 24 horas después de efectuada la aplicación.

FITOTOXICIDAD: PEGASUS® 50 SC es seguro para los cultivos y dosis recomendadas en este panfleto. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos a pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: PEGASUS® 50 SC es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas, acaricidas y productos nutricionales de uso agrícola. Sin embargo, se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

PEGASUS® 50 SC no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Peligro de serios daños a la salud por exposición prolongada al contacto con la piel y si es ingerido

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si se ingiere, busque ayuda médica de inmediato y presente el envase, la etiqueta o este panfleto. No induzca el vómito.
POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada y llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco y protéjala de la hipotermia.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave abundantemente con agua y jabón las partes del cuerpo afectadas.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560/ 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-496
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.



No aplique cerca de animales domésticos. No alimentar ganado en áreas que hayan sido tratadas con este producto, hasta transcurrido un mes después de efectuada la aplicación.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES
VACÍOS.



TÓXICO PARA ABEJAS.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Syngenta, S.A.
Carretera a Mamonal, km 6, Cartagena, Colombia.
Tel.: 95-668-5475. Fax: 95-668-5458

IMPORTADO POR:

Guatemala:
Agro Insumos, S.A.
5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel.
Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice:
James Brodie & Cia. Ltda.
16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel. 227-070 / Fax: 275-593

El Salvador:
Tecunsal, S.A. de C.V.
Km. 9,5 Carretera Puerto La Libertad, Antiguo Cuscatlán
La Libertad, El Salvador
Tel.: + 503 2121-2000

Honduras:

Costa Rica:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica
700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:
Syngenta, S.A.
R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Business Park, Costa del Este
Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12 Ciudad de Panamá
República de Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:
Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana
Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-190A	25-02-13
BELICE	0256-1	28-10-14
EL SALVADOR	AG-95-10-265	18-10-13
HONDURAS	384-193-III	17-01-13
COSTA RICA	3931	23-07-96
PANAMÁ	1230	03-12-09
REPÚBLICA DOMINICANA	1268	16-03-13