

Дихателна система

51. Хеморагичен характер има възпалението при: **грипната пневмония**
52. Коя от следните видове пневмонии не е характерна за имунокомпрометирани пациенти: **еозинофилна пневмония на Льофлер**
53. Комбинираното засягане на белите дробове и бъбреците е характерно за: **синдром на Гудпасчър**
54. Кой от видовете белодробен емфизем може да се определи като първичен: **старчески**
55. Кой от туморите на дихателната система се свързва с азбестова експозиция: **мезотелиом на плеврата**
56. Кой от туморите не се среща в белите дробове? **Базоцелуларен карцином**
57. Кое от следните заболявания не е усложнение на белодробните бронхиектазии: **хроничен белодробен емфизем**
58. Кое от следните заболявания не е извънбелодробно усложнение на бронхиектазиите: **полулуенен гломерулонефрит**
59. За коя от пневмониите е характерен фибринозен ексудат и левкоцитна инфилтрация в алвеолите? **крупозна**
60. Дефицитът на алфа1-антитрипсин води до развитието на: **белодробен емфизем**
61. Туморът на Pancuast-Tobias: **се локализира в белодробния връх**
62. При кое от заболяванията хистологичната находка включва задебелена бронхиална базална мембрана, обилна и гъста слузна секрция, богат на еозинофили възпалителен инфилтрат: **бронхиална астма**
63. При кое от посочените заболявания не се развива грануломатозно възпаление? **CMV инфекция на белите дробове**
64. Плеврален излив не се наблюдава при: **ХОББ**
65. При кое от изброените белодробни заболявания не се развива пневмосклероза? **Хроничен бронхит**
66. В стадий на червена хепатизация при крупозна пневмония хистологично се намира: **в алвеолите ексудат, богат на фибрин и еритроцити**
67. При остър бронхит макроскопски се наблюдава: **зачервяване и помътняване на лигавицата**
68. Хронично белодробно сърце не се развива при: **крупозна пневмония**

69. При торбовидните бронхиектазии хистологично се намира: **стена, изградена от гранулационна и фибозна тъкан**
70. Хеморагичен характер на възпалението има при пневмония с: **инфекция с чумния бактерия – *Yersinia pestis***
71. За крупозната пневмония макроскопски е характерно: **засягане на цял лоб и констелация като на черен дроб**
72. За пневмоцистната пневмония морфологично е характерно: **зърнеста, мрежовидна материя в алвеолите и лимфоцитарна инфилтрация в интерстициума**
73. Кое от изброените усложнения се наблюдава при бронхиалната астма: **хроничен обструктивен емфизем**
74. Саркоидният гранулом се отличава от туберкулозния по: **липса на некроза**
75. Кое от изброените усложнения не се наблюдава при бронхиектазиите: **кафява индурация на белите дробове**
76. Емпием на плеврата представлява: **обилен гноен ексудат в плевралната кухина**
77. Коя от посочените причини не води до развитие на хроничен бронхит: **попадане на чуждо тяло в бронха**
78. При коя от посочените причини не може да се развие дифузна пневмосклероза: **абсцес в белия дроб**
79. При хроничен обструктивен белодробен емфизем, белите дробове са: **с увеличен обем и намалена еластичност**
80. Обтурационната белодробна ателектаза може да се развие при: **запушване на бронхиалния лумен от туморна маса, чуждо тяло или възпалителен процес**
81. Кое от посочените усложнения не се наблюдава при белодробния карцином: **кафява индурация на белите дробове**
82. Рак на Панкоуст е: **първичен върхов белодробен карцином**
83. Силикозата се представя със следните макроскопски форми, с изключение на: **пневмонична**
84. При хронично белодробно сърце макроскопски се наблюдава: **хипертрофия и дилатация на дясната камера**
85. За вирусните пневмонии са характерни хистологично промени, с изключение на: **инфилтрация на интерстициума с неутрофилни левкоцити**
86. Бисинозата е професионално заболяване, което се среща при: **обработката на памук**

87. След карнизация в белодробния паренхим хистологично се наблюдава: **фиброзна тъкан в просвета на алвеолите**

88. Крупозната пневмония в стадий на сива хепатизация хистологично се характеризира с: **наличие на много фибрин и левкоцити в ексудата**

89. При старчески емфизем макроскопски белите дробове се характеризират с: **отпуснати, меки, късливи бели дробове**

90. При кой тип карцином на белия дроб туморната тъкан наподобява макроскопски пневмония: **при бронхиолоалвеоларен карцином**

91. За синдрома на Гудпасчър не е вярно твърдението: **често се усложнява с развитието на абсцес на белия дроб**

92. В патогенезата на субстанциалния емфизем участват всички изброени фактори, без: **първично увреждане на белодробните кръвоносни съдове**

93. Развитието на вторична амилоидоза е характерно усложнение на: **бронхиектатичната болест**

94. При кое от посочените белодробни заболявания не се развива дифузна пневмосклероза: **белодробен абсцес**

95. Компресионната белодробна ателектаза може да се развие при: **хидроторакс**

96. За означаване синдрома на Hamman Rich се използва названието: **хронична идиопатична интерстициална фиброза**

97. Пневмотораксът е усложнение при: **стафилококова огнищна пневмония**

98. Кое от долуизброените състояния не може да бъде усложнение на чернодробната цирроза:
инфаркт на черния дроб

99. Най-честият езофагит при имунокомпроментирани пациенти е:
микотичен (гъбков)

100. При микроскопско изследване на увеличен черен дроб се открива почти дифузна едрокапчеста стеатоза. Кое заболяване бихте обсъждали в диференциалната диагноза на първо място: хроничен алкохолизъм

101. Характерно за хроничния алкохолизъм е наличието в хепатоцитите на:
телца на Малори

102. Кой от изброените полипи не се смята за пренеопластичен: !
ХИПЕРПЛАСТИЧЕН ПОЛИП !

103. Усложнение на чернодробната цирроза е: асцит

104. За ранният стомашен карцином е характерно: В 90% СЕ ИЗЛЕКУВА
СЛЕД РЕЗЕКЦИЯ

105. Всички изброени твърдения за болестта на Крон са верни, с изключение на едно: ПРЕДОМИНИРАЩО СЕ ЗАСЯГАТ ЦЕКУМ И ТЪНКО ЧЕРВО

106. Рак на Крукенберг е: метастаза от желатинозен рак на стомаха в яйчника

107. Кое твърдение е вярно за болестта на Хиршпрунг: липсата на ганглийни клетки в стената на червото

108. При хепатит с морфологична активност се откриват винаги: НАРУШЕНА
ГРАНИЧНА ЛАМЕЛА

109. Баретов езофаг може да се асоциира с наличието на: ГЕРБ

110. Кое от изброените твърдения е вярно за псевдомембранозният ентероколит: наличие на некроза, фибрин и неутрофили в суперфициалните слоеве на лигавицата

111. 4-седмично бебе от мъжки пол, до заболяването здраво, започва да повръща след всяко хранене, спада на тегло. Коя е най-вероятната причина за повръщането: пилорна стеноза

112. Къде най-често се развива карциноид в стомашно-чревния тракт:
апендикс

113. При кое заболяване има сегментно засягане на тънкото и дебелото черво, трансмурално възпаление и развитие на епителоидноклетъчни грануломи: болест на Крон

114. Кое от изброените твърдения за карцинома на черния дроб е вярно: може да инвазира вена порте и хепаталните вени

115. Предиспозиращи фактори за развитието на хроничната пептична язва на стомаха са: инфекция с хеликобактер пилори

116. За алкохолния хепатит са характерни: телца на Малори

117. Кое от следните състояния не е преканцероза: дивертикулоза на дебелото черво

118. Ендоскопски се открива солидна, добре отграничена калозна язва в пилорния канал. С коя

от изброените находки бихте я свързали: хематемеза

119. Кой от изброените хистологични видове тумори може да се развие в стомаха: слузообразуващ карцином

120. Коя от изброените находки не се наблюдава хистологично в червото при болестта на Крон: ентамеба хистолитика микроорганизъм

121. 22-годишна жена с цел самоубийство е приела 30 таблетки парацетамол. При биопсичното изследване на черния дроб след 5 дни се установява: масивна некроза

122. Кое от долуизброените твърдения не е вярно за стомашната язва: при макроскопското изследване се установяват неравномерно задебелени на места със зърнист вид или разязвени ръбове

123. При кое от изброените заболявания се наблюдава най-силно изразена спленомегалия: портална чернодробна цироза

124. Продължителната употреба на орални контрацептивни средства може да доведе до: аденом на черния дроб

125. Стомашната язва не може да се усложни с развитието на: инсулином

126. Кой от следните фактори не е рисков за развитието на карцином на хранопровода: богата на плодове храна

127. Кое твърдение е вярно за колоректалния карцином: един от най-честите злокачествени тумори в България

128. Кое от долните твърдения е вярно за ранния стомашен карцином: висока преживяемост след резекция при повече от 90% от пациентите

129. При панкреатичната псевдокиста може да се установи всичко с изключение на: муцинозна епителна покривка

130. Кое от изброените по-долу не е белег за морфологична активност при хепатит: запазена гранична ламела

131. При кой синдром се наблюдава тромбоза на хепатални вени: синдром на Бъд-Киари
132. В кой орган най-често пенетрира стомашната язва: ПАНКСРЕАС
133. Вариците на хранопровода са характерни за: чернодробна цироза
134. Усложнение на флегмона на стомаха може да бъде развитието на: гноен перитонит
135. Паралитичен илеус се развива вследствие на: остър панкреатит
136. Асептичен перитонит може да се развие при: нарушена тубарна бременност
137. Епилусът е: туморовидно образуване на венеца
138. При епидемичния паротит възпалението е: серозно
139. Язвата на стомаха е най-честа в областта на: малката кривина
140. Дифузният карцином на стомаха хистологично най-често е: линитис пластика
141. Хънтеровият глосит е характерен за: пернициозна анемия
142. Коя е най-честата макроскопска форма на стомашния рак: язвена
143. През първата седмица при остра токсична дегенерация черният дроб е: намален и пъстър със сбръчкана капсула
144. В черния дроб най-често метастазира: карцином на стомаха
145. При карцином на папила Фатери в черния дроб се развива: механичен иктер
146. Черният дроб е намален, едровъзловат и силно деформиран при: постнекротична цироза
147. Ракът на черния дроб може да се предхожда от: цироза на черния дроб
148. Хидропс на жлъчния мехур се развива след: холелитиаза
149. Ракът на жлъчния мехур най-често е: АДЕНОКАРЦИНОМ
150. Характерни за болестта на Боткин са чернодробните клетки със: БАЛОННА ДЕГЕНЕРАЦИЯ
151. При остър панкреатит панкреасът е: УГОЛЕМЕН С КРЪВОИЗЛИВИ И НЕКРОЗИ
152. При муковисцидоза панкреасът е с: КИСТИЧНА ФИБРОЗА
153. Множествени малки чернодробни абсцеси могат да се развият при: СЕПТИКОМИЕМИЯ

154. При пигментна чернодробна цироза се намират: отлагане на хемосидерин

155. Холостазата и холангиолитът водят до: билиарна цироза

156. Черен дроб с вид на географска карта се наблюдава при: ЕКЛАМПСИЯ

157. „Кремъчен“ черен дроб се намира при: LUES CONGENITA

Покровителката
Астра Зенека, Пфайзер и Янсен

ВАКСИНИРАНИ ЛИ СТЕ?

1. ХЕМОРАГИЧЕН ХАРАКТЕР ИМА ВЪЗПАЛЕНИЕТО ПРИ:

- А/ ГРИПНАТА ПНЕВМОНИЯ
- Б/ КЛЕБСИЕЛНАТА ПНЕВМОНИЯ
- В/ БЕЛОДРОБНАТА ХИСТОПЛАЗМОЗА
- Г/ БЕЛОДРОБНАТА АСПЕРГИЛОЗА

2. КОЙ ОТ ТУМОРИТЕ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА СЕ СВЪРЗВА В 80% С АЗБЕСТОВА ЕКСПОЗИЦИЯ:

- А/ БРОНХИОЛО-АЛВЕОЛАРЕН КАРЦИНОМ
- Б/ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ
- В МЕЗОТЕЛИОМ НА ПЛЕВРАТА
- Г/ КАРЦИНОМ ТИП "ОВЕСЕНИ ЯДКИ"

3. ДЕФИЦИТЪТ НА АЛФА-1-АНТИТРИПСИН ВОДИ ДО РАЗВИТИЕТО НА:

- А/ СИНДРОМ НА GOODPASTURE
- Б/ БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ
- В/ БРОНХИАЛНА АСТМА
- Г/ БЕЛОДРОБНИ БРОНХИЕКТАЗИИ

4. ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ НЕ СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ:

- А/ МЕЗОТЕЛИОМ НА ПЛЕВРАТА
- Б/ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ
- В/ БРОНХИОЛО-АЛВЕОЛАРЕН КАРЦИНОМ
- Г/ ХОББ

5. РАК НА ПАНКОАСТ Е:

- А/ МАТАСТАЗА ОТ ЖЕЛАТИНОЗЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА В БЕЛИЯ ДРОБ
- Б/ ПЪРВИЧЕН ВЪРХОВ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
- В/ ВИД ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА БРОНХА
- Г/ ВИД БРОНХИОЛОАЛВЕОЛАРЕН КАРЦИНОМ

6. НАЙ-ЧЕСТИЯТ ЕЗОФАГИТ ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ Е:

- А/ ГРАНУЛОМАТОЗЕН
- Б/ МИКОТИЧЕН
- В/ РЕФЛУКСЕН
- Г/ ТУБЕРКУЛОЗЕН

7. КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПОЛИПИ НЕ СЕ СМЯТА ЗА ПРЕНЕОПЛАСТИЧЕН?

- А/ ВИЛОЗЕН АДЕНОМ / ПОЛИП/
- Б/ ТУБУЛОВИЛОЗЕН АДЕНОМ
- В/ МНОЖЕСТВЕНА ФАМИЛНА ПОЛИПОЗА
- Г/ ХИПЕРПЛАСТЕН ПОЛИП

8. УСЛОЖНЕНИЕ НА ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА Е?

- А/ АМИЛОИДОЗА НА СЛЕЗКАТА
- Б/ ХОЛЕЛИТИАЗА
- В/ АСЦИТ
- Г/ АНАЗАРКА

9. РАК НА КРУКЕНБЕРГ Е:

- А/ ЯЙЧНИКОВ ТУМОР ПЪРВИЧЕН
- Б/ ТУМОР НА ПАНКРЕАСА
- В/ ТУМОР НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
- Г/ МЕТАСТАЗА ОТ ЖЕЛАТИНОЗЕН РАК НА СТОМАХА В ЯЙЧНИЦИТЕ

10. КЪДЕ НАЙ-ЧЕСТО СЕ РАЗВИВА КАРЦИНОИД В СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ:

- А/ ТЪНКО ЧЕРВО
- Б/ АПЕНДИКС
- В/ ДЕБЕЛО ЧЕРВО
- Г/ СТОМАХ

1. КОМБИНИРАНОТО ЗАСЯГАНЕ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ И БЪБРЕЦИТЕ Е ХАРАКТЕРНО ЗА
А/ Синдрома на CHURGE-STRAUSS
Б/ Синдрома на GOODPASTURE
В/ СИНДРОМА НА FLAMMAN-RICH
Г/ Синдрома на WILSON-MIKITY

2. КОЙ ОТ ТУМОРЕТЕ НЕ СЕ СРЕЩА В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ:
А/ ВИСОКО ДИФЕРЕНЦИРАН ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ
Б/ БАЗОЦЕЛОЛАРЕН КАРЦИНОМ
В/ МЕТАСТАЗИ ОТ СТОМАШЕН КАРЦИНОМ
Г/ ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ ТИП "ОВЕСЕНИ ЯДКИ"

3. ЗА КОЯ ОТ ПНЕВМОНИИТЕ Е ХАРАКТЕРЕН ФИБРИНОВ ЕКСУДАТ И ЛЕВКОЦИТНА ИНФИЛТРАЦИЯ В АЛВЕОЛИТЕ
А/ ФРИДЛЕНДЕРОВА
Б/ СТАФИЛОКОКОВА
В/ КРУПОЗНА
Г/ ИНТЕРСТИЦИАЛНА

4. ПРИ КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НЕ СЕ РАЗВИВА ПНЕВМОСКЛЕРОЗА ?
А/ ТУБЕРКУЛОЗА
Б/ СИЛИКОЗА
В/ КАТАРАЛЕН БРОНХИТ
Г/ САРКОИДОЗА

5. ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ НЕ СЕ РАЗВИВА ПРИ:
А/ ПЪРВИЧНА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ
Б/ ХРОНИЧЕН ОБСТРУКТИВЕН ЕМФИЗЕМ
В/ ХРОНИЧНА ФИБРОЗНО- КАВЕРНОЗНА ТУБЕРКУЛОЗА
Г/ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ

6. БАРЕТОВ ЕЗОФАГ МОЖЕ ДА СЕ АСОЦИИРА С НАЛИЧИЕТО НА:
А/ АХАЛАЗИЯ
Б/ ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА
В/ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЕН РЕФЛУКС
Г/ АДЕНОКАРЦИНОМ НА СТОМАХА

7. ПРИ КОЕ ЗАБОЛЯВАНЕ ИМА СЕГМЕНТНО ЗАСЯГАНЕ НА ТЪНКО И ДЕБЕЛО ЧЕРВО, ТРАНСМУРАЛНО ВЪЗПАЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕПИТЕЛОИДОКЛЕТЪЧНИ ГРАНУЛОМИ?
А/ УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
Б/ КРИПТОСПОРИДИОЗА
В/ БОЛЕСТ НА КРОН
Г/ ДИВЕРТИКУЛИТ

8. ЗА АЛКОХОЛНИЯ ХЕПАТИТ Е ХАРАКТЕРНО:
А/ СТЕАТОЗА И ТЕЛЦА НА МАЛОРИ
Б/ ХЕМОСИДЕРОЗА
В/ НЕУТРОФИЛИ СРЕД ЛОБУЛАРНИЯ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ИНФИЛТРАТ
Г/ ЦЕНТРОЛОБУЛАРНА ФИБРОЗА

9. СТОМАШНАТА ЯЗВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ УСЛОЖНИ С РАЗВИТИЕТО НА:
А/ ИНСУЛИНОМ
Б/ ХЕМАТЕМЕЗА
В/ ПИЛОРНА СТЕНОЗА
Г/ ПЕНЕТРАЦИЯ

10. КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ХИСТОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ НЕ Е БЕЛЕГ ЗА МОРФОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ ПРИ ХЕПАТИТ:
А/ РЕАСЕ-МЕАЛ НЕКРОЗИ
Б/ НЕКРОИНФЛАМАТОРНИ ПРОМЕНИ В ЛОБУЛИ
В/ ЗАПАЗЕНА ГРАНИЧНА ЛАМЕЛА
Г/ МОСТОВИ НЕКРОЗИ

1. КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НЕ Е УСЛОЖНЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИТЕ БРОНХИЕКТАЗИИ?

А/ ОГНИЩНА ПНЕВМОНИЯ

Б/ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ

В/ ХРОНИЧЕН БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ

Г/ АБСЦЕС И ГАНГРЕНА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

2. ДЕФИЦИТЪТ НА АЛФА-1-АНТИТРИПСИН ВОДИ ДО РАЗВИТИЕТО НА:

А/ СИНДРОМ НА GOODPASTURE

Б/ БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ

В/ БРОНХИАЛНА АСТМА

Г/ БЕЛОДРОБНИ БРОНХИЕКТАЗИИ

3. В СТАДИЙ НА ЧЕРВЕНА ХЕПАТИЗАЦИЯ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАМИРА:

А/ НАЛИЧИЕ НА ХИАЛИННИ МЕМБРАНИ В АЛВЕОЛАРНИТЕ ХОДОВЕ

Б/ ГНОЕН ЕКСУДАТ В АЛВЕОЛИТЕ

В/ В АЛВЕОЛИТЕ ЕКСУДАТ БОГАТ НА ФИБРИН И ЕРИТРОЦИТИ

Г/ ОБИЛНА КЛЕТЪЧНА ИНТЕРСТИЦИАЛНА ИНФИЛТРАЦИЯ

4. КОЕ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ НЕ СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ БЕЛОДРОБНИЯТ КАРЦИНОМ:

А/ ДЕСТРУКЦИЯ НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ И МАСИВНИ КРЪВОИЗЛИВИ

Б/ АТЕЛЕКТАЗИ

В/ ГАНГРЕНА НА БЕЛИЯ ДРОБ

Г/ КАФЯВА ИНДУРАЦИЯ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

5. БИСИНОЗАТА Е ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, КОЕТО СЕ СРЕЩА ПРИ:

А/ ПРИ КАМЕНОДЕЛЦИ

Б/ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ПАМУК

В/ ПРИ ПРЕРАБТВАНЕТО НА СРЕБРО

Г/ ПРИ РАБОТНИЦИ ЗАЕТИ В СЪКЛАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

6. В КОЙ ОРГАН НАЙ-ЧЕСТО ПЕНЕТРИРА СТОМАШНАТА ЯЗВА:

А/ ЧЕРЕН ДРОБ

Б/ СЛЕЗКА

В/ ПАНКРЕАС

Г/ БЕЛИ ДРОБОВЕ

7. ЕПУЛИСЪТ Е:

А/ ФИБРОМ НА СТОМАХА

Б/ ТУМОР НА ЧЕЛЮСТИТЕ

В/ ВЪЗПАЛИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ВЕНЕЦА

Г/ ТУМОРОВИДНО ОБРАЗУВАНИЕ НА ВЕНЕЦА

8. LINITIS PLASTICA СЕ ИДЕНТИФИЦИРА С:

А/ ДИФУЗЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

Б/ НОДУЛАРЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

В/ ЯЗВЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

Г/ ЖЕЛАТИНОЗЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА

9. ЧЕРНИЯ ДРОБ Е НАМАЛЕН, ЕДРОВЪЗЛОВАТ И СИЛНО ДЕФОРМИРАН ПРИ:

А/ ПОРТАЛНА ЦИРОЗА

Б/ КАРДИАЧНА ЦИРОЗА

В/ ПОСТНЕКРОТИЧНА ЦИРОЗАЮ

Г/ БИЛИАРНА ЦИРОЗА

10. ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАПИЛА ФАТЕРИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ СЕ РАЗВИВА:

А/ МАСТНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ

Б/ МЕХАНИЧЕН ИКТЕР

В/ КРЪВОИЗЛИВИ

Г/ НЕКРОЗА НА ПАРЕНХИМА

1.АНГИНАТА НА LUDOWICI / ЛУДОВИК/ Е.

А/ ФЛЕГМОНОЗНА АНГИНА

Б/ ЛАКУНАРЕН ТОНЗИЛИТ ю

В/ АНГИНА ПРИ АГРАНУЛОЦИТОЗА

Г/ ФИБРИНОЗЕН ТОНЗИЛИТ

2. ПОСОЧЕТЕ КОЯ ОТ ХИСТОЛОГИЧНИТЕ ФОРМИ НА КАРЦИНОМ СЕ СРЕЩА НАЙ-ЧЕСТО В АНАЛНАТА ЧАСТ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО:

А/ АДЕНОКАРЦИНОМ

Б/ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ

В/ НЕДИФЕРЕНЦИРАН КАРЦИНОМ

Г/ ЖЕЛАТИНОЗЕН КАРЦИНОМ

3. ХРОНИЧНАТА ЯЗВА НА СТОМАХА СЕ ДИАГНОСТИЦИРА КАТО:

А/ ULCUS ROTUNDUM

Б/ ULCUS DURUM

В/ ULCUS CALLOSUM

Г/ ULCUS RODENS.

4. МЕТАФОРИТЕ “НЕКРОЗА, КАТО НАХАПАНО ОТ МОЛЦИ” И „МОСТОВИ НЕКРОЗИ” И “БАЛОННА ДЕГЕНЕРАЦИЯ” СА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ХИСТОЛОГИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА:

А/ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ НЕФРИТИ

Б/ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ ПНЕВМОНИИ

В/ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

Г/ ФИДЛЕРОВ МИОКАРДИТ.

5. ЗА ЧЕРНОДРОБНАТА ЦИРОЗА Е ХАРАКТЕРНА:

А/ АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Б/ АРТЕРИАЛНА ХИПОТОНИЯ

В/ ПОРТАЛНА ХИПЕРТЕНЗИЯ

Г/ ПРОТЕИНУРИЯ

6. КРУПОЗНАТА ПНЕВМОНИЯ Е:

А/ ЛОБУЛАРНА

Б/ ИНТЕРСТИЦИАЛНА

В/ ЛОБАРНА

Г/ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ

7. СИЛИКОЗАТА Е ПНЕВМОКОНИОЗА, КОЯТО СЕ РАЗВИВА ПРИ ВДИШВАНЕ НА ПРАХ СЪДЪРЖАЩ

А/ СИЛИЦИЕВ ДВУОКИС

Б/ АЗБЕСТ

В/ ВЪГЛИЩЕН ПРАХ

Г/ ТАЛҚ

8. КОИ МАКРОСКОПСКИ ПРОМЕНИ СА ХАРАКТЕРНИ ЗА СТАРЧЕСКИЯ ЕМФИЗЕМ?

А/ РАЗДУТИ С УВЕЛИЧЕН ОБЕМ БЕЛИ ДРОБОВЕ

Б/ ГОЛЕМИ ВЪЗДУШНИ МЕХУРИ ПО ПОВЪРХНОСТТА

В/ МАЛКИ БЕЛИ ДРОБОВЕ СВИТИ КЪМ ХИЛУСА

Г/ БЕЛИ ДРОБОВЕ ОТПУСНАТИ СЪС СИЛНО НАМАЛЕНА КОНСИСТЕНЦИЯ

9. КАКЪВ ХАРАКТЕР ИМА ЕКСУДАТЪТ В ПЛЕВРАЛНАТА И ПЕРИКАРДНА КУХИНА ПРИ ЛИМФОГЕННО ПРОНИКВАНЕ НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ В ТЯХ?

А/ ФИБРИНОЗЕН

Б/ ГНОЕН

В/ ХЕМОРАГИЧЕН

Г/ НЯМА ПРОМЕНИ

10. В СТАДИЙ НА ЧЕРВЕНА ХЕПАТИЗАЦИЯ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ СЕ НАМИРА:

А/ НАЛИЧИЕ НА ХИАЛИННИ МЕМБРАНИ В АЛВЕОЛАРНИТЕ ХОДОВЕ

Б/ ГНОЕН ЕКСУДАТ В АЛВЕОЛИТЕ

В/ В АЛВЕОЛИТЕ ЕКСУДАТ, БОГАТ НА ФИБРИН И ЕРИТРОЦИТИ

Г/ ОБИЛНА КЛЕТЪЧНА ИНТЕРСТИЦИАЛНА ИНФИЛТРАЦИЯ

1. КОЙ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ТУМОРИ СЕ РАЗВИВА ОТ ЕПИТЕЛА НА УСТНАТА КУХИНА ?

A/ БАЗОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ

Б/ НЕВРИНОМ

В/ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ

Г/ ГРАНУЛАРНОКЛЕТЪЧЕН ТУМОР /МИОБЛАСТЕН МИОМ/

2. ПОСОЧЕТЕ КОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ТУМОРИ СЕ РАЗВИВА В СЛЮНЧЕНАТА ЖЛЕЗА:

A/ АДЕНОЛИМФОМ

Б/ ФИБРОМ

В/ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ

Г/ ХЕМАНГИОМ

3. БОЛЕСТТА НА КРОН СЕ РАЗВИВА НАЙ-ЧЕСТО В:

A/ JEJUNUM

Б/ ILEUM

В/ COLON ASCENDENS

Г/ COLON TRANSVERSUM

4. ПОСОЧЕТЕ ПРИ КАКВА ФОРМА НА ХОЛЕЦИСТИТ МОЖЕ ДА НАСТЪПИ МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА:

A/ КАТАРАЛЕН

Б/ ГНОЕН

В/ ХРОНИЧЕН НЕКАЛКУЛОЗЕН

Г/ КАЛКУЛОЗЕН

5. КЪДЕ НАЙ-ЧЕСТО СЕ РАЗВИВА КАРЦИНОИД В СТОМАШНОЧРЕВНИЯ ТРАКТ?

A/ ТЪНКО ЧЕРВО

Б/ АПЕНДИКС

В/ РЕКТУМ

Г/ СТОМАХ

6. ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ СЕ РАЗВИВА ПРИ СЛЕДНИТЕ ПАТОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА:

A/ ПЪРВИЧНА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ

Б/ ХРОНИЧЕН ОБСТРУКТИВЕН ЕМФИЗЕМ

В/ ХРОНИЧНА ФИБРОЗНО- КАВЕРНОЗНА ТУБЕРКУЛОЗА

Г/ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ

7. В СТАДИЙ НА СИВА ХЕПАТИЗАЦИЯ ПРИ КРУПОЗНА ПНЕВМОНИЯ СЕ НАМИРА:

A/ НАЛИЧИЕ НА ХИАЛИННИ МЕМБРАНИ В АЛВЕОЛАРНИТЕ ХОДОВЕ

Б/ ГНОЕН ЕКСУДАТ В АЛВЕОЛИТЕ

В/ В АЛВЕОЛИТЕ ЕКСУДАТ БОГАТ НА ФИБРИН И ЛЕВКОЦИТИ

Г/ ОБИЛНА КЛЕТЪЧНА ИНТЕРСТИЦИАЛНА ИНФИЛТРАЦИЯ

8. ЕМПИЕМ НА ПЛЕВРАТА Е:

A/ СЕРОЗЕН ИЗЛИВ В ПЛЕВРАЛНАТА КУХИНА

Б/ ОБИЛЕН ГНОЕН ЕКСУДАТ В ПЛЕВРАЛНАТА КУХИНА

В/ ОБЛИТЕРИРАЩ ФИБРОЗЕН ПЛЕВРИТ

Г/ ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ В РЕЗУЛТАТ НА ТУМОРЕН ПРОЦЕС

9. РАК НА ПАНКОУСТ Е;

A/ МАТАСТАЗА ОТ ЖЕЛАТИНОЗЕН КАРЦИНОМ НА СТОМАХА В БЕЛИЯ ДРОБ

Б/ ПЪРВИЧЕН ВЪРХОВ БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

В/ ВИД ДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА БРОНХА

Г/ ВИД БРОНХИОЛОАЛВЕОЛАРЕН КАРЦИНОМ

10. СЛЕД КАРНИФИКАЦИЯ ПРИ ПНЕВМОНИЯ ХИСТОЛОГИЧНО СЕ НАБЛЮДАВА:

A/ ЕКСУДАТ ОТ ЛЕВКОЦИТИ И ЕРИТРОЦИТИ В АЛВЕОЛИТЕ

Б) ФИБРОЗНА ТЪКАН В ПРОСВЕТА НА АЛВЕОЛИТЕ

В/ ЕКСУДАТ ОТ ЛЕВКОЦИТИ И ФИБРИН В АЛВЕОЛИТЕ

Г/ ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ИНФИЛТРАТ ОТ ЕПИТЕЛОИДНИ КЛЕТКИ

Въпрос 4

Кое от долу изброените състояния не може да бъде усложнение на чернодробната цирроза:

- а/ коагулопатия
- б/ спленомегалия
- в/ хепатит
- г/ асцит

Въпрос 6

Холедохолитиазата с холестаза води до:

- а/ хемохроматоза
- б/ първична билиарна цирроза
- в/ мускатов черен дроб
- г/ вторична билиарна цирроза

Въпрос 15

Кое от изброените по-долу НЕ е белег за морфологична активност при вирусен хепатит:

- а/ мостови некрози
- б/ изразена стеатоза
- в/ некроинфламаторни промени в лобули
- г/ rease-meal некрози

Question 1

Хепатоцити тип „матово стъкло“ са характерни за:

- а/ вирусен хепатит тип А
- б/ вирусен хепатит тип В
- в/ стеатозен хепатит
- г/ вирусен хепатит тип С

Question 6

Усложнение на флегмонозен апендицит може да бъде развитието на:

- а/ пенетрация
- б/ асептичен перитонит
- в/ малигнена дегенерация
- г/ гноен перитонит

Question 14

Коя от изброените лезии в устната кухина е преканцероза:

- а/ Гигантоклетъчен епулис
- б/ иритационен фибром
- в/ фокална епителна хиперплазия
- г/ еритроплазия

Question 25

При коя от посочените причини не може да се развие дифузна пневмосклероза:
а/ Hamman-Rich

б/ **огнищна пневмония**

в/ вдишване на кварцов прах

г/ заболявания на съединителната тъкан

Въпрос 23

При кой тип карцином на белия дроб туморната тъкан наподобява макроскопски на пневмония:

а/ при дребноклетъчен карцином

б/ при плоскоклетъчен карцином с вроговяване

в/ **при бронхиолоалвеоларен карцином.**

г/ при аденокарцином