

Persiguiendo a Jacobson

Scientia gratia scientiae



¡Ah!

Filosofía,
jurisprudencia y medicina,
incluso teología,
todo lo he estudiado con ardor
creciente,
y heme aquí, pobre loco,
tan sabio como antes.

Fausto (Goethe)

De qué se habla

A día de hoy la física se encuentra dividida por dos teorías efectivas irreconciliables. Una de ellas nos permite hacer física determinista a escalas grandes, la relatividad general. La otra nos lo permite a escalas pequeñas y de forma probabilística, la mecánica cuántica.

Lo repetimos: la verdad se nos manifiesta en una escala como continua y determinista, en otra como discreta y probabilística. Si yo miro al oeste y encuentro que es de día y miro al este y es de noche lo primero que me tengo que preguntar es desde dónde estoy mirando y si estoy mirando como tengo que mirar.

Llevamos décadas intentando encontrar una verdad última que explique por qué se nos imponen maneras de mirar tan diferentes siendo igual de verdaderas, pero esto es como intentar meter el cuadrado en el agujero de los círculos y se nos resiste. La comunidad empieza además a manifestar cierto enfado, porque en este escenario la manera más prometedora que habíamos encontrado para convertir un cuadrado en un círculo es matemática y se está convirtiendo en un esfuerzo infinito que no hace más que consumir demasiados recursos: eso es la teoría de cuerdas. Y hay otras maneras de salir de este callejón sin salida. Una de ellas es Jacobson.

En su artículo de 1995 Jacobson¹ intuyó que no tenía sentido buscar herramientas válidas para ambos mundos, lo grande y determinista y lo pequeño y probabilístico, sino puentes que las unieran. Ya habíamos usado formas así antes. En la era de la máquina de vapor y el calor moviendo industrialmente el mundo habíamos tenido que recurrir a un mirar físico estadístico, macroscópico, encapsulando la realidad última y microscópica sin pretender explicarla. Ya teníamos una teoría efectiva

que conectaba eficazmente dos escalas: la termodinámica, que habríamos podido llamar termoestadística y que hoy hemos ampliado en lo que conocemos como física o mecánica estadística.

Jacobson se encontró con que ese mismo puente valía para explicar que eso grande y determinista que percibimos como gravedad es una apariencia estadística de algo más pequeño: hizo emerger la ecuación de la relatividad general de la termodinámica utilizando herramientas físicas aceptadas. Sin pararse a determinar qué subyace a nivel microscópico y que provoca la gravedad, evidenció que si había un puente analítico formal tendría que buscarse entre esa realidad microscópica y la cuántica, y que no tenía sentido buscar una relación entre unos fundamentos microscópicos en un lado y una manifestación macroscópica en el otro. Algo más tarde, en 2010, Verlinde² derivó también termodinámicamente las leyes de Newton desde una realidad microscópica.

En este artículo pretendemos abordar el trabajo de Jacobson y aprender en profundidad cada uno de sus fundamentos, por contener piezas de física fundamental que nos abrirán caminos igual de fascinantes que el que hoy empezamos. Hasta cierto punto parece de justicia que la termodinámica, la mejor fenomenología que tenemos para inferir y experimentar ese mirar estadístico, y que fue la base de que se sirvió Planck para superar la catástrofe del ultravioleta abriendo para siempre una crisis sistémica, sea ahora la única herramienta de que disponemos si queremos establecer puentes entre las dos orillas.

Metodología

Cuando empezamos este estudio nos aparece conveniente seguir la evolución del autor a través de su propio artículo. El mismo

¹ [Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State](#), Jacobson (1995)

² [On the Origin of Gravity and the Laws of Newton](#), Verlinde (2010)

Jacobson menciona las ideas que le inspiraron en una entrevista personal donde añade como idea germinal la búsqueda de una explicación íntima satisfactoria para los trabajos de Hawking³, y cómo la encontró en Rindler.

Empezaremos así por Rindler para establecer una equivalencia termodinámica entre el horizonte de un agujero negro y los que produce un observador acelerado en una métrica plana. Veremos después Unruh y el calor que experimenta ese observador acelerado por las fluctuaciones en el vacío y cómo Clausius nos permitirá traducirlo en un cambio de entropía. Pasaremos entonces a Raychaudhuri para establecer cómo esas variaciones en la entropía se traducen en variaciones en la geometría y ya por fin haremos el encaje algebraico final para que esa geometría se convierta en gravedad como la conocemos en la ecuación de campo de Einstein.

Intentaremos cerrar todo esto con una reflexión epistemológica: quizás hayamos llegado a una suerte de límite en el que el principio de incertidumbre pase a ser no ya una propiedad de lo mirado, como establece Copenhague, sino también del propio mirar. De ser así tendremos que conformarnos con buscar dualidades sobre puentes que conecten piezas inconexas, en vez de teorías simétricas, y considerar que hasta una de las teorías de mayor éxito, la teoría cuántica de campos, tiene menos de fundamental de lo que nos gustaría.


Horizonte de Rindler

El principio de equivalencia establece que la gravedad es localmente indistinguible de una aceleración de cualquier otra naturaleza, pero eso no significa que toda aceleración sea

la oposición a un campo gravitatorio y que no podamos estudiar el movimiento no inercial también en métricas planas.

Sea cual sea la estructura de la métrica plana que lo describa, la velocidad de todo observador acelerado está limitada a no alcanzar ni superar nunca c , es decir, que su línea de vida está obligada a converger asintóticamente a la línea de universo⁴ en Minkowski sin alcanzarla nunca.

Nos encontramos así con que lejos de esa pendiente toda línea de universo se cruzará en algún momento con nuestra línea de vida, ya sea en un momento coordinado con ct positivo o negativo según el origen elegido, pero que al acercarnos a la asíntota toda una región del espacio-tiempo queda causalmente desconectada, asintóticamente, del observador acelerado, como se muestra en el siguiente diagrama (Socolovsky 2013⁵)



Hay muchas reflexiones que se pueden hacer acerca de la naturaleza asintótica de esta desconexión causal u horizonte de Rindler. Esa desconexión exige condiciones que lo limitan al campo teórico: la aceleración debe ser permanente y no detenerse nunca

³ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025)

⁴ Una pequeña licencia: llamaremos línea de vida a la línea de mundo o universo del observador acelerado y dejaremos línea

de universo para referirnos a la de cualquier fotón y su pendiente: la razón de la métrica.

⁵ [Rindler Space and Unruh Effect](#), Socolovsky (2013)

para permanecer cerca de la asíntota, y no hay un punto exacto a partir del que se produzca esa desconexión. Parece imposible imaginar nada que cumpla tales condiciones, ni siquiera los hadrones del CERN. Pero en su naturaleza teórica incluso nosotros mismos, en cualquier aceleración por pequeña que sea, lo producimos: localmente no podemos conocer si dicha aceleración se va a detener en algún momento.

Horizontes locales (Jacobson)

Y esta fue la idea feliz de Jacobson: olvidarse de si un móvil real puede o no alcanzar las condiciones para crearlo, y pensar que en cada pequeña pieza del puzle del espacio-tiempo, en cada uno de sus puntos que podemos imaginar como una métrica plana según el principio de equivalencia, es teóricamente posible. De otra forma, en cada pieza, en cada punto, podemos imaginar una aceleración uniforme y un horizonte de Rindler: los horizontes locales de Jacobson⁶, que emergen de forma natural del propio espacio-tiempo.


La desconexión causal que producen esos horizontes es similar a las que se producen en el horizonte de eventos de un agujero negro, por más que el segundo sea una realidad física y nuestros horizontes locales una predicción teórica. Esa equivalencia nos permitirá el uso de la termodinámica que ya conocemos en los agujeros negros, que no deja de ser mecánica estadística para encapsular y tratar nuestro desconocimiento microscópico de una región inaccesible.

Coordenadas de Rindler WIP

Al introducir una aceleración en un móvil ya no le obligamos a seguir el segundo postulado de la relatividad especial

formulado para sistemas inerciales: el móvil que acelera huye de forma efectiva de cualquier fotón que lo persiga y ve reducirse la velocidad de ese fotón conforme se acerca a la asíntota. Eso es precisamente lo que establece la desconexión causal en el límite de Rindler y que hace que tengamos que introducir un mapa de coordenadas diferentes en Minkowski, construido alrededor de ese segundo postulado, para recordarnos que ya no podemos interpretar igual todas las direcciones de nuestras distancias espacio-temporales.

Rindler introdujo el sistema coordenado que lleva su nombre y que incorpora varios niveles para la aceleración propia y uniforme en la dirección espacial como una razón adicional hiperbólica a la línea de universo, de la forma⁷



En él las coordenadas ct y x quedan transformadas, para una aceleración propia a y el tiempo propio τ como

$$ct = \frac{c^2}{a} \sinh\left(\frac{a\tau}{c}\right) \quad x = \frac{c^2}{a} \cosh\left(\frac{a\tau}{c}\right)$$

en su mesa de trabajo. No se me ocurre que haya sustancia en este mundo que le pueda producir a uno lo que imagino que será esa sensación.

⁷ [Formas hiperbólicas en el mapa de Rindler](#)

⁶ [The Physicist Who Proved Entropy = Gravity](#), Curt Jaimungal in @TheoriesofEverything (2025). No sé de dónde reciben los genios sus ideas felices, sí que cuando nos las comunican nos ponen los pelos de punta: imaginen llegar a esto solos sentados

Y el elemento de línea, introduciendo la relación $\rho = \frac{c^2}{a}$, como

$$ds^2 = d\rho^2 - \left(\frac{\rho a}{c}\right)^2 d\tau^2$$

(incluir demostraciones en anexos)

(explicar aceleración propia y paradoja de Bell)

De no disponer de este nuevo mapa hiperbólico podríamos tender a, por ejemplo, imaginar mal la forma tridimensional del horizonte de Rindler al exigirle que todo punto de ese horizonte sea equidistante del móvil no sólo en el eje x , sino también en los ejes y y z , imaginando simetrías donde no las hay. Lo cierto es que la aceleración sólo se produce en una dirección, y el horizonte de Rindler se forma como un plano perpendicular al único eje acelerado. La distancia que une todos los puntos del plano al móvil en cada momento es la misma distancia ρ , y eso es lo que muestran las hipérbolas de nivel $\frac{c^2}{a}$ ya en nuestros nuevos diagramas.