Hernández Muciño Angel Gabriel

Tarea 7

Ejercicio 4_5

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ordenes								
Id_orden	**Fecha**	**Id_cliente**	**Nom_cliente**	**Estado**	**Num_art**	**nom_art**	**cant**	**Precio**
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN
- Generar el MER

$R(A, B, C, D, E, F, G, H, I)$

$DF: \{A \to BC, C \to DE, F \to GI, AF \to H\}$

$A\cancel{BCDEFGHI}^{+} = \{\dots\} \to SK$

$AF^{+} = \{\dots\} \to SK, CK$

$A^{+} = \{A, B, C, D, E\}$

$F^{+} = \{F, G, I\}$

$APs: [A, F]$

$CK: \{AF\}$

$PK: \{AF\}$

$nAPs: [B, C, D, E, G, H, I]$

$- 1FN: La\ tabla\ ya\ esta\ en\ su\ 1FN\ ya\ que\ no\ existen\ grupos\ de\ repetición.$

$- 2FN: ¿\ Existen\ dependencias\ funcionales\ parciales?$

$AF \to H$

$A \to BC \qquad \therefore A \to B, \qquad A \to C, \qquad A \to DE$

$F \to GI \qquad \therefore F \to G, \qquad F \to I$

$Existen\ dependencias\ funcionales\ parciales, por\ lo\ tanto\ no\ se\ cumple\ la\ 2FN.$

$Normalizando\ a\ 2FN:$

ORDEN_C: (A, B, C, D, E)

PK

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas
2302	25/02/11	107	Herman	Coro
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay

ARTICULO: (F, G, I)

FK, PK

Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

ORDEN_A: (A, F, H)

FK, PK

Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

$- 3FN: ¿\, Existen\ dependencias\ funcionales\ transitivas\ entre\ nAPs?$

$C \rightarrow DE$

$Hay\ dependencias\ funcionales\ transitivas\ entre\ nAPs, por\ lo\ tanto\ no\ se\ cumple\ la\ 3FN.$

$Normalizando\ a\ 3FN:$

ORDEN: (A, B, C)

Id_orden	Fecha	Id_cliente
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110
2303	27/02/11	110

CLIENTE: (C, D, E)

Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay
110	Pedro	Maracay

ARTICULO: (F, G, I)

Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

ORDEN_A: (A, F, H)

Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2