

exámenes.pdf



Chavalin



Metodología de la Investigación



3º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

UAX

iClo

Pregunta 2
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

En la siguiente imagen, se recoge información sobre el factor de impacto y el ranking durante 2013 de dos revistas de reconocido prestigio, *Anticancer Drugs* y *Advanced Drug Delivery Reviews*. Atendiendo a la posición que ocupan en el ranking de su especialidad, señala cuál de ellas presenta mayor calidad.

Journal Ranking ⓘ
For 2013, the journal **ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS** has an Impact Factor of **12.707**.
This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.

Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	4	Q1


Journal Ranking ⓘ
For 2013, the journal **ANTI-CANCER DRUGS** has an Impact Factor of **1.091**.
This table shows the ranking of this journal in its subject categories based on Impact Factor.

Category Name	Total Journals in Category	Journal Rank in Category	Quartile in Category
ONCOLOGY	203	143	Q3
PHARMACOLOGY & PHARMACY	256	155	Q3

Seleccione una:

- ☐ a. *Anticancer Drugs* puesto que está en el cuartil 3
- ☐ b. *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el tercil 1
- ☐ c. *Anticancer Drugs* puesto que está en el tercil 3
- ☒ d. *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el cuartil 1

WUOLAH



© 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

Key words: Lipid emulsion; Drug carrier; Poorly water-soluble drug; Paclitaxel; Tumor

It is estimated that approximately 40% or more of active substances being identified through drug discovery programs are poorly soluble in water.^{1,2} The effective applications of these drugs are mainly limited by low bioavailability after oral administration, and intravenous administration of such drugs is therefore used to overcome oral bioavailability problem and make these potent drugs available to patients. Over the past decades, drug-loaded nanomedicines for intravenous administration have been shown to be potentially excellent for the

capacity of loading large quantities of poorly water-soluble drugs. Reasonable approaches have been achieved in formulating poor-water soluble drugs into nanocarriers that included lipid nanoparticles,^{3,4} microspheres,⁵ liposomes,^{6,7} emulsions,⁸ and albumin conjugates.⁹

However, most of nanomedicines have three recognized obstacles to delay the development of poorly water-soluble drugs for intravenous injections in clinical application: i) poor physicochemical stability^{10,11}; ii) unable to be up-scaled by industrialized production¹²; iii) susceptible to be captured into the reticuloendothelial system (RES) organs, leading to the low therapeutic efficacy and high toxicity to these organs.¹³

Lipid emulsion, one of novel nanocarriers, has evolved as a feasible formulation option due to its abilities to incorporate poorly water-soluble drugs.¹⁴ In recent years, the increasing attentions have been focused on lipid emulsion based drug delivery systems due to their unique structure and properties.

This work was supported by the Nano Special Program Project of Shanghai Commission of Science and Technology, China (Grant 0952nm03000 and 12nm0501000).

*Corresponding author: School of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai 200433, PR China.

E-mail addresses: yaozhenb163.net (J. Yao), yjcmj@163.com (J. Chen).

[†] These two authors contributed equally to this work.

1549-9634/\$ – see front matter © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2013.07.018>

Seleccione una:

- ☐ a. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nano.2013.07.018>
- ☒ b. 1549-9634
- ☐ c. 371-380
- ☐ d. No tiene ISSN

8

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins


pierdo espacio




Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



WUOLAH




Imagínate aprobando el examen


Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins


perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



WUOLAH

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

☐ Marcar pregunta

Al valorar la asociación entre dos variables (A: tratamientos y B: grado de respuesta) se ha obtenido un χ^2 experimental de 4,05. Analizando la tabla χ^2 y teniendo en cuenta que cada variable tenía dos clases y un nivel de significación (α) del 5%, se puede concluir que...

TABLA - Distribución Chi Cuadrado χ^2

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	161,277	109,827	102,979	100,000	98,017	95,023	92,364	90,531	89,332	88,385	87,552	86,813	86,159	85,578	85,000

1	10,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	2,7055	2,0722	1,6424	1,3233	1,0742	0,8735	0,7083	0,5707	0,4549
2	13,8150	11,9827	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	3,2189	2,7726	2,4079	2,0996	1,8326	1,5970	1,3863
3	16,2660	14,3202	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3170	4,6416	4,1083	3,6649	3,2831	2,9462	2,6430	2,3660
4	18,4662	16,4238	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853	4,8784	4,4377	4,0446	3,6871	3,3567
5	20,5147	18,3854	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257	6,0644	5,5731	5,1319	4,7278	4,3515
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8468	7,2311	6,6948	6,2106	5,7652	5,3481
7	24,3213	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,0170	10,7479	9,8032	9,0371	8,3834	7,8061	7,2832	6,8000	6,3458
8	26,1239	23,7742	21,9549	20,0902	17,5345	15,5073	13,3616	12,0271	11,0301	10,2189	9,5245	8,9094	8,3505	7,8325	7,3441
9	27,8767	25,4625	23,5893	21,6660	19,0228	16,9190	14,6837	13,2880	12,2421	11,3887	10,6564	10,0060	9,4136	8,8632	8,3428
10	29,5879	27,1119	25,1881	23,2093	20,4832	18,3070	15,9872	14,5339	13,4420	12,5409	11,7807	11,0971	10,4732	9,8922	9,3418
11	31,2635	28,7291	26,7569	24,7250	21,9200	19,6752	17,2750	15,7671	14,6314	13,7007	12,8987	12,1836	11,5298	10,9199	10,3418
12	32,9092	30,3182	28,2997	26,2170	23,3367	21,0261	18,5493	16,9893	15,8120	14,8454	14,0111	13,2661	12,5830	11,9463	11,3483
13	34,5274	31,8830	29,8193	27,6882	24,7356	22,3620	19,8119	18,2020	16,9848	15,9839	15,1187	14,3451	13,6356	12,9717	12,3398
14	36,1239	33,4262	31,3194	29,1412	26,1189	23,6848	21,0641	19,4062	18,1508	17,1169	16,2221	15,4209	14,6853	13,9961	13,3393
15	37,6978	34,9494	32,8015	30,5780	27,4884	24,9958	22,3071	20,6030	19,3107	18,2451	17,3217	16,4940	15,7332	15,0197	14,3389
16	39,2518	36,4555	34,2671	31,9999	28,8453	26,2962	23,5418	21,7931	20,4651	19,3609	18,4179	17,5646	16,7795	16,0425	15,3385
17	40,7911	37,9462	35,7184	33,4087	30,1910	27,5871	24,7490	22,9770	21,6146	20,4887	19,5110	18,6330	17,8244	17,0646	16,3382
18	42,3119	39,4220	37,1564	34,8052	31,5264	28,8693	25,9894	24,1555	22,7595	21,6049	20,6014	19,6993	18,8679	18,0860	17,3379
19	43,8194	40,8847	38,5821	36,1908	32,8523	30,1435	27,2036	25,3289	23,9004	22,7178	21,6891	20,7638	19,9102	19,1069	18,3376
20	45,3142	42,3358	39,9969	37,5663	34,1696	31,4104	28,4120	26,4976	25,0375	23,8277	22,7745	21,8265	20,9514	20,1272	19,3374
21	46,7963	43,7749	41,4009	38,9322	35,4789	32,6706	29,6151	27,4620	26,1711	24,9348	23,8578	22,8876	21,9915	21,1470	20,3372
22	48,2676	45,2041	42,7957	40,2894	36,7807	33,9245	30,8132	28,8224	27,2015	26,0393	24,9390	23,9473	23,0307	22,1663	21,3370
23	49,7276	46,6231	44,1814	41,6383	38,0756	35,1725	32,0069	29,9792	28,4288	27,1413	26,0184	25,0055	24,0689	23,1852	22,3369
24	51,1790	48,0336	45,5584	42,9798	39,3641	36,4150	33,1962	31,1325	29,5533	28,2412	27,0960	26,0635	25,1064	24,2037	23,3367
25	52,6187	49,4351	46,9280	44,3140	40,6465	37,6525	34,3816	32,2825	30,6752	29,3388	28,1719	27,1183	26,1430	25,2218	24,3366
26	54,0511	50,8291	48,2898	45,6416	41,9231	38,8851	35,5632	33,4295	31,7946	30,4346	29,2463	28,1730	27,1789	26,2395	25,3365
27	55,4751	52,2152	49,6450	46,9628	43,1945	40,1133	36,7412	34,5736	32,9117	31,5284	30,3193	29,2266	28,2141	27,2509	26,3363
28	56,8918	53,5939	50,9936	48,2782	44,4608	41,3372	37,9159	35,7150	34,0266	32,6205	31,3909	30,2791	29,2486	28,2748	27,3362
29	58,3006	54,9662	52,3355	49,5878	45,7223	42,5569	39,0875	36,8538	35,1394	33,7109	32,4612	31,3308	30,2825	29,2908	28,3361

Seleccione una:

- ☒ a. Ambas variables son independientes puesto que χ^2 experimental < χ^2 teórico
- ☐ b. Ambas variables son dependientes puesto que χ^2 experimental > χ^2 teórico
- ☐ c. Ambas variables son dependientes puesto que χ^2 experimental < χ^2 teórico
- ☐ d. Ambas variables son independientes puesto que χ^2 experimental > χ^2 teórico

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Pregunta 11
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección rápida de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20 determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en la siguiente tabla:

ESTADÍSTICOS		
	Método A	Método B
N	20	20
Media	25	20
Mediana	21	23
Moda	26	26
Desviación estándar	10	10
Varianza	234	301
Rango	53	63
Percentiles		
25	11	9
50	15	12
75	17	15

Seleccione una:

- ☐ a. Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
- ☐ b. Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A
- ☒ c. Se preferirá el método A al presentar un coeficiente de variabilidad menor al método B
- ☐ d. Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B

Página anterior

WUOLAH

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Atendiendo al ejercicio de la imagen, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:

Se ha medido la concentración de sodio (en mEq/l) en el sudor de 64 estudiantes obteniéndose los siguientes resultados:

46,29,35,61,54,37,53,57,52,51,43,67,66,31,53,51,48,59,55,47,76,49,59,50,65,41,60,51,43,82,63,58,43,61,73,38,71,47,47,60,69,53,51,39,66,53,51,39,66,53,56,72,75,52,63,57,54,77,59,36,45,63,67,44

Según los cuales se han determinado los siguientes parámetros:

ESTADÍSTICOS	
Concentración de sodio (mEq/l)	
N	64
Media	54,56
Mediana	53
Moda	51
Desviación estándar	11,77
Varianza	136,4
Rango	53
Percentiles	25 47
	50 53
	75 63

Seleccione una:

- ☐ a. Mediana: 53
- ☒ b. Moda: 51
- ☐ c. Desviación estándar: 11,77
- ☐ d. Media: 54,56

00:14

-00:28

Metodología

1) Indica cual de las afirmaciones sobre ciencias es cierta:

- a. Se puede definir «el conocimiento que se obtiene aplicando un método sistemático y verificable de observación de hechos empíricos, y la obtención de proposiciones universales explicativas (leyes) por razonamiento tanto inductivo falsadle como «deductivo
- b. Los hechos no se ven directamente y sin problema a través de los sentidos puesto que pueden estar influenciados por la percepción
- c. Las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico se derivan por inducción a parte de una base de hechos suministrada por la observación y experimentación. Una vez que se cuenta con este conocimiento general, se puede recurrir a el para hacer predicciones y ofrecer explicaciones
- d. **Todas las opciones son ciertas**

2) Las observaciones realizadas para generar conocimiento se deben de ser:

- a. Pasivas y Privadas
- b. **Activas y Publicas**
- c. Pasivas y Públicos
- d. Activas y Privadas

3) Es cierto que el método científico...

- a. Consta de: observaciones de la realidad; Elaboración de hipótesis « explicativas » y Teoría científica
- b. **Consta de: Observación de la realidad; Elaboración de hipótesis «explicativas»; Contraste de la misma y Teoría científica**
- c. Consta solamente de Interferencia inductiva
- d. Consta solamente de Interferencia deductiva

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Free 4G

11:29

98 %

attachment.outlook.live.net

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

4) En la generación de conocimiento, es imposible observar todos los casos presentes en la naturaleza, por ello se analiza una muestra representativa de una determinada población, de manera que cuando se aplica una ley o conclusión general a casos particulares se trata de:

- a. Interferencia inductiva $N \text{ observaciones particulares} = \text{conclusión general}$
- b. Interferencia deductiva $\text{Enunciado general} = \text{modelos y predicción}$
- c. Interferencia tanto inductiva como deductiva
- d. Ninguna de las anteriores

5) Señala la afirmación correcta:

- a. Las hipótesis deben de establecerse de manera que sea posible demostrar su falsedad
- b. Las hipótesis deben de poder contrastarse
- c. Las hipótesis no se demuestran, sino que se rechazan o no
- d. Todas las opciones son correctas

6) Señala la afirmación correcta:

- a. En un protocolo de investigación deben de contemplarse los problemas éticos y legales si hubiese
- b. El desarrollo tecnológico orientado hacia la obtención de productos tangibles puede considerarse un tipo de proyecto
- c. Todos los proyectos deben contemplarse con hipótesis
- d. Todas las opciones son correctas

7) Señala la afirmación correcta:

- a. Los documentos científicos son las

WUOLAH

8) Los artículos en una revista científica

- a. Son evaluados previamente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- b. Son evaluados previamente por los propios autores para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- c. Son evaluados posteriormente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- d. Son evaluados posteriormente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica

9) ISBN es un código que identifica

- a. Una revista
- b. Un libro científico
- c. Un artículo científico
- d. Una patente

10) Bibliografía gris es una fuente bibliográfica caracterizada por:

- a. Ser difícil de leer por su lenguaje demasiado técnico
- b. Ser de fácil acceso y no contener nada importante
- c. Ser de difícil acceso y contener información valiosa
- d. Estar publicada sin figuras en color

- 11) La bibliografía representa la relación de obras consultadas para la realización de un trabajo y cada una de ellas debe aparecer citada de una manera concreta a través de la llamada referencia bibliográfica. Por tanto:
- a. Los nombres de las revistas deben de ser siempre especificados al detalle
 - b. Los nombres de las revistas pueden abreviarse siguiendo guías nacionales o internacionales
 - c. Los nombres de las revistas pueden abreviarse según el criterio del autor
 - d. Todas son falsas

- 12) Señala la afirmación correcta:
- a. El método estadístico no permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
 - b. El método estadístico permite validar la extrapolación que supone aplicar la explicación extraída de una muestra representativa a toda la población
 - c. El método estadístico solo se dedica a muestrear una población
 - d. Todo lo anterior es falso

- 13) Las hipótesis son:
- a. Propositiones tentativas a cerca de la relación de dos o mas variables
 - b. Propositiones tentativas a cerca del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas
 - c. Propositiones tentativas a cerca de la comparación (igualdad o diferencia) entre 2 grupos de observaciones
 - d. Propositiones tentativas a cerca de la relación de dos o mas variables, del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas, o de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos Grupos de observaciones

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

14) Una vez establecidas la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el nivel de significación alfa del 5% y un estadístico de contraste:

- Aceptare la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05
- Rechazare la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05**
- Aceptare la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005
- Rechazare la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005

p-valor < alfa: rechazo H_0

cuanto menor sea el valor p, tanta mas confianza hay en que H_1 sea cierta

15) La afirmación «el consumo de antibióticos difiere entre hombres y mujeres» puede considerarse como hipótesis alternativa (H_1) de una investigación de manera que

- Su hipótesis nula (H_0) podría ser «no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres»**
- Su hipótesis nula (H_0) podría ser «hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres»
- Una afirmación de este tipo, solo puede constituir el objetivo de una investigación
- Ninguna de las anteriores

16) El grupo sanguíneo (ABO), religión o provincia puede considerarse como:

- Variable cuantitativa discreta **con cifra cuando no admiten valores intermedios (cifra entera)**
- Variable cuantitativa continua **con cifra cuando admiten valores intermedios**
- Variable cualitativa nominal con letra sin orden**
- Variable cualitativa ordinal **con letra y posible establecer un orden entre ellas**

17) Numero de hijos, numero de farmacias:

- Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios (cifra entera)**
- Variable cuantitativa continua **con cifra cuando admiten valores intermedios**
- Variable cualitativa nominal **con letra sin orden**
- Variable cualitativa ordinal **con letra y posible**

WUOLAH

18) **Altura, peso, concentración, etc...**

- a. Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios
- b. **Variable cuantitativa continua** con cifra cuando admiten valores intermedios
- c. Variable cualitativa nominal con letra sin orden
- d. Variable cualitativa ordinal con letra y posible establecer un orden entre ellas

19) Consumo de alimento, grado de recuperación...

- a. Variable cuantitativa discreta con cifra cuando no admiten valores intermedios
- b. Variable cuantitativa continua con cifra cuando admiten valores intermedios
- c. Variable cualitativa nominal con letra sin orden
- d. **Variable cualitativa ordinal** con letra y posible establecer un orden entre ellas

20) La probabilidad de rechazar H_0 cuando esta es verdadera:

- a. **Implica cometer error tipo I o alfa**
- b. Implica cometer error tipo II o alfa
- c. Implica cometer error tipo II o beta
- d. Se conoce como potencia de contraste

	H_0 verdadera	H_0 falsa/ H_1 cierta
H_0 se rechaza	Error tipo I o alfa	Decisión correcta
H_0 se acepta	Decisión correcta	Error tipo II o Beta

21) A la hora de seleccionar una muestra, es falso que:

- a. Hay que tener en cuenta que el muestreo de sujetos voluntarios es no probabilístico
- b. **Hay que definir la unidad de análisis, pero no la población** **HAY QUE DEF LA POBLACION**
- c. Hay que tener en cuenta que el muestreo estratificado es probabilístico
- d. Hay que definir la unidad de análisis y la población

- 22) En la estadística descriptiva, destaca como medida de posición de tendencia central:
- a. El percentil POSICION
 - b. La mediana MODA, MEDIA
 - c. El rango DISPERSION
 - d. La varianza DISPERSION
- 23) El percentil 25 () de la talla de los niños varones recién nacidos es de 55cm. ¿Que significa?
- a. Que el 25% de los niños tienen una talla superior a 55cm
 - b. Que el 25% de los niños tienen una talla igual a 55cm
 - c. Que el 25% de los niños tienen una talla inferior a 55cm
 - d. No significa nada de esto
- 24) Acercando del ejercicio 1 recogido en el ANEXO, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:
- a. Media: 34,58
 - b. Mediana: 53
 - c. Moda: 31
 - d. Desviación estándar: 11,7 RAIZ CUADRADA DE VARIANZA
- 25) Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20n determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en el ejercicio 2 del anexo:
- a. Se preferirá el método A al presente un coeficiente de variabilidad menor al método B menos CV es mejor
 - b. Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
 - c. Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B
 - d. Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



26) Los pictogramas:

- a. Son un tipo de representación grafica de variables cualitativas **DIAGRAMA DE SECTORES**
- b. Son un tipo de representación grafica de variables cuantitativas
- c. Son un tipo de representación grafica tanto de variables cualitativas como cuantitativas
- d. Nada de las anteriores

27) Señala la afirmación correcta:

- a. La distribución normal también es conocida como «distribución de sucesos raros» puesto que la probabilidad de que ocurre es muy pequeña **POISSON**
- b. La distribución de poisson también es conocida como «distribución de sucesos raros» puesto que la probabilidad de que ocurre es muy pequeña
- c. La distribución de poisson también es conocida como «distribución de sucesos raros» puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
- d. Todo lo anterior es cierto

28) Los test estadísticos paramétricos:

- a. Son aquellos que comparan variables cualitativas **Puede ser las 2**
- b. Son aquellos que comparan variables cuantitativas
- c. Son aquellos en los que se conoce la distribución de los datos
- d. Son aquellos en los que se desconoce la distribución de los datos **NO PARAMETRICOS**


WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

29) El test de Kolmogorov-Smirnov se usa para:

- a. Comparar dos grupos de medidas independientes
PRUEBAS DE STUDENT (paramétrica) y Mann-Whitney (no paramétrica)
- b. Compara mas de dos grupos de medidas independientes
- c. **Comprobar si los datos se ajustan a la distribución normal**
- d. Comprobar la homogeneidad de varianzas entre diferentes grupos **TEST DE BARTLETT**

30) Si el coeficiente de correlación de Pearson es $r=0,7$ significa que

- a. **Existe correlación positiva entre las dos variables que se están analizando**
- b. No existe correlación entre las dos variables que se están analizando
- c. Se existen correlación negativa entre las 2 variables que se están analizando
- d. Nada de lo anterior es cierto porque r no permite relacionar variables

$0 < r < 1$: correlacion positiva

$r = 0$: no correlación

$-1 < r < 0$: correlación negativa

31) Hemos medido la cantidad de bilirrubina en sangre en 3 grupos de una población : niños, adultos y ancianos.

Deseamos saber si hay diferencia significativas entre estos 3 grupos, por lo cual se realiza:

- a. Una T-student, comprobando antes la normalidad
- b. **Si hay normalidad y homocedasticidad, ANOVA de una via con test post-HOC**
- c. Correlación de Pearson, si hay normalidad; si no, correlación de Spearman
- d. El test de MANN-WHITNEY, si no, de WILLCOXON

32) Al valorar la asociación entre dos variables

(A: tratamientos y B : grado de respuesta) se ha obtenido un χ^2 experimental de 4,05. Teniendo en cuenta que cada variable tenía dos clases y el nivel de significación (alfa) se fijó en el 5% : se puede concluir que :

- a. **Ambas variables son independientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} < \chi^2_{\text{teórico}}$**
- b. Ambas variables son dependientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} < \chi^2_{\text{teórico}}$
- c. Ambas variables son independientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} > \chi^2_{\text{teórico}}$
- d. Ambas variables son dependientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} > \chi^2_{\text{teórico}}$

$\chi^2_{\text{experimental}} < \chi^2_{\text{teórico}}$: independientes y acepta a H_0
 $\chi^2_{\text{experimental}} > \chi^2_{\text{teórico}}$: dependiente y rechaza a H_0

33) Al realizar un ANOVA de un factor para estudiar el efecto de 4 dosis distintas de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad se obtiene la tabla 1 que aparece en el anexo, la cual significa que

- a. Hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento
- b. No hay diferencias entre las diferentes. Dosis de medicamento
- c. No se puede realizar la ANOVA porque hay mas de dos grupos a analizar
- d. Todo lo anterior es falso

34) La introducción de un artículo estándar:

- a. Debe describir el que y el porque de la investigación
- b. Debe indicar el propósito del artículo y una justificación del estudio
- c. Debe definir el problema (pregunta) de investigación y plantear los objetivos de la investigación
- d. **Todas son verdaderas**

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



- 35) En la discusión de un artículo estándar, es falso que:
- Se tenga que analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación
 - Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales y las conclusiones que deriven de ellos
 - Describir el significado de los hallazgos del estudio y conclusiones que deriven de ellos
 - Todas falsas**

- 36) La bibliografía de un manuscrito representa la relación de obras consultadas para la realización del trabajo y su introducción en el texto depende del sistema elegido por tanto es cierto que:

- Las referencias bibliográficas tienen que seguir siempre el estilo Vancouver**
- Las referencias bibliográficas serán registradas en el manuscrito en función de las exigencias de la revista
- Las referencias bibliográficas deben de ser citadas indiscriminadamente
- Las referencias bibliográficas deben de recoger documentos no recuperables por el lector

- 37) De entre las siguientes opciones, aquella que nos permite localizar un artículo concreto es:

- Zinutti C, Int J Pharm.
- Zinutti C, 1996
- Int J Pharma, 1996;133:97-105
- Todas las opciones lo permiten

- 38) Los cuestionarios son herramientas muy utilizadas en los estudios experimentales o observaciones para obtener resultados cuyos datos podrán ser posteriormente analizados estadísticamente. Actualmente hay disponibles una serie de programas informáticos que pueden ayudar en su confección como, por ejemplo:

- Surveymonkey**
- Journal Citation Report
- Endnoteweb
- SPSS

WUOLAH

39) Entre las principales causas de. Rechazo de un manuscrito, se encuentran:

- a. Las referencias bibliográficas no coinciden con la referencia señalada en el texto
- b. El título contiene el nombre comercial de producto
- c. No colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras
- d. **Todas correctas**

40) Se puede definir lectura crítica como la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, describiendo, los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. Por tanto, los componentes de la lectura crítica deben de ser:

- a. Interpretar, enjuiciar, y proponer
- b. Interpretar y enjuiciar sin proponer
- c. Interpretar no enjuiciar y proponer
- d. Ninguna de las anteriores

41) Para confeccionar la bibliografía de un manuscrito, existen gestores que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal a partir de búsquedas en catálogos de bibliotecas, base de datos y revistas electrónicas. Entre ellos destacan:

- a. SurveyMonkey
- b. Journal Citation Report
- c. **Endnoteweb**
- d. SPSS

42) Es falso que parámetros de las estadísticas descriptivas puedan calcularse:

- a. **Únicamente aplicando la formula correspondiente**
- b. mediante Softwares especializados como SPSS o Statgraphics

20.- En un estudio se ha visto que la tasa de los niños vacunados es superior a la de los no vacunados. ¿Qué tipo de prueba se debe utilizar para comprobar si la diferencia es significativa?

- a) Prueba de signo
- b) Prueba de signo
- c) Prueba de signo
- d) Prueba de signo

21.- Al analizar un experimento se recogieron los siguientes datos: el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25

22.- Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección rápida de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20 determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en el ejercicio 2 del Anexo:

- a) Se preferirá el método A al presentar un coeficiente de variabilidad menor al método B
- b) Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
- c) Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B
- d) Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A

23.- Los pictogramas

- a) Son un tipo de representación gráfica de variables cualitativas
- b) Son un tipo de representación gráfica de variables cuantitativas
- c) Son un tipo de representación gráfica tanto de variables cualitativas como cuantitativas
- d) Nada de lo anterior es cierto

24.- Señala la afirmación correcta:

- a) La distribución normal también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- b) La distribución de Poisson también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- c) La distribución de Poisson también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
- d) Todo lo anterior es cierto

25.- Los test estadísticos paramétricos

- a) Son aquellos que comparan variables cualitativas
- b) Son aquellos que comparan variables cuantitativas
- c) Son aquellos en los que se conoce la distribución de los datos
- d) Son aquellos en los que se desconoce la distribución de los datos

26.- El test de independencia de la hipótesis de los efectos secundarios

- a) Se utiliza para comprobar si hay una relación entre dos variables cualitativas
- b) Se utiliza para comprobar si hay una relación entre dos variables cuantitativas
- c) Se utiliza para comprobar si hay una relación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa
- d) Se utiliza para comprobar si hay una relación entre dos variables cuantitativas

27.- Si el coeficiente de correlación de Spearman es 0,8

- a) Existe una correlación positiva entre las dos variables
- b) Existe una correlación negativa entre las dos variables
- c) No existe correlación entre las dos variables
- d) No se puede determinar si existe correlación

28.- Hemos medido la cantidad de tabaquismo en sangre de tres grupos de una población: niños, adultos y ancianos. Queremos saber si hay diferencias significativas entre los tres grupos, para lo cual se realiza:

- a) Una t-Student, comprobando antes la normalidad y la homogeneidad de varianzas
- b) Si hay normalidad y homogeneidad de varianzas, una prueba de chi-cuadrado
- c) Correlación de Pearson, si hay normalidad y correlación de Spearman
- d) El test de Mann-Whitney, si no hay normalidad

29.- Al valorar la asociación entre dos variables (tratamientos y B: grado de respuesta) se ha obtenido un valor de 4,05. Teniendo en cuenta que la variable tenía dos clases, y el nivel de significación es el 5%, se puede concluir que:

- a) Ambas variables son independientes
- b) Ambas variables son dependientes
- c) Ambas variables son independientes
- d) Ambas variables son dependientes

30.- Al realizar un ANOVA de un factor (tratamiento) se ha obtenido un valor de 4,05. Teniendo en cuenta que la variable tenía dos clases, y el nivel de significación es el 5%, se puede concluir que:

- a) Hay diferencias significativas entre los grupos
- b) No hay diferencias significativas entre los grupos
- c) No se puede concluir
- d) Todo lo anterior es cierto

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins


perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



20.- El percentil 25 (P₂₅) de la talla de los niños varones recién nacidos es de 55 cm ¿qué significa?

- a) Que el 25% de ellos tiene una talla superior a 55cm
- b) Que el 25% de ellos tiene una talla igual a 55 cm
- c) Que el 25% de ellos tiene una talla inferior a 55 cm
- d) No significa nada de esto

21.- Atendiendo al Ejercicio 1 recogido en el ANEXO, el valor de la variable con mayor frecuencia absoluta es:

- a) Media: 54,56
- b) Mediana: 53
- c) Moda: 51
- d) Desviación estándar: 11,77

22.- Se pretende valorar dos métodos (A y B) para la detección rápida de la hepatitis C. Para ello, se han realizado 20 determinaciones del virus en sangre de una misma muestra por medio de ambos métodos. Según los resultados que aparecen en el ejercicio 2 del ANEXO:

- a) Se preferirá el método A al presentar un coeficiente de variabilidad menor al método B
- b) Se preferirá el método B al presentar un coeficiente de variabilidad mayor al método A
- c) Se preferirá el método A al presentar una varianza menor al método B
- d) Se preferirá el método B al presentar una varianza mayor al método A

23.- Los pictogramas

- a) Son un tipo de representación gráfica de variables cualitativas
- b) Son un tipo de representación gráfica de variables cuantitativas
- c) Son un tipo de representación gráfica tanto de variables cualitativas como cuantitativas
- d) Nada de lo anterior es cierto

24.- Señala la afirmación correcta:

- a) La distribución normal también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- b) La distribución de Poisson también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy pequeña
- c) La distribución de Poisson también es conocida como "distribución de sucesos raros" puesto que la probabilidad de que ocurra es muy alta
- d) Todo lo anterior es cierto

25.- Los tests estadísticos paramétricos

- a) Son aquellos que comparan variables cualitativas
- b) Son aquellos que comparan variables cuantitativas
- c) Son aquellos en los que se conoce la distribución de los datos
- d) Son aquellos en los que se desconoce la distribución de los datos

26.- El test de Kolmogorov-Smirnov se usa para:

- a) Comparar dos grupos de medidas independientes
- b) Comparar más de tres grupos de medidas independientes
- c) Comprobar si los datos se ajustan a la distribución normal
- d) Comprobar la homogeneidad de varianzas entre diferentes grupos

27.- Si el coeficiente de correlación de Pearson es $r = 0,7$ significa que:

- a) Existe correlación positiva entre las dos variables que se están analizando
- b) No existe correlación entre las dos variables que se están analizando
- c) Existe correlación negativa entre las dos variables que se están analizando
- d) Nada de lo anterior es cierto porque r no permite relacionar variables

28.- Hemos medido la cantidad de bilirrubina en sangre en tres grupos de una población: niños, adultos y ancianos. Deseamos saber si hay diferencias significativas entre estos tres grupos, para lo cual se realiza:

- a) Una t-Student, comprobando antes la normalidad.
- b) Si hay normalidad y homocedasticidad, ANOVA de una vía con test post-hoc
- c) Correlación de Pearson, si hay normalidad; si no, correlación de Spearman
- d) El test de Mann-Whitney, sino, de Wilcoxon

29.- Al valorar la asociación entre dos variables (A: tratamientos y B: grado de respuesta) se ha obtenido un χ^2 experimental de 4,05. Teniendo en cuenta que cada variable tenía dos clases, y el nivel de significación (α) se fijó en el 5%: Se puede concluir que:

- a) Ambas variables son independientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} < \chi^2_{\text{teórico}}$
- b) Ambas variables son dependientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} < \chi^2_{\text{teórico}}$
- c) Ambas variables son independientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} > \chi^2_{\text{teórico}}$
- d) Ambas variables son dependientes puesto que $\chi^2_{\text{experimental}} > \chi^2_{\text{teórico}}$

30.- Al realizar un ANOVA de un factor para estudiar el efecto de 4 dosis distintas de un medicamento en el tratamiento de una enfermedad se obtiene la tabla 1 que aparece en el ANEXO. Lo cual significa que:

- a) Hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento
- b) No hay diferencias entre las diferentes dosis de medicamento.
- c) No se puede realizar el ANOVA porque hay más de dos grupos a analizar
- d) Todo lo anterior es falso

6.- En el ANEXO 2, se recoge información sobre el factor de impacto y el ranking durante 2013 de dos revistas de reconocido prestigio, *Anticancer Drugs* y *Advanced Drug Delivery Reviews*. Atendiendo a la posición que ocupan en el ranking de su especialidad, señala cuál de ellas presenta mayor calidad.

- a) *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el cuartil 1
- b) *Advanced Drug Delivery Reviews* puesto que está en el tercil 1
- c) *Anticancer Drugs* puesto que está en el cuartil 3
- d) *Anticancer Drugs* puesto que está en el tercil 3

7.- La introducción de un artículo estándar:

- a) Debe describir el qué y el porqué de la investigación
- b) Debe indicar el propósito del artículo y una justificación del estudio
- c) Debe definir el problema (pregunta) de investigación y plantear los objetivos de la investigación
- d) Todas las opciones son correctas

8.- En la discusión de un artículo estándar, es falso que:

- a) Se tenga que analizar e interpretar los datos de la investigación según la metodología empleada para concretar una respuesta (conclusión) a la pregunta (objetivo) de la investigación
- b) Destacar los aspectos nuevos y relevantes del estudio y las principales conclusiones que deriven de ellos
- c) Describir el significado de los hallazgos del estudio y conclusiones que deriven de ellos
- d) Todas las opciones son falsas

9.- La bibliografía de un manuscrito representa la relación de obras consultadas para la realización del trabajo y su introducción en el texto depende del sistema elegido. Por tanto, es cierto que:

- a) Las referencias bibliográficas tienen que seguir siempre el estilo Vancouver
- b) Las referencias bibliográficas serán registradas en el manuscrito en función de las exigencias de la revista
- c) Las referencias bibliográficas deben de ser citadas indiscriminadamente
- d) Las referencias bibliográficas deben de recoger documentos no recuperables por el lector

10.- De entre las siguientes opciones, aquella que nos permite localizar un artículo concreto es:

- a) Zinutti C, *Int J Pharm*.
- b) Zinutti C, 1996
- c) *Int J Pharm*, 1996; 133: 97-105.
- d) Todas las opciones lo permiten

11.- Los cuestionarios son herramientas muy utilizadas en los estudios experimentales u observacionales para obtener resultados cuyos datos podrán ser posteriormente analizados estadísticamente. Actualmente, hay disponibles una serie de programas informáticos que pueden ayudar en su confección, como por ejemplo:

- a) SurveyMonkey
- b) Journal Citation Reports
- c) Endnoteweb
- d) SPSS

12.- Entre las principales causas de rechazo de un manuscrito se encuentran:

- a) Las referencias bibliográficas no coinciden con la referencia señalada en el texto
- b) El título contiene el nombre comercial de producto
- c) No colocar títulos a las tablas, gráficos y figuras.
- d) Todas las opciones son correctas

13.- Se puede definir Lectura Crítica como la capacidad del lector para hacer consciente una postura propia sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos implícitos, la idea directriz, los puntos fuertes y débiles de los argumentos y proponer otros planteamientos que superen los del autor, para así reafirmar o modificar su propia postura. Por tanto, los componentes de la lectura crítica deben de ser:

- a) Interpretar, enjuiciar y proponer
- b) Interpretar y enjuiciar sin proponer
- c) Interpretar no enjuiciar y proponer
- d) Ninguna de las anteriores

14.- Para confeccionar la bibliografía de un manuscrito existen gestores que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal a partir de búsquedas en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Entre ellos destacan:

- a) SurveyMonkey
- b) Journal Citation Reports
- c) Endnoteweb
- d) SPSS

15.- Es falso que parámetros de la estadística descriptiva puedan calcularse:

- a) Únicamente aplicando la fórmula correspondiente
- b) Mediante softwares especializados como SPSS o Statgraphics
- c) Mediante el programa de Excell
- d) Mediante una calculadora científica.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

APELLIDOS, NOMBRE Y FIRMA

El test supone un 30% de la nota final de la asignatura.
La duración del examen es de 45 minutos. Consta de un test de 30 preguntas.
Cada pregunta tiene cuatro opciones y solo una es correcta. Las respuestas incorrectas no restan pero se penaliza en cuanto a la
probabilidad de acertar al azar.
Las respuestas se plasmarán en la plantilla (sólo se corrige la plantilla).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre Ciencia es correcta:

Se puede definir como "el conocimiento que se obtiene aplicando un método sistemático y verificable de observación de hechos empíricos, y la obtención de proposiciones universales explicativas (leyes) por razonamientos tanto inductivo falsable como deductivo".
Los hechos no se ven directamente y sin problema a través de los sentidos puesto que pueden estar influenciados por la percepción.
Las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico se derivan por inducción a partir de una base de hechos suministrada por la observación y la experimentación. Una vez que se cuenta con este conocimiento general, se puede recurrir a él para hacer predicciones y ofrecer explicaciones.
Todas las opciones son ciertas.

Observaciones realizadas para generar conocimiento científico:

Observativas y Privadas
Observativas y Públicas
Observativas y Privadas
Observativas y Públicas

que el método científico...

Consta de: Observación de la realidad;
Formulación de hipótesis "explicativas" y Teoría científica

Consta de: Observación de la realidad;
Formulación de hipótesis "explicativas"; Contraste de hipótesis y Teoría científica

Consta solamente de Inferencia inductiva
Consta solamente de Inferencia deductiva

4.- En la generación del conocimiento, es imposible observar todos los casos presentes en la naturaleza, por ello se analiza una muestra representativa de una determinada población, de manera que cuando se aplica una ley o conclusión general a casos particulares se trata de:

a) Inferencia inductiva
b) Inferencia deductiva
c) Inferencia tanto inductiva como deductiva
d) Ninguna de las anteriores

5.- Señala la afirmación correcta:

a) Las hipótesis deben de establecerse de manera que sea posible demostrar su falsedad
b) Las hipótesis deben de poder contrastarse
c) Las hipótesis no se demuestran, sino que se rechazan o no
d) Todas las opciones son correctas

6.- Señala la afirmación correcta:

a) En un protocolo de investigación deben de contemplarse los problemas éticos y legales si hubiese
b) El desarrollo tecnológico orientado hacia la obtención de productos tangibles puede considerarse un tipo de proyecto
c) Todos los proyectos deben contemplar hipótesis
d) Todas las opciones son correctas

7.- Señala la afirmación correcta:

a) Los documentos científicos son las fundamentales, más reconocidas, que conocer para profundizar en
b) El proceso de investigación comienza con la documentación científica
c) Las publicaciones a congresos son la documentación científica
d) Todas las afirmaciones anteriores

8.- Los artículos publicados en una revista científica

- a) Son evaluados previamente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- b) Son evaluados previamente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- c) Son evaluados posteriormente por miembros de la comunidad científica para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica
- d) Son evaluados posteriormente por los propios autores del trabajo para asegurar un mínimo de estándares de calidad y validez científica

SBN es un código que identifica:

- Una revista
- Un libro científico
- Un artículo científico
- Una patente

iliografía gris es una fuente bibliográfica da por:

r difícil de leer por su lenguaje demasiado nico
de fácil acceso y no contener nada importante
de difícil acceso y contener información valiosa
publicada sin figuras en color

zfa representa la relación de obras a la realización de un trabajo y cada una de cer citada de una manera concreta a través erencia bibliográfica. Por tanto:

res de las revistas deben de ser siempre dos al detalle

res de las revistas pueden abreviarse

guías nacionales o internacionales

s de las revistas pueden abreviarse

erio del autor

ciones son falsas

n correcta:

dístico no permite validar la

ue supone aplicar la explicación

muestra representativa a toda la

itico permite validar la

supone aplicar la explicación

uestra representativa a toda la

o solo se dedica a muestrear

- d) proposiciones tentativas acerca de la relación de o más variables, del ajuste de las observaciones a distribuciones teóricas, o de la comparación (igualdad o diferencia) entre dos grupos de observaciones

14.- Una vez establecidas la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el nivel de significación α del 5% y un estadístico de contraste:

- a) Aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05
- b) Rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea menor a 0,05
- c) Aceptaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005
- d) Rechazaré la hipótesis nula cuando el valor de p calculado sea mayor a 0,005

15.- La afirmación "el consumo de antibióticos difiere entre hombres y mujeres" puede considerarse como hipótesis alternativa (H_1) de una investigación, de manera que

- a) Su hipótesis nula (H_0) podría ser "no hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres"
- b) Su hipótesis nula (H_0) podría ser "hay diferencias en la cantidad de antibióticos consumidos por hombres y mujeres"
- c) Una afirmación de ese tipo, solo puede constituir el objetivo de una investigación
- d) Ninguna de las anteriores

16.- El grupo sanguíneo (ABO) puede considerarse como:

- a) Variable cuantitativa discreta
- b) Variable cuantitativa continua
- c) Variable cualitativa nominal
- d) Variable cualitativa ordinal

17.- La probabilidad de rechazar H_0 cuando esta es verdadera:

- a) Implica cometer error tipo I o α
- b) Implica cometer error tipo II o β
- c) Implica cometer error tipo II o β
- d) Se conoce como potencia de contraste

18.- A la hora de seleccionar una muestra es falso que:

- a) Hay que tener en cuenta que el muestreo de sujetos voluntarios es no probabilístico
- b) Hay que definir la unidad de análisis pero no la población
- c) Hay que tener en cuenta que el muestreo estratificado es probabilístico
- d) Hay que definir la unidad de análisis y la población