

2-exam.pdf



Chavalin



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



20. ¿Cuál es la mejor técnica de concentración para detectar huevos de Schistosoma?

- a. Sedimentación con Na Cl
- b. Sedimentación con formalina-éter
- c. Método de Baermann
- d. Técnica de flotación en sacarosa
- e. Sedimentación con sulfato de zinc

23. ¿Qué parásito puede producir una oxuriasis vaginal en el hospedador?

- a. Ancylostoma duodenale
- b. Ascaris lumbricoides
- c. Enterobius vermicularis
- d. Taenia sp.
- e. Trichomonas vaginalis

33. La taglina es:

- a. Una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en algunos helmintos
- b. Un factor de virulencia que confiere a algunos protozoos resistencia a fármacos
- c. Un proteasa presente en Entamoeba histolytica
- d. Una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en Giardia intestinalis
- e. Una toxina presente en algunos microsporidios

46. ¿Cuál de los siguientes parásitos presenta autofluorescencia?

- a. Cryptosporidium sp.
- b. Giardia intestinalis
- c. Plasmodium sp.
- d. Leishmania donovani
- e. Isospora sp.

47. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede localizarse en una muestra de esputo?

- a. Plasmodium falciparum
- b. Schistosoma mansoni
- c. Paragonimus westermani
- d. Isospora belli
- e. Taenia saginata

49. Dentro de un macrófago aparece una amastigote ¿Qué parásito puede ser?

- a. Leishmania donovani
- b. Isospora belli
- c. Schistosoma haematobium
- d. Tripanosoma brucei
- e. Toxoplasma gondii

50. El método de Baermann nos permite recuperar:

- a. Ooquistes de nematodos
- b. Huevos de Trematodos
- c. Larvas de nematodos
- d. Quistes de trematodos
- e. Huevos de nematodos

51. Una muestra de endocervix se siembra en Thayer-Martin y al día siguiente se observan colonias.

Lo más probable es que el microorganismo sea:

- a. Streptococcus agalactiae
- b. Escherichia coli
- c. Candida albicans
- d. Chlamydia trachomatis
- e. Neisseria gonorrhoeae

52. En un paciente ingresado y con un catéter endovascular encontramos crecimiento en el hemocultivo, el agente más probable es:
- Streptococcus agalactiae
 - Streptococcus pyogenes
 - Neisseria meningitidis
 - Escherichia coli
 - Staphylococcus epidermidis
53. En un frotis de sangre aparece un protozoo con forma de anillo ¿qué parásito puede ser?
- Plasmodium falciparum HRP-2
 - Trypanosoma brucei
 - Leishmania donovani
 - Schistosoma haematobium.
 - Toxoplasma gondii
54. Indica la respuesta CORRECTA:
- Shigella da color rosa intenso en Mc. Conkey
 - E. coli da color rosa intenso en verde-Brillante
 - E. coli da color rosa intenso en Mc. Conkey
 - Salmonella da color rosa intenso en Mc.Conkey
 - Todas son correctas
55. Indica la respuesta CORRECTA:
- Todas son correctas
 - La hepatitis B se estudia durante el embarazo
 - La hepatitis A se transmite vía fecal-oral
 - Salmonella da color rosa intenso en Verde-Brillante
 - La gangrena gaseosa la produce Clostridium perfringens
56. Indica la respuesta CORRECTA:
- La erisipela la produce Clostridium perfringens
 - Salmonella da color amarillo fosforito intenso en Verde-Brillante
 - Todas son correctas
 - La hepatitis B se estudia durante el embarazo
 - La hepatitis C se transmite vía fecal-oral
57. La prueba de detección del factor CAMP:
- Es positiva para Streptococcus agalactiae
 - Se realiza para prevenir meningitis neonatal
 - Todas son correctas
 - Se basa en una reacción sinérgica entre dos hemolisinas
 - Se realiza en las últimas semanas de gestación
58. Los puntos o hendiduras de Maurer en eritrocitos infectados son característicos de
- Plasmodium vivax
 - Trypanosoma brucei
 - Plasmodium ovale
 - Leishmania donovani
 - Plasmodium falciparum
59. Que una embarazada sea seronegativa frente a anticuerpos anti-Toxoplasma significa
- Infección congénita
 - Paciente sin riesgo de infección congénita durante el embarazo
 - Paciente debe tomar precauciones durante el embarazo ante el riesgo de infección congénita
 - Infección crónica
 - Fallo de sensibilidad de la prueba

62. En el suero de un varón de 35 años detectamos IgG-anti-HBs. No se encuentran otros anticuerpos ni antígenos relacionados con el VHB. Con estos datos podrías concluir:
- Que ha pasado la hepatitis B y ahora está bien
 - Que tiene hepatitis B aguda
 - Que tiene hepatitis B crónica
 - Que es VIH positivo
 - Que esta vacunado de la hepatitis B
63. Señala la opción CORRECTA. En la siembra en agar sangre a partir de un frasco de hemocultivo positivo:
- Streptococcus pneumoniae daría unas colonias alfa hemolíticas compuestas por diplococos Gram positivos.
 - Escherichia coli daría colonias no hemolíticas, compuestas de cocos Gram negativos.
 - Streptococcus "viridans" daría unas colonias beta hemolíticas compuestas por cocos Gram positivos.
 - Staphylococcus aureus daría unas colonias amarillentas compuestas de cocos Gram negativos.
 - Staphylococcus epidermidis daría unas colonias blancas compuestas por bacilos Gram positivos.
64. Si en un LCR se observa un recuento muy elevado de linfocitos y una glucosa normal:
- Sospecharía de meningitis por S.agalactiae
 - Sospecharía de meningitis meningocócica
 - Sospecharía de meningitis vírica
 - Sospecharía de meningitis neumocócica
 - Sospecharía de endocarditis
65. Si en un LCR se observa un recuento muy elevado de linfocitos y una glucosa normal:
- Sospecharía de meningitis neumocócica
 - Sospecharía de endocarditis
 - Sospecharía de meningitis herpética
 - Sospecharía de meningitis meningocócica
 - Sospecharía de meningitis por S.agalactiae
66. ¿Cuál de las asociaciones siguientes es CORRECTA?
- Staphylococcus aureus - Osteomielitis
 - Todas son correctas
 - Staphylococcus aureus - artritis séptica
 - Staphylococcus aureus - endocarditis
 - Staphylococcus aureus - orzuelo
67. ¿Cuál de las asociaciones siguientes es CORRECTA?
- Streptococcus del grupo viridans - síndrome de la piel escaldada
 - Shigella - colonias negras en medio SS
 - Listeria monocytogenes - bacilo Gram positivo
 - Streptococcus agalactiae - CAMP negativo
 - Uretritis gonocócica - Chlamydia trachomatis
68. ¿Cuál de las asociaciones siguientes es INCORRECTA?:
- Streptococcus del grupo viridans - Endocarditis
 - Uretritis gonocócica - Chlamydia trachomatis
 - Salmonella - Colonias negras en medio SS
 - Listeria monocytogenes - Bacilo Gram positivo
 - Streptococcus agalactiae - CAMP +

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

69. ¿Cuál de las siguientes filarias se detecta en sangre?

- a. Dracunculus medinensis
- b. Stroglyoides stercolaris
- c. Onchocerca volvulus
- d. Necator americanus
- e. **Wuchereria bancrofti**

70. ¿Cuál de las siguientes filarias se detecta en sangre?

- a. **Brugia malayi**
- b. Dracunculus medinensis
- c. Stroglyoides stercolaris
- d. Onchocerca volvulus
- e. Necator americanus

71. ¿Cuál de las siguientes enfermedades NO ES una enfermedad exantémica vírica?

- a. **Herpes labial**
- b. Exantema súbito
- c. Sarampión
- d. Varicela
- e. Rubeola

72. ¿Cuál de los siguientes NO ES una infección de la piel y del tejido subcutáneo?

- a. Pie de atleta
- b. Tiña
- c. Úlcera de decúbito
- d. **Peritonitis**
- e. Celulitis

73. ¿Cuál de las siguientes es una infección de la Piel y del tejido subcutáneo?

- a. Pie de atleta
- b. Celulitis
- c. Tiña
- d. **Todas son correctas**
- e. Úlcera de decúbito

78. ¿Qué parásito se puede detectar mediante una tinción ácido-alcohol resistente?

- a. Giardia intestinalis
- b. **Cryptosporidium sp.**
- c. Entamoeba coli
- d. Trypanosoma sp.
- e. Leishmania donovani

79. ¿Qué técnica nos facilita el diagnóstico de una oxuriasis?

- a. Concentración con formalina-éter
- b. Tinción con Giemsa
- c. Concentración con NaCl
- d. **Técnica de Graham**
- e. Tinción tricrómica

80. ¿Qué técnica nos detecta a Entorubius vermicularis?

- a. Concentración NaCl
- b. Tinción de Giemsa
- c. Tinción tricrómica
- d. Concentración con formalina-éter
- e. **Técnica de Graham**

WUOLAH

82. Indica la afirmación CORRECTA

- a. El medio Thayer-Martin es específico para Campylobacter
- b. Un paciente hospitalizado y tratado con antibióticos desde hace unos días comienza a...en este caso el agente mas probable es Salmonella
- c. El caldo selenito en un medio liquido de enriquecimiento
- d. Los exudados óticos se siembran en agar SS y verde-brillante
- e. La candidiasis vaginal en mujeres es una infección de transmisión sexual

83. Indica la afirmación INCORRECTA:

- a. La candidiasis vaginal no es una ITS
- b. El Caldo selenito es un medio líquido de enriquecimiento
- c. Los exudados conjuntivales se siembran en agar sangre y agar chocolate
- d. El medio Skirrow es específico para Campylobacter
- e. Un paciente hospitalizado y tratado con antibióticos desde hace unos días comienza a tener diarrea. En este caso el agente más probable es Salmonella

84. Indica la respuesta incorrecta sobre la obtención y el transporte de la muestra

- a. Las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible y en las condiciones de seguridad y temperatura indicadas
- b. El síndrome clínico condiciona el tipo de muestra
- c. El tipo de paciente condiciona el procedimiento de obtención
- d. Los posibles agentes etiológicos implicados condicionan el sistema de transporte
- e. Las muestras deben tomarse siempre después de iniciarse el tratamiento antibiótico

TEST RESPONDUS MICRO Y PARA 2 P 2021

1.- ¿Que parásito se puede detectar mediante una tinción ácido-alcohol resistente?

- a.-Giardia intestinalis.
- b.Entamoeba coli.
- c. Trypanosoma sp.
- d.Cyclospora sp.
- e. Leishmania donivani.

4.- ¿Cuál de las siguientes enfermedades causa bacteriemia primaria?

- a. Todas son correctas.
- b. Pielonefritis.
- c. Neumonía.
- d. Fiebre tifoidea.
- e.-Celulitis.

7.- Indica la afirmación correcta respecto a las Conjuntivitis:

- a. Las conjuntivitis bacterianas producen pus.
- b. La etiología vírica es la más frecuente.
- c. Todas son correctas.
- d. Es frecuente el enrojecimiento del ojo.
- e. Los hisopos conjuntivales deben sembrarse en agar-sangre y agar-chocolate.



026 · SANTANDER · 2026 · S

NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER

A-Z

ANA MENA
DELA OSSA
JUAN MAGÁN
C MARÍ · D. VALENTINO
LA DIFERENCIA 2006
MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

TANDER



ENTRADAS AQUÍ



cantabria
infinita



BARDINET

MOURO
PRODUCCIONES



9.-Indica la respuesta correcta respecto a la meningitis:

- a. Al ser una enfermedad muy grave hay que poner inmediatamente tratamiento antibiótico y luego recoger el LCR.
- b. **Escherichia coli puede producir meningitis en neonatos.**
- c. En adultos el agente etiológico que causa meningitis con más frecuencia es Streptococcus agalactiae.
- d. Un líquido cefalorraquídeo muy turbio suele indicar meningitis vírica.
- e. Si no observamos microorganismos en el Gram podemos decir que el paciente no tiene meningitis.

10.- ¿Cuál de las asociaciones siguientes es INCORRECTA?

- a. Brucelosis-Bacteriemia primaria.
- b. Streptococcus agalactiae -Medio agar granada.
- c. E.coli 0157-Agar Mac Conkey-sorbitol.
- d. **Campylobacter jejuni -Bacilo Gram positivo.**
- e. Uretritis no gonocócica -Chlamydia trachomatis.

30.- La diarrea del viajero la produce fundamentalmente

- a. **Cepas ETET y ECEA.**
- b. Campylobacter.
- c. Brucella.
- d. Salmonella.
- e. Clostridium difficile.

En un aspirado intestinal encontraremos: Trofozoítos de Giardia intestinalis

Qué muestra cogemos para el diagnóstico de oncocercosis:

Piel

Prueba positiva en la intradermoreacción de Montenegro:

Leishmania con buena respuesta inmunológica

Ac de antitoxoplasma IgM e IgG:

Precaución durante el embarazo

Que agente etiológico produce síndrome urémico hemolítico:

- a) Campylobacter
- b) Clostridium difficile
- c) Salmonella
- d) Shigella
- e) **E. coli 0157 H7**

Cuál es el marcador que se detecta en suero de individuos vacunados de Hepatitis B:

- a) HBsAg
- b) Anti HBe
- c) Anti HBc
- d) **Anti HBs**
- e) HBeAg

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

Líquido cefalorraquídeo, linfocitos elevados y glucólisis normal:
Meningitis vírica

Causa común de meningitis bacteriana:
Streptococcus pneumoniae

Meningitis por hongos: **Cryptococcus neoformans** (enfermo VIH)

Agente implicado en endocarditis ADVP:
Staphylococcus aureus

Cuál de las siguientes manifestaciones es exantémica:
Pitiriasis versicolor (malassezia fur fur)

Qué infección no esta producida por un virus: **Pitiriasis versicolor** (Malassezia, es un hongo)

Asociación: **Staphylococcus aureus- artritis séptica**

Causa más frecuente de infecciones articulares y óseas: **Staphylococcus aureus**

Primer marcador para detectar una infección por hepatitis: **HBsAG**

Positivo en sífilis: **VDRL**

No buscaremos Staphylococcus aureus en: **LCR (líquido cefalorraquídeo)**

El Gram -, sobre una muestra procedente de un frasco de Hemocultivo positivo, muestra la presencia de bacilos Gram +, sospecharíamos que la bacteriemia está producida por:

- a) **Listeria monocitógenes**
- b) Neisseria meningitis
- c) Streptococcus agalactiae
- d) Escherichia coli????
- e) Neisseria gonorrhoeae

40. En el Gram procedente de una muestra uretral de un paciente se observan diplococos Gram (-) intracelulares, ¿que medio de cultivo empleamos para el diagnostico selectivo?
Thayer-Martin

43. ¿Cómo podemos detectar una Tricomiasis? **Exudado vaginal**

45. ¿Qué microorganismo es coco gram (+), catalasa (+) y coagulasa (+)? **S. aureus**

WUOLAH

1. ¿Qué quiste de las siguientes especies presenta un aspecto fibroso en su interior?

- a. *Entamoeba histolytica*
- b. *Trichomonas vaginalis*
- c. *Entamoeba coli*
- d. *Taenia solium*
- e. *Giardia intestinalis*

Parasito en orina Schistosoma haematobium

Dentro de los macrófagos encontramos Amastigotes de Leishmania spp

Cual de los siguientes parásitos puede habitar dentro de la célula del sistema mononuclear fagocitado:
Leishmania donovani

44. Señala la afirmación INCORRECTA respecto a la prueba de Western Blot:

- a) Se utiliza entre otras aplicaciones como prueba confirmatoria para el diagnóstico del VIH
- b) En esta prueba las proteínas componentes del virus VIH se separan por electroforesis en gel de poliacrilamida
- c) Las proteínas separadas se transfieren a tiras de nitrocelulosa que se incuban con el suero del individuo
- d) Los anticuerpos ligados a antiVIH si existen, se visualizan con el microorganismo de fluorescencia
- e) Los anticuerpos ligados anti VIH, si existen, se visualizan con un conjugado (antiIGF – marcada) y posterior

63. ¿Qué agente etiológico produce síndrome urémico hemolítico?

- a) HBs Ag
- b) Anti HBe
- c) Anti HBc
- d) Anti HBs
- e) HBe Ag

64. si en un muestra de heces frescas aparecen larvas lo mas probable es que pertenezcan a:

- a) Taenia Solium
- b) Strongiloides stercoralis
- c) Acaris lumbricoides
- d) Ancylostoma duodenale
- e) Enterococcus granulosus

42. ¿Cuál es la afirmación correcta respecto a la respuesta inmunológica de hidatidosis? Es mayor en quistes hepáticos que en hidatídicos

43. ¿Cómo podemos detectar una Tricomiasis? Exudado vaginal

45. ¿Qué microorganismo es coco gram (+), catalasa (+) y coagulasa (+)? S. aureus

PREGUNTAS PARASITOLOGÍA SEGUNDO PARCIAL

1. Diarrea, náuseas, mala absorción: Giardia intestinal
2. Frotis de sangre encontramos protozoo de tipo Trypomastis: Trypanosoma brucei
3. Diarrea, acceso febril, anemia, hiperbilirrubina, insuficiencia respiratoria: Malaria grave
4. Parásito en biopsia cerebral: Naegleria floweri
5. Larvas en esputo: Ancylostoma duodenale
6. Filarias no en sangre: Onchocerca volvulus
7. Aspirado ganglio linfático: amastigote tripanosoma cruzi
8. Microfilamentos en sangre: Onchocerca volvulus, burgia, loa-loa, wester...
9. Análisis de heces aparece toma parasitaria compatible con un ooquiste de Chytridium spp., para confirmar descubrimiento la técnica recomendada es: tinción de Zhiel-Nelsen.
10. Aspirado bazo: Leishmania visceral
11. SNC: LCR o biopsia cerebral: Meningoencefalitis amebiana

EXAMEN A PAPEL MJ

Indica la respuesta correcta

- a) La hepatitis B se estudia durante el embarazo
- b) El HBeAg indica replicación viral del VHB
- c) La hepatitis A se transmite vía fecal-oral
- d) La presencia de HBsAg indica que el paciente padece hepatitis B aguda
- e) Todas las anteriores son correctas

¿Cuál de las asociaciones siguientes es INCORRECTA?

- A. staphylococcus aureus -Artritis séptica
- B. staphylococcus aureus-endocarditis
- C. staphylococcus aureus-osteomielitis
- D. streptococcus agalactiae-artritis séptica
- E. streptococcus del grupo viridans-endocarditis

Indica la afirmación Incorrecta:

- A. La peritonitis secundaria suele deberse a perforaciones intestinal
- B. La peritonitis secundaria suele ser monomicrobiana
- C. En las infecciones piogénicas y necrotizantes es importante estudiar la presencia de bacterias anaerobias estrictas.
- D. la osteomielitis puede ser de origen hematógeno

¿En cuál de los siguientes medios Salmonella crece dando colonias color negro?

- A. Agar sharrow
- B. Agar Mc Conkey
- C. Agar verde brillante
- D. Agar SS
- E. la a y d son ciertas

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

De los medios de cultivo entéricos, señala el binomio CORRECTO:

- A. Caldo selenito – medio líquido de enriquecimiento
- B. SS Y XLD – diferenciales poco selectivos
- C. Medio Mc Conkey con sorbitol – permite el crecimiento e identificación de E. coli O157:H7
- D. Mc Conkey y Verde Brillante – diferenciales moderadamente selectivos
- E. **La a) y la c) son correctas**

De los medios de cultivo entéricos, señala el binomio INCORRECTO:

- CIN selectivo para campylobacter**

Un paciente hospitalizado y tratado con antibióticos desde hace unos días comiéndame atener diarrea. ¿Cuál crees que es el agente etiológico más probable que aisláramos de las heces?

- A. Campylobacter
- B. **Clostridium difficile**
- C. Shiguella
- D. Salmonella
- E. Escherichia coli O157:H7

El gram realizado sobre una muestra de un frasco de hemocultivo positivo muestra la presencia de bacilos Gram negativos. Sospecharías que la bacteriemia esta producida por:

- A. Neisseria meningitis
- B. staphylococcus epidermis
- C. **Escherichia coli???**
- D. streptococchi del grupo viridans
- E. la B y D son correctas

¿Cuál de las siguientes NO ES una infección de la piel y del tejido subcutáneo?

- a) Tiña
- b) **Enfermedad inflamatoria pélvica**
- c) Pies de atleta
- d) Úlcera de decúbito
- e) Celulitis

¿Cuál de los siguientes emparejamientos es CORRECTO?

- A. Vulvovaginitis - escherichia coli
- B. uretritis gonococica - chlamydia trachomatis
- C. síndrome de la piel escaldada - staphylococcus epidermis
- D. orzuelo - streptococcus pyogenes
- E. **sifilis - treponema pallidum**

¿Cuál de los siguientes microorganismos produce bacteriemia primaria?

- A. Streptococcus pneumonia
- B. Escherichia coli
- C.
- D. Streptococcus pyogenes
- E. Todas las anteriores

WUOLAH

Un Gram del exudado conjuntival de un recién nacido muestra la presencia de diplococos Gram negativos. ¿Cuál es el agente etiológico más probable que está causando la conjuntivitis?

- A. Streptococcus pyogenes
- B. Staphylococcus aureus
- D. Neisseria gonorrhoeae
- E. Listeria monocitógenes
- F. Escherichia coli

Si en el suero de una embarazada detectamos IgG antiHBs, pero no detectamos otros anticuerpos ni antígenos relacionados con el VHB podrías concluir

- A. Que tiene hepatitis B aguda
- B. Que tiene hepatitis B crónica
- C. Que tiene una infección por Streptococcus agalactiae
- D. Que ha pasado la hepatitis B y ahora está bien
- E. Que esta vacunada frente al VHB

El medio Skirrow se suele emplear para detectar

- a) Salmonella
- b) Shigella
- c) Yersinia
- d) Campylobacter
- e) La a) y la b)

En el LCR de un recién nacido se observan bacilos Gram positivos. ¿Cuál es el microorganismo más probable que le puede producir meningitis?

- a) Neisseria gonorrhoeae
- b) Staphylococcus epidermidis
- c) Streptococcus pyogenes
- d) Escherichia coli
- e) Listeria monocitógenes

¿Dónde deben sembrarse las muestras de exudado ótico?

- a) En agar sangre y agar Mc Conkey
- b) En agar sangre, agar chocolate y agar Mc Conkey (a 37°C y CO₂)
- c) En agar sangre y agar chocolate
- d) En agar chocolate y agar Mc Conkey
- e) En medio Thayer-Martin

Indica la afirmación INCORRECTA

- a) Ante la sospecha de meningitis lo primero que hay que hacer es coger una muestra de LCR y luego de antibióticos
- b) la observación de bacilos gram negativos en un LCR de un recién nacido podría ser debido a Escherichia coli.
- c) El crecimiento de colonias en medio TCBS a partir de una muestra de heces indica la presencia de vibrio cholerae.
- d) La presencia de “clue cells” en un exudado vaginal indica la presencia de infección por Gardinerella vaginalis.
- e) Para diagnosticar una bacterinemia lo primero que hay que hacer es obtener una muestra de sangre del paciente y hacer directamente una tinción de gram.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO ES exantemática?

- a) varicela
- b) sarampion
- c) **molusco contagioso**
- d) rubeola
- e) exantema súbito

¿Cuál de los siguientes parásitos puede detectarse en una muestra de orina?

- a) **Shistosoma hematobium**
- b) tripanosoma histolytica
- c) guardia intestinalis
- d) trypanosoma cruzi
- e) ancylostoma duodenale

¿A que parasito puede deberse la aparición de varices esofagicas?

- a) Entamoeba histolytica
- b) Schistosoma hematobium
- c) **Schistosoma mansoni**
- d) Entamoeba coli
- e) Toxoplasma gondii

85. Dentro de un aspisado de ganglios linfáticos, podremos detectar

- a. Tripomastigotes de Plasmodium falciparum
- b. Tripomastigotes de Trypanosoma cruzi
- c. **Amastigotes de Trypanosoma cruzi**
- d. Amastigotes de Trypanosoma brucei
- e. Microfilarias de Onchocerca volvulus

5. El medio de transporte Cary-Blair se utiliza fundamentalmente para el transporte de muestras de

- a) Exudado faríngeo
- b) **Heces**
- c) Exudado uretral
- d) Exudado vaginal
- e) Espustos

6. La vaginitis asociada principalmente al consumo de antibióticos, conceptivas orales y otros fármacos que modifican las condiciones de la vagina es producida por:

- a) Treponema pallidum
- b) Diferentes virus
- c) Haemophilus ducreyi
- d) Neisseria gonorrhoeae
- e) **Candida albicans**

4. En el medio Mc Conkey:

- a) **Las bacterias que fermentan la lactosa dan colonias rosas**
- b) Se inhibe el crecimiento de las enterobacterias
- c) Las bacterias pertenecientes al genero Salmonella dan colonias negras
- d) Las bacterias que fermentan la lactosa dan colonias verdes
- e) Ninguna es correcta



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



GARDINER

MOURO

MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

9. La siguiente secuencia de pruebas microbiológicas es la correspondiente a la identificación de un microorganismo patógeno ¿cuál? Siembra en agar sangre de la muestra clínica, aislamiento de una colonia alfa hemolítica correspondiente a un coco gran positivo y catalasa negativo. Confirmación en bilis, sensibilidad a la optoquina y de su solubilidad en bilis

- A. Klebsiella pneumoniae
- B. Streptococcus pneumoniae
- C. Haemophilus influenzae
- D. Streptococcus pyogenes
- E. Streptococcus viridans

10. Señala la opción no correcta. En el cultivo de líquido cefalorraquídeo:

- A. En agar sangre escherichia coli da unas colonias no hemolíticas compuestas de bacilos gram negativos.
- B. En agar sangre haemophilus influenza da unas colonias compuestas por bacilos Gram negativos.
- C. En agar sangre streptococcus pneumoniae da unas colonias alfa hemolíticas, catalasa negativas, compuestas por diplococos gram positivos
- D. En agar sangre streptococcus agalactiae da colonias compuestas de cocos gram positivos
- E. En agar sangre neisseria meningitidis da colonias de diplococos Gram negativos

13. Si a un paciente se extraen dos hemocultivos y solo en uno de ellos se detecta la presencia de Coco Gram (+) y coagulasa (-):

- a) El paciente tiene una bacteriemia por S aureus
- b) El paciente tiene una bacteriemia por S. pyogenes
- c) Puede deberse a contaminación por S. aureus
- d) Puede deberse a contaminación por Staphylococcus epidermis
- e) El paciente tiene una bacteriemia por E.coli

17. La presencia de una levadura con capsula en una muestra LCR teñida con tinta china es indicativa de una infección por

- a) S. pneumoniae
- b) H. influenzae
- c) Cryptococcus neoformans
- d) M. Tuberculosis
- e) N. Meningitis

18. Los medios SS y XLD:

- a) Son medios para el cultivo de LCR
- b) Son medios líquidos
- c) No son medios selectivos
- d) No son medios diferenciales
- e) Son medios diferenciales moderadamente selectivos

19. La prueba de detección del factor CAMP se utiliza en mujeres embarazadas para la identificación de:

- a) S. pneumoniae
- b) S. viridans
- c) S. pyogenes
- d) S. agalactiae
- e) L. monocytogenes

WUOLAH

11. La siguiente secuencia de pruebas microbiológicas es la correspondiente a la identificación de un microorganismo patógeno ¿cuál? siembra en Agar sangre de la muestra clínica, aislamiento de una colonia beta hemolítica correspondiente a un coco gran positivo y catalasa negativo. Confirmación de su sensibilidad a bacitracina.

- A. Klebsiella pneumoniae
- B. Streptococcus pneumoniae
- C. haemophilus influenza
- D. Streptococcus pyogenes
- E. Streptococcus viridans

26.Cuál de las siguientes NO se realiza dentro de las pruebas rutinarias de serología en el embarazo:

- a) VIH
- b) Rubeola
- c) Toxoplasma
- d) Sarampión
- e) Sífilis

28. El caldo selenito:

- a) Es un medio de enriquecimiento
- b) Inhibe el crecimiento de la flora normal
- c) Es un medio diferencial
- d) Se emplea en los cultivos de exudados vaginales
- e) A y B son ciertas

33. Si en un Gram a partir de LCR se observan diplococos Gram negativos, sospecharías de una meningitis:

- a) Meningocócica
- b) Neumocócica
- c) Estreptocócica
- d) Vírica
- e) No sospecharía de meningitis porque se trata de flora normal

37. La técnica de flotación en solución saturada de NaCl es útil para la recuperación de:

- a) Huevos de nematodos
- b) Trofozoítos de Giardia intestinalis
- c) Trofozoítos de Entamoeba histolytica
- d) Huevos de trematodos
- e) B y C son correctas

38. Señala la afirmación correcta

- a) La preparación de gota gruesa son útiles para el diagnóstico de hemoparasitosis leves
- b) Los frotis sanguíneos son más sensibles que las preparaciones de gota gruesa
- c) Las preparaciones de gota gruesa son útiles para una buena identificación de especies Plasmodium
- d) Se tarda más en examinar una preparación de gota gruesa que de frotis
- e) En un frotis sanguíneo la sangre esta deshemoglobinizada

39. Plasmodium falciparum se puede diferenciar de otras especies de plasmodios por

- a) La presencia de Shuffne en frotis de sangre
- b) La presencia de puntos Maurer en frotis de sangre
- c) La presencia de puntos Shuffne en preparación de gota gruesa
- d) La presencia de puntos Maurer en preparaciones de gota gruesa
- e) Ninguna respuesta es correcta

41. ¿Cómo diagnosticarías la fase crónica o meningoencefálica de la Tripanosomiasis africana?

- a) Detectando amastigotes de Trypanosoma brucei gambiense en LCR
- b) Detectando amastigotes de Trypanosoma cruzi en LCR
- c) Detectando tripomastigotes de Trypanosoma cruzi en LCR
- d) Detectando tripomastigotes de Trypanosoma brucei gambiense en LCR
- e) Detectando tripomastigotes de Trypanosoma brucei gambiense en sangre

42. En cuanto al síndrome de Löeffler, señala la respuesta correcta:

- a) Es producido por la fase migradora de Trichinella spiralis
- b) Es producida por la fase migradora de Onchocerca volvulus
- c) Es producida por Giardia intestinalis
- d) Es la presencia de linfa en orina
- e) Es producido por la fase migradora de Ancylostoma duodenale

44. El diagnóstico más adecuado de una Anisakidosis se obtiene

- a) Localizando larvas en muestra fresca de heces
- b) Localizando larvas en muestra concentrada de heces
- c) Mediante radiografías
- d) Mediante endoscopias
- e) Analizando muestras de sangre

45. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede diagnosticarse mediante un análisis coprológico?

- a) Hidatidosis
- b) Triquinosis
- c) Criptosporidiosis
- d) A y B
- e) Ninguna

47. Un resultado negativo en una prueba de intradermoreaccion de Montenegro o prueba de la leishmania puede indicar:

- A. Ausencia de contacto con el parásito
- B. Leishmaniosis anergica
- C. Infección por Leishmania y buena respuesta inmunología
- D. A y b son correctas
- E. Ninguna respuesta es correcta

48. En cuanto a la respuesta inmunología frente a un hidatidosis señala la respuesta correcta:

- A. Es maxima en quistes calcificados o muertos
- B. Desaparece sí el quiste se rope
- C. Es mayor en quistes hepáticos que en quistes pulmonares
- D. Nunca se detectan anticuerpos frente a un quiste hidiatico
- E. A y b son correctas

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

49. en que muestra biológica podrias encontrar al parasito *Pneumocystis jirovecii* (=P. carinii)?

- A. Heces
- B. Orina
- C. Sangre
- D. Piel
- E. **Espito**

50. que muestra clinica es la mas adecuada para diagnosticar una Tricomoniasis

- A. Heces
- B. Orina
- C. Sangre
- D. **Exudado vaginal**
- E. espito

EXAMEN 2 PARCIAL

4. El método Baerman nos permite recuperar:

- a) Huevos de trematodos
- b) Quistes de trematodos
- c) **Larvas de helmintos**
- d) Ooquistes de nematodos
- e) Larvas de protozoos

12. ¿En cual de las siguientes medios *Salmonella* crece dando colonias negras?

- a. Agar verde brillante
- b. Agar Mc Conkey
- c. Todas son correctas
- d. Agar Skirrow
- e. **Agar SS**

39. El antígeno Australia

- a) Es el antígeno más importante del VIH
- b) Es el antígeno que se detecta para el diagnóstico del herpes genital
- c) Es el antígeno del core del virus de la hepatitis C
- d) Es el antígeno del core del papilomavirus
- e) **Es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B.**

40. Tras la obtención de una biopsia de hueso y posterior procedimiento en el laboratorio se observa en agar sangre, crecimiento de colonias que resultan ser cocos Gram +, catalasa y coagulasa +. La osteomielitis estaría producida por:

- a) **S. aureus**
- b) S. epidermis
- c) S. viridans
- d) No es una osteomielitis porque se trata de fibra normal
- e) N. gonorrhoeae

45. Si a partir de una muestra de uretritis se observa crecimiento en la placa de Thayer Martin dirías que la infección está producida por:

- a) T. Pallidum
- b) **N. Gonorrhoeae**
- c) C. Trachomatis
- d) Candida albicans
- e) Ureaplasma ureapylucum

WUOLAH

49. Que muestra clínica es adecuada para diagnósticas una leishmaniosis visceral

- a) Biopsia hepática
 - b) Sangre
 - c) Orina
 - d) Raspado e pie
 - e) Aspirado de medula ósea.
- (ganglios linfáticos, bazo, y liquido cefalorraquídeo)

57.Cuál de las siguientes microfilaria no se detecta muestra de sangre

- a) Wuchereria Banchofti
- b) Bruya malayi
- c) Loa Loa
- d) Onchocerca volvulus
- e) Todas se detectan habitualmente en la sangre

60. el incremento de IgG anti toxoplasma entre dos muestras tomadas con tres semanas de diferencia junto con la aparición de IgM en una estante significa

- a) riesgo nulo de toxoplasmosis congénita
- b) se trata de una infección secundaria
- c) riesgo alto de toxoplasmosis congénita
- d) B y C son correctas
- e) Ninguna opción es correcta.

62. En cuanto a la respuesta inmunológica frente a una hidatidosis, señale la correcta

- a) Es máxima en quistes calcificados o muertos
- b) Desaparece si el quiste se rompe
- c) Es mayor en quistes hepáticos que en quistes hidatídico
- d) Nunca se detectan anticuerpos frente a quiste hidatídico
- e) A Y B son correctas

65. Que prueba serológica es la más adecuada para detectar una neurocisticercosis

- a) Detección de glicoproteínas estructurales mediante ELISA.
- b) Técnica de aglutinación
- c) Prueba de intradermoreacción.
- d) Detección mediante Western-blot de uno o más anticuerpos para glicoproteínas estructurales.
- e) IFI

1. Protozoo se transmite a través del día -- Plasmodium malarie
2. Enfermedad del sueño es producida por: Trypanosoma gambiense
3. Forma polimórfica de Trypanosoma gambiense podrías localizar por el hombre: Tripomastigote
4. Trypanosoma, las formas metaclínicas – tripomastigotes multiplicados en el hombre
5. Leishmaniosis visceral: Kala-azar
6. Forma polimórfica del tripanosoma gambiense localizas en el hombre: tripomastigotes
7. Leishmaniosis: Inoculación vector
8. Amebiosis: Metronidazol
9. Toxoplasmosis congénita debida a: Taquizoitos

10. *Toxoplasma gondii* al hombre: alimentos contaminados
11. Merozoítos de *Plasmodium* sp. Se pueden formar en: Hepatocitos y glóbulos rojos
12. Compuestos antimoniales se emplean en el tratamiento de *Leishmania donovani*
13. *Phlebotomus ariasi* es un vector mecánico
14. *Leishmania* presente en España es: *L. donovani infantum*
15. Tricosomiasis: exudado vaginal
16. Eosinofilia: Helmintiasis
17. Gal Gal Nac de 240: Proteína *Anthamoeba histolytica*
18. *Onchocerca volvulus*: onchocercosis – tejido subconjuntivo y cutáneo
19. Medio cultivo otitis: As, Mc, Ach
20. No busco *S. aureus* en LCR
21. En orina no *Streptococcus pneumoniae*
22. *Pyogenes*: coco g+ catalasa – Bacitracina
23. *Influziae*: cocobacilo g- Ach Ash-
24. *Pneumoniae*: coco g+ catalasa - Optoquinona
25. Flotación NaCl: huevos nematodos
26. Urocultivo: 1microlitro de orina sin centrifugar
27. *P. westermani* : quiste hidatídico
28. Sangre sin anticoagulante para *Trypanosoma*, *Plasmodium*, filarias
29. Músculo: *Trichinella spiralis*
30. Heces frescas larvas: *E. stercoraria*
31. Paludismo: sangre sin ac
32. Aspirado médula: L visceral
33. Heces disintéricas formas ameboides – *E. histolytica*
34. *E. coli* colonia rosa: Mc Conkey
35. Formadora de lactosa: *Coli* y *Klebsiella*
36. Uropatógenas: Adesinas
37. Cled: ITU
38. TRI: esputo
39. H. *Influenzae*: Agar sangre SOLO
40. Fluorocromos: tuberculosis
41. Meningitis vírica: RL elevado, proteínas y glucosa normal
42. *S. agalactiae*: Agar sangre CAMP+
43. *Neisseria meningitidis*: gram – maltosa –
44. Meningitis por hongos: *Cryptococcus neoformans*

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

- 
45. Camp: Streptococcus agalactiae
 46. Cari Blair: transp heces
 47. Eosina azul metileno: cultivo entérico
 48. Agar xilosa lisina: salmonella shigella
 49. Eriquecimiento: selenito
 50. Kligler: semisólido fermentador gas
 51. Chlamydia trachomatis: uretritis no gonocócica
 52. Thayer Martin: Vancomicina
 53. Sífilis primaria: lesión solitaria e indolora
 54. Graham – enterovirus
 55. Nosocomial:
 56. Lowerstein y Middle: tuberculosis
 57. NaOH y Azul ... hongos
 58. NaOH – tuberculosis
 59. PCR - + antígeno no se mete
 60. Cryptosporidium mas ciclos --- alcohol resistente
 61. W-blot: fluorescente
 62. Taenia – intestinal
 63. G+ catalasa – bacitracina S – pyogenes
 - 64. Cabot – forma alterada de eritrocito que puede confundirse con parásitos sanguíneos**
 65. Microfilaria no sangre: onchocerca volvulus
 66. Agar sangre en hemocultivo positivo: S. Viridans colonias alfa hemolíticos
 67. Nosocomial – hospital
 68. Entéricos, binomio incorrecto: SS y XLD: poco selectivos
 69. Síndrome urémico hemolítico: E. coli
 70. Marcador en suero de individuos vacunados de hpatitis: anti HBs
 71. PCR: dna infeccioso
 72. Heces quistes ovalados fibrosos: Giardia intestinalis
 73. Heridas pos quirúrgicas – muy resistentes ab
 74. Alta creatinina – triquinosis
 75. Skirrow – campylobacter
 76. Levadura con cápsula teñida con tinta china – Cryptococcus neoformans
 77. SS y XLD: moderadamente selectivos

WUOLAH