

Examen1.pdf



Chavalin



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

TEST MICRO Y PARA CLINICAS

1. ¿Cuál de los siguientes no es un método de identificación bacteriana a partir de un cultivo puro?
 - a. Técnicas proteómicas (MALDI-TOF)
 - b. Tiras API
 - c. PCR
 - d. Sistemas automatizados (Wider, Vitek...)
 - e. Elisa indirecto

2. ¿Cuál de las siguientes técnicas son las más habituales para el diagnóstico de infecciones víricas en un laboratorio de diagnóstico clínico ordinario?
 - a. Pruebas serológicas y de detección de antígeno
 - b. Aislamiento del virus
 - c. Shell-vial
 - d. Microscopia electrónica
 - e. Tinción de auramina-rodamina

3. Las pruebas de screening de ITU mediante tira reactiva ha dado negativa en una muestra de orina de una mujer joven sintomática. ¿Qué podrías concluir?
 - a. Qué probablemente tiene una ITU por *Escherichia coli*
 - b. Qué probablemente tiene una ITU por *Proteus*
 - c. Qué probablemente tiene una ITU por *Staphylococcus saprophyticus*
 - d. Qué probablemente tiene una ITU por *Klebsiella*
 - e. Qué no tiene infección de orina

4. En la primera etapa de cada uno de los ciclos de la PCR se produce:
 - a. La hibridación de una molécula de ADN con otra de ARN
 - b. La hibridación de dos moléculas de ADN de cadena sencilla para formar una doble hélice de ADN
 - c. La desnaturalización de las dos hebras de ADN
 - d. La Unión de los primers
 - e. La elongación mediante la Taq-polimerasa

5. La tinción de Zielh- Neelsen:
 - a. Permite observar *Mycobacterium tuberculosis*
 - b. Permite observar *Legionella pneumophila*
 - c. Permite observar *Mycoplasma pneumoniae*
 - d. Permite observar *Haemophilus influenzae*
 - e. La A y C son correctas

6. Entre otras aplicaciones, el Western Blot se utiliza para confirmar la infección por virus Del VIH. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el método es incorrecta:
- a. Las proteínas componentes del virus VIH se separan por electroforesis en gel de poliacrilamida
 - b. Se transfieren las proteínas separadas por electroforesis del gel de poliacrilamida a tiras de nitrocelulosa que se incuban con el suero del individuo
 - c. Los anticuerpos anti-VIH, Si existen, se ligan a las proteínas virales contenidas en la tira
 - d. Los anticuerpos ligados se visualizan con el microscopio de fluorescencia (Se visualizan con una banda coloreada)
 - e. Los anticuerpos ligados se visualizan con un conjugado (anti-Ig que porta una enzima) y posterior observación de líneas de color en la tira
7. Indica la afirmación incorrecta:
- a. La prueba de filamentación es muy útil para identificar *Cándida albicans*
 - b. La observación directa de la muestra clínica tratada con KOH (30%) o azul de lactofenol es muy útil para diagnosticar hongos filamentosos
 - c. El CRUP es una infección que se da en niños
 - d. La sinusitis y la otitis media suelen estar producidas por *Streptococcus pyogenes*
 - e. La detección de antígeno frente a *Legionella* en orina es una prueba muy útil para el diagnóstico
8. Indica la respuesta incorrecta sobre la obtención y el transporte de las muestras
- a. Las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible y en las condiciones de temperatura y seguridad adecuadas
 - b. El síndrome clínico condiciona el tipo de muestra
 - c. El tipo de paciente (niño, paciente intubado...) Condiciona el procedimiento de obtención
 - d. Los posibles agentes etiológicos implicados condicionan el sistema de transporte
 - e. Las muestras deben tomarse siempre después de iniciar el tratamiento antibiótico
9. ¿Cuál es el orden correcto en el que hay que añadir los reactivos para realizar la tinción de GRAM?
- a. Safranina- Lugol- Alcohol acetona- Cristal violeta
 - b. Cristal violeta- Lugol- Alcohol acetona- Safranina
 - c. Cristal violeta- Safranina- Lugol- Alcohol acetona
 - d. Cristal violeta- Lugol- Safranina- Alcohol acetona
 - e. Lugol-safranina- Alcohol acetona- Cristal violeta

10. La técnica de diagnóstico por inmunocromatografía es una prueba:
- Serológica
 - De detección de anticuerpos
 - De detección de antígenos
 - Es positiva cuando se observa fluorescencia
 - Se emplea solo para detección de hongos
11. Indique el binomio correcto
- Neumonía atípica- *Streptococcus pneumoniae*
 - Estreptococo beta-hemolítico resistente a la bacitracina- *Streptococcus pyogenes*
 - Estreptococo Alfa hemolítico resistente a la optoquina- *Streptococcus pneumoniae*
 - Crecimiento en agar sangre- *Legionella*
 - Requerimiento de factores V y X- *Haemophilus influenzae*
12. ¿Cuál de las siguientes bacterias se suele aislar en neumonías por aspiración)
- Klebsiella pneumoniae*
 - Legionella pneumophila*
 - Haemophilus influenzae*
 - Mycoplasma pneumoniae*
 - Mycobacterium tuberculosis*
13. La identificación mediante secuenciación del 16S rRNA:
- Es una técnica muy específica
 - Requiere especialistas en genética molecular
 - No se aísla la bacteria, por lo que no es posible la realización de perfiles de susceptibilidad de antibióticos
 - Es un método rápido y eficaz
 - Todas son correctas
14. En la radiografía de un paciente con sospecha de neumonía se observan infiltrados bilaterales. en las placas convencionales solo aparece crecimiento de flora normal. lo más probable es que el paciente tenga:
- Neumonía atípica por *Haemophilus influenzae*
 - Neumonía típica por *Streptococcus pneumoniae*
 - Neumonía por aspiración por *Klebsiella pneumoniae*
 - Neumonía atípica por *Mycoplasma pneumoniae*
 - Neumonía atípica por *Streptococcus pneumoniae*
15. La tinción de auramina-rodamina:
- Permite visualizar *Legionella pneumophila*
 - Permite visualizar *Mycoplasma pneumoniae*
 - Permite diagnosticar una tuberculosis pulmonar



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

- d. Permite diagnosticar una neumonía por *Streptococcus penumoniae*
- e. Permite diagnosticar una infección producida por hongos

16. ¿Cuál de los siguientes no es una infección nosocomial?

- a. Una otitis media
- b. Una sinusitis
- c. Una neumonía en un paciente intubado
- d. Una ITU en un paciente ingresado y sondado
- e. La A y B son correctas

17. La técnica de la PCR:

- a. Sirve para amplificar anticuerpos en el paciente
- b. Es una prueba de detección de antígeno
- c. Permite detectar proteína compuesta radiactiva
- d. Permite amplificar un fragmento específico de material genético
- e. Permite la detección de un fragmento específico de una proteína bacteriana

18. Al plantear el diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica debe tener en cuenta que el microorganismo que la produce:

- a. Es un coco Gram positivo, catalasa positivo, resistente a bacitracina
- b. Es Alfa hemolítico en agar sangre
- c. Es un coco Gram positivo, catalasa negativo, beta hemolítico, sensible a bacitracina
- d. No crece en agar sangre
- e. La C y D son correctas

19. Ante la sospecha de una ITU en una mujer y con el fin de que la muestra de orina sea apta para ser cultivada, se recomienda:

- a. Que se recoja la primera porción de la orina
- b. Que la muestra se tome a última hora de la tarde
- c. No lavar la zona genital ya que así hay mayor concentración de microorganismos y facilitaría el diagnóstico
- d. Que se ingieran diuréticos para favorecer la micción
- e. Que se recoja la parte media de la micción

20. El medio Lowestein- Jensen permite el crecimiento de:

- a. *Legionella pneumophila*
- b. *Mycobacterium tuberculosis*
- c. *Mycobacterium bovis*
- d. *Streptococcus penumoniae*
- e. La B y C son correctas

21. Señale la respuesta correcta:

- a. En el ELISA indirecto los pocillos están recubiertos de anticuerpos
 - b. La técnica de secuenciación del 16S rRNA sirve para identificar bacterias virus y hongos
 - c. Es posible la visualización de células infectadas por virus mediante inmunofluorescencia directa
 - d. La PCR convencional permite conocer la carga viral
 - e. El MALDI- TOF permite detectar anticuerpos frente al virus
22. Indica cuál es la afirmación correcta respecto a la tuberculosis:
- a. La tinción con fluorocromos es de gran utilidad
 - b. La muestra del esputo debe descontaminarse con NaOH antes de sembrar
 - c. La observación de bacilos ácido alcohol resistentes permite confirmar el diagnóstico
 - d. La prueba de Mantoux positivo indica que se ha tenido contacto con el bacilo
 - e. Todas las respuestas son correctas
23. La observación de adenovirus en células del exudado faríngeo mediante anticuerpos marcados con fluorescencia:
- a. Debe realizarse en un microscopio de fluorescencia
 - b. Es una prueba serológica
 - c. Es una prueba bioquímica
 - d. Es una inmunofluorescencia indirecta (Es directa)
 - e. La A y D son correctas
24. ¿Cuál de los siguientes reactivos hace específica a una reacción de PCR?
- a. dNTPs
 - b. oligonucleótidos, primers o cebadores
 - c. Taq- polimerasa
 - d. inmunoglobulinas contra las regiones específicas
 - e. Buffer
25. Indica la respuesta correcta sobre el diagnóstico de las infecciones fúngicas
- a. Las técnicas proteómicas como el MALDI-TOF no se pueden emplear
 - b. Las características macroscópicas y microscópicas de los hongos filamentosos crecidos no permiten su identificación
 - c. Los hongos levaduriformes crecen en Agar- Sabouraud
 - d. Los Dermatofitos crecen muy rápido dando colonias en 24 horas
 - e. El examen microscópico directo no suele emplearse ya que no aporta gran información.



2026 · SANTANDER · 2026 · S

NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER

A-Z

ANA MENA
DELAOSSA
JUAN MAGÁN
C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006
MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

TANDER



ENTRADAS AQUÍ



cantabria
infinita



BARDINET

MOURO
PRODUCCIONES



26. Ante la sospecha de una mononucleosis infecciosa, ¿Qué prueba realizarías?
- a. Una tinción de Ziehl- Neelsen del esputo
 - b. Una inmunocromatografía para detectar antígeno de *Mycoplasma*
 - c. Un ELISA para la detección de IgM contra el antígeno de la cápside del virus de Epstein-Barr
 - d. Un cultivo de la muestra en Mc-Conkey
 - e. Un test de aglutinación frente a rinovirus

27. De los siguientes parásitos, cuál de ellos al migrar por distintos órganos puede causar daños en el pulmón:
- a. *Schistosoma haematobium*
 - b. *Plasmodium sp.*
 - c. *Leishmania donovani*
 - d. *Necátor americanus*
 - e. *Enterobius vermicularis*

NOTA: *Ancylosdoma duodenale* también puede producir daño por migración al pulmón.

28. La taglina es:
- a. Una toxina presente en algunos microsporidios
 - b. una proteasa presente en *Entamoeba histolytica*
 - c. una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en algunos helmintos
 - d. un factor de virulencia que confiere a algunos protozoos resistencias a fármacos
 - e. una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en *Giardia intestinalis*

29. En qué parásitos se produce monocitosis, neutropenia y eritropenia
- a. Leishmaniosis
 - b. Esquistosomiasis
 - c. El paludismo
 - d. La estrongiloidosis
 - e. La giardiosis

30. ¿Cuál de los siguientes parásitos presenta autofluorescencia?
- a. *Plasmodium sp.*
 - b. *Giardia intestinalis*
 - c. *Leishmania donovani*
 - d. *Isospora sp.*
 - e. *Cryptosporidium sp.*

31. ¿Qué parásito puede producir una oxiuriasis vaginal en el hospedador?



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

- a. *Trichomonas vaginalis*
- b. *Taenia sp.*
- c. *Ancylostoma duodenale*
- d. *Enterobius vermicularis*
- e. *Áscaris lumbricoides*

32. ¿En qué parasitosis se podría detectar la proteína HRP-2 en sangre?

- a. Leishmaniosis visceral
- b. Esquistosomiasis
- c. Paludismo
- d. Tripanosomiasis
- e. Filariosis

33. ¿Qué tipo de conservación es adecuada para una muestra de suero?

- a. PVA
- b. Formalina
- c. Formaldehído
- d. Temperatura ambiente
- e. Congelación

34. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede localizarse en una muestra de esputo?

- a. *Schistosoma mansoni*
- b. *Plasmodium falciparum*
- c. *Paragonimus westermani*
- d. *Isospora belli*
- e. *Taenia saginata*

35. El aspirado esplénico se emplea para el diagnóstico de:

- a. La leishmaniosis cutánea
- b. La leishmaniosis visceral
- c. La toxoplasmosis
- d. La estrongiloidosis
- e. La giardiosis

36. ¿A qué especie pertenece el trofozoíto del dibujo adjunto?

- a. *Entamoeba histolytica*
- b. *Entamoeba coli*
- c. *Giardia intestinalis* (forma de higo, parece que tienen dos ojos)
- d. *Trichomonas vaginalis* (redondeados, con un "núcleo" coloreado)
- e. Ninguna de las respuestas es correcta

NOTA: Como no se ve la foto, describo cómo es cada trofozoíto, por si pone la imagen

37. Contesta la afirmación correcta: DUDA

- a. Las heces disintéricas deben examinarse cuanto antes debido a la posible presencia de quistes
- b. En las heces disintéricas no se recomienda la utilización de conservantes
- c. En las heces acuosas es posible la presencia de abundantes trofozoítos
- d. En las heces formadas es posible la presencia de abundantes quistes
- e. En las heces sueltas es posible la presencia de abundantes quistes

38. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede habitar dentro de células del sistema mononuclear fagocítico?

- a. Enterocytozoon bienersi
- b. Giardia intestinalis
- c. Cyclospora sp
- d. Plasmodium falciparum
- e. Ninguno de los anteriores

NOTA: Es *Leishmania* la que puede habitar en sistema mononuclear fagocítico

39. La muestra biológica adecuada para el diagnóstico de la leishmaniosis visceral es:

- a. Biopsia hepática
- b. Biopsia muscular
- c. Muestra de líquido cefalorraquídeo
- d. Muestra de sangre
- e. Aspirado de médula ósea

40. Contesta la respuesta correcta:

- a. El Lugol se usa para detectar trofozoíto en una muestra de heces (Lugol permite observar formas más grandes como huevos o larvas)
- b. Es posible detectar microsporidiosis en un análisis microscópico directo de heces
- c. El azul de metileno está recomendado para la detección de trofozoíto en un análisis microscópico directo de heces
- d. El azul de metileno está recomendado para la detección de quistes en un análisis microscópico directo de heces (Detecta trofozoítos)
- e. No es posible detectar quistes de amebas en un análisis microscópico directo de heces sin usar Lugol