

Segundo-parcial-MyP.pdf



Chavalin



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



MVRK • METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ • D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

Segundo parcial MyP

1. Señale el binomio INCORRECTO:

- a) Agar Mac Conkey-Diferencial moderadamente selectivo para Enterobacterias.
- b) Caldo selenito-Medio líquido de enriquecimiento.
- c) Agar CCFA-Diagnóstico de Clostridium difficile.
- d) Agar SS-Diferencial moderadamente selectivo para Enterobacterias.
- e) Agar Mac Conkey con sorbitol-Identificación de E. coli O157:H7.

2. ¿Qué prueba serológica es la más adecuada para detectar una neurocisticercosis?

- a) Detección de glicoproteínas estructurales mediante ELISA.
- b) Técnica de aglutinación
- c) Prueba de intradermoreacción.
- d) Detección mediante Western-blot de uno o más anticuerpos para glicoproteínas estructurales.
- e) IFI

3. El agente infeccioso habitualmente aislado en diarreas nosocomiales es:

- a) Clostridium difficile
- b) Norovirus
- c) Yersinia enterocolitica
- d) Campylobacter jejuni
- e) Escherichia coli enterotoxigénica

4. ¿Qué parásito podría producir queratitis?

- a) Dracunculus medinensis
- b) Onchocerca volvulus
- c) Giardia intestinalis
- d) Entamoeba hartmanni
- e) Entamoeba butschlii

5. Un LCR en el que se observa un recuento muy elevado de linfocitos y una glucosa normal indicaría sospecha de:

- a) Meningitis por Staphylococcus epidermidis
- b) Meningitis por Pseudomonas aeruginosa.
- c) Meningitis vírica
- d) Meningitis meningocócica
- e) Meningitis neumocócica

WUOLAH

6. De los siguientes virus, ¿Cuál puede producir carcinoma de cérvix?

- a) VIH
- b) VPH**
- c) VHB
- d) VHS
- e) Virus Varicela-Zóster

7. ¿Qué muestra es útil para diagnosticar la fase aguda de la enfermedad de Chagas?

- a) LCR**
- b) Muestra de orina.
- c) Biopsia cerebral.
- d) Suero sanguíneo.
- e) Gánglios linfáticos**

8. Indica la afirmación CORRECTA:

- a) La tinción de Gram permite la visualización de treponemas para el diagnóstico de la sífilis.
- b) La presencia de diplococos Gram negativos intracelulares en secreción uretral establece el diagnóstico de uretritis no gonocócica.
- c) La presencia de un chancro indica una sífilis secundaria.
- d) La vaginosis producida por *Gardnerella vaginalis* es una ITS.
- e) La presencia de gomas sífilíticas indica una sífilis terciaria.**

9. ¿Cuál de las siguientes filarias se detecta en un raspado de piel?

- a) *Strongyloides stercoralis*
- b) *Onchocerca volvulus***
- c) *Dracunculus medinensis***
- d) *Brugia malayi*
- e) *Wuchereria bancrofti*

10. Respecto a las conjuntivitis indique la respuesta CORRECTA:

- a) *Chlamydia trachomatis* causa la oftalmia neonatal
- b) La etiología vírica es la menos frecuente.
- c) La conjuntivitis vírica produce secreciones oculares con pus.
- d) Las muestras recogidas con hisopo se siembran en agar-sangre y agar-chocolate.**
- e) Es la inflamación debida a la infección de la córnea.

11. Para saber si un individuo presenta infección por VIH, ¿Qué protocolo de pruebas diagnósticas harías?

- a) Un ELISA y en caso positivo, un Western Blot.**
- b) Un ELISA y, en caso negativo, un Western Blot.

- c) Una inmunofluorescencia indirecta.
- d) Una aglutinación y, en caso positivo, un Western Blot.
- e) Un Western Blot y, en caso positivo, un ELISA.

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el test de CAMP es VERDADERA?

- a) Es una prueba de detección de material genético.
- b) Se basa en una reacción sinérgica entre dos hemolisinas.**
- c) Se realiza en placa de agar chocolate.
- d) Se realiza en las primeras semanas de gestación.
- e) Se realiza para prevenir meningitis neonatal por Streptococcus pyogenes.

13. Si en el suero de una embarazada detectamos la presencia de IgG- antiHBs e IgG antiHbc y no detectamos antígenos relacionados con el VHB podrías deducir:

- a) Que tiene hepatitis B aguda.
- b) Que es vulnerable a la infección por el VHB
- c) Que es inmune al VHB por una infección natural.**
- d) Que está vacunada frente al VHB.
- e) Que tiene hepatitis B crónica.

14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el test de CAMP es VERDADERA?

- a) Es una prueba de detección de material genético.
- b) Se basa en una reacción sinérgica entre dos hemolisinas.**
- c) Se realiza en placa de agar chocolate.
- d) Se realiza en las primeras semanas de gestación.
- e) Se realiza para prevenir meningitis neonatal por Streptococcus pyogenes.

15. ¿Qué microorganismo es el causante de la gangrena gaseosa?

- a) Streptococcus del grupo viridans
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Staphylococcus aureus
- d) Clostridium perfringens**
- e) Staphylococcus epidermidis

16. En el LCR de un recién nacido se observan diplococos Gram negativos, ¿Cuál es el microorganismo más probable que le puede producir meningitis?

- a) Cryptococcus neoformans
- b) Neisseria meningitidis**
- c) Streptococcus pneumoniae
- d) Escherichia coli
- e) Haemophilus influenzae



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



GARDINER

MOURO

MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DE LA OSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

17. La causa más frecuente de osteomielitis es:

- a) Staphylococcus coagulasa negativos
- b) Borrelia burgdorferi
- c) Mycobacterium marinum
- d) Staphylococcus aureus
- e) Pseudomonas aeruginosa

18. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) La presencia de la IgG anti-HBc indica que el paciente está vacunado.
- b) La presencia de HBsAg indica que el paciente padece hepatitis B aguda.
- c) La hepatitis B se transmite principalmente por vía fecal-oral.
- d) La hepatitis A se transmite por fundamentalmente por vía parenteral.
- e) El HBcAg indica replicación viral del VHB.

19. ¿Qué forma de Trypanosoma cruzi aparece en ganglios linfáticos?

- a) Tripomastigote
- b) Epimastigote
- c) Coanomastigote
- d) Promastigote
- e) Amastigote

20. ¿En qué parasitosis NO harías nunca una biopsia?

- a) Enfermedad de Chagas
- b) Esquistosomiasis intestinal
- c) Hidatidosis
- d) Leishmaniasis
- e) Esquistosomiasis vesical

21. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) Si en un individuo VIH+ la carga viral es indetectable es que los antirretrovirales están funcionando.
- b) Los ELISAS de cuarta generación detectan exclusivamente anticuerpos frente al VIH.
- c) Una inmunocromatografía negativa frente al VIH realizada después de un mes de haber mantenido prácticas de riesgo indica que el individuo no se ha infectado del VIH.
- d) La prueba de confirmación de la infección por VIH es la RPR o la VDRL
- e) Los ELISAS de cuarta generación son las pruebas de confirmación para el diagnóstico de la infección

WUOLAH

22. Indica la afirmación INCORRECTA:

- a) Ante la sospecha de meningitis lo primero que hay que hacer es coger una muestra de LCR y luego dar antibióticos.
- b) La observación de bacilos Gram negativos en un LCR de un recién nacido podría ser debido a *Escherichia coli*
- c) La presencia de "clue cells" en un exudado vaginal indica la presencia de infección por *Gardnerella vaginalis*.
- d) El crecimiento de colonias en medio TCBS a partir de una muestra de heces indica la presencia de *Vibrio cholerae*
- e) El test de filamentación permite el diagnóstico de *Streptococcus agalactiae*.

23. Responde la respuesta CORRECTA:

- a) En una preparación de gota gruesa la sangre se fija siempre.
- b) En un frotis de sangre se observa más cantidad de sangre que en una preparación de gota gruesa.
- c) En una preparación de gota gruesa la sangre no se fija.
- d) En un frotis la sangre se deshemoglobina.
- e) En un frotis de sangre no se observan puntos Schüffner.

24. ¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir meningoencefalitis?

- a) *Trypanosoma histolytica*
- b) *Naegleria fowleri*
- c) *Trypanosoma cruzi*
- d) *Giardia intestinalis*
- e) *Meningococcus duodenale*

25. En un frotis de sangre aparece un protozoo con un flagelo recurrente que forma membrana ondulante. ¿Qué parásito puede ser?

- a) *Leishmania donovani*
- b) *Toxoplasma gondii*
- c) *Schistosoma haematobium*
- d) *Trypanosoma brucei*
- e) *Plasmodium falciparum*

26. Indica la afirmación INCORRECTA:

- a) La peritonitis secundaria suele deberse a perforación intestinal.
- b) En las infecciones piogénicas y necrotizantes no es importante estudiar la presencia de bacterias anaerobias estrictas.
- c) La osteomielitis puede ser de origen hematógeno.
- d) La peritonitis secundaria suele ser polimicrobiana.
- e) La fascitis necrotizante la produce *Streptococcus pyogenes*



2026 · SANTANDER · 2026 · S

NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER

A-Z

ANA MENA
DELAOSSA
JUAN MAGÁN
C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006
MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

TANDER



ENTRADAS AQUÍ



cantabria
infinita



BARDINET

MOURO
PRODUCCIONES



27. ¿Cuál es el agente etiológico que se aísla con más frecuencia en la endocarditis protésica precoz (menos de un año)?

- a) **Estafilococos coagulasa negativos**
- b) Streptococcus pyogenes
- c) Neisseria meningitidis
- d) Escherichia coli
- e) Listeria monocytogenes

28. Indica en cuál de las siguientes infecciones NO estaría implicado Staphylococcus aureus:

- a) Hidrosadenitis
- b) Folliculitis.
- c) **Erisipela**
- d) Paroniquia
- e) Síndrome de la piel escaldada

29. Indica la opción CORRECTA:

- a) Neisseria meningitidis nunca produce bacteriemia primaria.
- b) Brucella mellitensis produce bacteriemia secundaria.
- c) La tinción de Gram en el diagnóstico de las bacteriemias se realiza con la muestra de sangre recién extraída del paciente.
- d) Streptococcus pyogenes es la principal causa de bacteriemias por colonización de catéter endovascular.
- e) **Salmonella enterica serotipo Typhi produce bacteriemia primaria.**

30. Indica el binomio INCORRECTO

- a) Virus de Hepatitis C- No hay vacuna disponible.
- b) **Virus de Hepatitis E- Transmisión parenteral**
- c) Virus de Hepatitis D-Necesita la presencia del VHB para infectar hepatocitos.
- d) Virus de Hepatitis C-Infección aguda asintomática en la mayoría de los casos.
- e) Virus de Hepatitis C-Transmisión parenteral

31. Señala la opción CORRECTA sobre la siembra en agar sangre y tinción de GRAM a partir de un frasco de hemocultivo

- a) Staphylococcus epidermidis daría unas colonias blancas compuestas por bacilos Gram positivos.
- b) Streptococcus "viridans" daría unas colonias beta hemolíticas compuestas por cocos Gram negativos.
- c) Staphylococcus aureus daría colonias amarillentas compuestas de cocos Gram negativos.
- d) **Neisseria meningitidis daría colonias compuestas de diplococos Gram negativos.**



NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER



cantabria
infinita



MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

- e) *Streptococcus pneumoniae* daría colonias beta hemolíticas compuestas por diplococos Gram positivos.

32. ¿Qué diagnóstico clínico darías a un paciente con los siguientes síntomas: Ictericia, anemia e insuficiencia renal?

- a) **Malaria complicada**
- b) Tripanosomiasis americana
- c) Amebiosis extraintestinal
- d) Tripanosomiasis africana
- e) Leishmaniosis visceral

33. Las infecciones de las prótesis articulares se deben fundamentalmente a:

- a) *Neisseria gonorrhoeae*
- b) ***Estafilococos coagulasa negativos***
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Salmonella* spp.
- e) *Pseudomonas aeruginosa*

34. ¿Cuál de las siguientes infecciones ES un exantema vírico?

- a) *Molluscum contagiosum*
- b) Fascitis necrotizante
- c) Impétigo
- d) **Sarampión**
- e) *Ptíriasis versicolor*

35. De las siguientes bacterias productoras de enteritis, ¿Cuál es una ENTEROTOXIGÉNICA?

- a) ***Vibrio cholerae***
- b) *Yersinia enterocolitica*
- c) *Salmonella enterica*
- d) *Shigella* spp.
- e) *Campylobacter jejuni*

WUOLAH