

primer-parcial-myp-clinica.pdf



user_3138669



Microbiología y Parasitología Clínicas



4º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH





NEGRITA MUSIC FESTIVAL

27 & 28 DE AGOSTO
SANTANDER

SANTANDER

SANTANDER

cantabria
infinita

Club de Fútbol
Cáceres

GARDINER

MOURO

MVRK · METRIKA
MICHENLO
XIYO & FERNANDEZZ

C MARÍ · D. VALENTINO
LADIFERENCIA2006

DELAOSSA
JUAN MAGAN

ANA MENA



ENTRADAS AQUÍ

1) De los siguientes parásitos, cuál de ellos al migrar por distintos órganos, puede causar daños en el pulmón :

- a) *Schistosoma haematobium*.
- b) *Plasmodium* sp
- c) *Leishmania donovani*
- d) *Necator americanus*
- e) *Enterobius vermicularis*

2) La taglina es:

- a) Una toxina presente en algunos microsporidios
- b) Un proteasa presente en *Entamoeba histolytica*
- c) Una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en algunos helmintos
- d) Un factor de virulencia que confiere a algunos protozoos resistencia a fármacos
- e) Una molécula de adhesión a los tejidos del hospedador presente en *Giardia intestinalis*

3) En qué parasitosis se produce monocitosis, neutropenia y eritropenia:

- a) Leishmaniosis
- b) Esquistosomiasis
- c) El paludismo
- d) La estrongiloidosis
- e) La giardosis

4) ¿Cuál de los siguientes parásitos presenta autofluorescencia?:

- a) *Plasmodium* sp.
- b) *Giardia intestinalis*
- c) *Leishmania donovani*
- d) *Isospora* sp.
- e) *Cryptosporidium* sp.

5) ¿Qué parásito puede producir una oxuriasis vaginal en el hospedador?

- a) *Trichomonas vaginalis*
- b) *Taenia* sp.
- c) *Ancylostoma duodenale*
- d) *Enterobius vermicularis*
- e) *Ascaris lumbricoides*

6) ¿En qué parasitosis se podría detectar la proteína HRP-2 en sangre?

- a) Leishmaniosis visceral
- b) Esquistosomiasis
- c) Paludismo
- d) Tripanosomiasis
- e) Filariosis

7) ¿Qué tipo de conservación es adecuada para una muestra de suero?:

- a) PVA
- b) Formalina
- c) Formaldehído
- d) Temperatura ambiente
- e) Congelación

8) ¿Cuál de los siguientes parásitos puede localizarse en una muestra de esputo?

- a) *Schistosoma mansoni*
- b) *Plasmodium falciparum*
- c) *Paragonimus westermani*
- d) *Isospora belli*
- e) *Taenia saginata*

9) El aspirado esplénico se emplea para el diagnóstico de:

- a) La leishmaniosis cutánea
- b) La leishmaniosis visceral
- c) La toxoplasmosis
- d) La estrongiloidosis
- e) La giardosis

10) ¿A qué especie pertenece el trofozoito del dibujo adjunto?:

- a) *Entamoeba histolytica*
- b) *Entamoeba coli*
- c) *Giardia intestinalis*
- d) *Trichomonas vaginalis*
- e) Ninguna respuesta es correcta



11) Contesta la afirmación correcta:

- a) Las heces disentericas deben examinarse cuanto antes debido a la posible presencia de quistes
- b) En las heces disentericas no se recomienda la utilización de conservantes
- c) En las heces acuosas es posible la presencia de abundantes trofozoitos
- d) En las heces formadas es posible la presencia de abundantes quistes
- e) En las heces sueltas es posible la presencia de abundantes quistes

12) ¿Cuál de los siguientes parásitos puede habitar dentro de células del sistema mononuclear fagocítico?

- a) *Enterocytozoon bienewisi*
- b) *Giardia intestinalis*
- c) *Cyclospora* sp
- d) *Plasmodium falciparum*
- e) Ninguno de los anteriores

13) La muestra biológica adecuada para el diagnóstico de la leishmaniosis visceral es:

- a) Biopsia hepática
- b) Biopsia muscular
- c) Muestra de líquido céfalo-raquídeo
- d) Muestra de sangre
- e) Aspirado de médula ósea

14) Contesta la respuesta correcta:

- a) El lugol se usa para detectar trofozoitos en una muestra de heces
- b) Es posible detectar microsporidios en un análisis microscópico directo de heces
- c) El azul de metileno está recomendado para la detección de trofozoitos en un análisis microscópico directo de heces
- d) El azul de metileno está recomendado para la detección de quistes en un análisis microscópico directo de heces
- e) No es posible detectar quistes de amebas en un análisis microscópico directo de heces sin usar lugol

15) En la radiografía de un paciente con sospecha de neumonía se observan infiltrados bilaterales. En las placas convencionales sólo aparece crecimiento de flora normal. Lo más probable es que el paciente tenga:

- a) Neumonía atípica por *Haemophilus influenzae*
- b) Neumonía típica por *Streptococcus pneumoniae*
- c) Neumonía por aspiración por *Klebsiella pneumoniae*
- ☒ d) Neumonía atípica por *Mycoplasma pneumoniae*
- e) Neumonía atípica por *Streptococcus pneumoniae*

16) La tinción de auramina-rodamina:

- a) Permite visualizar *Legionella pneumophila*
- b) Permite visualizar *Mycoplasma pneumoniae*
- ☒ c) Permite diagnosticar una tuberculosis pulmonar
- d) Permite diagnosticar una neumonía por *Streptococcus pneumoniae*
- e) Permite diagnosticar una infección producida por hongos

17) ¿Cuál de las siguientes NO ES una infección nosocomial?:

- a) Una otitis media
- b) Una sinusitis
- c) Una neumonía en un paciente intubado
- d) Una ITU en un paciente ingresado y sondado
- ☒ e) La a) y la b) son correctas

18) La técnica de la PCR:

- a) Sirve para amplificar anticuerpos en el paciente
- b) Es una prueba de detección de antígeno
- c) Permite detectar Proteína Compuesta Radiactiva
- d) Permite amplificar un fragmento específico de material genético
- ☒ e) Permite la detección de un fragmento específico de una proteína bacteriana

19) Al plantear el diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica debe tenerse en cuenta que el microorganismo que la produce:

- a) Es un coco Gram-positivo, catalasa-positivo resistente, a bacitracina
- b) Es alfa-hemolítico en agar sangre
- c) Es un coco Gram positivo catalasa negativo, beta-hemolítico, sensible a bacitracina
- d) No crece en agar sangre
- e) La c) y la d) son correctas

20) Ante la sospecha de una ITU en una mujer y con el fin de que la muestra de orina sea apta para ser cultivada, se recomienda:

- a) Que se recoja la primera porción de la orina
- b) Que la muestra se tome a última hora de la tarde
- c) No lavar la zona genital ya que así hay mayor concentración de microorganismos y facilitaría el diagnóstico
- d) Que se ingieran diuréticos para favorecer la micción
- ☒ e) Que recoja la parte media de la micción

21) El medio Löwenstein-Jensen permiten el crecimiento de:

- a) *Legionella pneumophila*
- b) *Mycobacterium tuberculosis*
- c) *Mycobacterium bovis*
- d) *Streptococcus pneumoniae*
- ☒ e) La b) y la c) son correctas

22) Señale la respuesta verdadera:

- a) En el ELISA indirecto los pocillos están recubiertos de anticuerpo.
- ☒ b) La técnica de secuenciación del 16S rRNA sirve para identificar bacterias, virus y hongos
- c) Es posible la visualización de células infectadas por virus mediante inmunofluorescencia directa
- d) La PCR convencional permite conocer la carga viral
- e) El MALDI TOF permite detectar anticuerpos frente a virus

23) Indica cual es la afirmación correcta respecto a la tuberculosis:

- a) La Tinción con fluorocromos es de gran utilidad
- b) La muestra del esputo debe descontaminarse con NaOH antes de sembrar
- c) La observación de bacilos ácido alcohol resistentes permite confirmar el diagnóstico
- d) La prueba de Mantoux positiva indica que se ha tenido contacto con el bacilo
- ☒ e) Todas son correctas

24) La observación de adenovirus en células del exudado faríngeo mediante anticuerpos marcados con fluoresceína:

- a) Debe realizarse en un microscopio de fluorescencia
- b) Es una prueba serológica
- c) Es una prueba bioquímica
- d) Es una Inmunofluorescencia indirecta
- ☒ e) La a) y la d) son correctas

25) ¿Cuál de los siguientes reactivos hace específica a una reacción de PCR?

- a) dNTPs
- b) Oligonucleótidos, primers o cebadores
- c) Taq-Polimerasa
- ☒ d) Inmunoglobulinas contra las regiones específicas
- e) Buffer

26) Indica la respuesta correcta sobre el diagnóstico de las infecciones fúngicas:

- a) Las técnicas proteómicas como el MALDI-TOF no se pueden emplear
- ☒ b) Las características macroscópicas y microscópicas de los hongos filamentosos crecidos no permiten su identificación
- c) Los hongos levaduriformes crecen en Agar Sabouraud
- d) Los dermatofitos crecen muy rápido, dando colonias en 24 h.
- e) El examen microscópico directo no suele emplearse ya que no aporta gran información.

27) Ante la sospecha de una mononucleosis infecciosa ¿que prueba harías?:

- a) Una tinción de Ziehl-Neelsen del esputo
- b) Una inmunocromatografía para detectar antígeno de *Mycoplasma*
- ☒ c) Un ELISA para la detección de IgM contra el antígeno de la cápside del Virus de Epstein-Barr
- d) Un cultivo de la muestra en Mc. Conkey
- e) Un test de aglutinación frente a Rinovirus

¿Cuál de los siguientes NO ES un método de identificación bacteriana a partir de un cultivo puro?

- a) Técnicas proteómicas (MALDI-TOF)
- b) Tiras API
- c) PCR
- d) Sistemas automatizados (Wider, Vitek...etc)
- ☒ e) Elisa indirecto

29) ¿Cuál de las siguientes técnicas son las más habituales para el diagnóstico de infecciones víricas en un laboratorio de diagnóstico clínico ordinario?:

- ☒ a) Pruebas serológicas y de detección de antígeno
- b) Aislamiento del virus
- c) Shell-vial
- d) Microscopía electrónica
- e) Tinción de auramina-rodamina

30) La prueba de screening de ITU mediante tira reactiva ha dado negativa en una muestra de orina de una mujer joven sintomática. ¿Que podrías concluir?

- a) Que probablemente tiene una ITU por *Escherichia coli*
- b) Que probablemente tiene una ITU por *Proteus*
- c) Que probablemente tiene una ITU por *Staphylococcus saprophyticus*
- d) Que probablemente tiene una ITU por *Klebsiella*
- ☒ e) Que no tiene infección de orina.

31) En la primera etapa de cada uno de los ciclos de la PCR se produce:

- a) La hibridación de una molécula de ADN con otra de ARN.
- b) La hibridación de dos moléculas de ADN de cadena sencilla para formar una doble hélice de ADN
- ☒ c) La desnaturalización de las dos hebras del ADN
- d) La unión de los primers
- e) La elongación mediante la Taq-polimerasa

32) La tinción de Ziehl-Neelsen:

- a) Permite observar *Mycobacterium tuberculosis*
- b) Permite observar *Legionella pneumophila*
- c) Permite observar *Mycoplasma pneumoniae*
- d) Permite observar *Haemophilus influenzae*
- ☒ e) La a) y la c) son correctas

33) Entre otras aplicaciones, el Western Blot se utiliza para confirmar la infección por virus del VIH. Indica cual de las siguientes afirmaciones sobre el método es INCORRECTA.

- a) Las proteínas componentes del virus VIH se separan por electroforesis en gel de poliacrilamida.
- b) Se transfieren las proteínas separadas por electroforesis del gel de poliacrilamida a tiras de nitrocelulosa que se incuban con el suero del individuo.
- c) Los anticuerpos anti-VIH, si existen, se ligan a las proteínas virales contenidas en la tira.
- ☒ d) Los anticuerpos ligados se visualizan con el microscopio de fluorescencia.
- e) Los anticuerpos ligados se visualizan con un conjugado (anti-Ig que porta un enzima) y posterior observación de líneas de color en la tira.

34) Indica la afirmación INCORRECTA::

- ☒ a) La prueba de filamentación es muy útil para identificar *Candida albicans*

- ☒ b) La observación directa de la muestra clínica tratada con KOH (30%) o azul de Lactofenol es muy útil para diagnosticar hongos filamentosos
- c) El crup es una infección que se da en niños
- d) La sinusitis y la otitis media suelen estar producidas por *Streptococcus pyogenes*
- e) La detección de antígeno frente a *Legionella* en orina es una prueba muy útil para el diagnóstico

35) Indica la respuesta INCORRECTA sobre la obtención y el transporte de las muestras:

- a) Las muestras deben enviarse al laboratorio lo antes posible y en las condiciones de temperatura y seguridad adecuadas
- b) El síndrome clínico condiciona el tipo de muestra
- c) El tipo de paciente (niño, paciente intubado...) condiciona el procedimiento de obtención
- d) Los posibles agentes etiológicos implicados condicionan el sistema de transporte
- ☒ e) Las muestras deben tomarse siempre después de iniciar el tratamiento antibiótico

36) ¿Cuál es el orden correcto en el que hay que añadir los reactivos para realizar la tinción de Gram?

- a) Safranina-Lugol-Alcohol acetona-Cristal Violeta
- ☒ b) Cristal Violeta-Lugol-Alcohol acetona-Safranina
- c) Cristal Violeta- Safranina- Lugol-Alcohol acetona
- d) Cristal Violeta-Lugol- Safranina-Alcohol acetona
- e) Lugol -Safranina-Alcohol acetona-Cristal Violeta

37) La técnica de diagnóstico por inmunocromatografía es una prueba:

- a) Serológica
- b) De detección de anticuerpos
- c) De detección de antígenos
- d) Es positiva cuando se observa fluorescencia
- e) Que se emplea sólo para detección de hongos

38) Indique el binomio correcto:

- a) Neumonía atípica - *Streptococcus pneumoniae*
- ☒ b) Estreptococo beta-hemolítico resistente a la bacitracina - *Streptococcus pyogenes*
- c) Estreptococo alfa- hemolítico resistente a la optoquina - *Streptococcus pneumoniae*
- d) Crecimiento en agar sangre - *Legionella*
- e) Requerimiento de factores V y X - *Haemophilus influenzae*

39) ¿Cuál de las siguientes bacterias se suele aislar en neumonías por aspiración?

- ☒ a) *Klebsiella pneumoniae*
- b) *Legionella pneumophila*
- c) *Haemophilus influenzae*
- d) *Mycoplasma pneumoniae*
- e) *Mycobacterium tuberculosis*

40) La identificación mediante secuenciación del 16S rRNA::

- a) Es una técnica muy específica
- b) Requiere especialistas en genética molecular
- c) No se aísla la bacteria, por lo que no es posible la realización de perfiles de susceptibilidad antibióticos
- d) Es un método rápido y eficaz
- ☒ e) Todas son correctas

WUOLAH