

2-PARCIAL-CORRECTO.pdf



Ninisare



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

Una cuenta que no te pide **nada**.

Ni siquiera que apruebes. De momento.

(Estudia y no nos des ideas)

Cuenta NoCuenta

Saber más

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherida al Sistema de Garantía de Depósitos holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](#)



MENÚ
SIMPLE

3'50
€



MENÚ
DOBLE

4'50
€



MENÚ
TRIPLE

5'50
€



PRECIO ESPECIAL €

POR TIEMPO LIMITADO

MENÚ 4YOU



Oferta válida desde el 06/01/2026 al 09/02/2026. Menú a elegir entre Cheeseburger o Chicken Mayo: Simple por 3,50€, Doble por 4,50€, Triple por 5,50€. Precios máximos en restaurante. Los precios de los Menús y los complementos pueden variar entre restaurantes, pudiendo verse incrementados en el servicio de McDelivery. Estos menús incluyen patatas y bebidas medianas. Consulta en restaurante el precio de tu complemento, tus opciones y con agua y otras bebidas + 0,01€ suplemento por cada producto que incorpore plástico Ley 7/2022 excepto los no envasados por McDonald's®. No acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos. Cristalería para presentación del producto no disponible en restaurante. Restaurantes McDonald's, S.A.U. (C/ Basauri nº 17, 28023-Madrid).

1. EN UNA ANALISIS DE HECES, EL DESCENSO DE PH POR DEBAJO DE 5,5, JUNTO CON AUMENTO DE ACIDO LACTATICO

- a) Puede informar de intolerancia a la lactosa
- b) Puede informar de intolerancia a la sacarosa
- c) Informa de una posible intolerancia a la isomaltosa
- d) **Todas las anteriores son correctas**

2. Con respecto a la glucogénesis muscular es falso que:

- a) La tipo VII (7) es una de ellas
- b) La tipo I o enfermedad de von gierke no es una de ellas
- c) **Para su diagnostico se utiliza es test del glucagón**
- d) Para su diagnostico se utiliza el test de isquemia

3. La enfermedad de Hunter

- a) Es una mucopolisacaridosis tipo 2 que se transmite con carácter autosómico recesivo
- b) **Es una mucopolisacaridosis tipo 2 que se transmite ligada al sexo**
- c) Es una mucopolisacaridosis tipo 1 que se transmite con carácter autosómico recesivo
- d) Es una mucopolisacaridosis tipo 1 que se transmite ligada al sexo

4. La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en:

- a) Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
- b) **Alteraciones en el metabolismo de los lípidos**
- c) Alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos
- d) Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

5. La determinación de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardiacas puesto que tiene propiedades aterogenicas como por ejemplo:

- a) Los quilomicrones
- b) HDL
- c) **Las LDL solamente**
- d) Las LDL o las Lpa

6. Según la clasificación de Frederikson:

- a) La hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por un hipercolesterolemia
- b) **La hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por una hipercolesterolemia**
- c) La hiperlipoproteinemia tipo VI se caracteriza por una hipercolesterolemia
- d) Todas son correctas

7. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas es cierto que:

- a) **La concentración de Apo B en plasma debe utilizarse como alternativa a la concentración de LDL colesterol**
- b) La concentración de Apo A en plasma debe utilizarse como alternativa a la concentración de LDL colesterol
- c) Las HDL- colesterol se pueden determinar con la formula de Fridewald
- d) Las HDL- colesterol se pueden determinar de ultracentrifugacion y precipitación adicionar sal de acido fosfotungstico.

8. El CPT afecta a a:

- a) La degradación de los cuerpos
- b) **A la síntesis de los acidos grasos**
- c) A la síntesis de los cuerpos cetonicos

9. Entre las alteraciones en el metabolismo de los triglicéridos destacan:

- a) **Deficiencia de glicerol quinasa**

WUOLAH

- b) Deficiencia de HMG- CoA liasa
- c) Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
- d) Deficiencia de dipalmitoil lecitina

10. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolipidos indica la opción correcta:

- a) Los defectos en sus síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles.
- b) Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
- c) **Pueden producirse por defectos en las saponinas**
- d) Pueden deberse por defectos en los plasmalogenos

11. En las alteraciones en el transporte de los aminoácidos no se encuentra:

- a) **Fenilcetonuria**
- b) Cistinuria
- c) Inminoglicinuria
- d) Enfermedad de Hartnup

12. El albinismo:

- a) Esta causado por déficit cistationasa
- b) Esta causado por la perdida del triptófano
- c) **Esta causado por déficit de tirosinasa**
- d) Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa

13. La alcaptonuria:

- a) Es una alteración del catabolismo de la prolina
- b) Esta causado por la perdida de triptófano
- c) **Produce una coloración oscura en la orina por la presencia de acido homogentisico**
- d) Produce el síndrome del pañal azul por la formación de indican

14. La orina con olor a jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de aminoácidos:

- a) Azufrados
- b) Alifáticos no ramificados
- c) Básicos
- d) **Alifáticos ramificados**

15. Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a) Carbamoil-fosfato sintetasa 1.
- b) ornitina transcarbamilasa
- c) arginina succinato sintetasa
- d) **todas son correctas**

16. la xantinuria hereditaria se produce por:

- a) acumulación de xantina oxidasa y xantina deshidrogenasa
- b) cursa con hiperuricemia
- c) es una alteración metabólica de las pirimidinas
- d) **todas son falsas**

17. En la determinación de proteínas de plasma sanguíneo:

- a) se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar la proteína total
- b) la reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- c) la separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d) **ninguna de las opciones es correcta**

18. Dentro de lo que se engloba como proteína en fase aguda se incluye:

- a) la albumina

- b) **la ceruloplasmina**
 c) todas las proteínas de fracción β
 d) todas las proteínas de la fracción γ
19. En un proteinograma cual de las siguientes proteínas aparece en la región β :
- a) albúmina
 b) **transferrina**
 c) ceruloplasmina
 d) IgG
20. Que magnitud bioquímica analizarías para valorar la integridad de las células del hígado:
- a) Bilirrubinatri
 b) Fosfatasa alcalina
 c) Albumina
 d) **Alanina aminotransferasa**
21. Cual de las siguientes enzimas de interés clínico se eleva en plasma tras una pancreatitis:
- a) Lactato deshidrogenasa
 b) Fosfatasa alcalina
 c) **Amilasa**
 d) Creatinina quinasa
22. El aclaramiento de la creatinina calculado en un volumen de 2160 mm de orina recogido durante 19h a una concentración en orina de 8,1 m.mol/L y plasmática de 160 μ mol/ L fue de :
- a) 65,9 mL/ min se calcula: $Cl = (8,1/160 \times 10^{-3}) \times (2160 \text{ ml} / 1140) =$
 b) **95,7 mL/ min**
 c) 75,9 μ L/ min
 d) 95,7 μ L/ min
24. Con respecto al estudio bioquímico de la función renal:
- a) Se suele analizar la concentración de amonio o de creatinina para estudiar alteraciones glomerulares
 b) Se suele analizar la concentración de amonio o de creatinina para estudiar alteraciones tubulares
 c) Se suele analizar la integridad del epitelio y el mantenimiento del equilibrio ácido básico para estudiar alteraciones glomerulares
 d) **Se suele analizar la integridad del epitelio y el mantenimiento del equilibrio ácido básico para estudiar alteraciones tubulares**
25. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los fosfoacilgliceridos, indica la opción correcta:
- a) los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
 b) pueden cursar con descerebración
 c) pueden producirse por deficiencias en las saponinas
 d) **pueden deberse a deficiencias en los plasmalogenos**
26. a la hiperlipoproteinemia tipo 1 de frederickson también se la conoce como:
- a) hipercolesterolemia familiar
 b) hiperbetaproteinemia familiar
 c) **hipertrigliceridemia familiar**
 d) hiperglicemia familiar
27. La determinación de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardiacas como la aterosclerosis. Sin embargo no todas las lipoproteinemias presentan riesgo aterogenico como por ejemplo:
- a) los quilomicrones y las HDL
 b) las quilomicrones y las LDL
 c) las LDL
 d) **Las LDL o las B- VLDL**



MENÚ 4YOU

Oferta válida desde el 06/01/2026 al 09/02/2026. Menú a elegir entre Cheeseburger o Chicken Mayo: Simple por 3,50€, Doble por 4,50€, Triple por 5,50€. Precios máximos en restaurante. Los precios de los Menús y los complementos pueden variar entre restaurantes, pudiendo verse incrementados en el servicio de McDelivery. Estos menús incluyen patatas y bebidas medianas. Consulta en restaurante el precio de tu complemento, tus opciones y con agua y otras bebidas + 0,01€ suplemento por cada producto que incorpore plástico. Ley 7/2022 excepto los no envasados por McDonald's®. No acumulable con otras ofertas, promociones o descuentos. Cristalera para presentación del producto no disponible en restaurante. Restaurantes McDonald's, S.A.U. (C/ Basauri nº 17, 28023-Madrid).

28. Con respecto a la gota señala la afirmación incorrecta:

- a) Trastorno metabólico de las pirimidinas
- b) Puede cursar con tofos
- c) Puede aparecer como una gota juvenil
- d) **Se caracteriza por una aparición de cristales de urato en los tejidos**

29. Cual de las ss afirmaciones es correcta:

30. Según la clasificación de Frederickson

OPCION CORRECTA: la hiperliproteïnemia Tipo I se caracteriza por una hipergliciridemia con elevados niveles de TAG y lipoproteína elevada QM

Relaciona cada patología con la alteración metabólica correspondiente. Responde correctamente rellenando la tabla de la derecha con la letra que corresponde:

1.	Síndrome de Morquio		1	Mucopolisacaridosis F
2.	Aciduria orótica hereditaria		2	Alteraciones del metabolismo de las pirimidinas
3.	Enfermedad de TAY SACHS			ESFINGOLIPIDOS Acumula gangliosido.
4.	Síndrome de Lesh-nyhan		3	ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE PURINAS
5.	Abetaipoproteinemia		4	HIPOLIPOPROTEINEMIA I
6.	Enfermedad de Hers		5	GLUCOGENOSIS G
7.	Enfermedad de Fabry		6	ALTERAC DEL METABOLISMO ESFINGOLIPIDOS
8.	Intolerancia a la maltosa		7	METABOLISMO DE LOS DISACARIDOS
9.	Hipertriacilglicerolemia familiar		8	HIPERPROTEINEMIA
10.	Enfermedad de Wollman		9	METABOLISMO DE LOS TRIGLICERIDOS
11.	Enfermedad de la orina olor a jarabe de arce		10	METABOLISMO DE LOS AMINOACIDOS

Responde si son V o F las siguientes afirmaciones marcando con una cruz en la casilla correspondiente:

Pregunta	V	F
Las mucopolisacaridosis son enfermedades lisosomales	x	
La osmolalidad del plasma y la orina permiten estudiar la función glomerular renal	x	
Altas concentraciones de amonio en sangre no son indicativas de alteraciones en el ciclo de la urea		x
La concentración de hemoglobina y células sanguíneas aparecen siempre en un análisis de sangre rutinario	x	
El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos	x	
Los intolerantes a la isomaltosa – sacarosa se pueden hacer tolerantes a la patata con la edad	x	
En todos los glucogenosis se produce un acumulo de glucógeno		x
El tiempo de protombina permite estudiar la hemostasia primaria		x
Alteraciones en la β oxidación producen hipoglucemia no cetónica	x	

WUOLAH

Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica		x
Bajas concentraciones de hemoglobina en sangre es indicativo de insuficiencia renal crónica		x
Bajas concentraciones de albumina en sangre son indicativas de insuficiencia hepática crónica	x	
La ocronosis es típico de la alcaptonuria	x	
Ciertas esfingolipidosis cursan con descerebración	x	
La enfermedad de hunter se transmite ligada al cromosoma sexo	x	
Para el diagnostico de la enfermedad tauri se utiliza el test del glucacón		X
Elevadas concentraciones de urea en sangre son indicativas de alteraciones en el ciclo urea		x
Las esfingolipidosis son enfermedades lisosomales	x	
La enfermedad de san Filippo cursa con alteraciones neurológicas por acumulo de dermatan sulfato ES FALSO EL REAL ES QUERATAN SULFATO		x
Con valores de amonio plasmático superiores a 40 μmol se considera hiperanionemia		X
Los cálculos urinarios de xantínuria hereditaria son lisos y ovalados con coloración marrón anaranjada	X	
El compuesto que tiñe las heces de color azul en la enfermedad de hartnup es el triptofano		x

La ocronosis es signo de la alcaptonuria - VERDADERO

Los cálculos urinarios de la gota son lisos ovalados y de color anaranjado – FALSO

Un menor número de plaquetas implica mayor riesgo de hemorragia – VERDADERA

Las alteraciones en la concentración de FOFATASA ALCALINA indican alteración de la función hepática VERDADERA

Albumina transaminas y creatinina son magnitudes que nos informan de lesión hepática – FALSA son las aminotransferasas, la albumina, ggt , ast alt

El tiempo de Trombina es el que permite estudiar la coagulación – FALSA porque es la protombina no Trombina.

Los xantomas y las xantelasmas son característicos de las lipoproteínas e Hipercolesterolemia VERDADERO

Los neutrófilos son linfocitos monocleares FALSO Son prolimofornucleares.

La mucopolisacaridosis son enfermedades de almacenamiento de glucosaminoglicanos VERDADERO

La hiperanionemia no es significativa de

Relaciona esta patología con la alteración metabólica correspondiente

Alteraciones del metabolismo de fosfolípidos (FOSFOALCILGLICERIDOS)	Síndrome de Zellweger
Alteraciones del metabolismo de aminoácidos azufrados	homocistinuria
Alteraciones del metabolismo de triglicéridos	Enfermedad de wolman
alteraciones del metabolismo de pirimidinas	aciduria orotica hereditaria
Alteraciones del metabolismo de ácidos grasos	Enfermedad de Refsum
Alteraciones del metabolismo de lipoproteínas	abetalipoproteinemia
Alteraciones del metabolismo de mucopolisacaridos	Enfermedad de Hunter
Alteraciones en el transporte de aminoácidos	iminoglicinuria
Alteraciones del metabolismo de las purinas	síndrome de lesch- nyhan
Alteraciones del metabolismo de esfingolipidos	Enfermedad de Gaucher



COMIENZA 2026 CON 20 USDC

Regístrate y opera con 50 euros y llévate
20 USDC

REGÍSTRATE



Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

Completa las siguientes afirmaciones:

- a) Para evaluar una posible intolerancia a un disacárido se somete a una persona a la sobrecarga oral del mismo. Un valor de glucemia inferior a200 . mg/ dl se considera resultado positivo.
- b) La glucogenosis II o enfermedad de POMPE se debe a una déficit de α – 1,4– GLUCOSIDASA por acumulación de glucógeno en los lisosomas.
- c) La enfermedad de San Filippo, cursa entre otras cosas, con alteraciones neurológicas debido a un acumulo de HEPARAN SULFATO.
- d) Según la clasificación de Frederickson el suero de una persona con hiperlipoproteinemias tipo I se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de elevados triglicéridos.
- e) En la enfermedad de Hartnup el compuesto que tñe las heces del color azul se denomina INDACAN.
- f) La reacción de JAFTE se utiliza para cuantificar creatinina.
- g) Como consecuencia de una disfunción en los glomérulos renales aparecerá una proteinuria INESPECIFICA
- h) Los linfocitos proceden de la línea MIELOIDE en la hematopoyesis.
- i) Para valorar la regulación de los líquidos corporales se realiza la PRUEBA DE RESTRICCIÓN HÍDRICA.
- j) En el proteinograma la presencia de una banda discreta en la fracción y puede ser indicativo de PARAPROTEÍNA o componente monoclonal, que puede ser signo de malignidad.
- k) Para valorar el equilibrio ácido base de los tubulos renales se realiza
- l) En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo la reacción de Bradford se utiliza para CUANTIFICAR PROTEÍNAS TOTALES
- m) La xanturia hereditaria se produce por un acumulo de XANTINA E HIPOXANTINA
- n) Como consecuencia de una disfunción en los glomérulos renales aparece una PROTEINURIA INESPECIFICA si es la FUNCIÓN TUBULAR es la proteína específica
- o) La orina con olor a jarabe de arce se produce por alteraciones en el metabolismo DE LOS AMINOÁCIDOS
- p) La prueba de Perry y Berry se utilizan para detectar UN EXCESO DE POLISACÁRIDOS en la orina.
- q) Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos se encuentra CISTINURIA, INMINOGLICINURIA Y ENFERMEDAD DE HARTUP.
- r) El lipidograma puede representar muchas alteraciones de las LIPOPROTEÍNAS.
- s) La glucogenosis tipo II o enfermedad de POMPE se debe a un déficit de ALFA 1,4 GLUCOSIDASA
- t) Para valorar la regulación de los líquidos corporales se realiza