

FOTO-EXAMEN-PARCIAL-2.pdf



_nimo



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



SEGUNDO CONTROL ELIMINATORIO BIOQUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA GFA (360107) CURSO 22-23

APELLIDOS y NOMBRE:

HP
FIRMA

- (1 punto) Determina el aclaramiento de creatinina de un paciente en el que la concentración en orina del marcador era de $9,6 \text{ mmol/L}$ y en sangre de $240 \mu\text{mol/L}$. Ten en cuenta que el espécimen de orina (2100 ml) utilizado se recogió durante 20 horas. Según el valor obtenido ¿podría tener alterada la función glomerular? Justifica su respuesta.
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): Elevadas concentraciones de UREA (AMONIO) en sangre pueden indicar alteraciones del ciclo de la urea.
- (0.2 puntos) Todas las glucogenosis se producen por acumulación de glucógeno ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
Tipo IX: La única enfermedad en la que existe deficiencia de glucógeno en vez de incremento.
- (0.2 puntos) Las proteínas de fase aguda se incluyen todas en la fracción beta de la electroforesis. ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
La mayoría de las proteínas que constituyen las fracciones α_1 y α_2 aumentan en los procesos en los que existe lesión tisular activa.
- Completa (0.2 puntos): El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dl de hematíes calculada a partir de la concentración de hemoglobina y del hematocrito es
Concentración hemoglobínica corpuscular media (CHCM)
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La enfermedad de Gaucher es una MUCOPOLISACARIDOSIS -ESFINGOLIPIDOSIS
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): Los granulocitos proceden de la línea MIELOIDE-LINFOIDE de la hematopoyesis
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): En una prueba de sobrecarga oral de sacarosa, se considera como resultado positivo de intolerancia cuando la concentración de GLUCOSA-SACAROSA es inferior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba.
- Completa (0.2 puntos): En las pruebas bioquímicas empleadas para el diagnóstico de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas se puede determinar la concentración de APO A como alternativa a la concentración de
LDL
- (0.2 puntos) La Xantínuria Hereditaria se produce por alteración en el metabolismo de las pirimidinas ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
Disminución síntesis de xantinas
- Completa (0.2 puntos): La aparece siempre cuando hay alteración en la digestión, absorción y transporte de lípidos
- Completa (0.2 puntos): La glucogenosis tipo I o enfermedad de Von Gierke se produce por déficit de la
Glucosa-6-fosfatasa
- (0.5 puntos) Dibuja en el lipidograma las bandas correspondientes que deberían aparecer en una persona que tenga una hiperquilomicronemia familiar y marca la o las casillas correspondientes al aspecto de la muestra de suero que se ha dejado reposar overnight a 4°C

QM LDL VLDL HDL

--	--	--	--

Normal

Paciente

SUERO	CAPA SUPERFICIAL CREMOSA	X
	TURBIO	X
	TRANSPARENTE	

Detiene la síntesis y elongación de ácidos grasos

- (0.2 puntos) El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
- Completa (0.2 puntos): Las alteraciones del ciclo de la urea que más frecuentemente se producen son los déficit de la

- Completa (0.2 puntos): La aparición en el sedimento urinario de cristales hexagonales planos es indicativo de ^{Cistinuria}
- Completa (0.2 puntos): Existe hiperamonemia cuando la concentración de amonio supera los ^{60 micromoles por litro} en sangre.
- (0.2 puntos) Las personas con intolerancia hereditaria a la isomaltosa se hacen más tolerantes al consumo de patata con la edad ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La enfermedad de Refsum es una alteración en el metabolismo de ACIDOS GRASOS-
TRIGLICÉRIDOS
- (0.2 puntos) La enfermedad de San Filippo o mucopolisacaridosis tipo III cursa con alteraciones neurológicas debido a la acumulación de queratán sulfato ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
- (0.2 puntos) Los tofos pueden aparecer en personas con Gota ¿Verdadero o Falso? ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): Para valorar la capacidad de síntesis de las células hepáticas se analiza la ALANINA AMINOTRANSFERASA-ALBÚMINA.
- Completa (0.2 puntos): concentraciones de hemoglobina en sangre serían indicativas de insuficiencia renal
- Completa (0.2 puntos): El déficit de Acetil-CoA carboxilasa impide la correcta síntesis de necesario para sintetizar ácidos grasos.
- Completa (0.2 puntos): Las magnitudes bioquímicas que nos confirmarían daño hepático son
- Completa (0.2 puntos): El aclaramiento plasmático de de un individuo sano oscila entre 80-120
- Completa (0.2 puntos): La enfermedad de Tauri es una glucogenosis
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La prueba de restricción hídrica se utiliza para valorar la función GLOMERULAR-TUBULAR del riñón
- (1 punto) A continuación se recogen los resultados de una bioquímica sanguínea de varios pacientes adultos. Basándote en estos resultados, contesta SOLAMENTE a las preguntas que se te plantean:

MAGNITUDES	Paciente 1	Paciente 2	Paciente 3	Paciente 4	I.R
[Na ⁺]	141	120	138	137	135-145 (mmol/L)
[K ⁺]	3,8	7	4,5	4,3	3,5-5,1 (mmol/L)
[Ca ⁺⁺]	96	88	95	98	95-105 (mmol/L)
[Cl ⁻]	101	120	103	99	98-106 (mmol/L)
[HCO ₃ ⁻]	28	12	23	25	22-28 (mmol/L)
[Urea]	4	9,5	2,3	8	2,5-8 (mmol/L)
[Creatinina]	52	147	65	53	40-130 (μmol/L)
[Glucosa]	4,5	5	5,7	4,3	3-6 (mmol/L)
[Albúmina]	47	52	22	43	40-52 (g/L)
[Bilirrubina]	8	11	29	15	3-22 (μmol/L)
[Hemoglobina]	15	10	14	15	14-16 (g/dl)
[Aspartato-aminotransferasa] (AST)	0,5	0,7	1,7	24	0,2-0,8 (μKat/L)
[Alanina-aminotransferasa] (ALT)	0,15	0,1	1,1	27,6	0,05-0,92 (μKat/L)
[Fosfatasa alcalina] (FA)	2,1	4,9	6	5,7	1,3-4,7 (μKat/L)
[γ-glutamil-transferasa] (GGT)	0,35	0,2	1	1,3	<0,6 (μKat/L)

- ¿Qué paciente presenta una insuficiencia renal?
- ¿En qué magnitudes te basas para confirmar que se trata de un daño renal?
- ¿Podría ser daño agudo o crónico?
- ¿En qué te basarías?

SEGUNDO CU
APELLIDOS y NOMBRE: SA

EL ALUMNO DEBERÁ PONER TODOS SUS DATOS EN TODAS LAS PÁGINAS DEL EXAMEN. En cada una de ellas está contemplado el examen consta de 48 preguntas. UTILIZANDO BOLÍGRAFO en caso de LETRA LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS. UTILIZAR móviles o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico está estrictamente prohibido. Esta medida disciplinaria. Esto será motivo de expulsión y se tomarán medidas disciplinarias.

PREGUNTAS

- (0.2 puntos) Según la clasificación de Frederickson, las hiperlipoproteinemias tipo Ila, Iib y Iiii se caracterizan por una hipertrigliceridemia. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La fenilcetonuria es una alteración en el TRANSPORTE-METABOLISMO de la fenilalanina. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- (0.2 puntos) Un hígado cirrótico es señal de una insuficiencia renal crónica. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): En la enfermedad de HARTNUP-EOJA, el indacán es el compuesto que tinte las heces de color azul.
- (0.2 puntos) Como consecuencia de una disfunción de los túbulos renales aparecerá una proteinuria inespecífica. ¿Verdadero o Falso? Falso ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La transterrina es una proteína de fase aguda NEGATIVA-POSITIVA.
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La abetalipoproteinemia es un tipo de HIPOLIPOPROTEINEMIA.
- Completa (0.2 puntos): La banda discreta que aparece en una electroforesis de proteínas plasmáticas en la región gamma por un componente monoclonal se denomina HIPERLIPOPROTEINEMIA.
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): En la determinación de las proteínas del plasma sanguíneo se utilizan métodos inmunológicos para cuantificar proteínas TOTALES-ESPECÍFICAS.
- (0.2 puntos) Las alteraciones hepáticas crónicas pueden producirse por envenenamiento, por infección o por una mala perfusión. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- Completa (0.2 puntos): Valores elevados de plaquetas pueden producir.....
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): El lipidograma es una técnica ELECTROFORETICA-CROMATOGRÁFICA que permite revelar alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas.
- (0.2 puntos) La ocrónosis se produce en pacientes con alcaptonuria. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- (0.2 puntos) Los constituyentes mínimos que deben ir incluidos en un hemograma son: la concentración de albúmina, la concentración de las células sanguíneas, índices eritrocitarios y el examen morfológico de las células sanguíneas. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- Completa (0.2 puntos): Para el diagnóstico de glucogenosis musculares se utiliza el test de
- (0.2 puntos) Los linfocitos son leucocitos polimorfonucleares. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- (0.2 puntos) Alteraciones en el metabolismo de fosfoacilglicéridos pueden deberse a déficit de saposinas. ¿Verdadero o Falso? Verdadero ¿Por qué?
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): Se puede producir un descenso de pH en un espécimen de ORINA-HECES en personas con intolerancia a un disacárido.
- Rodea la opción correcta (0.1 puntos): La enfermedad de HUNTER-HURLER es una mucopolisacaridosis que no se transmite ligada al cromosoma X.



RESERVA YA
TU PLAZA



A un paso
de la uni



la concentración de hemoglobulina, concentración de las células sanguíneas, los índices eritrocitarios y el examen morfológico de las células sanguíneas.

15. Completa: Para el diagnóstico de glucogenosis musculares se utiliza el test de **isquemia**

16. Los linfocitos son leucocitos polimorfonucleares ¿verdadero o falso? **FALSO** ¿por qué? **Los leucocitos polimorfonucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos**

17. Alteraciones en el metabolismo de fosfoacilglicerol pueden deberse a déficit de saposinas ¿verdadero o falso? ¿por qué? ...

18. Rodea la opción correcta: Se puede producir un descenso de pH en un espécimen de **ORINA-HECES** en personas con intolerancia a un disacárido.

19. Rodea la opción correcta: La enfermedad de **HUNTER-HURLER** es una mucopolisacaridosis que no se transmite ligada al cromosoma X.

20. Determina el aclaramiento de creatinina de un paciente en el que la concentración en orina del marcador era de 9,6 mmol/L y en sangre de 240 umol/L. Ten en cuenta que el espécimen de orina (2100 ml) utilizado se recogió durante 20 horas. Según el valor obtenido ¿podría tener alterada la función glomerular? Justifica su respuesta.

21. Rodea la opción correcta: Elevadas concentraciones de **UREA-AMONIO** en sangre pueden indicar alteraciones del ciclo de la urea.

22. Todas las glucogenosis se producen por acumulación de glucógeno ¿verdadero o falso? **FALSO** ¿por qué? **Porque también puede producirse por déficit de este, como en la tipo IX**

23. Las proteínas de fase aguda se incluyen todas en la fracción beta de la electroforesis ¿verdadero o falso? **FALSO** ¿por qué? **son de la fracción alfa**

24. Completa: El valor de la cantidad de hemoglobina (en g) contenida en 1 dl de hematíes calculada a partir de la concentración de hemoglobina y del hematocrito es..

25. Rodea la opción correcta: La enfermedad de Gaucher es una **MUCOPOLISACARIDOSIS-ESFINGOLIPIDOSIS**

26. Rodea la opción correcta: Los granulocitos proceden de la línea **MIELOIDE- LINFOIDE** de la hematopoyesis

27. Rodea la opción correcta: En una prueba de sobrecarga oral de sacarosa, se considera como resultado positivo de intolerancia cuando la concentración de **GLUCOSA-SACAROSA** es inferior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba.


28. Completa: En las pruebas bioquímicas empleadas para el diagnóstico de las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas se puede determinar la concentración de APO A como alternativa a la concentración de **HDL-colesterol**

29. La Xantínuria Hereditaria se produce por alteración en el metabolismo de las pirimidinas ¿verdadero o falso? **FALSO** ¿por qué? **es por alteración de las purinas**

30. Completa: La **esteatorrea** aparece siempre cuando hay alteración en la digestión, absorción y transporte de lípidos.

31. Completa: La Glucogenosis tipo 1 o enfermedad de Von Gierke se produce por déficit de la **Glucosa-6-fosfatasa**

32. Dibuja en el lipidograma las bandas correspondientes que deberían aparecer en una persona que tenga una hiperquilomicronemia familiar (tipo I) y marca la o las casillas correspondientes al aspecto de la muestra de suero que se ha dejado reposar overnight a 4C



SUERO	CAPA SUPERFICIAL CREMOSA	
	TURBIO	
	TRANSPARENTE	

marcar cremosa y turbio

33. El déficit de biotina impide la síntesis de ácidos grasos ¿verdadero o falso? **VERDADERO** ¿por qué? **su déficit detiene la elongación de ácidos grasos**

34. Completa: Las alteraciones del ciclo de la urea que más frecuentemente se producen son los déficit de la **carbamoil**

35. Completa: La aparición en el sedimento urinario de cristales hexagonales planos es indicativo de **CISTINURIA**

36. Existe hiperamonemia cuando la concentración de amonio supera los **60 micromoles por litro** en sangre.



CANVAS
BY GREYSTAR



**PARA QUIEN
QUIERE
INDEPENDIZARSE
SIN QUE SEA
UN MARRÓN.**

**Sí, esta Resi
también es para ti.**

**RESERVA YA
TU PLAZA**



**Pamplona, Sabadell,
Salamanca, Sevilla, Valencia**



37. Las personas con intolerancia hereditaria a la isomaltosa se hacen más tolerantes al consumo de patata con la edad ¿verdadero o falso? **VERDADERO** ¿por qué? **la tolerancia mejora con la edad y con el crecimiento del intestino que permite el aumento de la cantidad total de enzimas**
38. Rodea la opción correcta: La enfermedad de Refsum es una alteración en el metabolismo de **ÁCIDOS GRASOS- TRIGLICÉRIDOS**
39. Enfermedad de San filippo o mucopolisacaridosis tipo III cursa con alteraciones neurológicas debido a la acumulación de queratan sulfato ¿verdadero o falso? **FALSO** ¿por qué? **esta causada por el heparan sulfato**
40. Los tofos pueden aparecer en personas con Gota ¿verdadero o falso? **VERDADERO** ¿por qué? **por la agregación de cristales**
41. Rodea la opción correcta: Para valorar la capacidad de síntesis de las células hepáticas se analiza la **ALANINA AMINOTRANSFERASA-ALBÚMINA**
42. Completa: **bajas** concentraciones de hemoglobina en sangre serían indicativas de insuficiencia renal **aguda**
43. Completa: El déficit de Acetil-CoA carboxilasa impide la correcta síntesis de **ácidos grasos** necesario para sintetizar **ácidos grasos**.
44. Completa: Las magnitudes bioquímicas que nos confirmaron daño hepático son **bilirrubina y albumina**
45. Completa: El aclaramiento plasmático de **creatinina** de un individuo sano oscila entre 80-120 mL/min
46. Completa: La enfermedad de Tauri es una glucogenosis **Fosfofructoquinasa muscular**
47. Rodea la opción correcta: La prueba de restricción hídrica se utiliza para valorar la función **GLOMERULAR-TUBULAR** del riñón.

VENTE
A VIVIR A
SABADELL



A un paso
de la uni

