Probabilidad 2025-1 Tareas

8 de febrero de 2025

Expediente	Nombre
	Bórquez Guerrero Angel Fernando
223203899	Tostado Cortes Dante Alejandro

- 1. Si n(A) = 15, n(B) = 20, y $n(A \cap B) = 10$. Encontrar $n(A \cup B)$.
 - Su respuesta va entre estos corchetes
- 2. Una persona tiene 4 camisetas, 5 pantalones, 7 pares de zapatos y 2 sombreros. ¿Cuántos conjuntos diferentes podría vestir?
- 3. ¿Cuántos números de tres dígitos se forman utilizando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Se permiten dígitos repetidos.

1.	Una cerradura de combinación se abrirá cuando se seleccione la opción correcta de
	tres números (del 1 al 40, contando el 40). ¿Cuántas combinaciones diferentes de la
	cerradura son posibles?

2.	Cuatro parejas (8 personas) han reservado asientos en una fila para un concierto ¿En cuántas formas pueden tomar asiento si (a) no hay restricciones para hacerlos (b) los dos de cada pareja desean sentarse juntos?
	(a)
	(b)
3.	De entre un grupo de 40 personas, ha de seleccionarse un jurado de 12 personas ¿En cuántas formas puede ser seleccionado el jurado?
4.	La complejidad de las relaciones interpersonales crece de modo considerable cuando el tamaño del grupo es mayor. Determine el número de relaciones de dos parejas en grupos de (a) 3, (b) 8, (c) 12 y (d) 20 personas.
	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
5.	¿Cuántos arreglos diferentes pueden formarse con una caja de 8 colores, si contiene 4 blancos, 3 azules y 1 rojo?

6.	Se sacan cinco cartas de un mazo ordinario de 52 cartas de juego. (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada sea del mismo palo? (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada sea una escalera? (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada sea una tercia?
	(a)
	(b)
	(c)
7.	Se sacan cinco cartas de un mazo ordinario de 52 cartas de juego. (a) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada sean dos pares? (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada sea un par? (c) ¿Cuál es la probabilidad de que la mano sacada no tenga ningún juego posible (carta alta)?
	(a)
	(b)
	(c)

- 1. En Hermosillo hay 4% de probabilidades de que el día de independencia se tenga una temperatura baja. ¿Cuál es la probabilidad de que ese día no se tenga una temperatura baja?
- 2. En una clase de álgbra y trigonometría hay 18 alumnos de primer año y 15 de segundo. De los 18 de primero, 10 son hombres; de los 15 de segundo, 8 son hombres. Encuentre la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea:
 - (a) De primero o mujer:
 - (b) De segundo u hombre:
- 3. Determinar la siguiente igualdad $P(A \cup B \cup C) =$
- 4. ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de 60 personas, por lo menos 2 tengan la misma fecha de cumpleaños?

- 1. Juan vive en una gran ciudad y viaja al trabajo diariamente en subterráneo o en taxi. Aborda el subterráneo $80\,\%$ del tiempo porque cuesta menos y toma un taxi el otro $20\,\%$ del tiempo. Cuando se toma el subterráneo, llega al trabajo a tiempo $70\,\%$ de las veces, mientras que llega a tiempo $90\,\%$ de las veces cuando viaja en taxi.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad de que Juan tome el subterrábneo y llegue a tiempo al trabajo en cualquier día dado?
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad de que Juan tome un taxi y llegue a tiempo al trabajo en cualquier día dado?
- 2. Se lanza un dado equilibrado dos veces. Determine si los siguientes pares de eventos son independientes.
 - (a) A: La suma de los dos resultados es 6. B: El primer resultado es 4.
 - (b) A: La suma de los dos resultados es 7. B: El segundo resultado es 4.
- 3. Demostrar la siguiente igualdad $P(A|B) = 1 P(A^c|B)$
- 4. Si dos eventos son independientes, ¿entonces deben ser disjuntos?
- 5. La paradoja de la caja de Bertrand. Se tienen tres cajas y cada una de ellas tiene dos monedas. La caja A contiene dos monedas de oro. La caja B contiene una moneda de oro y una moneda de plata. La caja C contiene dos monedas de plata. Se selecciona una caja al azar y de allí se escoge una moneda. Si resulta que la moneda escogida es de oro, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la caja con dos monedas de oro?