

Probabilidad 2025-1

Tareas Parcial 2

11 de marzo de 2025

Expediente	Nombre
219208106	Bórquez Guerrero Angel Fernando
223203899	Tostado Cortes Dante Alejandro

Tarea 5

1. Determinar si se trata de una variable aleatoria discreta o continua.

a) X = “Número de televisiones que prenden”:

Discreta

b) Y = “Velocidad de un automóvil”:

Continua

c) Z = “Altura de una persona”

Continua

d) W = “Número de llamadas telefónicas en alguna hora”:


Discreta

e) X = “Mililitros en una lata de cerveza”:

Continua

2. Se lanza una moneda 3 veces. Sea X la variable aleatoria que cuenta el número de águilas que suceden en el experimento. Encontrar la función de probabilidad de la variable aleatoria y realizar el histograma.

$$f(x) = P(X = x) = \frac{{}_3C_x}{8}$$



Tarea 6

1. Un dado equilibrado se lanza dos veces consecutivas. Sea X la diferencia entre el resultado del primer y el segundo lanzamiento.

a) Encuentre la función de probabilidad de X .

$$f(x) = P[X = x] = \frac{6-|x|}{36}$$

b) Encuentre la función de distribución de X .

$$F(x) = \sum_{x=-5}^5 \frac{6-|x|}{36}$$


c) Determinar el valor esperado de X .

$$E[X] = \mu = \sum_{x=-5}^5 x \frac{6-|x|}{36} = 0$$

d) Determinar la varianza de X .


$$Var(X) = \sigma^2 = \sum_{x=-5}^5 (x - \mu)^2 \left(\frac{6-|x|}{36}\right) = \frac{35}{6}$$

e) Determinar el histograma.



f) Dibujar el valor esperado y el intervalo que resulta de estar dentro de una desviación estándar de la media.

$$\sigma = \sqrt{\frac{35}{6}}$$



2. Se sabe que un jugador tiene una probabilidad del 95 % de ganar un juego importante. Sea X la variable aleatoria que indica si gana o pierde el juego.

a) ¿Sigue una distribución de Bernoulli?

Dado que solo existen dos posibles resultados (éxito o fracaso), esta sigue una distribución de Bernoulli $X \sim Be(0.95)$

b) Si pudiera jugar muchas veces el juego importante, ¿qué porcentaje de victorias esperaría observar?

Si cada juego es independiente, $E[X] = 0.95 = 95 \%$

c) ¿Cuál es la varianza de esta variable aleatoria?

$Var(X) = \sigma^2 = 0.95(1 - 0.95) = 0.0475$

d) Determine el intervalo de valores que están dentro de una desviación estándar de la media.

$\sigma = \sqrt{0.0475} = \frac{\sqrt{19}}{20} = 0.218$

$[E[X] - \sigma, E[X] + \sigma] = [0.95 - 0.218, 0.95 + 0.218] = [0.732, 1.168]$

Dado que no pueden haber valores mayores que 1, el intervalo termina siendo $[0.732, 1]$

Tarea 7

1. Antes de la venta de pianos, deben probarse para saber si se encuentran en buen estado o defectuoso. El porcentaje de defectuosos es de 5 %. Sea X el número de pianos en buen estado en una muestra aleatoria de tamaño $n = 25$,

a) ¿Qué tipo de distribución tiene X ?

Dado que solo existen dos posibles resultados (buen estado o defectuoso) y contamos con una muestra, esta sigue una distribución binomial $X \sim \text{Bin}(25, 0.95)$

b) Determinar la probabilidad de observar exactamente 7 pianos en buen estado.

$$P[X = 7] = \binom{25}{7}(0.95)^7(0.05)^{18} = 1.28 \times 10^{-18}$$

c) Determinar la probabilidad de observar 22 o más pianos en buen estado.

$$P[X \geq 22] = \sum_{x=22}^{25} \binom{25}{x}(0.95)^x(0.05)^{25-x} = 0.966$$

d) Determinar la probabilidad de observar menos de 22 pianos en buen estado

$$P[X < 22] = 1 - P[X \geq 22] = 1 - 0.966 = 0.034$$

e) Determinar el número de pianos que espera encontrar en buen estado.

$$E[X] = (25)(0.95) = 23.75$$

f) Determinar la varianza de X .

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = (25)(0.95)(0.05) = 1.1875$$

2. Una pareja desea tener una niña en su familia. La pareja decide tener hijos hasta que se tenga la primer niña. Suponga que la probabilidad de tener una hija es de 0.25.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga x niñas?

$$P[X = x] = (1 - 0.25)^x(0.25)$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuatro hijos?

$$(0.75)^3(0.25) = 0.1055$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que la familia tenga cuando mucho cuatro hijos?

$$\sum_{x=0}^4 (0.75)^x(0.25)$$

d) ¿Cuántos hijos esperaría que tenga esta familia?

$$E[X] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.25} = 4$$

e) ¿Cuál es la desviación estándar?

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2} = \frac{0.75}{(0.25)^2} = 12$$

3. Sea X una variable aleatoria tal que $X \sim U\{1, 2, \dots, n\}$. Demuestre que:

a) $E(X^2) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$

Dado que X se distribuye de manera uniforme, esto significa que todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia.

- El valor esperado de X se calcula de la siguiente manera:

$$E[X] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- La suma de los primeros n números naturales puede ser calculada de la siguiente forma:

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Reescribiendo la función obtenemos lo siguiente:

$$E[X] = \frac{n+1}{2} \quad \forall X \sim U\{1, 2, \dots, n\}$$

- Ya que X^2 se distribuye de la misma forma uniforme, su valor esperado se calcula de la siguiente forma:

$$E[X^2] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

- También podemos calcular la suma de los primeros n^2 naturales con la siguiente función:

$$f(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

- Reescribiendo en la función del valor esperado hemos obtenido lo que deseábamos demostrar.

$$E[X^2] = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

b) $Var(X) = \frac{n^2-1}{12}$

La varianza de una distribución uniforme se calcula de la siguiente forma:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

- Utilizando los valores del inciso anterior podemos reescribir la función cómo:

$$Var(X) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

- Desarrollando obtenemos la función que buscábamos.

$$Var(X) = \frac{2n^2+3n+1}{6} - \frac{n^2+2n+1}{4}$$

$$Var(X) = \frac{4n^2+6n+2}{12} - \frac{3n^2+6n+3}{12}$$

$$Var(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Tarea 8

1. Se sabe que, en promedio, llegan 15 personas por hora a una tienda departamental. Conteste lo siguiente:
 - a) ¿Qué tipo de distribución tiene X ?
 - b) Determine la probabilidad de observar exactamente 15 personas en una hora.
 - c) Determine la probabilidad de observar 5 o más personas en una hora.
 - d) Determine la probabilidad de observar menos de 5 personas en una hora.
 - e) Determine en número de personas que se espera que lleguen en una hora.
 - f) Determinar la varianza de X .
2. Sean $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p)$ y $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p)$, dos variables aleatorias independientes con la misma probabilidad de éxito p . Sea la variable aleatoria $Z = X_1 + X_2$. Demuestra que $Z \sim \text{Bin}(n_1 + n_2, p)$. Recuerde que la función de probabilidad de Z está dada por:

$$P(Z = z) = \sum_{k=0}^z P(X_1 = k)P(X_2 = z - k)$$

Hint: Usa el siguiente resultado:

$$\sum_{k=0}^z \binom{n_1}{k} \binom{n_2}{z-k} = \binom{n_1 + n_2}{z}$$

3. Genere números aleatorios de una variable aleatoria geométrica con parámetro 0.7 en cualquier lenguaje de programación. Para ello, siga estos pasos:
 - Genere un número aleatorio a partir de una distribución uniforme en $(0, 1)$.
 - Utilice el criterio visto en clase basado en la inversa de la función de distribución acumulada de la variable geométrica para determinar el valor generado.