



Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche  
Corso di Laurea in infermieristica  
INFERMIERISTICA CLINICA IN AREA MATERNO-INFANTILE

# L'assistenza infermieristica al neonato sano

## Obiettivo

Al termine della lezione lo studente sarà in grado di:

- ♦ identificare i bisogni di assistenza infermieristica del neonato sano e relativi interventi

# Assistenza infermieristica al neonato sano

- ◊ In sala parto – sala operatoria
- ◊ In degenza (rooming-in)



Barbara Figari

# Il neonato 'sano'

Il neonato sano a termine:

- ◇ è nato tra la 37<sup>a</sup> settimana e la fine della 41<sup>a</sup> settimana di gestazione
- ◇ è di peso appropriato rispetto all'età gestazionale
- ◇ non ha difetti congeniti né malattie
- ◇ ha una valutazione APGAR > 7 al 1° minuto, senza interventi di rianimazione



# In sala parto/sala operatoria

Alla nascita osservare il bambino per valutare la necessità di trattamenti di urgenza o monitoraggio intensivo

In caso negativo:

- ◇ non ha alcuna necessità di essere aspirato né di essere sottoposto a somministrazione di ossigeno


I principali obiettivi dell'assistenza sono:

- ◇ facilitare l'adattamento alla vita extrauterina
- ◇ favorire il naturale legame di adattamento con la madre (contatto pelle a pelle)
- ◇ limitare il più possibile gli interventi sulla diade



# Il clampaggio del cordone ombelicale

- ◇ Può essere precoce (entro 1' dalla nascita) o ritardato (3'-5')
- ◇ Posizionare cordon clamp a circa 2/5 cm dalla base del moncone
- ◇ Coprire gli arti inferiori del neonato con un panno per contenerlo e per proteggerlo da lesioni accidentali durante la recisione
- ◇ Procedere al taglio del cordone ombelicale con forbici specifiche (a cuore)



# Cura del moncone ombelicale

- ◇ Il processo di mummificazione è fisiologico e spontaneo
- ◇ Il moncone va mantenuto pulito, asciutto e protetto da feci e urine con garze sterili (al di fuori del pannolino)
- ◇ L'igiene del moncone va effettuata secondo la procedura istituzionale; sostanze antisettiche non dovrebbero essere utilizzate routinariamente nel neonato sano a termine) (NICE, 2006; Zupan, Garner & Omari, 2004, revisione 2013)

# Identificazione del neonato

- ◇ Immediatamente dopo la nascita, applicare a madre e neonato appositi bracciali di riconoscimento che riportano identici elementi identificativi (tra cui, obbligatoriamente, un numero
- ◇ Annotare il numero identificativo della diade sul registro delle nascite. In caso di parto plurimo, ogni neonato avrà il braccialetto con il numero progressivo a seconda dell'ordine di genitura, e la madre avrà un braccialetto per ogni neonato
- ◇ I bracciali vanno applicati badando a che non siano accidentalmente sfilabili (tenendo anche conto del calo ponderale del neonato dopo la nascita), e devono essere mantenuti per tutta la durata della degenza
- ◇ La presenza e la corrispondenza dei bracciali di madre e neonato verrà verificata al momento della dimissione (Accordo Conferenza Stato-Regioni, 2001)

# Bisogno di termoregolazione

- ◇ Il mantenimento della temperatura corporea è molto importante nell'assistenza al neonato (l'ipotermia può provocare: ipoglicemia, ipossiemia, distress respiratorio)
- ◇ La termodispersione per conduzione può essere ridotta riscaldando i piani di appoggio ed utilizzando telini caldi
- ◇ La termodispersione per evaporazione può essere ridotta asciugando con telini caldi il corpo del neonato e soprattutto il capo e il viso
- ◇ La termodispersione per irradiazione può essere ridotta ponendo il neonato in una culla riscaldata o sotto una lampada radiante
- ◇ Fondamentale il controllo del microclima ambientale

# Il bisogno di interazione comunicativa e di adattamento all'ambiente

Il neonato, anche se nato prima delle 37 settimane di gravidanza, dovrebbe sperimentare (compatibilmente con le sue condizioni di salute) un contatto prolungato pelle a pelle con la madre già in sala parto

L'attenzione deve essere posta a:

- ◇ ridurre al minimo indispensabile la separazione
- ◇ garantire sicurezza, quiete, riservatezza
- ◇ fornire supporto all'instaurarsi della diade/triade



# Il legame madre-bambino

Il bambino, vissuto per nove mesi nell'utero, una volta nato ha estrema necessità di continuare a mantenere il contatto continuo con la madre, soddisfacendo i propri bisogni in modo immediato

L'allattamento materno risponde a questa esigenza

Il bisogno di consolazione, di contatto e di contenimento soprattutto nei primi sei mesi di vita ma anche in seguito sono garantiti nel caso di allattamento al seno

In caso di necessità è comunque possibile spremere il latte materno (manualmente, o con mastosuttori) da somministrare poi al neonato tramite sonda, biberon, bicchiere o cucchiaino

In questi casi il latte va conservato refrigerato o congelato, senza mai interrompere la catena del freddo



# Fattori di rischio per lo sviluppo neurocomportamentale del neonato

## ◊ Ambientali

luci, rumori, temperatura, dolore, mancanza di "contenimento", manipolazioni frettolose e anaffettive

## ◊ Relazionali

interruzione della simbiosi materna

# La “developmental care” del neonato

- ◇ E' l'uso di interventi assistenziali allo scopo di diminuire lo stress del neonato pretermine ricoverato in area critica

## Obiettivi

- ◇ Facilitare uno SVILUPPO GLOBALE ed ARMONICO favorendo la stabilità dell'organismo
- ◇ Promuovere il PROCESSO DI ATTACCAMENTO, le COMPETENZE GENITORIALI e la RELAZIONE GENITORE – BAMBINO

# Come?

- ❖ Riducendo lo stress (condizioni ambientali e fisiche che portano ad instabilità del neonato)
- ❖ Promuovendo la stabilità e l'autoregolazione (condizioni ambientali rispondenti ai bisogni del neonato)
- ❖ Fornendo l'opportunità di esperienze maturative (NON stimoli!)

# Effetti della "developmental care" sul neonato

- ◇ Stabilità/ miglioramento dei parametri vitali
- ◇ Migliore funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria, digestiva
- ◇ Minore necessità di assistenza intensiva nel neonato critico

# In pratica prevede di...

- ❖ dosare le attività in base alle necessità ed alle risposte/segnali del neonato (p.es. rispetto del ritmo sonno-veglia)
- ❖ intervenire sul micro-ambiente: piano d'appoggio stabile/accogliente/morbido, confini, contenimento (uso di nidi, mani ferme- "holding" -, teli, abiti, calzine, cappellini)



- ❖ intervenire sul macro-ambiente: luci, rumori, temperatura, affollamento



♦ utilizzare "gentle touch" e "wrapping" nella manipolazione e lo spostamento del neonato



- ◇ evitare gli stimoli dolorosi  
(prevenzione/saturazione sensoriale)
- ◇ incentivare la mamma ed il papà a prendersi cura in prima persona del loro figlio
- ◇ attuare il contatto pelle a pelle  
(metodo "marsupio") con la mamma o il papà ogni volta che sia possibile



# Il "metodo marsupio"

- ◇ Aumento della produzione del latte materno
- ◇ Maggiore/più rapido incremento ponderale
- ◇ Maggiore stabilità della temperatura corporea e dei parametri vitali, con riduzione delle apnee, delle bradicardie e aumento della saturazione periferica di ossigeno
- ◇ Momenti più prolungati di sonno quieto e di veglia quieta, pianto meno frequente
- ◇ Riduzione dello stress e senso di benessere per il bambino e per i genitori
- ◇ Ruolo propositivo dei genitori nel prendersi cura del loro bambino, aumento di sicurezza ed autostima, maggiore autonomia

# Effetti positivi del massaggio neonatale

- ◇ Rilassante: aiuta il bambino a superare lo stress e a liberarsi dalle tensioni del corpo
- ◇ Stimolante: aiuta a regolare le funzioni respiratorie, circolatorie e gastrointestinali
- ◇ Psicologico: perché approfondisce la conoscenza tra genitori e bambino tramite il "BONDING"



# La "care"...

È eticamente dovuta

Va **integrata** in tutte le attività quotidiane:

- ❖ Spostamenti
- ❖ Cambio del pannolino
- ❖ Bagnetto
- ❖ Peso
- ❖ Procedure dolorose



# Bisogno di alimentazione

- Peso alla nascita
- Calo fisiologico ( $\leq 10\%$ )
- Ritorno al peso iniziale (in meno di 15 gg.)

Pesata:

- ◇ in ospedale = giornaliera (doppia pesata ?)
- ◇ a casa = settimanale

# ALLATTAMENTO MATERNO



Barbara Figari

# Come favorire l'allattamento al seno

E' importante che fin dai primi minuti madre e figlio rimangano insieme, facendo in modo che si instauri il cosiddetto contatto "pelle-a-pelle"

Il corpo della madre aiuta il bambino a mantenere una temperatura adeguata e il bambino è meno stressato, più calmo, ed ha respiro e battito cardiaco più regolari



Il primo contatto con il seno dovrebbe avvenire entro mezz'ora/un'ora dalla nascita, lasciando la mamma e il bambino (insieme al papà se presente) liberi di interagire spontaneamente, senza interferenze per avviare fin da subito l'allattamento

La stessa infermiera che ha assistito il bambino alla nascita proseguirà il contatto con i genitori fornendo ulteriori informazioni sui primi momenti di vita del neonato e le prime nozioni sull'allattamento al seno

# Il "Rooming-in"

Tramite il ROOMING-IN è facilitata la vicinanza del neonato alla mamma, che viene incoraggiata ad attaccare il bambino al seno precocemente e tutte le volte che lo richiede senza orari fissi



Occorre evitare, in particolare in questi primi momenti, l'introduzione di elementi di disturbo (succhiotti o biberon, soluzioni di glucosio) che possono costituire un impedimento all'avviamento di un efficace allattamento al seno

Non lavare il seno dopo ogni poppata ed evitare l'uso di creme o unguenti durante l'allattamento; la normale igiene della mamma è sufficiente e il seno è provvisto di ghiandole che provvedono ad una naturale disinfezione dell'areola

L'unico consiglio da dare a una mamma che allatta è quello di aver fiducia in una buona riuscita dell'allattamento, di fidarsi di se stessa e del proprio bambino.

# Tipi di allattamento secondo la definizione dell'O.M.S.



- ◇ Allattamento al seno esclusivo: solo latte materno
- ◇ Allattamento al seno predominante: latte materno + liquidi nutritivi
- ◇ Allattamento misto: latte materno + latte di formula

Il miglior alimento per il neonato per i primi mesi di vita è il latte materno.

L'O.M.S. raccomanda sei mesi almeno di allattamento esclusivo (in situazione fisiologica nessun altro liquido è necessario)

# I 10 PASSI DELL'O.M.S.

- ◇ Definire un protocollo scritto per la promozione dell'allattamento
- ◇ Addestrare il personale sanitario ad applicarlo
- ◇ Informare le donne sui vantaggi dell'allattamento già in gravidanza
- ◇ Aiutare le madri a cominciare l'allattamento entro mezz'ora dal parto
- ◇ Mostrare come allattare e mantenere la produzione di latte anche in caso di separazione
- ◇ Non somministrare ai neonati alimenti diversi dal latte materno
- ◇ Praticare il ROOMING-IN
- ◇ Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta
- ◇ Non dare succhiotti o tettarelle artificiali durante l'allattamento al seno
- ◇ Favorire la formazione di gruppi di sostegno all'allattamento a cui rivolgersi dopo la dimissione dall'ospedale

# Fisiologia dell'allattamento

Il colostro è prodotto nei primi giorni dopo il parto, è secreto in piccole quantità ma ha un particolare valore nutritivo grazie al suo alto contenuto di proteine e di vitamine liposolubili e alle sue proprietà immunitarie

Si trasforma gradualmente in latte di transizione, e successivamente, nelle prime due o tre settimane, in latte maturo; rispetto al colostro il latte è più opaco, ed è di colore bianco



La montata latte, compare dopo tre/cinque giorni; il seno diventa turgido, e può dolere; il meccanismo alla base della montata latte è l'aumento della prolattina.

La produzione di latte si regolerà in base alle effettive necessità del neonato, seguendo la legge "della domanda e dell'offerta": più il bambino succhia e più il latte viene prodotto

Il neonato tramite la suzione, dà vita ad un riflesso che assicura una continua e abbondante produzione di prolattina nella mamma

Al contrario, il ristagno nel seno inibirà la produzione di latte; è molto importante, quindi, fin dall'inizio, non interferire in alcun modo con i ritmi di suzione del neonato: l'allattamento dovrà essere a richiesta, e non soggetto ad orari (ogni lattante ha esigenze proprie, quindi numero, orari e durata delle poppate vanno adattati ad ogni singolo caso)

# Le posizioni per allattare

La posizione in cui il neonato è attaccato al seno è fondamentale per una buona suzione. Il neonato deve essere posto nelle condizioni migliori per succhiare col minimo sforzo.

Nella posizione classica la madre è seduta comodamente con i piedi poggiati su uno sgabello, in modo che le ginocchia rimangano sollevate e le gambe sostengano il bambino ad un'altezza sufficiente per afferrare il seno, senza che quest'ultimo subisca trazioni.

La madre non deve abbassare il busto verso il bambino, ma è il bambino che deve essere portato al seno, con il capo allineato al corpo (no a torsioni del collo).

Cuscini od altri sostegni potranno aiutare la donna a trovare e mantenere una posizione comoda.

Nelle donne cesarizzate l'avvio dell'allattamento può essere più difficoltoso; la posizione migliore prevede la mamma ed il neonato di fronte coricati su di un fianco.

Qualsiasi posizione è valida se permette poppate efficaci ed è gradita alla mamma ed al bambino.




# Il neonato è attaccato correttamente al seno quando:



- ◇ La sua bocca è ben aperta, comprende anche parte dell'areola oltre al capezzolo, il labbro inferiore e quello superiore sono incurvati in fuori
- ◇ Il mento e il naso del neonato toccano il seno
- ◇ E' più visibile l'areola al di sopra del labbro superiore rispetto al labbro inferiore (i dotti galattofori sono spremuti dal movimento della lingua)
- ◇ Vi sono lente e profonde suzioni dopo qualche minuto di suzioni più rapide (il latte all'inizio esce più velocemente ed è più liquido)
- ◇ Non si sentono schiocchi durante la suzione (segnale di una suzione a vuoto) né si formano fossette sulle guance
- ◇ La mamma non avverte dolore (ma nei primi giorni, anche se l'attacco è corretto, è normale avvertire un leggero fastidio)



## ATTACHMENT - The Key to Successful Breastfeeding.



Bring baby's chin and chest forward onto the breast.



© Barbara Figari, M.D., All Rights Reserved

# I segnali di un allattamento efficace

- ◇ Recupero del calo ponderale
- ◇ Diuresi valida (5/6 pannolini al giorno)
- ◇ Intervalli di sonno o veglia tra un pasto e l'altro senza manifestare segnali di appetito (che compaiono prima del pianto, che è un segnale tardivo: in genere il neonato gira la testa, oppure si stiracchia, o apre le labbra tirando fuori la lingua in cerca del capezzolo)
- ◇ Evacuazioni presenti (più volte al giorno)



# I vantaggi dell'allattamento materno

## PER IL BAMBINO

- ◇ Il legame affettivo fra madre e il bambino viene rafforzato
- ◇ Protegge e riduce l'incidenza di patologie croniche dell'intestino
- ◇ Protegge dalle infezioni respiratorie
- ◇ Protegge da malattie infettive
- ◇ Protegge da malattie autoimmuni (diabete)
- ◇ Riduce il rischio di sviluppare allergie
- ◇ Riduce il rischio di obesità
- ◇ Migliora la vista e lo sviluppo psicomotorio

## PER LA MADRE

- ◇ Favorisce la produzione di ormoni che favoriscono uno stato di serenità e rilassamento.
- ◇ Riduce i casi di depressione post-parto
- ◇ Induce la produzione di ormoni utili al processo e all'equilibrio post-parto
- ◇ Protegge e riduce l'incidenza di cancro alla mammella e all'utero
- ◇ Stimola la contrazione dell'utero (produzione di ossitocina)
- ◇ Favorisce il consumo dei grassi accumulati durante la gravidanza
- ◇ Ritarda la ricomparsa delle mestruazioni e permette di aumentare le proprie riserve di ferro

# Complicanze nell'allattamento

Possono interferire e, in alcuni casi, portare all'interruzione dello stesso.

Questi disturbi possono essere, nella maggior parte dei casi, risolti con successo senza porre fine all'allattamento.



## Possono essere rappresentate da:

- ◇ ragadi del capezzolo, ovvero ferite che possono creare fastidio o dolore, fino al sanguinamento
- ◇ ingorgo mammario, ovvero una ostruzione temporanea di uno o più dotti galattofori, che impedisce al latte di fluire normalmente e provoca una crescente sensazione di tensione della mammella, fino a renderla particolarmente dura e dolorante
- ◇ mastite, ovvero una infiammazione della mammella conseguente ad una infezione batterica, la cui risoluzione spesso comporta l'utilizzo di antibiotici

# Il bisogno di igiene

Il bagnetto non ha solo funzione di pulizia da residui di sangue e/o vernice caseosa, ma deve rappresentare soprattutto un momento di rilassamento e tranquillità per il neonato in un elemento – l'acqua – a lui familiare



# Importante...

- ◇ Il bagnetto può essere procrastinato ed effettuato con la collaborazione dei parenti
- ◇ Regolare il microclima e la temperatura dell'acqua (37°C)
- ◇ Immergere lentamente il neonato per mantenere la sua stabilità
- ◇ Lavarlo delicatamente con gesti calmi
- ◇ Utilizzare poco detergente (neutro e ipoallergenico)
- ◇ Asciugare ed avvolgere il neonato con panni caldi
- ◇ Favorire il contatto con l'addome materno (bonding)




# Bisogno di un ambiente sicuro

- ◇ Evitare il rischio di isolamento e deprivazione sensoriale: sollecitare la presenza ed il contatto fisico dei genitori
- ◇ Ridurre il rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.): personalizzazione dell'assistenza, uso dei d.p.i. (es: guanti) e lavaggio delle mani tra un neonato e l'altro e tra diversi segmenti corporei dello stesso neonato
- ◇ Prevenire il rischio di caduta o traumatismo accidentale: non lasciare MAI il neonato incustodito
- ◇ Prevenire il rischio di danni iatrogeni (ustioni, lesioni, ecc.): seguire le procedure e valutare i presidi da utilizzare per integrità, funzionalità ed adeguatezza

# Prevenzione della S.I.D.S.

- ◇ Posizionare il bambino in posizione supina durante il sonno  
(per evitare la plagiocefalia posizionare il bambino prono o sul fianco quando è sveglio e costantemente osservato)
- ◇ Mantenere gradevole la temperatura dell'ambiente in cui il bambino dorme ed evitare abbigliamento pesante ed eccessi di coperte (il bambino non deve essere caldo al tatto)
- ◇ Farlo dormire nella propria culla o lettino, ma in camera con i genitori nei primi mesi di vita
- ◇ Evitare l'esposizione al fumo di tabacco
- ◇ Non usare cuscino e materassi troppo soffici
- ◇ Promuovere l'allattamento al seno e proporre l'uso del succhiotto per addormentarsi dopo che l'allattamento sia stato avviato (non insistere se il bimbo lo rifiuta mentre dorme)
- ◇ Mantenere la culla sgombra da oggetti o giochi imbottiti, coperte, peluches, paracolpi morbidi e non fissati



**If you use a blanket, place the baby with feet at the end of the crib. The blanket should reach no higher than the baby's chest. Tuck the ends of the blanket under the crib mattress to ensure safety.**

# Bisogno di eliminazione


Meconio: nel 98% dei casi emesso entro le 24 ore

Diuresi: nel 95/97% dei casi la prima emissione avviene entro 24 ore, spesso già in sala parto

# Bisogno di procedure terapeutiche

Profilassi malattia emorragica con vitamina K per via parenterale (i.m.) o enterale

N.B. La sede indicata per la somministrazione i.m. nel neonato è la antero-laterale della coscia (muscolo vasto laterale o retto femorale)



# Bisogno di procedure diagnostiche

## Il prelievo ematico dal tallone

Solitamente viene effettuato per eseguire gli screening neonatali per l'accertamento di difetti metabolici congeniti (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica) allo scopo di avere una diagnosi precoce e migliorare la prognosi a lungo termine

Diversi studi dimostrano come sia preferibile, quando possibile, il prelievo endovenoso in quanto meno doloroso

# Procedura

- ◇ Si effettua l'igiene delle mani, si indossano i guanti, e si identifica il neonato
- ◇ Dopo avere riscaldato e disinfettato la sede, si preleva al neonato un piccolo campione di sangue pungendolo le zone laterali del tallone (NON il calcagno) con un presidio sterile monouso (dispositivi indolore e sicuri contro le punture accidentali)
- ◇ Il campione prelevato si applica su un appositi cartoncini di carta assorbente e, compilato in tutte le sue parti, va inviato al laboratorio

**IMPORTANTE: ATTUARE LA SATURAZIONE SENSORIALE per prevenire il dolore**

- ◇ PARLARE/CANTARE AL NEONATO
- ◇ TOCCARLO DELICATAMENTE
- ◇ OFFRIRE LA SUZIONE CONSOLATORIA (anche con la somministrazione del pasto o di soluzione glucosata)
- ◇ PREVEDERE IL CONTATTO CON LA MAMMA



# Bibliografia

- ◇ AACN (a cura di), Procedure manual for pediatric acute and critical care, Saunders Elsevier, St. Louis, 2008
- ◇ AAP – Task Force on Sudden Infant Death Syndrome (a cura di), Policy statement – The Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts, Controversies Regarding Sleeping Environment, and New Variables to Consider in Reducing Risk, in *Pediatrics*, November 2005; 116(5):1245-1255
- ◇ Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 Novembre 2001, Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida sulle modalità per l'identificazione del neonato".
- ◇ Als HA, Synactive model of neonatal behavioural development: a framework for assessment of neurobehavioral development in the premature infant and for support of infants and parents in the neonatal intensive care environment, in *Physical and occupational therapy in pediatrics*, 1986,6 (3-4), 3-53
- ◇ Buonocore, G., Bracci, R., & Weindling, M. (2012). *Neonatology: A practical approach to neonatal diseases*. Milano: Springer-Verlag
- ◇ Conferenza Unificata Accordo 16 Dicembre 2010, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane sul documento concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo".
- ◇ McDonald, S.J., & Middleton, P. (2009) Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2, CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.pub2.
- ◇ NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence (2006) *Postnatal care: NICE Clinical Guideline 37. Review 2012*. Manchester, UK (rev. 2012)
- ◇ S.I.N. G.d.S. di Analgesia e sedazione nel neonato, *Raccomandazioni per la prevenzione ed il trattamento del dolore nel neonato*, Padova, CLEUP, 2005
- ◇ WHO – World Health Organization (2009). *Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care: a guide for essential practice. 2<sup>nd</sup> Edition*. Geneva: World Health Organization
- ◇ Zupan, J., Garner, P., & Omari A.A.A. (2004) Topical umbilical cord care at birth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, CD001057. DOI: 10.1002/14651858.CD001057.pub2. (rev. 2013)
- ◇ <http://www.nichd.nih.gov/sts/about/risk/Pages/reduce.aspx>
- ◇ <http://safetosleep.nichd.nih.gov>