ais comuns? Quais são as funções de uma distribuição? O que sa distribuição nor sa comuns? Experimentos podem se cados para identificar a normalidade da distribuição? O que sa distribuição no que é uma análise não paramétrica? Por ises paramétricas são preferidas? Que parâmetros de tendência central podem ser estimados? Que parâmetros do podem ser estimados? Que parâmetros de distribuição estimados? Que parâmetros de proporção podem ser estimados? Que parâmetros de distribuição estimados? Que parâmetros extremos podem ser estimados? O que são valores discrepantes (*outliers*)? Con duzir análises com valores discrepantes? O que é o tamanho do efeito? Quais são os tipos de tamanho do efeito converter um tamanho de efeito em outro? Como interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que é efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito? O que interpretar um tamanho do efeito? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação? O que interpretar um tamanho do efeito de modificação de la modificação de feito de modificação de feito de feito de modificação de feito de feito

ito aleatório? O que é efeito principal? O que é um modificador de efeito? O que é efeito de modificação? O que o de interação? O que é efeito direto? O que é efeito doreto? O que é efeito doreto? O que é efeito total? O que é efeito bruto? O que é efeito padronizado? O que é significância estatística como justificar o nível de significância estatística de um teste? O que é o P-valor? Como interpretar o P-valor? O prevalor não é? Qual a origem do 'P<0,05'? Quais são os complementos ou alternativas ao P-valor? Quais são erísticas de ensaios clínicos aleatorizados? Que modelos podem ser utilizados para comparações? O que são a linha de base? O que é comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados? Para quarar grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados? Quais são as razões para diferenças entre gramento nas (co)variáveis na linha de base? Quais cenários permitem a comparação entre grupos na linha de

em ensaios clínicos aleatorizados? Por que não se deve comparar grupos na linha de base em ensaios clínico torizados? Quais estratégias podem ser adotadas para substituir a comparação entre grupos na linha de base ensaios clínicos a la comparação entre grupos na linha de base ensaios? Quais estratégias podem ser adotadas para substituir a comparar intragrupos (pré - pós) em ensaios cos zados? que é comparação en ensaios comparar intragrupos (pré - pós) em ensaios? Comparação de la comparação de cubir que en casa de comparação de la comparação de cubir que en casa de comparação de interação? Quais variáveis devem ser utilizadas no ajuste de covariáveis? Quais os beneficiate de **Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados** sfecilidar com os dados perdidos em covariáveis? Quais são as diretrizes para redação de ensaios experimentais?

núltiplas? O que são erros de medida? Quais fontes de variabilidade são comumente investigadas? O que são mentos? O que é acurácia? O que é precisão? Qual é a relação entre viés e variabilidade? O que é meta-análomo avaliar a variação do tamanho do efeito? Como avaliar a heterogeneidade entre os estudos? Quais são as zes para redação de meta-análises? O que são modelos? O que são predições? Quais suposições são feitas pelagem? Como avaliar as suposições de um modelo? O que é qualidade de ajuste de um modelo? Como avalidade de ajuste de um modelo? Quais são as características de estudos observacionais? Quais são as diretrizedação de estudos observacionais? Quais são as diretrizedação de estudos observacionais? O que são paradoxos estatísticos? O que é o paradoxo de Abelson? O que

pebsting? O que e o paradoxo de Simpson? O que e o paradoxo de Stein? O que e o paradoxo de Okie? O que adoxo da acurácia? O que é o paradoxo do falso positivo? O que é o paradoxo da caixa de Bertrand? O que é o do elevador? O que é o paradoxo da amizade? O que é o paradoxo do menino ou menina? O que é o parado e surpresa? O que é o paradoxo do nó da gravata? O que é o paradoxo da Bela Adormecida? O que são falácia dicias? O que é a falácia? O que é amostra? O que é amostras? O que é unidade de análise? Por que identificar a unidade de análise de um estudo? O que é amostragem? Quais métodos de amostragem?

oodem ser obtidas da unidade de análise de um estudo? O que é amostragem? Quais métodos de amostrage s para obter uma amostra da população? O que é erro de amostragem? O que é reamostragem? Por que util nostragem? Quais procedimentos de reamostragem podem ser realizados? O que é subamostragem? O que ostragem? O que é metodologia da pesquisa? Qual a relação entre estatística e metodologia da pesquisa? O

ostragem? O que é metodologia da pesquisa? Qual a relação entre estatística e metodologia da pesquisa? O produtibilidade? Por que reprodutibilidade é importante? O que é robustez? O que é replicabilidade? O que é zação? O que é um experimento? O que é espaço amostral discreto? O que é evento discreto? O que é espa discretos? O que é espaço amostral contínuo? O que é evento contínuo? O que é espaço de eventos contínu

eros? O que é teorema central do limite? Quais a

Arthur de Sá Ferreira

Ciência com R

Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados

Sumário

Sumário		iii	
Lista	e Figuras	ix	
Lista	e Tabelas	хi	
Sobr	o autor xi	iii	
Dedi	tória 2	W	
Agra	ecimentos	⁄ii	
Prefá	io x	ix	
Parte	- Fundamentos	1	
1 1 1 1 1 1 1 1	Espaço amostral e eventos discretos Espaço amostral e eventos contínuos Probabilidade Independência e probabilidade Leis dos números anômalos Leis dos pequenos números Leis dos grandes números Teorema central do limite Deservada estatístico População Amostra Unidade de análise Amostragem Reamostragem	3 3 5 5 6 7 7 8 8 12 15 15 16 16 17	
	Asamento metodológico Metodologia da pesquisa	19 19 19 19 21	
4 P		23	

iv SUMÁRIO

	4.2	Falácias estatísticas	26
5	Viese 5.1	8	27 27
Pa	rte 2 -	- Estatística Básica	29
6	Com	aputação estatística	31
	6.1	1)	31
	6.2		33
	6.3		33
	6.4		34
	6.5	Compartilhamento	36
7	Med	idas e instrumentos	39
	7.1		39
	7.2	Medidas	39
	7.3		42
	7.4		43
	7.5		43
	7.6	Viés e variabilidade	44
8	Dade	os, metadados e <i>big data</i>	45
	8.1		45
	8.2		45
	8.3		47
	8.4		48
	8.5	Metadados	48
9	Tahı	ılação de dados	51
,	9.1	· ·	51 51
			-
10			55
			55
		,	56
			57 58
		, ,	50 59
	10.5	Tutoles	5)
11		1 I	61
			61
			63
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	64
	11.4	Valores discrepantes	66
12	Aná	lise inicial de dados	67
			67
13			69
	13.1	Análise exploratória de dados	69
14	Anál	lise descritiva	73
17			73 73
			74
			75
	14.4	Tabela 2	75
	14 5	Gráficos	76

SUMÁRIO

15	Análise inferencial	79
13	15.1 Raciocínio inferencial	79
	15.2 Hipóteses científicas	79
	15.3 Testes de hipóteses	80
	15.4 Poder do teste	81
	15.5 Interpretação de análise inferencial	
	15.6 Erros de inferência	85
16	Tamanho do efeito e P-valor	87
10	16.1 Tamanho do efeito	87
	16.2 Efeito fixo	88
	16.3 Efeito aleatório	88
		88
	16.4 Efeito principal	
	16.5 Efeito de modificação	88
	16.6 Efeito de interação	88
	16.7 Efeito de mediação	90
	16.8 Efeitos brutos e padronizados	91
	16.9 P-valor	91
		—
Pa	rte 3 - Estatística Aplicada	93
1 u	ne 5 - Estatsuca / Ipacada	75
17	Seleção de testes	95
	17.1 Multiverso de análises estatísticas	95
	17.2 Escolha de testes para análise inferencial	95
18	Testes estatísticos	97
	18.1 Scripts compartilhados	97
	18.2 Testes de Qui-quadrado (χ^2)	98
	18.3 Teste exato de Fisher	100
19	Plano de análise	103
	19.1 Plano de análise estatística	103
20	3	105
	20.1 Análise de descrição	
	20.2 Estimação	105
21	F.:	107
	21.1 Análise inferencial de comparação	107
22	Correlação	109
	22.1 Análise inferencial de correlação	
	22.2 Coeficientes de correlação	
	22.2 Coefficientes de conferação	111
23	Redes	115
_	23.1 Análise de redes	_
24	~···································	117
	24.1 Análise inferencial de associação	117
	24.2 Associação bivariada	
	24.3 Associação multivariada	118
25		119
	25.1 Modelos estatísticos	
	25.2 Predição via modelagem	
	25.3 Suposições dos modelos	
	25.4 Avaliação de modelos	120

vi SUMÁRIO

26	6 Regressão		121
	26.1 Análise de regressão		121
	26.2 Preparação de variáveis para regressão		
	26.3 Redução de dimensionalidade para regressão		
	20.5 Redução de difficissofiandade para regressão		122
27	Árvore de decisão		125
41	27.1 Árvore de decisão		
	27.1 Alvoie de decisão		123
20	A di do /i		127
28	Aprendizagem de máquina		
	28.1 Aprendizagem de máquina		
	28.2 Aprendizagem supervisionada		
	28.3 Aprendizagem não-supervisionada	. \.	127
	28.4 Aprendizagem por reforço		127
	28.5 Aprendizagem profunda		128
Pa	arte 4 - Metodologia da Pesquisa Aplicada		129
29	Delineamento de estudos		131
	29.1 Critérios de delineamento		131
	29.2 Alocação		131
	20.2 Cagamento	•	131
	29.2 Alocação		121
	29.4 Pareamento	•	131
	29.5 Aleatorização		132
	29.6 Taxonomia de estudos		132
20			105
30	Tamanho da amostra		135
	30.1 Tamanho da amostra		135
	30.2 Cálculo do tamanho da amostra		
	30.3 Perdas de amostra		137
	30.4 Ajustes no tamanho da amostra		138
	30.5 Justificativa do tamanho da amostra		
31	Simulação computacional		139
	31.1 Características		139
	31.2 Método de Monte Carlo		
	31.3 Diretrizes para redação		
	51.5 Directizes para redação		140
32	2. Propriedades psicométricas		141
<i>32</i>	32.1 Características		
	32.2 Análise fatorial exploratória		
	32.3 Análise fatorial confirmatória		
	32.4 Validade de conteúdo		
	32.5 Validade de face		142
	32.6 Validade do construto		142
	32.7 Validade fatorial		143
	32.8 Validade convergente		143
	32.9 Validade discriminante		
	32.10 Validade de critério		
	32.11 Validade concorrente		
	32.12Responsividade		
	32.13Concordância		
	32.14Confiabilidade		
	32.15Diretrizes para redação		146
_			
33	Desempenho diagnóstico		147
	33.1 Características		
	33.2 Tabelas 2x2		147
	33.3 Gráficos crosshair		149

SUMÁRIO	vii
---------	-----

	33.4	Curvas ROC	19
	33.5	Interpretação da validade de um teste	50
	33.6	Diretrizes para redação	50
24	Trades d	las abasmasiansis	71
34		los observacionais 15	
		Características	
	34.2	Diretrizes para redação) 1
35	Ensai	ios quase-experimentais	53
	35.1	Características	53
	35.2	Diretrizes para redação	53
•	.		
36		ios experimentais	
		Ensaio clínico aleatorizado	
	36.2	Modelos de análise de comparação 15 Comparação na linha de base 15)6
	30.3 26.4) O
	30.4 26.5	Comparação intragrupos) /
		Comparação de subgrupos	
		Ajuste de covariáveis	
	36.9	Imputação de dados perdidos	, , 59
		Diretrizes para redação	
		1 ,	
37	Meta-	-análise 10 Características 16	51
		Interpretação de efeitos em meta-análise	
	37.3	Diretrizes para redação)2
38	Reda	ção de resultados	53
	38.1	Resultados da análise estatística	53
		Diretrizes e Listas	
Bil	bliogra	ofia 10	5 5
Fo		aternas 10	
		ican Heart Association	
		ican Physiological Society	
		ican Statistical Association	
		h Medicine Journal	
		al of the American Medical Association	
		e Publishing Group	
		Statistical Society	
	-	tics in Medicine	
		Trials	
		ournal of Applied Statistics in the Pharmaceutical Industry	
	1110 0		. J
Re	ferênc	ias 10	59

viii SUMÁRIO



Lista de Figuras

1.1	Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as
	faces de um dado
1.2	Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado
1.3	Espaço de eventos: União dos eventos face = 3 e face = 4 de um dado
1.4	Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3
1	lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior)
1.5	Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.
1.6	Esquerda: Histogramas de lançament de 1 dado com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com
1.7	reposição e igual probabilidade
1.0	Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade
1.8	Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1)
3.1	Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico
4.1	Paradoxo de Simpson representado com dados simulados. Os pontos no gráfico representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação
6.1	Interface do RStudio. Fonte: https://docs.posit.co/ide/user/
7.1 7.2	Acurácia e precisão como propriedades de uma medida
11.1	Distribuições e funções de probabilidade
16.1	Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação
16.2	Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de
	efeito de interação
	Exemplo de diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y
26.1	Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável
33.1	Árvore de frequência do desempenho diagnóstico de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico) 148


x LISTA DE FIGURAS



Lista de Tabelas

/.1	Tabela de dados brutos com medidas unicas.	40
7.2	Tabela de dados brutos com medidas repetidas.	40
7.3	Tabela de dados brutos com medidas repetidas agregadas	41
7.4	Tabela de dados brutos com medidas seriadas não agregadas	41
7.5	Tabela de dados brutos com medidas seriadas não agregadas	42
7.6	Tabela de dados brutos com medidas múltiplas.	42
9.1	Estrutura básica de uma tabela de dados.	52
9.2	Formatação recomendada para tabela de dados	52
9.3	Formatação não recomendada para tabela de dados	53
	Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística	
15.2	Tabela de erro tipo S de inferência estatística	85
15.3	Tabela de erro tipo M de inferência estatística.	85
18.1	Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)	99
18.2	Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)	100
18.3	Teste exato de Fisher	101
	Quarteto de Anscombe	111
	parâmetros quase idênticos.	111
	Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos	
32.2	Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas	144
32.3	Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas	145
	Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnós-	147
	tico de testes e variáveis dicotômicas.	149

Ferreira, Arthur de Sá. **Ciência com R: Perguntas e respostas para pesquisadores e analistas de dados**. Rio de Janeiro: 1a edição, 2023. 201p. doi: 10.5281/zenodo.8320232.



Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou usada de qualquer maneira sem a permissão prévia por escrito do proprietário dos direitos autorais, exceto para o uso de breves citações em uma resenha do livro.

Para solicitar permissões, entre em contato com cienciacomr@gmail.com

Capa dura: ISBN Brochura: ISBN E-book: ISBN

Sobre o autor



Arthur de Sá Ferreira

Obtive minha Graduação em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 1999), Formação em Acupuntura pela Academia Brasileira de Arte e Ciência Oriental (ABACO, 2001), Mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2002) e Doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 2006).

Tenho experiência em docência no ensino superior, atuando com professor da graduação em cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia, entre outros (2001-atual); pós-graduação *lato sensu* em Fisioterapia (2001-atual) e *stricto sensu* níveis mestrado e doutorado (2010-atual).

Como pesquisador, sou Professor Adjunto do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), atuando nos Programas de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2009-atual) e Desenvolvimento Local (PPGDL; 2018-atual). Também sou pesquisador do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR; 2024-atual). Fundei o Laboratório de Simulação Computacional e Modelagem em Reabilitação (LSCMR) em 2012, onde desenvolvo projetos de pesquisa principalmente nos seguintes temas: Bioestatística, Modelagem e simulação computacional, Processamento de sinais biomédicos, Movimento funcional humano, Medicina tradicional (chinesa), Distúrbios musculoesqueléticos, Doenças cardiovasculares e Doenças respiratórias.

Como gestor, estou na Coordenação do Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Ciências da Reabilitação (PPGCR; 2016-atual). Atuei como coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM; 2020-2024) e como Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO; 2004-2009).

Sou membro efetivo da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia (ABRAPG-FT) (2007-atual), Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) (2019-atual), Committee on Publication Ethics (COPE) (2018-atual) e Royal Statistical Society (RSS) (2021-atual).

Componho o corpo editorial e de revisores de periódicos nacionais e internacionais como Scientific Reports, Frontiers in Rehabilitation Sciences, The Journal of Clinical Hypertension, Chinese Journal of Integrative Medicine, Journal of Integrative Medicine, Brazilian Journal of Physical Therapy, Fisioterapia e Pesquisa.

Currículos externos

5432142731317894

0000-0001-7014-2002

F-6831-2012



Dedicatória

Esta obra é dedicada a todos que, em princípio, buscam conhecimento para melhorar a qualidade da pesquisa científica - seja a sua própria, a de colegas ou a de desconhecidos - mas, em última análise, desejam mesmo prover melhores condições de saúde e desenvolvimento da sociedade.

Dedico também ao leitor eventual que chegou aqui por acaso.



Agradecimentos

Este trabalho não seria possível sem o apoio e suporte da minha esposa Daniele, minha irmã Mônica, meu pai José Victorino, minha mãe Angela (*in memoriam*) e meus filhos Giovanna, Victor e Lucas.



Prefácio

No âmbito da análise estatística de dados, os processos envolvidos são marcados por uma série de escolhas críticas. Estas decisões abrangem considerações metodológicas e ações operacionais que moldam toda a jornada analítica. Deve-se selecionar, cuidadosamente, um delineamento de estudo para enfrentar os desafios únicos colocados por um projeto de pesquisa. Além disso, a escolha de métodos estatísticos adequados para lidar com os dados gerados pelo delineamento escolhido tem um peso importante. Estas decisões necessitam de uma base construída sobre as evidências mais convincentes da literatura existente e na adesão a práticas sólidas de investigação.

Interpretar os resultados destas análises não é uma tarefa simples. Confiar apenas na formação educacional convencional, no bom senso e na intuição para decifrar tabelas e gráficos pode revelar-se inadequado. Interpretações errôneas podem gerar consequências indesejáveis, incluindo a utilização de testes diagnósticos imprecisos ou o endosso de tratamentos ineficazes.

Este livro emerge do reconhecimento desses desafios.

A proposta gira em torno da organização de um compêndio abrangente de métodos e técnicas de ponta, para análise estatística de dados em pesquisa científica, apresentados em formato de perguntas e respostas. Esse formato promove um diálogo direto e objetivo com o leitor, respondendo a dúvidas comumente colocadas por alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, bem como por pesquisadores.

O objetivo geral de cada capítulo é elucidar as questões metodológicas fundamentais: "O que é?", "Por que usar?", "Quando usar?", "Quando não usar?" e "Como fazer?". Em cada capítulo, diversas questões específicas são propostas e respondidas sistematicamente, permitindo ao leitor uma melhor elaboração do conteúdo e resultado do seu trabalho.

Os capítulos foram organizados para seguir uma progressão de conceitos e aplicações. Embora sejam fragmentados para maior clareza instrucional, as referências cruzadas ajudam a mitigar a fragmentação do conteúdo e reforçar a interconexão dos tópicos.

O público-alvo compreende pesquisadores, professores, analistas de dados, profissionais e estudantes que regularmente lidam com a tomada de decisões em pesquisa. Os estudantes de pós-graduação encontrarão aqui uma obra repleta de exemplos para adaptar na análise dos dados de seus projetos de pesquisa. Professores de graduação e pós-graduação terão acesso a uma obra didática de referência, direcionada para seus alunos. Pesquisadores e analistas de dados iniciantes descobrirão um valioso acervo de informações e referências para a construção de projetos e manuscritos. Pesquisadores e os cientistas mais experientes podem recorrer às referências e esclarecimentos mais atuais sobre vieses, paradoxos, mitos e mal práticas em pesquisa. E mesmo os leitores não familiarizados ainda com as técnicas de análise de dados em pesquisa terão a oportunidade de apreciar o papel fundamental de colocar e responder suas perguntas na busca do conhecimento científico.

Arthur de Sá Ferreira



Parte 1 - Fundamentos



Capítulo 1

Pensamento probabilístico

1.1 Experimento

1.1.1 O que é um experimento?

- Um experimento é um processo de simulação ou medição cujo resultado é chamado de desfecho. 1
- Tentativa se refere a uma repetição de um experimento aleatório.¹
- Em um experimento aleatório, o desfecho de cada tentativa é imprevisível. 1

1.2 Espaço amostral e eventos discretos

1.2.1 O que é espaço amostral discreto?

- O espaço amostral S de um experimento aleatório é definido como o conjunto de todos os desfechos possíveis de um experimento. 1
- Em probabilidade discreta, o espaço amostral S pode ser enumerado e contato. 1

1.2.2 O que é evento discreto?

- Um evento E é um único desfecho ou uma coleção de desfechos.¹
- Um evento E é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento. 1

1.2.3 O que é espaço de eventos discretos?

- Um espaço de eventos \boldsymbol{E}_s também é um subconjunto do espaço amostral S de um experimento. 1
- A união de dois eventos $E_1 \cup E_2$ é o conjunto de todos os desfechos que estão em ambos. 1
- A intersecção de dois eventos $E_1 \cap E_2$, ou evento conjunto, é o conjunto de todos os desfechos que estão em ambos os eventos 1
- O complemento de um evento E^C consiste em todos os desfechos que não estão incluídos no evento E^{1}




Figura 1.1: Exemplos de espaço amostral discreto. Superior: Todas as faces de uma moeda. Inferior: Todas as faces de um dado.




Figura 1.2: Exemplos de evento de experimento. Superior: 1 lançamento de 1 moeda. Inferior: 1 lançamento de 1 dado.





Figura 1.3: Espaço de eventos: União dos eventos face = 3 e face = 4 de um dado.

1.3 Espaço amostral e eventos contínuos

1.3.1 O que é espaço amostral contínuo?

• .[REF]

1.3.2 O que é evento contínuo?

• .[REF]

1.3.3 O que é espaço de eventos contínuo?

• .[REF]

1.4 Probabilidade

1.4.1 O que é probabilidade?

- Com um espaço amostral S finito e não vazio de desfechos igualmente prováveis, a probabilidade P de um evento E é a razão entre o número de desfechos no evento E e o número de desfechos no espaço amostral S.
- Um evento E impossível não contém um desfecho e, portanto, nunca ocorre: $P(E)=0.^{1,2}$
- Um evento E é certo consiste em qualquer um dos desfechos possíveis e, portanto, sempre ocorre: $P(E)=1.^1$

1.4.2 Quais são os axiomas da probabilidade?

- A probabilidade de um evento é um número real que satisfaz os seguintes axiomas descritos por Andrei Nikolaevich Kolmogorov em 1950:^{1,2}
 - Axioma I. Probabilidades de um evento E são números não-negativos: $P(E) \ge 0$.
 - Axioma II. Probabilidade de todos os eventos do espaço amostral A ocorrerem é 100%: P(S) = 1.
 - Axioma III. A probabilidade de um conjunto k de eventos mutuamente exclusivos é igual a soma da probabilidade de cada evento: $P(E_1 \cup E_2 \cup ... E_k) = P(E_1) + P(E_2) + ... + P(E_k)$.
- Os axiomas possuem as seguintes consequências: 1
 - A soma da probabilidade de dois eventos que dividem o espaço amostral é 100%: $P(E)+P(E)^C=1$.
 - O valor máximo de probabilidade de um evento é 100%: $P(S) \leq 1$.
 - A probabilidade é uma função não decrescente do número de desfechos de um evento.

1.5 Independência e probabilidade

1.5.1 O que é independência em estatística?

- Em experimentos aleatórios, é comum assumir que os eventos de tentativas separadas são independentes devido a independência física de eventos e experimentos.¹
- Se a ocorrência do evento E_1 não tiver efeito na ocorrência do evento E_2 , os eventos E_1 e E_2 são considerados estatisticamente independentes.
- Eventos são mutuamente exclusivos, ou disjuntos, se a ocorrência de um exclui a ocorrência dos outros. 1
- Se dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos, então os eventos E_1 e E_2 não podem ocorrer ao mesmo tempo e, portanto, são eventos dependentes.
- Em experimentos independentes, o desfecho de uma tentativa é independente dos desfechos de outras tentativas, passadas e/ou futuras. Uma tentativa em um experimento aleatório é independente se a probabilidade de cada desfecho possível não mudar de tentativa para tentativa.¹

1.5.2 O que é probabilidade marginal?

• Probabilidade marginal é a probabilidade de ocorrência de um evento E independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).

1.5.3 O que é probabilidade conjunta?

- Probabilidade conjunta é a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos independentes $E_1, E_2, ..., E_k$, independentemente da(s) probabilidade(s) de outro(s) evento(s).
- Se a probabilidade conjunta dos eventos é nula ($E_1 \cup E_2 = 0$), esses dois eventos E_1 e E_2 são mutuamente exclusivos ou disjuntos.¹

1.5.4 O que é probabilidade condicional?

- Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrência do evento E_2 quando se sabe que o evento E_1 já ocorreu $P(E_2|E_1)$.
- A probabilidade condicional $P(E_2|E_1)$ representa que a ocorrência do evento E_1 fornece informação sobre a ocorrência do evento E_2 .
- Se a ocorrência do evento E_1 tiver alguma influência na ocorrência do evento E_2 , então a probabilidade condicional do evento E_2 dado o evento E_1 pode ser maior ou menor do que a probabilidade marginal. ¹



Figura 1.4: Esquerda: Evento (face = 4). Direita: Experimentos de 1 lançamento de 1 dado (superior), 3 lançamentos de 1 dado (central), 10 lançamentos de 1 dado (inferior).

1.6 Leis dos números anômalos

1.6.1 O que é a lei dos números anômalos?

• A lei dos números anômalos - lei de Benford - é uma distribuição de probabilidade que descreve a frequência de ocorrência do primeiro dígito em muitos conjuntos de dados do mundo real.[REF]

1.7 Leis dos pequenos números

1.7.1 O que é a lei dos pequenos números?

- A crença exagerada na probabilidade de replicar com sucesso os achados de um estudo, pela tendência de se considerar uma amostra como representativa da população.³
- A crença na lei dos pequenos números se refere à tendência de superestimar a estabilidade das estimativas provenientes de estudos com amostras pequenas.⁴
- Quando se percebe um padrão, pode não ser possível identificar se tal padrão é real.⁵

1.7.2 Quais são as versões da lei dos pequenos números?

- 1a Lei Forte dos Pequenos Números: "Não há pequenos números suficientes para atender às muitas demandas que lhes são feitas".⁵
- 2a Lei Forte dos Pequenos Números: "Quando dois números parecem iguais, não são necessariamente assim".⁶

1.8 Leis dos grandes números

1.8.1 O que é a lei dos grandes números?

- A lei dos grandes números descreve que, ao realizar o mesmo experimento E um grande número de vezes (n), a média μ dos resultados obtidos tende a se aproximar do valor esperado $E[\bar{X}]$ à medida que mais experimentos forem realizados $(n \to \infty)$.[REF]
- De acordo com a lei dos grandes números, a média amostral converge para a média populacional à medida que o tamanho da amostra aumenta.[REF]

1.8.2 Quais são as versões da lei dos grandes números?

- Lei Fraca dos Grandes Números (de Poisson): "".[REF]
- Lei Fraca dos Grandes Números (de Bernoulli): "".[REF]
- Lei Forte dos Grandes Números: "".[REF]

1.9 Teorema central do limite

1.9.1 O que é teorema central do limite?

• O teorema central do limite - equação (1.1) - afirma que, para uma amostra aleatória de tamanho n de uma população com valor esperado igual à média $E[\bar{X}_i] = \mu$ e variância $Var[\bar{X}_i]$ igual a σ^2 , a distribuição amostral da média de uma variável \bar{X} se aproxima de uma distribuição normal N com média μ e variância σ^2/n à medida que n aumenta $(n \to \infty)$:

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{n \to \infty} N(0, \sigma^2) \tag{1.1}$$

- O teorema central do limite demonstra que se o tamanho da amostra n for suficientemente grande, a distribuição amostral das médias obtidas utilizando reamostragem com substituição será aproximadamente normal, com média μ e variância σ^2/n , independentemente da distribuição da população.⁷
- No exemplo abaixo, uma variável aleatória numérica com distribuição uniforme no espaço amostral S=[18;65] tem média $\mu=38.53$ e variância $\sigma^2=172.433$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu=38.493$ e variância $\sigma^2=0.038$, independentemente da distribuição da população:
- Em outro exemplo, o lançamento de um dado com distribuição uniforme no espaço amostral $S=\{1,2,3,4,5,6\}$ tem média $\mu=3.77$ e variância $\sigma^2=3.169$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu=3.767$ e variância $\sigma^2=0.001$, independentemente da distribuição da população:
- Mais um exemplo, o lançamento de uma moeda com distribuição uniforme no espaço amostral $S=\{0,1\}$ codificado para sucesso=1 e insucesso=0 tem média $\mu=0.5$ e variância $\sigma^2=0.253$. A distribuição amostral da média de 100 amostras de tamanho 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade se aproxima de uma distribuição normal com média $\mu=0.5$ e variância $\sigma^2=0$, independentemente da distribuição da população:



Figura 1.5: Esquerda: Histogramas de uma variável aleatória com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.



Figura 1.6: Esquerda: Histogramas de lançament de 1 dado com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.




Figura 1.7: Esquerda: Histogramas de lançament de 1 moeda com distribuição uniforme (N = 100). Direita: Histogramas da média de 100 amostras de tamanhos 5, 50, 500 e 5000 tomadas da população com reposição e igual probabilidade.

1.9.2 Quais as condições de validade do teorema central do limite?

- As condições de validade do teorema central do limite são:⁷
 - As variáveis aleatórias devem ser independentes e identicamente distribuídas (independent and identically distributed ou i.i.d.);
 - As variáveis aleatórias devem ter média μ e variância σ^2 finitas;
 - O tamanho da amostra deve ser suficientemente grande (geralmente, $n \geq 30$).

1.9.3 Qual a relação entre a lei dos grandes números e o teorema central do limite?

• A lei dos grandes números é um precursor do teorema central do limite, pois estabelece que a média da amostra se torna cada vez mais próxima da média populacional (isto é, mais representativa) à medida que o tamanho da amostra aumenta, e o teorema central do limite demonstra que o a distribuição da soma das variáveis aleatórias se aproxima de uma distribuição normal também à medida que o tamanho da amostra aumenta.[REF]

1.9.4 Qual a relevância do teorema central do limite para a análise estatística?

- O teorema central do limite explica porque os testes paramétricos têm maior poder estatístico do que os testes não paramétricos, os quais não requerem suposições de distribuição de probabilidade.⁷
- O teorema central do limite implica que os métodos estatísticos que se aplicam a distibuições normais podem ser aplicados a outras distribuições quando suas suposições são satisfeitas.⁷
- Como o teorema central do limite determina a distribuição amostral Z equação (1.2) das médias com tamanho amostral suficientemente grande, a média pode ser padronizada para uma distribuição normal com média 0 e variância 1, N(0,1):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \tag{1.2}$$

• Para amostras com $n \ge 30$, a distribuição amostral Student-t se aproxima da distribuição normal padrão Z e, portanto, as suposições sobre a distribuição populacional não são mais necessárias de acordo com o teorema central do limite. Neste cenário, a suposição de distribuição normal pode ser usada para a distribuição de probabilidade.

1.10 Regressão para a média

1.10.1 O que é regressão para a média?

- Regressão para a média 8 é um fenômeno estatístico que ocorre quando uma variável aleatória X é medida na mesma unidade de análise em dois ou mais momentos diferentes, $X_1, X_2, ..., X_t$ e X_t é mais próximo da média populacional do que X_1 , ou seja, $E(X_t)$ é mais próxima de E(X) do que $E(X_1)$ é de E(X).
- O valor real sem erros aleatório ou sistemático em geral não é conhecido, mas pode ser estimado pela média de várias observações.⁹
- Regressão para a média pode ocorrer em qualquer pesquisa cujo delineamento envolva medidas repetidas.
- Em medidas repetidas, a média de várias observações é mais próxima da média verdadeira do que qualquer observação individual, pois o erro aleatório é reduzido pela média.
- Valores extremos em direção ao mínimo ou máximo em uma medição inicial tendem a ser seguidos por valores mais próximos da média (valor real) na medição subsequente.⁹
- No exemplo abaixo, a 2a medida (dado 2 = 121) é mais próxima da média (valor real = 120) do que a 1a medida (dado 1 = 118):




Figura 1.8: Representação gráfica da regressão para a média em medidas repetidas. A segunda medida (dado 2) é mais próxima da média (valor real) do que a primeira medida (dado 1).

1.10.2 Qual a causa da regressão para a média?

- A regressão para a média pode ser atribuída ao erro aleatório, que é a variação não sistemática nos valores observados em torno de uma média verdadeira (por exemplo, erro de medição aleatório ou variações aleatórias em um participante).
- Regrssão para a média é uma consequência da observação de que dados extremos não se repetem com frequência.¹⁰
- Deve-se assumir que a regressão para a média ocorreu até que os dados mostrem o contrário.

1.10.3 Por que detectar o fenômeno de regressão para a média?

 A regressão para a média pode levar a conclusões errôneas sobre a eficácia de uma intervenção, pois a mudança observada pode ser devida ao erro aleatório e não ao tratamento.¹⁰

1.10.4 Com detectar o fenômeno de regressão para a média?

 O fenômeno de regressão para a média pode ser detectado por meio de gráfico de dispersão da diferença (estudos transversais) ou mudança (estudos longitudinais) versus os valores da 1a medida.⁹



O pacote $regtomean^{11}$ fornece as funções $cordata^a$ para calcular a correlação entre medidas tipo antes—e-depois e $meechua \ reg^b$ para ajustar modelos lineares de regressão.


^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/regtomean/versions/1.1/topics/cordata

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/regtomean/versions/1.1/topics/meechua_reg

1.10.5 Como o fenômeno de regressão para a média pode ser evitado?

 Aloque os participantes de modo aleatório nos grupos de tratamento e controle pode reduzir o fenômeno de regressão para a média.⁹

• Selecine participantes com base em medidas repetidas ao invés de medidas únicas.⁹



Capítulo 2

Pensamento estatístico

2.1 População

2.1.1 O que é população?

- População ou população-alvo refere-se ao conjunto completo sobre o qual se pretende obter informações.
- População é metodologicamente delimitada pelos critérios de inclusão e exclusão do estudo.
- Em estudos observacionais, inicialmente as características geográficas e/ou demográficas, por exemplo, definem a população a ser estudada. 12
- Em estudos analíticos, a população é inicialmente definida pelos objetivos da pesquisa e, posteriormente, as observações são realizadas na amostra. 12

2.2 Amostra

2.2.1 O que é amostra?

- Amostra é uma parte finita da população do estudo.¹²
- Em pesquisa científica, utilizam-se dados de uma amostra de participantes (ou outras unidades de análise) para realizar inferências sobre a população. 13

2.2.2 Por que usar dados de amostras?

- Dados de uma amostra de tamanho suficiente e características representativas podem ser utilizados para inferência sobre uma população.⁷
- Em geral, amostras de tamanhos maiores possuem médias mais próximas da média populacional e menores variâncias.⁷

2.3 Unidade de análise

2.3.1 O que é unidade de análise?

- A unidade de análise (ou unidade experimental) de pesquisas na área de saúde geralmente é o indivíduo. 14
- A unidade de análise também pode ser a instituição em estudos multicêntricos (ex.: hospitais, clínicas) ou um estudo publicado em meta-análise (ex.: ensaios clínicos).¹⁴

2.3.2 Por que identificar a unidade de análise de um estudo?

• É fundamental identificar corretamente a unidade de análise para evitar inflação do tamanho da amostra (ex.: medidas bilaterais resultando em o dobro de participantes), violações de suposições dos testes de hipótese (ex.: independência entre medidas e/ou unidade de análise) e resultados espúrios em testes de hipótese (ex.: P-valores menores que aqueles observados se a amostra não estivesse inflada). 14,15

2.3.3 Que medidas podem ser obtidas da unidade de análise de um estudo?

• Da unidade de análise podem ser coletadas informações em medidas únicas, repetidas, seriadas ou múltiplas.

2.4 Amostragem

2.4.1 O que é amostragem?

• .[REF]

2.4.2 Quais métodos de amostragem são usados para obter uma amostra da população?

- O método de amostragem é geralmente definido pelas condições de viabilidade do estudo, no que diz respeito a acesso aos participantes, ao tempo de execução e aos custos envolvidos, entre outras.¹²
- Não-probabilísticas ou intencionais: 12
 - Bola de neve.
 - Conveniência.
 - Participantes encaminhados
- Probabilísticas:12
 - Simples.
 - Sistemática.
 - Multiestágio.
 - Estratificada.
 - Agregada.

2.4.3 O que é erro de amostragem?

• .[REF]

2.5 Reamostragem

2.5.1 O que é reamostragem?

- Reamostragem é um procedimento que cria vários conjuntos de dados sorteados a partir de um conjunto de dados real - a amostra da população - sem a necessidade de fazer suposições sobre os dados e suas distribuições.¹³
- O procedimento é repetido várias vezes para usar a variabilidade dos resultados para obter um intervalo de confiança do parâmetro.¹³

2.5.2 Por que utilizar reamostragem?

- Quando se dispõe de dados de apenas 1 amostra, as diversas suposições que são feitas podem não ser atingidas.¹³
- Procedimentos de reamostragem produzem um conjunto de observações escolhidas aleatoriamente da amostra, igualmente representativo da população original.¹³
- Procedimentos de reamostragem permitem estimar o erro-padrão e intervalos de confiança sem a necessidade de tais suposições, sendo, portanto, um conjunto de procedimentos não-paramétricos. ¹³

2.5.3 Quais procedimentos de reamostragem podem ser realizados?

Bootstrap: Cada iteração gera uma amostra bootstrap do mesmo tamanho do conjunto de dados original
escolhendo aleatoriamente observações reais, uma de cada vez. Cada observação tem chances iguais de ser
escolhida a cada vez, portanto, algumas observações serão escolhidas mais de uma vez e outras nem serão
escolhidas.¹³

2.6 Subamostragem e superamostragem

2.6.1 O que é subamostragem?

• .[REF]

2.6.2 O que é superamostragem?

• .[REF]



Pensamento metodológico

3.1 Metodologia da pesquisa

3.1.1 O que é metodologia da pesquisa?

 A utilização de um vocabulário próprio — incluindo termos frequentemente usados em metodologia, epidemiologia e estatística — facilita a discussão na comunidade científica e melhora a compreensão das publicações.^{16,17}

3.2 Relação Estatística-Metodologia

3.2.1 Qual a relação entre estatística e metodologia da pesquisa?

• .18

3.3 Reprodutibilidade

3.3.1 O que é reprodutibilidade?

• Reprodutibilidade é a habilidade de se obter resultados iguais ou similares quando uma análise ou teste estatístico é repetido. 19–21

3.3.2 Por que reprodutibilidade é importante?

- Analisar a reprodutibilidade pode fornecer evidências a respeito da objetividade e confiabilidade dos achados, em detrimento de terem sido obtidos devido a vieses ou ao acaso.¹⁹
- A reprodutibilidade não é apenas uma questão metodológica, mas também ética, uma vez que pode envolver mal práticas científicas como fabricação e/ou falsificação de dados.¹⁹
- Reprodutibilidade pode ser considerada um padrão mínimo em pesquisa científica.²⁰

3.4 Robustez

3.4.1 O que é robustez?

• .[REF]




Figura 3.1: Mapa mental da relação entre o pensamento estatístico e o pensamento metodológico.

3.5. REPLICABILIDADE 21

3.5 Replicabilidade

3.5.1 O que é replicabilidade?

• Replicabilidade é a habilidade de se obter conclusões iguais ou similares quando um experimento é repetido. ^{20,21}

3.6 Generalização

3.6.1 O que é generalização?

 $\bullet \ \ Generalização \ refere-se\ \grave{a}\ extrapolação\ das\ conclusões\ do\ estudo, observados\ na\ amostra,\ para\ a\ população.^{12}$





Paradoxos e falácias

- 4.1 Paradoxos estatísticos
- 4.1.1 O que são paradoxos estatísticos?
 - Paradoxos podem originar da incompreensão ou mal informação da nossa intuição a respeito do fenômeno.²²
- 4.1.2 O que é o paradoxo de Abelson?

• .23

4.1.3 O que é o paradoxo de Berkson?

• .24

- 4.1.4 O que é o paradoxo de Big Data?
 - "Quanto maior a quantidade de dados, maior a certeza de que vamos nos enganar". 22
- 4.1.5 O que é o paradoxo de Ellsberg?

• .25

4.1.6 O que é o paradoxo de Freedman?

• .26,27

4.1.7 O que é o paradoxo de Hand?

• .28

4.1.8 O que é o paradoxo de Lindley?

• .29

4.1.9 O que é o paradoxo de Lord?

• .30,31


4.1.10 O que é o paradoxo de Proebsting?


• .[REF]

4.1.11 O que é o paradoxo de Simpson?

- O paradoxo de Simpson ocorre quando a associação entre duas variáveis X e Y desaparece ou mesmo reverte sua direção quando condicionadas em uma terceira variável Z. 32,33
- Para decisão do paradoxo de Simpson pode-se utilizar o conceito de 'back-door', o qual considera os 'caminhos' (isto é, associações) no gráfico acíclio direcionado e assegura que todos as associações espúrias do tratamento X para o desfecho Y nesse diagrama causal sejam interceptados pela variável Z.³⁴
- Dependendo do contexto em que os dados foram obtidos delineamento do estudo, escolha dos instrumentos e dos tipos de variáveis a melhor escolha para a análise pode variar entre a análise da população agregada ou da subpopulação desagregada.³⁴
- É possivel que em alguns contextos nem a análise agregada ou a desagregada podem oferecer a resposta correta, sendo necessário o uso de outras (mais) covariáveis.³⁴

População desagregada





Subpopulação agregada Z=0

-2 0 2

Subpopulação agregada Z=




Figura 4.1: Paradoxo de Simpson representado com dados simulados. Os pontos no gráfico representam observações individuais e as linhas de tendência representam as regressões lineares ajustadas para os dados desagregados da população e agregados por subpopulação.

4.1.12 O que é o paradoxo de Stein? • .35 4.1.13 O que é o paradoxo de Okie? • .[REF] 4.1.14 O que é o paradoxo da acurácia? • .[REF] 4.1.15 O que é o paradoxo do falso positivo? • .[REF] 4.1.16 O que é o paradoxo da caixa de Bertrand? • .[REF] 4.1.17 O que é o paradoxo do elevador? • .36 4.1.18 O que é o paradoxo da amizade? • .37 4.1.19 O que é o paradoxo do menino ou menina? 4.1.20 O que é o paradoxo do teste surpresa? • .[REF] 4.1.21 O que é o paradoxo do nó da gravata? • .[REF]

4.1.22 O que é o paradoxo da Bela Adormecida?• .[REF]

4.2 Falácias estatísticas

4.2.1 O que são falácias estatísticas?

- Falácias estatísticas são erros de raciocínio que ocorrem em situações que envolvem dados e estatísticas. Elas podem ocorrer em qualquer etapa do processo de análise de dados, desde a coleta até a interpretação dos resultados. Elas podem ser intencionais ou não intencionais, e podem ser usadas para manipular, enganar ou confundir as pessoas. [REF]
- As falácias estatísticas podem ser difíceis de detectar, pois muitas vezes são sutis e podem parecer plausíveis à primeira vista. No entanto, é importante estar ciente delas e saber como identificá-las para evitar erros de interpretação e tomada de decisão.[REF]

4.2.2 O que é a falácia do jogador?

A falácia do jogador é a crença de que eventos independentes têm uma influência sobre eventos futuros. Por
exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia do jogador sugere que
a próxima jogada será coroa, pois a moeda "deve" se equilibrar. No entanto, cada lançamento da moeda é
independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.³⁸

4.2.3 O que é a falácia da mão quente?

 A falácia da mão quente é a crença de que um jogador que teve sucesso em um jogo de azar terá mais chances de sucesso no futuro. Por exemplo, se uma moeda é lançada várias vezes e cai cara em todas as vezes, a falácia da mão quente sugere que a próxima jogada será cara, pois o jogador está "quente". No entanto, cada lançamento da moeda é independente e não afeta o resultado do próximo lançamento.³⁸

Vieses metodológicos

- 5.1 Vieses metodológicos
- 5.1.1 O que são vieses metodológicos?
 - .[REF]



Parte 2 - Estatística Básica



Computação estatística

6.1 Programas de computador

6.1.1 O que é R?

- R é um programa de computador de código aberto com linguagem computacional direcionada para análise estatística. ^{39,40}
- R version 4.4.0 (2024-04-24) está disponível gratuitamente em Comprehensive R Archive Network (CRAN)¹.

6.1.2 Por que usar R?

• R é o software de maior abrangência de métodos estatísticos, possui sintaxe que permite análises estatísticas reproduzíveis e está disponível gratuitamente no Comprehensive R Archive Network (CRAN)².²¹

6.1.3 O que é RStudio?

- RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado (*integrated development environment*, IDE) desenvolvido visando a reprodutibilidade e a simplicidade para a criação e disseminação de conhecimento. 40,41
- O ambiente do RStudio é dividido em paineis:
 - Source/Script editor: para edição de R scripts. 40
 - Console: para execução de códigos simples, .40
 - Environments: para visualização de objetos criados durante a sessão de trabalho.⁴⁰
 - Output: para visualização de gráficos criados durante a sessão de trabalho. 40
- As principais características do RStudio incluem um ambiente de edição com abas para acesso rápido a arquivos, comandos e resultados; histórico de comandos previamente utilizados; ferramentas para visualização de bancos de dados e elaboração de scripts e gráficos e tabelas. 40,41
- RStudio está disponível gratuitamente em Posit³.



O pacote learnr⁴² fornece tutoriais interativos para RStudio.

¹⁽https://cran.r-project.org)

²(https://cran.r-project.org)

³https://posit.co/download/rstudio-desktop/



Figura 6.1: Interface do RStudio. Fonte: https://docs.posit.co/ide/user/

6.1.4 Que programas de computador podem ser usados para análise estatística com R?

- JASP⁴.⁴³
- jamovi⁵.⁴⁴
- BlueSky⁶.



Os pacotes jmv^{45} e $jmvconnect^{46}$ fornecem funções para análise descritiva e inferencial com interface com jamovi.

6.2 Scripts computacionais

6.2.1 O que são R scripts?

- "Scripts são dados".⁴⁷
- Scripts permitem ao usuário se concentrar nas tarefas mais importantes da computação e utilizar pacotes ou bibliotecas para executar as funções mais básicas com maior eficiência.⁴⁷
- Um script é um arquivo de texto contendo (quase) os mesmos comandos que você digitaria na linha de comando do R. (Quase) refere-se ao fato de que se você estiver usando *sink()* para enviar a saída para um arquivo, você terá que incluir alguns comandos em *print()* para obter a mesma saída da linha de comando (CRAN⁷).

6.3 Pacotes

6.3.1 O que são pacotes?

- Pacotes são conjuntos de scripts programados pela comunidade e compartilhados para uso público.
- Os pacotes ficam armazenados no Comprehensive R Archive Network (CRAN)⁸ e podem ser instalados diretamente no RStudio.⁴⁰
- Na mais recente atualização deste livro, o Comprehensive R Archive Network (CRAN)⁹ possui 358802 pacotes disponíveis.⁴⁰
- Os pacotes disponíveis podem ser encontrados em R PACKAGES DOCUMENTATION¹⁰.



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *install.packages*^a para instalar os pacotes no computador.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/install.packages



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *library*^a para carregar os pacotes instalados no computador.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/library

⁴https://jasp-stats.org

⁵https://www.jamovi.org

⁶https://www.blueskystatistics.com

⁷https://cran.r-project.org/doc/contrib/Lemon-kickstart/kr scrpt.html

⁸(https://cran.r-project.org)

⁹⁽https://cran.r-project.org)

¹⁰https://r-packages.io/packages



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *require*^a para indicar se o pacote requisitado está disponível.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/require



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *installed.packages*^a para listar os pacotes instalados no computador.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/installed.packages



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *update.packages*^a para atualizar os pacotes instalados no computador.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/update.packages

6.3.2 Quais práticas são recomendadas na redação de scripts?

- Use nomes consistentes para as variáveis. 49
- Defina os tipos de variáveis adequadamente no banco de dados.
- Defina constantes isto é, variáveis de valor fixo ao invés de digitar valores. ⁴⁹
- Use e cite os pacotes disponíveis para suas análises. 49
- Controle as versões do script. 49,50
- Teste o script antes de sua utilização. 49
- Conduza revisão por pares do código durante a redação (digitação em dupla). 49



O pacote formatR⁵¹ fornece a função tidy_source^a para formatar um R script.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/formatR/versions/1.14/topics/tidy_source



O pacote styler⁵² fornece a função style_file^a para formatar um R script.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/styler/versions/1.10.1/topics/style file



O pacote $lintr^{53}$ fornece a função $lint^a$ para verificar a adesão de um script a um determinado estilo, identificando erros de sintaxe e possíveis problemas semânticos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/lintr/versions/3.1.0/topics/lint

6.4 Manuscritos reproduzíveis

6.4.1 O que são manuscritos reproduzíveis?

 Manuscritos reproduzíveis - manuscritos executáveis ou relatórios dinâmicos - permitem a produção de um manuscrito completo a partir da integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística (incluindo comentários para sua interpretação), dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas citadas, além dos demais elementos textuais (tabelas, gráficos) - todos gerados dinamicamente.⁴⁷

6.4.2 Por que usar manuscritos reproduzíveis?

- No processo tradicional de redação científica há muitas etapas de copiar e colar não reproduzíveis envolvidas.
 Documentos dinâmicos combinam uma ferramenta de processamento de texto com o R script que produz o texto/tabela/figura a ser incorporado no manuscrito.²¹
- Ao trabalhar com relatórios dinâmicos, é possível extrair o mesmo script usado para análise estatística. Os documentos podem ser compilados em vários formatos de saída e salvos como DOCX, PPTX e PDF.²¹
- Muitos erros de análise poderiam ser evitados com a adoção de boas práticas de programação em manuscritos reproduzíveis.⁵⁴



O pacote *rmarkdown*⁵⁵ fornece as funções *render*^a para criar manuscritos reprodutíveis a partir de arquivos .Rmd.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/rmarkdown/versions/2.24/topics/render



O pacote *officedown*⁵⁶ fornece as funções *rdocx_document*^a e *rpptx_document*^b para criar arquivos DOCX e PPTX, respectivamente, com o conteúdo criado no manuscrito reprodutível.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/officedown/versions/0.3.0/topics/rdocx_document

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/officedown/versions/0.3.0/topics/rpptx document



O pacote bookdown⁵⁷ fornece as funções gitbook^a, pdf_book^b, epub_book^c e html_document2^d para criar documentos reprodutíveis em diversos formatos (Git, PDF, EPUB e HTML, respectivamente).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/gitbook

6.4.3 O que é RMarkdown?

- RMarkdown⁵⁸ é uma ferramenta que permite a integração de texto, código e saída em um único documento. O RMarkdown é uma extensão do Markdown, que é uma linguagem de marcação simples e fácil de aprender, que é usada para formatar texto. O RMarkdown permite a inclusão de blocos de código R, Python, SQL, C++, entre outros, e a saída desses blocos de código é incorporada ao documento final. O RMarkdown é uma ferramenta poderosa para a criação de relatórios dinâmicos, que podem ser facilmente atualizados com novos dados ou análises. O RMarkdown é amplamente utilizado na comunidade científica para a criação de relatórios de pesquisa, artigos científicos, apresentações, livros, entre outros.
- O trabalho com RMarkdown⁵⁸ permite um fluxo de dados totalmente transparente, desde o conjunto de dados coletados até o manuscrito finalizado. Todos os aspectos do fluxo de dados podem ser incorporados em blocos de R script (*chunk*), exibindo tanto o R script quando o respectivo texto, tabelas e figuras formatadas no estilo científico de interesse.⁵⁹
- O RMarkdown⁵⁸ foi projetado especificamente para relatórios dinâmicos onde a análise é realizada em R e oferece uma flexibilidade incrível por meio de uma linguagem de marcação.²¹

6.4.4 Como manuscritos reprodutíveis contribuem para a ciência?

 O compartilhamento de bancos de dados e seus scripts de análise estatística permitem a adoção de práticas reprodutíveis, tais como a reanálise dos dados.⁶⁰

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/pdf_book

^chttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/epub_book

dhttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/html_document2



O pacote *projects*⁶¹ fornece a função *setup_projects*^a para criar um projeto com arquivos organizados em diretórios.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/projects/versions/2.1.3/topics/setup_projects

6.4.5 Como contribuir para a reprodutibilidade?

- Disponibilize publicamente os bancos de dados, respeitando as considerações éticas vigentes (ex.: autorização dos participantes e do Comitê de Ética em Pesquisa) e internacionalmente.²¹
- Produza manuscritos reprodutíveis manuscritos executáveis ou relatórios dinâmicos que permitem a integração do banco de dados da(s) amostra(s), do(s) script(s) de análise estatística (incluindo comentários para sua interpretação), dos pacotes ou bibliotecas utilizados, das fontes e referências bibliográficas citadas, além dos demais elementos textuais (tabelas, gráficos) todos gerados dinamicamente.



O pacote *rmarkdown*⁵⁵ fornece a função *render*^a para criar manuscritos reprodutíveis a partir de arquivos .Rmd.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/rmarkdown/versions/2.24/topics/render



O pacote bookdown⁵⁷ fornece as funções gitbook^a, pdf_book^b, epub_book^c e html_document2^d para criar documentos reprodutíveis em diversos formatos (Git, PDF, EPUB e HTML, respectivamente).

- ^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/gitbook
- ^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/pdf book
- ^chttps://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/epub_book
- ${\it d} https://www.rdocumentation.org/packages/bookdown/versions/0.35/topics/html_document2$

6.5 Compartilhamento

6.5.1 Por que compartilhar scripts?

 Compartilhar o script — principalmente junto aos dados — pode facilitar a replicação direta do estudo, a detecção de eventuais erros de análise, a detecção de pesquisas fraudulentas.⁶²

6.5.2 O que pode ser compartilhado?

- Idealmente, todos os scripts, pacotes/bibliotecas e dados necessários para outros reproduzirem seus dados.
- Minimamente, partes importantes incluindo implementações de novos algoritmos e dados que permitam reproduzir um resultado importante. ⁵⁰

6.5.3 Como preparar dados para compartilhamento?

• .[REF]

6.5.4 Como preparar scripts para compartilhamento?

- Providencie a documentação sobre seu script (ex.: arquivo README).⁵⁰
- Inclua a versão dos pacotes usados no seu script por meio de um script inicial para instalação de pacotes (ex.: 'instalar.R').⁵⁴
- Documente em um arquivo README os arquivos disponíveis e os pré-requisitos necessários para executar
 o código (ex.: pacotes e respectivas versões). Uma lista de configurações (hardware e software) que foram
 usadas para rodar o código pode ajudar na reprodução dos resultados.²⁰
- Use endereços de arquivos relativos.⁵⁴
- Crie links persistentes para versões do seu script. 50
- Defina uma semente para o gerador de números aleatórios em scripts com métodos computacionais que dependem da geração de números pseudoaleatórios.²⁰



O pacote $base^{63}$ fornece a função $set.seed^a$ para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/Random

- Escolha uma licença¹¹ apropriada para garantir os direitos de criação e como outros poderão usar seus scripts.⁵⁰
- Teste o script em uma nova sessão antes de compartilhar.⁵⁴
- Cite todos os pacotes relacionados à sua análise.⁶⁴



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *citation*^a para citar o programa R e os pacotes da sessão atual.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/citation



O pacote *grateful*⁶⁵ fornece a função *cite_packages*^a para citar os pacotes utilizados em um projeto R

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/grateful/versions/0.2.0/topics/cite_packages

Inclua a informação da sessão em que os scripts foram rodados.⁵⁴



O pacote *utils*⁴⁸ fornece a função *sessionInfo*^a para descrever as características do programa, pacotes e plataforma da sessão atual.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/sessionInfo}$

6.5.5 O que incluir no arquivo README?

- Título do trabalho.²⁰
- Autores do trabalho.20

¹¹ https://choosealicense.com/licenses/

- Principais responsáveis pela escrita do script e quaisquer outras pessoas que fizeram contribuições substanciais para o desenvolvimento do script.²⁰
- Endereço de e-mail do autor ou contribuidor a quem devem ser direcionadas dúvidas, comentários, sugestões e bugs sobre o script. 20
- Lista de configurações nas quais o script foi testado, tais com nome e versão do programa, pacotes e plataforma.²⁰

Medidas e instrumentos

7.1 Escalas

7.1.1 O que são escalas?

- Uma escala de medição grosseira representa um construto de natureza contínua medido por itens tais que diferentes pontuações são agrupadas na mesma categoria no ato da coleta de dados.⁶⁶
- Em escalas grosseiras, erros são introduzidos porque as variações contínunas do constructo são colapsadas em uma mesma categorias ou separadas entre categorias próximas.⁶⁶
- Escalas tipo Likert com 5 categorias tipo "discordo totalmente", "discordo parcialmente", "nem concordo nem discordo", "concordo parcialmente", e "concordo totalmente" são escalas grosseira porque as diferenças entre as categorias não são iguais. Por exemplo, a diferença entre "discordo totalmente" e "discordo parcialmente" não é a mesma que a diferença entre "concordo parcialmente" e "concordo totalmente".



O pacote *likert*⁶⁷ fornece a função *likert*^a para analisar respostas de instrumentos em escala Likert.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/likert/versions/1.3.5/topics/likert

 O erros em escalas grosseiras é considerado sistemático mas não pode ser corrigido em nível da unidade de análise.⁶⁶

7.2 Medidas

7.2.1 O que são medidas diretas?

• .[REF]

7.2.2 O que são medidas derivadas?

• .[REF]

7.2.3 O que são medidas por teoria?

• .[REF]

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) 118	
1		
2	113	
3	116	
4	110	
5	111	
6	116	
7	120	
8	111	
9	120	
10	112	

Tabela 7.1: Tabela de dados brutos com medidas únicas.

Tabela 7.2: Tabela de dados brutos com medidas repetidas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #1	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #2	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) #3
1	114	112	112
2	115	120	113
3	115	110	120
4	117	116	114
5	110	118	116
6	110	120	113
7	118	114	117
8	111	112	119
9	120	112	117
10	110	115	115

7.2.4 O que são medidas únicas?

- A medida única da pressão arterial sistólica no braço esquerdo resulta em um valor pontual.[REF]
- Medidas únicas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.[REF]
- O valor pontual será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: **120 mmHg** para o participante **#9**).

7.2.5 O que são medidas repetidas?

- As medidas repetidas podem ser tabuladas separadamente, por exemplo para análise da confiabilidade de obtenção dessa medida.[REF]
- A medida repetida da pressão arterial no braço esquerdo resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: 110 mmHg, 118 mmHg e 116 mmHg para o participante #5).
- As medidas repetidas podem ser agregadas por algum parâmetro ex.: média, mediana, máximo, mínimo, entre outros —, observando-se a relevância biológica, clínica e/ou metodológica desta escolha.[REF]
- Medidas agregadas obtidas de diferentes unidades de análise podem ser consideradas independentes se observadas outras condições na coleta de dados.[REF]
- O valor agregado será considerado representativo da variável para a unidade de análise (ex.: média = 115 mmHg para o participante #5).

7.2. MEDIDAS 41

Tabela 7.3: Tabela de dados brutos o	com medidas repeti	das agregadas.
--------------------------------------	--------------------	----------------

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) média	
1	113	
2	116	
3	115	
4	116	
5	115	
6	114	
7	116	
8	114	
9	116	
10	113	

Tabela 7.4: Tabela de dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Unidade de análise	Tempo (min)	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)
1	1	114
1	2	120
1	3	110
2	1	119
2	2	120
2	3	114
3	1	116
3	2	114
3	3	116
4	1	113



O pacote *stats*⁶⁸ fornece a função *aggregate*^a para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

7.2.6 O que são medidas seriadas?

- Medidas seriadas são possivelmente relacionadas e, portanto, dependentes na mesma unidade de análise.[REF]
- Por exemplo, a medida seriada da pressão arterial no braço esquerdo, em intervalos tipicamente regulares (ex.: 114 mmHg, 120 mmHg e 110 mmHg em 1 min, 2 min e 3 min, respectivamente, para o participante #1).
- Medidas seriadas também agregadas por parâmetros ex.: máximo, mínimo, amplitude são consideradas representativas da variação temporal ou de uma característica de interesse (ex.: amplitude = 10 mmHg para o participante #1).



O pacote *stats*⁶⁸ fornece a função *aggregate*^a para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

 $^{{\}it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/aggregate$

 $^{{\}it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/aggregate$

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg) amplitude
1	10
2	6
3	2
4	6
5	1
6	8
7	9
8	10
9	7
10	5

Tabela 7.5: Tabela de dados brutos com medidas seriadas não agregadas.

Tabela 7.6: Tabela de dados brutos com medidas múltiplas.

Unidade de análise	Pressão arterial, braço esquerdo (mmHg)	Pressão arterial, braço direito (mmHg)
1	117	115
2	120	118
3	112	118
4	112	112
5	116	112
6	112	118
7	115	113
8	114	118
9	119	114
10	112	116

7.2.7 O que são medidas múltiplas?

- Medidas múltiplas também são possivelmente relacionadas e, portanto, são dependentes na mesma unidade de análise. Medidas múltiplas podem ser obtidas de modo repetido para análise agregada ou seriada.[REF]
- A medida de pressão arterial bilateral resulta em um conjunto de valores pontuais (ex.: braço esquerdo = 114 mmHg, braço direito = 118 mmHg para o participante #8). Neste caso, ambos os valores pontuais são considerados representativos daquela unidade de análise.



O pacote *stats*⁶⁸ fornece a função *aggregate*^a para agregar medidas repetidas utilizando uma função personalizada.

7.3 Erros de medida

7.3.1 O que são erros de medida?

- .[REF]
- A natureza dos erros de medida são em geral atribuídos aos (1) instrumentos utilizados e variações no protocolo, na medida em que o seu tamanho médio pode ser reduzido por modificações e melhorias nesses instrumentos; e (2) variações genuínas medida em de curto prazo.⁶⁹

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/aggregate

7.4. INSTRUMENTOS 43

7.3.2 Quais fontes de variabilidade são comumente investigadas?

- Intra/Entre participantes (isto é, unidades de análise). 70
- Intra/Entre repetições.⁷⁰
- Intra/Entre observadores.⁷⁰

7.4 Instrumentos

7.4.1 O que são instrumentos?

• .[REF]

7.5 Acurácia e precisão


7.5.1 O que é acurácia?

• .[REF]


7.5.2 O que é precisão?

• .[REF]


Acurácia alta, Precisão alta



Acurácia alta, Precisão baixa



Acurácia baixa, Precisão alta



Acurácia baixa, Precisão baixa




Figura 7.1: Acurácia e precisão como propriedades de uma medida.

7.6 Viés e variabilidade

7.6.1 Qual é a relação entre viés e variabilidade?


• .[REF]

Viés alto, Variância baixa

Viés baixo, Variância alta

Viés baixo, Variância baixa








Figura 7.2: Viés e variabilidade de uma medida.

Dados, metadados e big data

8.1 Dados

8.1.1 O que são dados?

- "Tudo são dados".⁷¹
- Dados coletados em um estudo geralmente contêm erros de mensuração e/ou classificação, dados perdidos e são agrupados por alguma unidade de análise.⁷²

8.1.2 O que são dados primários e secundários?

- Dados primários são dados originais coletados intencionalmente para uma determinada análise exploratória ou inferencial planejada a priori.⁷³
- Dados secundários compreendem dados coletados inicialmente para análises de um estudo, e são subsequentemente utilizados para outras análises.⁷³

8.1.3 O que são dados quantitativos e qualitativos?

• .[REF]

8.2 Dados perdidos

8.2.1 O que são dados perdidos?

Dados perdidos são dados não coletados de um ou mais participantes, para uma ou mais variáveis.



O pacote $base^{63}$ fornece a função $is.na^a$ para identificar que elementos de um objeto são dados perdidos.

 $^{{\}it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/na$

8.2.2 Qual o problema de um estudo ter dados perdidos?

- Uma grande quantidade de dados perdidos pode comprometer a integridade científica do estudo, considerando-se que o tamanho da amostra foi estimado para observar um determinado tamanho de efeito mínimo.⁷⁴
- Perda de participantes no estudo por dados perdidos pode reduzir o poder estatístico (erro tipo II). ⁷⁴
- Não existe solução globalmente satisfatória para o problema de dados perdidos.⁷⁴

8.2.3 Quais os mecanismos geradores de dados perdidos?

- Dados perdidos completamente ao acaso (*missing completely at random*, MCAR), em que os dados perdidos estão distribuídos aleatoriamente nos dados da amostra. ^{75,76}
- Dados perdidos ao acaso (*missing at random*, MAR), em que a probabilidade de ocorrência de dados perdidos é relacionada a outras variáveis medidas. ^{75,76}
- Dados perdidos não ao acaso (*missing not at random*, MNAR), em que a probabilidade da ocorrência de dados perdidos é relacionada com a própria variável. ^{75,76}

8.2.4 Como identificar o mecanismo gerador de dados perdidos em um banco de dados?

- Por definição, não é possível avaliar se os dados foram perdidos ao acaso (MAR) ou não (MNAR).⁷⁵
- Testes t e regressões logísticas podem ser aplicados para identificar relações entre variáveis com e sem dados perdidos, criando um fator de análise ('dado perdido' = 1, 'dado observado' = 0).⁷⁵



O pacote *misty*⁷⁷ fornece a função *na.test*^a para executar o Little's Missing Completely at Random (MCAR) test⁷⁸.

8.2.5 Que estratégias podem ser utilizadas na coleta de dados quando há expectativa de perda amostral?

 Na expectativa de ocorrência de perda amostral, com consequente ocorrência de dados perdidos, recomendase ampliar o tamanho da amostra com um percentual correspondente a tal estimativa (ex.: 10%), embora ainda não corrija potenciais vieses pela perda.⁷⁴

8.2.6 Que estratégias podem ser utilizadas na análise quando há dados perdidos?

- Na ocorrência de dados perdidos, a análise mais comum compreende apenas os 'casos completos', com exclusão de participantes com algum dado perdido nas variáveis do estudo. Em casos de grande quantidade de dados perdidos, pode-se perder muito poder estatístico (erro tipo II elevado).⁷⁴
- A análise de dados completos é válida quando pode-se argumentar que que a probabilidade de o participante ter dados completos depende apenas das covariáveis e não dos desfechos.⁷⁶
- A análise de dados completos é eficiente quando todos os dados perdidos estão no desfecho, ou quando cada participante com dados perdidos nas covariáveis também possui dados perdidos nos desfechos.⁷⁶



O pacote base⁶³ fornece a função na.omit^a para remover dados perdidos de um objeto em um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/misty/versions/0.5.0/topics/na.test

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/na.fail



O pacote *stats*⁷⁹ fornece a função *complete.cases*^a para identificar os casos completos - isto é, sem dados perdidos - em um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/complete.cases

- A análise com imputação de dados pode ser útil quando pode-se argumentar que os dados foram perdidos ao acaso (MAR); quando o desfecho foi observado e os dados perdidos estão nas covariáveis; e variáveis auxiliares — preditoras do desfecho e não dos dados perdidos — estão disponíveis.⁷⁶
- Na ocorrência de dados perdidos, a imputação de dados (substituição por dados simulados plausíveis preditos pelos dados presentes) pode ser uma alternativa para manter o erro tipo II estipulado no plano de análise. ⁷⁴
- Modelos lineares e logísticos podem ser utilizados para imputar dados perdidos em variáveis contínuas e dicotômicas, respectivamente.⁸⁰
- Os métodos de imputação de dados mais robustos incluem a imputação multivariada por equações encadeadas (multivariate imputation by chained equations, MICE)⁸¹ e a correspondência média preditiva (predictive mean matching, PMM)^{82,83}.



Os pacotes *mice*⁸¹ e *miceadds*⁸⁴ fornecem funções *mice*^a e *mi.anova*^b para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

8.2.7 Que estratégias podem ser utilizadas na redação de estudos em que há dados perdidos?

 Informar: o número de participantes com dados perdidos; diferenças nas taxas de dados perdidos entre os braços do estudo; os motivos dos dados perdidos; o fluxo de participantes; quaisquer diferenças entre os participantes com e sem dados perdidos; o padrão de ausência (por exemplo, se é aleatória); os métodos para tratamento de dados perdidos das variáveis em análise; os resultados de quaisquer análises de sensibilidade; as implicações dos dados perdidos na interpretação do resultados.

8.3 Dados anonimizados

8.3.1 O que são dados anonimizados?

• .[REF]

8.3.2 Com anonimizar os dados de um banco?

• .[REF]



O pacote ids⁸⁶ fornece a função random id^a para criar identificadores aleatórios por criptografía.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ids/versions/1.0.1/topics/random_id



O pacote *hash*⁸⁷ fornece a função *hash*^a para criar identificadores por objetos *hash*.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/hash/versions/3.0.1/topics/hash

ahttps://www.rdocumentation.org/packages/mice/versions/3.16.0/topics/mice

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/miceadds/versions/3.16-18/topics/mi.anova



O pacote *anonimizer*⁸⁸ fornece a função *anonymize*^a para criar uma versão anônima de variáveis em um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/anonymizer/versions/0.2.0/topics/anonymize



O pacote *digest*⁸⁹ fornece a função *digest*^a para criar identificadores por objetos *hash* criptografados ou não.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/digest/versions/0.6.33/topics/digest

8.3.3 O que são dados sintéticos?

• .[REF]



O pacote $synthpop^{90}$ fornece a função syn^a para criar bancos de dados sintéticos a partir de um banco de dados real.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/synthpop/versions/1.8-0/topics/syn

8.4 Big data

8.4.1 O que são big data?

• Big data refere-se a bancos de dados muito grandes com um mecanismo "R" — aleatório (Random), autoreportado (self-Reported), reportado administrativamente (administratively reported), seletivamente respondido (selectively repondend) — descontrolado ou desconhecido.²²

8.5 Metadados

8.5.1 O que são metadados?

- Metadados são informações técnicas relacionadas às variáveis do estudo, tais como rótulos, limites de valores plausíveis, códigos para dados perdidos e unidades de medida.⁹¹
- Metadados também são informações relacionadas ao delineamento e/ou protocolo do estudo, recrutamento dos participantes, e métodos para realização das medidas.

8.5.2 Quais são as recomendações para os metadados de um banco de dados?

- Utilize rótulos padronizados para variáveis e fatores para facilitar o reuso (reprodutibilidade) do conjuntos de dados e scripts de análise.⁹²
- Crie rótulos de variáveis concisos, claros e mutuamente exclusivos. 92
- Evite muitas letras maiúsculas ou outros caracteres especiais que usam a shift. 92
- Na existência de versões de instrumentos publicadas em diferentes anos, use o ano de publicação das escalas no rótulo.⁹²
- Divida o rótulo da variável ou fator em partes e ordene-as do mais geral para o mais particular geral (ex.: experimento -> repetição -> escala -> item). 92

8.5. METADADOS 49



O pacote base⁶³ fornece a função names^a para declarar o nome de uma variável.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/names



O pacote base⁶³ fornece a função labels^a para declarar o rótulo de uma variável.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/labels



O pacote *units*⁹³ fornece a função *units*^a para declarar as unidades de medida de uma variável.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/units/versions/0.8-3/topics/units



O pacote *units*⁹³ fornece a função *valid_udunits*^a para listar as opções de unidades de medida de uma variável.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/units/versions/0.8-3/topics/valid_udunits



O pacote *janitor*⁹⁴ fornece a função *clean_names*^a para formatar de modo padronizado o nome das variáveis utilizando apenas caracteres, números e o símbolo '_'.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/janitor/versions/2.2.0/topics/clean_names



O pacote $Hmisc^{95}$ fornece a função $contents^a$ para criar um objeto com os metadados (nomes, rótulos, unidades, quantidade e níveis das variáveis categóricas, e quantidade de dados perdidos) de um dataframe.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Hmisc/versions/5.1-0/topics/contents



Tabulação de dados

9.1 Planilhas eletrônicas

9.1.1 Qual a organização de uma tabela de dados?

- As informações podem ser organizadas em formato de dados retangulares (ex.: matrizes, tabelas, quadro de dados) ou não retangulares (ex.: listas).[REF]
- Cada variável possui sua própria coluna (vertical).⁹⁶
- Cada observação possui sua própria linha (horizontal). 96
- Cada valor possui sua própria célula especificada em um par (linha, coluna). 96
- Cada célula possui seu próprio dado.⁹⁶



O pacote *DataEditR*⁹⁷ fornece a função *data_edit^a* para interativamente criar, editar e salvar a tabela de dados

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/DataEditR/versions/0.1.5/topics/dataInput

9.1.2 Qual a estrutura básica de uma tabela para análise estatística?

- Use apenas 1 (uma) planilha eletrônica para conter todas as informações coletadas. Evite múltiplas abas no mesmo arquivo, assim como múltiplos arquivos quando possível.⁹⁸
- Use apenas 1 (uma) linha de cabeçalho para nomear os fatores e variáveis do seu estudo. 98
- Tipicamente, cada linha representa um participante e cada coluna representa uma variável ou fator do estudo. Estudos com medidas repetidas dos participantes podem conter múltiplas linhas para o mesmo participante (repetindo os dados na mesma coluna, conhecido como *formato curto*) ou só uma linha para o participante (repetindo os dados em colunas separadas, conhecido como *formato longo*).

9.1.3 O que usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Seja consistente em: códigos para as variáveis categóricas; códigos para dados perdidos; nomes das variáveis; identificadores de participantes; nome dos arquivos; formato de datas; uso de caracteres de espaço. 98,99
- Crie um dicionário de dados (metadados) em um arquivo separado contendo: nome da variável, descrição da variável, unidades de medida e valores extremos possíveis.⁹⁸

V1 V2V3V4 $x_{1,3}$ $x_{1,1}$ $x_{1,2}$ $x_{1,4}$ $x_{2,1}$ $x_{2,2}$ $x_{2,3}$ $x_{2,4}$ $x_{3,1}$ $x_{3,2}$ $x_{3,3}$ $x_{3,4}$ $x_{4.1}$ $x_{4.2}$ $x_{4.3}$ $x_{4.4}$ $x_{5,1}$ $x_{5,2}$ $x_{5,3}$ $x_{5,4}$

Tabela 9.1: Estrutura básica de uma tabela de dados.

Tabela 9.2: Formatação recomendada para tabela de dados.

ID	Data.Coleta	Estado.Civil	Numero.Filhos
1	30-07-2024	casado	NA
2	31-07-2024	casado	1
3	01-08-2024	casado	NA
4	02-08-2024	solteiro	NA
5	03-08-2024	casado	NA
6	04-08-2024	solteiro	0
7	05-08-2024	solteiro	NA
8	06-08-2024	solteiro	NA
9	07-08-2024	casado	NA
10	08-08-2024	solteiro	NA

• Use recursos para validação de dados antes e durante a digitação de dados. 98,99



O pacote $data.table^{100}$ fornece a função $melt.data.table^a$ para reorganizar a tabela em diferentes formatos.

9.1.4 O que não usar para organizar tabelas para análise computadorizada?

- Não deixe células em branco: substitua dados perdidos por um código sistemático (ex.: NA [not available]). 98
- Não inclua análises estatísticas ou gráficos nas tabelas de dados brutos.⁹⁸
- Não utilize cores como informação. Se necessário, crie colunas adicionais variáveis instrumentais ou auxiliares para identificar a informação de modo que possa ser analisada.
- Não use células mescladas.
- Delete linhas e/ou colunas totalmente em branco (sem unidades de análise e/ou sem variáveis).

9.1.5 O que é recomendado e o que deve ser evitado na organização das tabelas para análise?

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/data.table/versions/1.14.8/topics/melt.data.table

Tabela 9.3: Formatação não recomendada para tabela de dados.

ID	Data de Coleta	Estado Civil	Número de Filhos
1	30-07-2024	casado	NA
2	31-07-2024	Casado	1
3	01-08-2024	casado	NaN
4	02-08-2024	Solteiro	N/A
5	03-08-2024	Casado	N.A.
6	04-08-2024	solteiro	0
7	05-08-2024	solteiro	
8	06-08-2024	Solteiro	na
9	07-08-2024	casado	n.a.
10	08-08-2024	Solteiro	999



Variáveis e fatores

10.1 Variáveis

10.1.1 O que são variáveis?

- Variáveis são informações que podem variar entre medidas em diferentes indivíduos e/ou repetições.
- Variáveis definem características de uma amostra extraída da população, tipicamente observados por aplicação de métodos de amostragem (isto é, seleção) da população de interesse.⁷³

10.1.2 Como são classificadas as variáveis?

- Quanto à informação: 73,102-104
 - Quantitativa
 - Qualitativa
- Quanto ao conteúdo: 73,102-105
 - Contínua: representam ordem e magnitude entre valores.
 - * Contínua (números inteiros) vs. Discreta (números racionais).
 - * Intervalo (valor '0' é arbitrário) vs. Razão (valor '0' verdadeiro).
 - Categórica ordinal (numérica ou nominal): representam ordem, mas não magnitude entre valores.
 - Categórica nominal (multinominal ou dicotômica): não representam ordem ou magnitude, apenas categorias.
- Quanto à interpretação: 73,102-104
 - Dependente (desfecho)
 - Independente (preditora, covariável, confundidora, controle)
 - Mediadora
 - Moderadora
 - Modificadora
 - Auxiliar
 - Indicadora



O pacote base⁶³ fornece a função class^a para identificar qual é o tipo do objeto.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/class



O pacote $base^{63}$ fornece as funções $as.numeric^a$ e $as.character^b$ para criar objetos numéricos e categóricos, respectivamente.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/numeric

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/character



O pacote $base^{63}$ fornece as funções $as.Date^a$ e $as.logical^b$ para criar objetos em formato de data e lógicos (VERDADEIRO, FALSO), respectivamente.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/as.Date

10.1.3 Por que é importante classificar as variáveis?

 Identificar corretamente os tipos de variáveis da pesquisa é uma das etapas da escolha dos métodos estatísticos adequados para as análises e representações no texto, tabelas e gráficos.

10.2 Transformação de variáveis

10.2.1 O que é transformação de variáveis?

- Transformação significa aplicar uma função matemática à variável medida em sua unidade original. 106
- A transformação visa atender aos pressupostos dos modelos estatísticos quanto à distribuição da variável, em geral a distribuição gaussiana.^{73,106}
- A dicotomização pode ser interpretada como um caso particular de agrupamento. 107

10.2.2 Por que transformar variáveis?

- Muitos procedimentos estatísticos supõem que as variáveis ou seus termos de erro, mais especificamente são normalmente distribuídas. A violação dessa suposição pode aumentar suas chances de cometer um erro do tipo I ou II.¹⁰⁸
- Mesmo quando se está usando análises consideradas robustas para violações dessas suposições ou testes não paramétricos (que não assumem explicitamente termos de erro normalmente distribuídos), atender a essas questões pode melhorar os resultados das análises (por exemplo, Zimmerman, 1995).

10.2.3 Quais transformações podem ser aplicadas?

- Distribuições com assimetria à direita: 108
 - Raiz quadrada
 - Logaritmo natural
 - Logaritmo base 10
 - Transformação inversa
- Distribuições com assimetria à esquerda: 108
 - Reflexão e raiz quadrada
 - Reflexão e logaritmo natural

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/logical

- Reflexão e logaritmo base 10
- Reflexão e transformação inversa
- Transformação arco-seno. 108
- Transformação de Box-Cox.¹⁰⁹
- Transformação de escore padrão (Z-score ou padronização).
- Escala Mínimo-Máximo (0,1).
- Normalização (normas L1, L2).
- Diferenciação.
- · Categorização.
- · Dicotomização.



O pacote MASS¹¹⁰ fornece a função boxcox^a para executar a transformação de Box-Cox. ¹⁰⁹

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/MASS/versions/7.3-58.3/topics/boxcox

10.3 Categorização de variáveis contínuas

10.3.1 O que é categorização de uma variável?

• .[REF]

10.3.2 Por que não é recomendado categorizar variáveis contínuas?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a categorização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.¹¹¹
- Categorizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de categorizar, priorize as variáveis contínuas.^{112–114}
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam. 112-114
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine três ou mais grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.
- Categorização de variáveis contínuas aumenta a quantidade de testes de hipótese para comparações pareadas entre os quantis, inflando, portanto, o erro tipo I. 116
- Categorização de variáveis contínuas requer uma função teórica que pressupõe a homogeneidade da variável dentro dos grupos, levando tanto a uma perda de poder como a uma estimativa imprecisa.
- Categorização de variáveis contínuas pode dificultar a comparação de resultados entre estudos devido aos pontos de corte baseados em dados de um banco usados para definir as categorias.



O pacote *questionr*¹¹⁷ fornece a função *irec*^a para executar uma interface interativa para codificação de variáveis categóricas.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/questionr/versions/0.7.8/topics/irec

10.3.3 Quais são as alternativas à categorização de variáveis contínuas?

- Análise com os dados das variáveis na escala de medida original. 111
- Análise com modelos de regressão com pesos locais (lowess) tais como splines e polinômios fracionais. 111

10.4 Dicotomização de variáveis contínuas

10.4.1 O que são variáveis dicotômicas?

- Variáveis dicotômicas (ou binárias) podem representar categorias naturais tipo "presente/ausente", "sim/não".[REF]
- Variáveis dicotômicas podem representar categorias fictícias, criadas a partir de variáveis multinominais, em que cada nível é convertido em uma variável dicotômica dummy.[REF]
- Dicotomização é considerado um artefato da análise de dados, uma vez que é realizada após a coleta de dados.⁶⁶
- Geralmente são representadas por "1" e "0".[REF]

10.4.2 Quais argumentos são usados para defender a categorização ou dicotomização de variáveis contínuas?

- O argumento principal para dicotomização de variáveis é que tal procedimento facilita e simplifica a apresentação dos resultados, principalmente para o público em geral.¹⁰⁷
- Os pesquisadores não conhecem as consequências estatísticas da dicotomização.
- Os pesquisadores não conhecem os métodos adequados de análise não-paramétrica, não-linear e robusta.
- As categorias representam características existentes dos participantes da pesquisa, de modo que as análises devam ser feitas por grupos e não por indivíduos.
- A confiabilidade da(s) variável(eis) medida(s) é baixa e, portanto, categorizar os participantes resultaria em uma medida mais confiável. 111

10.4.3 Por que não é recomendado dicotomizar variáveis contínuas?

- Nenhum dos argumentos usados para defender a dicotomização de variáveis se sustenta sob uma análise técnica rigorosa.¹¹¹
- Dicotomizar variáveis não é necessário para conduzir análises estatísticas. Ao invés de dicotomizar, priorize as variáveis contínuas.^{112–114}
- Em geral, não existe uma justificativa racional (plausibilidade biológica) para assumir que as categorias artificiais subjacentes existam. 112-114
- Dicotomização causa perda de informação e consequentemente perda de poder estatístico para detectar efeitos.^{111,112}
- Dicotomização também classifica indivíduos com valores próximos na variável contínua como indivíduos em pontos opostos e extremos, artificialmente sugerindo que são muito diferentes.
- Dicotomização pode diminuir a variabilidade das variáveis. 112
- Dicotomização pode ocultar não-linearidades presentes na variável contínua. 111,112
- A média ou a mediana, embora amplamente utilizadas, não são bons parâmetros para dicotomizar variáveis. 107,112
- Caso exista um ponto de corte ou limiar verdadeiro que discrimine dois grupos independentes, identificar tal ponto de corte ainda é um desafio.¹¹⁵

10.5. FATORES 59

10.4.4 Quais cenários legitimam a dicotomização das variáveis contínuas?

• Quando existem dados e/ou análises que suportem a existência - não apenas a suposição ou teorização - de categorias com um ponto de corte claro e com significado entre elas.¹¹¹

 Quando a distribuição da variável contínua é muito assimétrica, de modo que uma grande quantidade de observações está em um dos extremos da escala.¹¹¹

10.4.5 Quais métodos são usados para dicotomizar variáveis contínuas?

- Em termos de tabelas de contingência 2x2, os seguintes métodos permitem¹¹⁵ a identificação do limiar verdadeiro:
 - Youden. 118
 - Gini Index. 119
 - Estatística qui-quadrado (χ^2) . ¹²⁰
 - Risco relativo (RR). ¹²¹
 - Kappa (κ). 122.

10.5 Fatores

10.5.1 O que são fatores?

- Fator é um sinônimo de variável categórica.[REF]
- Na modelagem, fator é sinônimo de variável preditora, em particular quando se refere à modelagem de efeitos fixos e aleatórios os fatores (variáveis) são fatores fixos ou fatores aleatórios.[REF]
- Fatores são variáveis controladas pelos pesquisadores em um experimento para determinar seu efeito na(s) variável(ies) de resposta. Um fator pode assumir apenas um pequeno número de valores, conhecidos como níveis. Os fatores podem ser uma variável categórica ou baseados em uma variável contínua, mas usam apenas um número limitado de valores escolhidos pelos experimentadores.[REF]



O pacote base⁶³ fornece a função as factor^a para converter uma variável em fator.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/factor

10.5.2 O que são níveis de um fator?

• Níveis de um fator são as possíveis categorias que descrevem um fator.[REF]



O pacote $base^{63}$ fornece as funções $levels^a$ e $nlevels^b$ para listar os níveis e a quantidade deles em um fator.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/levels

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/nlevels



Distribuições e parâmetros

11.1 Distribuições de probabilidade

11.1.1 O que são distribuições de probabilidade?

• Uma distribuição de probabilidade é uma função que descreve os valores possíveis ou o intervalo de valores de uma variável (eixo horizontal) e a frequência com que cada valor é observado (eixo vertical).⁷³

11.1.2 Quais características definem uma distribuição?

• Uma distribuição pode ser definida por modelos matemáticos e caracterizada por parâmetros de tendência central, dispersão, simetria e curtose.

11.1.3 Quais são as distribuições mais comuns?

- Distribuções discretas:
 - Uniforme: resultados (finitos) que são igualmente prováveis. [REF]
 - Binomial: número de sucessos em k tentativas. [REF]
 - Poisson: número de eventos em um intervalo de tempo fixo.[REF]
 - Bernoulli: .[REF]
 - Geométrica: número de testes até o 1o sucesso.[REF]
 - Binomial negativa: número de testes até o k-ésimo sucesso.[REF]
 - Hipergeométrica: número de indivíduos na amostra tomados sem reposição. [REF]
- Distribuições contínuas:
 - Uniforme: resultados que possuem a mesma densidade.[REF]
 - Exponencial: tempo entre eventos.[REF]
 - Normal: .[REF]
 - Normal padrão: .[REF]
 - Aproximação binomial: número de sucessos em uma grande quantidade de tentativas.[REF]
 - Aproximação Poisson: número de ocorrências em um intervalo de tempo fixo.[REF]
 - Qui-quadrado: .[REF]
 - t-Student: .[REF]
 - Weibull: .[REF]

- Log-normal: .[REF]

Beta: .[REF]Gama: .[REF]Logística: .[REF]

- Pareto. [REF]

11.1.4 Quais são as funções de uma distribuição?

- Função de massa de probabilidade (probability mass function, pmf).[REF]
- Função de distribuição cumulativa (cumulative distribution function, cdf).[REF]
- Função quantílicas (quantile function, qf).[REF]
- Função geradora de números aleatórios (random function, rf).[REF]



O pacote *stats*¹²³ fornece funções de distribuição de probabilidade (p), funções de densidade (d), funções quantílicas (q) e funções geradores de números aleatórios (r) para as distribuições normal^a, Student t^b, binomial^c, qui-quadrado^d, uniforme^e, dentre outras.

^ehttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/Uniform



O pacote $ggdist^{124}$ fornece a função geom_slabinterval^a para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p) e funções de densidade (d) as distribuições.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ggdist/versions/3.3.0/topics/geom_slabinterval



O pacote *ggfortify*¹²⁵ fornece a função ggdistribution^a para criar gráficos de distribuição de probabilidade (p), funções de densidade (d), funções quantílicas (q) e funções geradores de números aleatórios (r) para as distribuições.

11.1.5 O que é a distribuição normal?

- A distribuição normal (ou gaussiana) é uma distribuição com desvios simétricos positivos e negativos em torno de um valor central.¹⁰²
- Em uma distribuição normal, o intervalo de 1 desvio-padrão (±1DP) inclui cerca de 68% dos dados; de 2 desvios-padrão (±2DP) cerca de 95% dos dados; e no intervalo de 3 desvios-padrão (±3DP) cerca de 99% dos dados. 102

11.1.6 Que métodos podem ser utilizados para identificar a normalidade da distribuição?

- Histogramas.⁷³
- Gráficos Q-Q.73

 $^{{\}it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/Normal$

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/TDist

^chttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/Binomial

dhttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/Chisquare

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ggfortify/versions/0.4.16/topics/ggdistribution

11.2. PARÂMETROS 63

Distribuição de probabilidade

Função de distribuição cumulativa




Figura 11.1: Distribuições e funções de probabilidade

- Testes de hipótese nula:⁷³
 - Kolmogorov-Smirnov
 - Shapiro-Wilk
 - Anderson-Darling

11.1.7 O que são distribuições não-normais?

• .[REF]

11.2 Parâmetros

11.2.1 O que são parâmetros?

- Parâmetros são informações que definem um modelo teórico, como propriedades de uma coleção de indivíduos.¹⁰¹
- Parâmetros definem características de uma população inteira, tipicamente não observados por ser inviável ter acesso a todos os indivíduos que constituem tal população.⁷³



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary

11.2.2 Que parâmetros podem ser estimados?

- Parâmetros de tendência central. 102,126
- Parâmetros de dispersão. 102,126,127
- Parâmetros de proporção. 102,126,128,128
- Parâmetros de distribuição. 126

• Parâmetros de extremos. 102



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary

11.2.3 O que é uma análise paramétrica?

- Testes paramétricos possuem suposições sobre as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.⁷³
- Testes paramétricos assumem que: a variável é quantitativa numérica (contínua); os dados foram amostrados de uma população com distribuição normal; a variância da(S) amostra(s) é igual à da população; as amostras foram selecionadas de modo aleatório na população; os valores de cada amostra são independentes entre si. 73,102
- Testes paramétricos são baseados na suposição de que os dados amostrais provêm de uma população com parâmetros fixos determinando sua distribuição de probabilidade.⁷

11.2.4 O que é uma análise não paramétrica?

- Testes não-paramétricos fazem poucas suposições, ou menos rigorosas, sobre as características e/ou parâmetros da distribuição dos dados na população.^{73,102}
- Testes não-paramétricos são úteis quando as suposições de normalidade não podem ser sustentadas. 102

11.2.5 Por que as análises paramétricas são preferidas?

- Em geral, testes paramétricos são mais robustos (isto é, possuem menores erros tipo I e II) que seus testes não-paramétricos correspondentes. ^{73,129}
- Testes não-paramétricos apresentam menor poder estatístico (maior erro tipo II) comparados aos testes paramétricos correspondentes.

11.3 Valores esperados

11.3.1 Que parâmetros de tendência central podem ser estimados?

- Média. 102,126
- Mediana. 102,126
- Moda. 102,126



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary

11.3.2 Que parâmetros de dispersão podem ser estimados?

- Variância. 102,126
- Desvio-padrão: Estima a variabilidade entre as observações e a média amostra, e estima a variabilidade na população.¹²⁷
- Erro-padrão: Estima a variabilidade teórica entre médias amostrais. 127
- *Amplitude*. 102,126
- Intervalo interquartil. 102,126
- Intervalo de confiança. 102,126



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary



O pacote $stats^{130}$ fornece a função $confint^a$ para calcular o intervalo de confiança em um nível de significância α .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/confint

11.3.3 Que parâmetros de proporção podem ser estimados?

- Frequência absoluta. 102,126,128
- Frequência relativa. 102,126,128
- Percentil. 102,126,128
- *Quantil*: é o ponto de corte que define a divisão da amostra em grupos de tamanhos iguais. Portanto, não se referem aos grupos em si, mas aos valores que os dividem. ¹²⁸
 - Tercil: 2 valores que dividem a amostra em 3 grupos de tamanhos iguais. ¹²⁸
 - Quartil: 3 valores que dividem a amostra em 4 grupos de tamanhos iguais. 128
 - Quintil: 4 valores que dividem a amostra em 5 grupos de tamanhos iguais. 128
 - Decil: 9 valores que dividem a amostra em 10 grupos de tamanhos iguais. 128



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary



O pacote base⁶³ fornece a função table^a para calcular proporções.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/table



O pacote stats¹³¹ fornece a função quantile^a para executar análise de percentis.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/quantile

11.3.4 Que parâmetros de distribuição podem ser estimados?

- Assimetria. 126
- Curtose. 126

11.3.5 Que parâmetros extremos podem ser estimados?

- Mínimo. 102
- *Máximo*. 102



O pacote base⁶³ fornece a função summary^a para calcular diversos parâmetros descritivos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/summary

11.4 Valores discrepantes

11.4.1 O que são valores discrepantes (outliers)?

- Em termos gerais, um valor discrepante "fora da curva" ou *outlier* é uma observação que possui um valor relativamente grande ou pequeno em comparação com a maioria das observações. 132
- Mais especificamente, um valor discrepante é uma observação incomum que exerce influência indevida em uma análise.¹³²

11.4.2 Como conduzir análises com valores discrepantes?

- Erros de observação e de medição são uma justificativa válida para descartar observações discrepantes. 132
- Valores discrepantes na variável de desfecho podem exigir uma abordagem mais refinada, especialmente quando representam uma variação real na variável que está sendo medida. 132
- Valores discrepantes em uma (co)variável podem surgir devido a um projeto experimental inadequado; nesse caso, abandonar a observação ou transformar a covariável são opções adequadas. 132
- É importante reportar se existem valores discrepantes e como foram tratados. 132



O pacote *outliers*¹³³ fornece a função *outlier*^a para identificar os valores mais distantes da média.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/outliers/versions/0.15/topics/outlier



O pacote *outliers*¹³³ fornece a função *rm.outlier*^a para remover os valores mais distantes da média detectados por testes de hipótese e/ou substitui-los pela média ou mediana.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/outliers/versions/0.15/topics/rm.outlier

Análise inicial de dados

12.1 Análise inicial de dados

12.1.1 O que é análise inicial de dados?

- Análise inicial de dados¹³⁴ é uma sequência de procedimentos que visam principalmente a transparência e integridade das pré-condições do estudo para conduzir a análise estatística apropriada de modo responsável para responder aos problemas da pesquisa.⁹¹
- O objetivo da análise inicial de dados é propiciar dados prontos para análise estatística, incluindo informações confiáveis sobre as propriedades dos dados.⁹¹
- A análise inicial de dados pode ser dividida nas seguintes etapas:⁹¹
 - Configuração dos metadados
 - Limpeza dos dados
 - Verificação dos dados
 - Relatório inicial dos dados
 - Refinamento e atualização do plano de análise estatística
 - Documentação e relatório da análise inicial de dados
- A análise inicial de dados não deve ser confundida com análise exploratória¹³⁵, nem deve ser utilizada para hipotetizar após os dados serem coletados (conhecido como *Hypothesizing After Results are Known*, HARKing)¹³⁶.

12.1.2 Como conduzir uma análise inicial de dados?

- Desenvolva um plano de análise inicial de dados consistente com os objetivos da pesquisa. Por exemplo, verifique a distribuição e escala das variáveis, procure por observações não-usuais ou improváveis, avalie possíveis padrões de dados perdidos.⁹¹
- Não altere diretamente os dados de uma tabela obtida de uma fonte. Use scripts para implementar eventuais alterações, de modo a manter o registro de todas as modificações realizadas no banco de dados.⁹¹
- Use os metadados do estudo para guiar a análise inicial dos dados e compartilhe com os dados para maior transparência e reprodutibilidade.⁹¹
- Representação gráfica dos dados pode ajudar a identificar características e padrões no banco de dados, tais como suposições e tendências.⁹¹
- Verifique a frequência e proporção de dados perdidos em cada variável, e depois examine por padrões de dados perdidos simultaneamente por duas ou mais variáveis.⁹¹

- Verifique a frequência e proporção de dados perdidos em cada variável, e depois examine por padrões de dados perdidos simultaneamente por duas ou mais variáveis.⁹¹
- Exclusão de dados *ad hoc* baseada no desfecho pode influenciar os resultados do estudo, portanto os critérios de exclusão de dados antes da análise estatística (descritiva e/ou inferencial) devem ser reportados. 137

12.1.3 Quais problemas podem ser detectados na análise inicial de dados?

• Ocorrência de dados perdidos, que podem ser excluídos ou imputados para não reduzir o poder do estudo.[REF]



O pacote stats⁶⁸ fornece a função na.omit^a para retornar os dados sem os dados perdidos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/na.fail



O pacote *stats*⁷⁹ fornece a função *complete.cases*^a para identificar os casos completos - isto é, sem dados perdidos - em um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/complete.cases

Registros duplicados, que devem ser excluídos para não inflar a amostra.



O pacote $base^{63}$ fornece a função $duplicated^a$ para identificar elementos duplicados de um banco de dados.

 ${\it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/duplicated$

- Codificação 0 ou 1 para variáveis dicotômicas para representar a direção esperada da associação entre elas. 138
- Ordenação cronológica de variáveis com registros temporais (retrospectivos ou prospectivos). 138
- A distribuição das variáveis para verificação das suposições das análises planejadas. ¹³⁸
- Ocorrência de efeitos teto e piso nas variáveis. 138

Análise exploratória de dados

13.1 Análise exploratória de dados

13.1.1 O que é análise exploratória de dados?

- Análise exploratória de dados consiste em um processo iterativo de elaboração e interpretação da síntese de dados, tabelas e gráficos, considerando os aspectos teóricos do estudo.¹³⁵
- Análise exploratória deve ser separada da análise inferencial de testes de hipóteses; a decisão sobre os modelos a testar deve ser feita *a priori*. ¹³²

13.1.2 Por que conduzir a análise exploratória de dados?

- A condução de análise exploratória de dados pode ajudar a identificar padrões e pode orientar trabalhos futuros, mas os resultados não devem ser interpretados como inferências sobre uma população.
- A análise exploratória não deve ser usada para definir as questões e hipóteses científicas do estudo. 132



O pacote *explore*¹³⁹ fornece a função *explore*^a para análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/explore/versions/1.0.2/topics/explore



O pacote $dataMaid^{140}$ fornece a função $makeDataReport^a$ para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/dataMaid/versions/1.4.1/topics/makeDataReport



O pacote *DataExplorer*¹⁴¹ fornece a função *create_report*^a para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/DataExplorer/versions/0.8.2/topics/create_report



O pacote *SmartEDA*¹⁴² fornece a função *ExpReport*^a para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/SmartEDA/versions/0.3.9/topics/ExpReport



O pacote *gtExtras*¹⁴³ fornece a função *gt_plt_summary*^a para criar uma tabela descritiva síntese com histogramas ou gráficos de barra a partir de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/gtExtras/versions/0.5.0/topics/gt_plt_summary



O pacote *radiant*¹⁴⁴ fornece a função *radiant*^a para executar uma interface interativa para análise exploratória de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/radiant/versions/1.5.0/topics/radiant

13.1.3 Quais etapas constituem a análise exploratória de dados?

- Cada combinação de problema de pesquisa e delineamento de estudo pode demandar um plano de análise exploratório distinto.¹³²
- Verifique a existência e/ou influência de valores discrepantes ("fora da curva" ou *outliers*): 132,134,135
 - Boxplots
 - Gráficos quantil-quantil (Q-Q)



O pacote graphics¹⁴⁵ fornece a função boxplot^a para construção de gráficos boxplot.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/graphics/versions/3.6.2/topics/boxplot

- Verifique a homocedasticidade (homogeneidade da variância): 132
 - Boxplots condicionais (por fator de análise)
 - Análise dos resíduos do modelo de regressão
 - Gráfico resíduos vs. valores ajustados
- Verifique a normalidade da distribuição dos dados: 132,134
 - Histograma das variáveis (por fator de análise)
 - Histograma dos resíduos da regressão
- Verifique a existência de grande quantidade de valores nulos (=0): 132
 - Histograma das variáveis (por fator de análise)
- Verifique a existência de colinearidade entre variáveis independentes de um modelo de regressão: 132
 - Fator de inflação de variância (variance inflation factor, VIF)
 - Coeficiente de correlação de Pearson (r)
 - Gráfico de dispersão entre variáveis
- Verifique possíveis relações entre as variáveis dependente(s) e independente(s) de um modelo de regressão:¹³²
 - Gráfico de dispersão entre variáveis independente e dependente
- Verifique possíveis interações entre as variáveis dependente(s) de um modelo de regressão: 132

- Gráfico *coplot* de dispersão entre variáveis dependentes



O pacote *graphics*¹⁴⁵ fornece a função *coplot*^a para construção de gráficos *boxplot* condicionais.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/graphics/versions/3.6.2/topics/coplot

- Verifique por dependência entre variáveis de um modelo de regressão: 132
 - Gráfico de série temporal das variáveis
 - Gráfico de autocorrelação entre as variáveis



Análise descritiva

14.1 Análise descritiva

14.1.1 O que é análise descritiva?

- A análise descritiva utiliza métodos para calcular, descrever e resumir os dados coletados da(s) amostra(s) de modo que sejam interpretadas adequadamente.⁷³
- As análises descritivas geralmente compreendem a apresentação quantitativa (numérica) em tabelas e/ou gráficos.⁷³



O pacote *explore*¹³⁹ fornece a função *explore*^a para análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/explore/versions/1.0.2/topics/explore



O pacote *dataMaid*¹⁴⁰ fornece a função *makeDataReport*^a para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/dataMaid/versions/1.4.1/topics/makeDataReport



O pacote $DataExplorer^{141}$ fornece a função $create_report^a$ para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

 ${\it a} https://www.rdocumentation.org/packages/DataExplorer/versions/0.8.2/topics/create_report$



O pacote *SmartEDA*¹⁴² fornece a função *ExpReport*^a para criar um relatório de análise exploratória de um banco de dados.

 ${\it a} https://www.rdocumentation.org/packages/SmartEDA/versions/0.3.9/topics/ExpReport. A continuous continu$

14.1.2 Como apresentar os resultados descritivos?

- Variáveis categóricas: Reporte valores de frequência absoluta e relativa (n, %). 146
- Organização das tabelas: as variáveis são exibidas em linhas e os grupos são exibidos em colunas.
- Calcule percentagens para as colunas (isto é, entre grupos) e não entre linhas. 146

 Em caso de dados perdidos, não inclua uma linha com total de dados perdidos, pois distorce as proporções entre colunas e as análises de tabela de contingência. Neste caso, indique no texto ou em uma coluna separada o total de dados perdidos por variável.¹⁴⁶

14.2 Tabelas

14.2.1 Por que usar tabelas?

 Tabelas complementam o texto (e vice-versa), e podem apresentar os dados de modo mais acessível e informativo.¹⁴⁷

14.2.2 Que informações incluir nas tabelas?

 Título ou legenda, uma síntese descritiva (geralmente por meio de parâmetros descritivos), intervalos de confiança e/ou P-valores conforme necessário para adequada interpretação. 147,148

14.2.3 Quais são os erros mais comuns de preenchimento de tabelas?

- Erros tipográficos. 149
- Ausência de rótulos ou unidades nas variáveis. 149
- Relatar estatísticas incorretamente, tais como rotular variáveis contínuas como porcentagens. 149
- Estatísticas descritivas de tendência central (ex.: médias) relatadas sem a estatística de dispersão correspondente (ex.: desvio-padrão). 149
- Desvio-padrão nulo ($\sigma = 0$). ¹⁴⁹
- Valores porcentuais que não correspondem ao numerador dividido pelo denominador.



O pacote $flextable^{150}$ fornece as funções $flextable^a$, $as_flextable^b$ e $save_as_docx^c$ para criar e salvar tabelas tabelas formatadas em DOCX.

- ^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/flextable/html/flextable.html
- ^bhttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/flextable/html/as flextable.html
- chttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/flextable/html/save_as_docx.html



O pacote $rempsyc^{151}$ fornece a função $nice_table^a$ para criar tabelas formatadas.

 $^a https://search.r-project.org/CRAN/refmans/rempsyc/html/nice_table.html$



O pacote *table l*¹⁵² fornece a função *table l*^a para construção de tabelas.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/table1/html/table1.html



O pacote *gtsummary*¹⁵³ fornece a função *tbl_summary*^a para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/gtsummary/html/tbl_summary.html

14.3. TABELA 1 75

14.3 Tabela 1

14.3.1 O que é a 'Tabela 1'?

 A 'Tabela 1' descreve as características demográficas, sociais e clínicas da amostra, completa ou agrupada por algum fator, geralmente por meio de parâmetros de tendência central e dispersão. 154,155

14.3.2 Qual a utilidade da 'Tabela 1'?

- Descrever (conhecer) as características da amostra e dos grupos sendo comparados, quando aplicável.
- Verificar aderência ao protocolo do estudo, incluindo critérios de inclusão/exclusão, tamanho da amostra e perdas amostrais.¹⁵⁵
- Permitir a replicação do estudo. 155
- Meta-analisar os dados junto a estudos similares.¹⁵⁵
- Avaliar a generalização (validade externa) das conclusões do estudo.

14.3.3 O que é a falácia da 'Tabela 1'?

 Falácia da Tabela 1 ocorre pela interpretação errônea dos P-valores na comparação entre grupos, na linha de base, de um ensaio clínico aleatorizado.¹⁵⁶

14.3.4 Como construir a 'Tabela 1'?

 A Tabela 1 geralmente é utilizada para descrever as características da amostra estudada, possibilitando a análise de ameaças à validade interna e/ou externa ao estudo.^{129,157}



O pacote table 1152 fornece a função table 1a para construção de tabelas.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/table1/html/table1.html



O pacote gtsummary¹⁵³ fornece a função tbl_summary^a para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/gtsummary/html/tbl summary.html

14.4 Tabela 2

14.4.1 O que é a 'Tabela 2'?

• .[REF]

14.4.2 Qual a utilidade da 'Tabela 2'?

A Tabela 2 mostra associações ajustadas multivariadas com o resultado para variáveis resumidas na Tabela
 1.154

14.4.3 O que é a falácia da 'Tabela 2'?

- A Tabela 2 pode induzir ao erro de interpretação pelas estimativas de efeitos para covariáveis do modelo também serem utilizados para controlar a confusão da exposição.^{154,158}
- Ao apresentar estimativas de efeito ajustadas para covariáveis juntamente com a estimativa de efeito ajustada para a exposição primária, a Tabela 2 sugere implicitamente que todas estas estimativas podem ser interpretadas de forma semelhante, se não de forma idêntica, como estimativa do efeito total. 154,158
- A falácia da Tabela 2 pode ser evitada limitando-se a tabela a estimativas das medidas primárias do efeito de exposição nos diferentes modelos, com as covariáveis secundárias de "ajuste" relatadas em uma nota de rodapé, juntamente com a forma como foram categorizadas ou modeladas.¹⁵⁴

14.4.4 Como construir a 'Tabela 2'?

 A Tabela 2 pode ser utilizada para apresentar estimativas de múltiplos efeitos ajustados de um mesmo modelo estatístico.¹⁵⁴



O pacote *table l*¹⁵² fornece a função *table l*^a para construção de tabelas.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/table1/html/table1.html



O pacote gtsummary¹⁵³ fornece a função tbl_summary^a para construção da 'Tabela 1' com dados descritivos.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/gtsummary/html/tbl_summary.html

14.5 Gráficos

14.5.1 O que são gráficos?

 Gráficos são utilizados para apresentar dados (geralmente em grande quantidade) de modo mais intuitivo e fácil de compreender.¹⁵⁹

14.5.2 Qual a utilidade dos gráficos?

• .[REF]

14.5.3 Que elementos incluir em gráficos?

Título, eixos horizontal e vertical com respectivas unidades, escalas em intervalos representativos das variáveis, legenda com símbolos, síntese descritiva dos valores e respectiva margem de erro, conforme necessário para adequada interpretação.



Os pacotes $ggplot2^{160}$, $plotly^{161}$ e $corrplot^{162}$ fornecem diversas funções para construção de gráficos tais como $ggplot^a$, $plot \ ly^b$ e $corrplot^c$ respectivamente.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ggplot2/versions/3.4.3/topics/ggplot

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/plotly/versions/4.10.2/topics/plot ly

chttps://www.rdocumentation.org/packages/corrplot/versions/0.92/topics/corrplot

14.5. GRÁFICOS 77

14.5.4 Para que servem as barras de erro em gráficos?

 Barras de erro ajudam ao autor a apresentar as informações que descrevem os dados (por exemplo, em uma análise descritiva) ou sobre as inferências ou conclusões tomadas a partir de dados.¹⁶³

- Barras de erro mais longas representam mais imprecisão (maiores erros), enquanto barras mais curtas representam mais precisão na estimativa.
- Barras de erro descritivas geralmente apresentam a amplitude (mínimo-máximo) ou desvio-padrão. 163
- Barras de erro inferenciais geralmente apresentam o erro-padrão ou intervalo de confiança (por exemplo, de 95%).
- O comprimento das barras de erro sugere graficamente a imprecisão dos dados do estudo, uma vez que o valor verdadeiro da população pode estar em qualquer nível do intervalo da barra. 163

14.5.5 Quais são as boas práticas na elaboração de gráficos?

- O tamanho da amostra total e subgrupos, se houver, deve estar descrito na figura ou na sua legenda. 163
- Para análise inferencial de figuras, as barras de erro representadas por erro-padrão ou intervalo de confiança são preferíveis à amplitude ou desvio-padrão.
- Evite gráficos de barra e mostre a distribuição dos dados sempre que possível. 164
- Exiba os pontos de dados em boxplots. 164
- Use *jitter* simétrico em gráficos de pontos para permitir a visualização de todos os dados. 164
- Prefira palhetas de cor adaptadas para daltônicos. 164



O pacote $ggsci^{165}$ fornece palhetas de cores tais como pal_lancet^a , pal_nejm^b e pal_npg^c inspiradas em publicações científicas para uso em gráficos.

^chttps://www.rdocumentation.org/packages/ggsci/versions/3.0.0/topics/pal_npg



O pacote *grDevices*¹⁶⁶ fornece a função *dev.new*^a para controlar diversos aspectos do gráfico, tais como tamanho e resolução.

14.5.6 Como exportar figuras em formato TIFF?



O pacote $tiff^{167}$ fornece a função $writeTIFF^a$ para exportar gráficos em formato TIFF.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/tiff/versions/0.1-11/topics/writeTIFF

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ggsci/versions/3.0.0/topics/pal_lancet

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/ggsci/versions/3.0.0/topics/pal_nejm

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/grDevices/versions/3.6.2/topics/dev



Análise inferencial

15.1 Raciocínio inferencial

15.1.1 O que é análise inferencial?

- Na análise inferencial são utilizados dados da(s) amostra(s) para fazer uma inferência válida (isto é, estimativa) sobre os parâmetros populacionais desconhecidos.⁷³
- No paradigma de Jerzy Neyman e Egon Pearson, um teste de hipótese científica envolve a tomada de decisão sobre hipóteses nulas (H_0) e alternativa (H_1) concorrentes e mutuamente exclusivas. ¹⁶⁸

15.1.2 Quais são os tipos de raciocínio inferencial?

- Inferência dedutiva: Uma dada hipótese inicial é utilizada para prever o que seria observado caso tal hipótese fosse verdadeira.¹⁶⁹
- Inferência indutiva: Com base nos dados observados, avalia-se qual hipótese é mais defensável (isto é, mais provável).¹⁶⁹

15.1.3 Quais são as questões fundamentais da análise inferencial?

- Qual é a direção do efeito?¹⁷⁰
- Qual é a magnitude do efeito?¹⁷⁰
- Qual é a importância do efeito?¹⁷⁰

15.2 Hipóteses científicas

15.2.1 O que é hipótese científica?

- Hipótese científica é uma ideia que pode ser testada. 168
- Definir claramente os problemas e os objetivos da pesquisa são o ponto de partida de todos os estudos científicos.⁷²

15.2.2 Quais são as principais fontes de ideias para gerar hipóteses científicas?

- Revisão das práticas atuais. 171
- Desafio a ideias aceitas. 171
- Conflito entre ideias divergentes. 171
- Variações regionais, temporais e populacionais. 171
- Experiências dos próprios pesquisadores. 171
- Imaginação sem fronteiras ou limites convencionais.¹⁷¹

15.3 Testes de hipóteses

15.3.1 O que é hipótese nula?

• A hipótese nula (H_0) é uma expressão que representa o estado atual do conhecimento (*status quo*), em geral a não existência de um determinado efeito. 126

15.3.2 O que é hipótese alternativa?

• A hipótese alternativa (H_1) é uma expressão que contém as situações que serão testadas, de modo que um resultado positivo indique alguma ação a ser conduzida. 126

15.3.3 Qual hipótese está sendo testada?

- A hipótese nula (H_0) é a hipótese sob teste em análises inferenciais. 102
- Pode-se concluir sobre rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula (H_0) . ¹⁰²
- Não se conclui sobre a hipótese alternativa (H_1) . ¹²⁶
- Para testar a hipótese nula, deve-se selecionar o nível de significância crítica (P-valor de corte); a probabilidade de rejeitarmos uma hipótese nula verdadeira (α); e a probabilidade de não rejeitarmos uma hipótese nula falsa (β). 168

15.3.4 Quais são os tipos de teste de hipóteses?

- Teste (clássico) de significância da hipótese nula. 172
- Teste de mínimos efeitos. 172
- Teste de equivalência. 172
- Teste de inferioridade. 172
- Teste de não-inferioridade.[REF]
- Teste de superioridade.[REF]

15.3.5 O que é uma família de hipóteses?

• .[REF]

15.4. PODER DO TESTE 81

15.3.6 O que são testes ad hoc e post hoc?

• .[REF]

15.3.7 Como ajustar a análise inferencial para hipóteses múltiplas?

• .[REF]



O pacote stats⁶⁸ fornece a função p.adjust^a para ajustar o P-valor utilizando diversos métodos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/p.adjust

15.3.8 O que são testes unicaudais e bicaudais?

• .[REF]

15.3.9 O que reportar após um teste de hipótese?

- P-valores, como estimativa da significância estatística.
- Tamanho do efeito, como estimativa de significância substantiva (clínica). 173

15.4 Poder do teste

15.4.1 O que é poder do teste?

- Poder do teste é a probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula (H_0) quando esta é falsa. ¹⁶⁸
- Poder do teste pode ser calculado como (1β) . ¹⁶⁸

15.4.2 O que é análise de poder do teste?

- Poder é a probabilidade de que um dado tamanho de efeito será observado em um experimento futuro sob um conjunto de hipóteses - tamanho de efeito real e erro tipo I - para um dado tamanho de amostra.
- O objetivo geral da análise de poder ao projetar um estudo é escolher um tamanho de amostra que controle os 2 tipos de erros de inferência estatística: tipo I (α , resultado falso-positivo) e tipo II (β , resultado falso-negativo). ¹⁷⁴
- Numericamente, o poder de um estudo é calculado como $1-\beta$ e reportado em valor percentual. ¹⁷⁴

15.4.3 Quando realizar a análise de poder do teste?

- Na fase de projeto de pesquisa: a análise de poder para determinar o tamanho da amostra objetiva que o tamanho da amostra permita uma probabilidade razoável de detectar um efeito significativo pré-especificado.¹⁷⁴
- Após a coleta de dados: a análise de poder objetiva informar estudos futuros a respeito do tamanho da amostra necessário para a detecção de um efeito significativo pré-especificado.¹⁷⁴



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.2p.test^a$ para cálculo do poder do teste de proporção balanceado (2 amostras com mesmo número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.2p.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.2p2n.test^a$ para cálculo do do poder do teste de proporção não balanceado (2 amostras com diferente número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.2p.test



O pacote *pwr*¹⁷⁵ fornece a função *pwr.anova.test*^a para cálculo do poder do teste de análise de variância balanceado (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.anova.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.chisq.test^a$ para cálculo do poder do teste de qui-quadrado χ^2 .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.chisq.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.f2.test^a$ para cálculo do poder do teste com modelo linear geral.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.f2.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.norm.test^a$ para cálculo do poder do teste de média de uma distribuição normal com variância conhecida.

 ${\it a} https://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.norm.test$



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.p.test^a$ para cálculo do poder do teste de proporção (1 amostra).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.p.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.r.test^a$ para cálculo do do poder to teste de correlação (1 amostra).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.r.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.t.test^a$ para cálculo do poder do teste t de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.t.test

15.4. PODER DO TESTE 83



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.t2n.test^a$ para cálculo do poder do teste t de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.t2n.test



O pacote *longpower*¹⁷⁶ fornece a função *power.mmrm*^a para calcular o poder de testes com análises por modelo de regressão linear misto.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/longpower/versions/1.0.24/topics/power.mmrm



O pacote *Superpower*¹⁷⁷ fornece a função *power.ftest*^a para calcular o poder do teste por análise de testes F.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power.ftest



O pacote *Superpower*¹⁷⁷ fornece a função *power_oneway_between*^a para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator entre-sujeitos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power_oneway_between



O pacote Superpower¹⁷⁷ fornece a função power_oneway_within^a para calcular o poder do teste por análise de variância (ANOVA) de 1 fator intra-sujeitos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power_oneway_within



O pacote *Superpower*¹⁷⁷ fornece a função *power_oneway_ancova*^a para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANCOVA).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power_oneway_ancova



O pacote *Superpower*¹⁷⁷ fornece a função *power_twoway_between*^a para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 2 fatores entre-sujeitos.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power_twoway_between}$



O pacote *Superpower*¹⁷⁷ fornece a função *power_threeway_between*^a para calcular o poder do teste por análise de covariância (ANOVA) de 3 fatores entre-sujeitos.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/power_threeway_between



O pacote *InteractionPoweR*¹⁷⁸ fornece a função *power_interaction*^a para calcular o poder do teste por análise de efeito de interações.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/InteractionPoweR/versions/0.2.1/topics/power_interaction

15.4.4 Por que a análise de poder do teste *post hoc* é inadequada?

• A análise do poder é teoricamente incorreta, uma vez que a probabilidade calculada $1-\beta$ expressa a probabilidade de um evento futuro, o que não é mais relevante quando o evento de interesse já ocorreu. 146,174

15.4.5 O que pode ser realizado ao invés da análise de poder?

 Após a coleta e análise de dados, recomenda-se realizar a análise e interpretação dos resultados a partir do tamanho do efeito e do seu intervalo de confiança no nível de significância α pré-estabelecido.¹⁷⁴

15.5 Interpretação de análise inferencial

Como interpretar uma análise inferencial?

- Testes de hipótese nula (H_0) vs. alternativa (H_1) a partir de um nível de significância (α) pré-especificado. 179
- P-valor como evidência estatística sobre (H_0) . 179
- Estimação de intervalos de confiança de um nível de significância (α) pré-especificado bicaudal $(IC_{1-\alpha/2})$ ou unicaudal $(IC_{1-\alpha})$. 179
- Análise Bayesiana.¹⁷⁹

15.5.1 O que são resultados 'positivos' e 'negativos' ou inconclusivos em teste de hipótese?

- Resultados 'positivos' compreendem um P-valor dentro da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: P < 0,05 ou outro ponto de corte) e sugerem que os autores rejeitem a hipótese nula H_0 , confirmando assim sua hipótese científica. ¹⁸⁰
- Resultados 'negativos' ou inconclusivos compreendem um P-valor fora da zona crítica estatisticamente significativa (ex.: P ≥ 0,05 ou outro ponto de corte) e sugerem que os autores não rejeitem a hipótese nula H₀ porque o efeito observado é nulo, ou porque o estudo não possui poder suficiente para detectá-lo, não permitindo portanto afirmar a hipótese científica.¹⁸⁰

15.5.2 Qual a importância de resultados 'negativos'?

- Conhecer resultados negativos contribui com uma visão mais ampla do campo de estudo junto aos resultados positivos.¹⁸¹
- Resultados negativos permitem um melhor planejamento das pesquisas futuras e pode aumentar suas chances de sucesso.¹⁸¹

15.5.3 Resultados inconclusivos: Ausência de evidência ou evidência de ausência?

- Em estudos (geralmente com amostras grandes), resultados estatisticamente significativos (com P-valores menores do limiar pré-estabelecido, $P < \alpha$) podem não ser clinicamente relevantes. ¹⁸²
- Em estudos (geralmente com amostras pequenas), resultados estatisticamente não significativos (com P-valores iguais ou maiores do limiar pré-estabelecido, $P \ge \alpha$) não devem ser interpretados como evidência de inexistência do efeito. 182
- Geralmente é razoável aceitar uma nova conclusão apenas quando há dados a seu favor ('resultados positivos'). Também é razoável questionar se apenas a ausência de dados a seu favor ('resultados negativos') justifica suficientemente a rejeição de tal conclusão.

Tabela 15.1: Tabela de erros tipos I e II de inferência estatística.

	Hipótese nula H_0 é falsa	Hipótese nula ${\cal H}_0$ é verdadeira
Hipótese nula H_0 foi rejeitada	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo I)
Hipótese nula H_0 não foi rejeitada	Decisão incorreta (erro tipo II)	Decisão correta

Tabela 15.2: Tabela de erro tipo S de inferência estatística.

	Sinal positivo	Sinal negativo
Sinal positivo	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo S)
Sinal negativo	Decisão incorreta (erro tipo S)	Decisão correta

15.6 Erros de inferência

15.6.1 O que são erros de inferência estatística?

- Um erro de inferência é a tomada de decisão incorreta, seja a favor ou contra a hipótese nula H_0 . 168

15.6.2 O que são erros tipo I e tipo II?

- Erro tipo I significa a rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é verdadeira. 168
- Erro tipo II significa a não rejeição de uma hipótese nula (H_0) quando esta é falsa. 168

15.6.3 O que são erros tipo S e tipo M?

- .[REF]
- .[REF]

Tabela 15.3: Tabela de erro tipo M de inferência estatística.

	Magnitude alta	Magnitude baixa
Magnitude alta	Decisão correta	Decisão incorreta (erro tipo M)
Magnitude baixa	Decisão incorreta (erro tipo M)	Decisão correta



Tamanho do efeito e P-valor

16.1 Tamanho do efeito

16.1.1 O que é o tamanho do efeito?

 Tamanho do efeito quantifica a magnitude de um efeito real da análise, expressando uma importância descritiva dos resultados.¹⁸³

16.1.2 Quais são os tipos de tamanho do efeito?

- Diferenças padronizadas entre grupos: 173,183
 - Cohen's d
 - Glass's Δ
 - Razão de chances (RC ou OR)
 - Risco relativo ou razão de risco (RR)
- Medidas de associação: 173,183
 - Coeficiente de correlação de Pearson (r), ponto-bisserial (r_s) , Spearman (ρ) , Kendall (τ) , Cramér (V) e ϕ .
 - Coeficiente de determinação (R^2)

16.1.3 Como converter um tamanho de efeito em outro?

• 183



O pacote *effectsize*¹⁸⁴ fornece diversas funções para conversão de diferentes estimativas de tamanhos de efeito.

16.1.4 Como interpretar um tamanho do efeito?

• Tamanhos de efeito podem ser comparadores entre diferentes estudos. ¹⁷³



O pacote *effectsize*¹⁸⁴ fornece a função *rules*^a para criar regras de interpretação de tamanhos de efeito.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/effectsize/versions/0.8.3/topics/rules



O pacote *effectsize*¹⁸⁴ fornece a função *interpret*^a para interpretar os tamanhos de efeito com base em uma lista de regras pré-definidas.

 $^a https://www.rdocumentation.org/packages/effectsize/versions/0.8.3/topics/interpret$



O pacote *pwr*¹⁷⁵ fornece a função *cohen.ES*^a para obter os tamanhos de efeito "pequeno", "médio" e "grande" para diversos testes de hipóteses.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/cohen.ES

16.2 Efeito fixo

16.2.1 O que é efeito fixo?

• .[REF]

16.3 Efeito aleatório

16.3.1 O que é efeito aleatório?

• .[REF]

16.4 Efeito principal

16.4.1 O que é efeito principal?

• .185

16.5 Efeito de modificação

16.5.1 O que é um modificador de efeito?

• .185

16.5.2 O que é efeito de modificação?

• 185

16.6 Efeito de interação

16.6.1 O que é efeito de interação?

- A interação representada pelo símbolo * é o termo estatístico empregado para representar a heterogeneidade de um determinado efeito.¹⁸⁶
- .185




Figura 16.1: Análise de efeito de interação (direta) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.




Figura 16.2: Análise de efeito de interação (inversa) entre grupos e tempo. Retas paralelas sugerem ausência de efeito de interação.



O pacote *nlme*¹⁸⁷ fornece a função *nlme*^a para ajustar um modelo de regressão misto não linear.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/nlme/versions/3.1-163/topics/nlme



O pacote $mmrm^{188}$ fornece a função $mmrm^a$ para ajuste de um modelo de regressão misto linear.

^ahttps://rdrr.io/cran/mmrm/man/mmrm.html



O pacote *emmeans*¹⁸⁹ fornece a função *emmeans*^a para calcular as médias marginais dos fatores e suas combinações de um modelo de regressão misto linear.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/emmeans/versions/1.8.7/topics/emmeans

16.7 Efeito de mediação

16.7.1 O que é um mediador de efeito?

- .190
- .185

16.7.2 O que é efeito de mediação?

- .190
- .185

16.7.3 O que é efeito direto?

- .190
- . 185

16.7.4 O que é efeito indireto?

- 190
- . 185

16.7.5 O que é efeito total?

- .190
- .185

16.8 Efeitos brutos e padronizados

16.8.1 O que é efeito bruto?

- .191
- .192

16.8.2 O que é efeito padronizado?

- .191
- .192

16.9 P-valor

16.9.1 O que é significância estatística?

• A expressão "significância estatística" ou "evidência estatística de significância" sugere apenas que um experimento merece ser repetido, uma vez que um baixo P-valor (calculado a partir dos dados, modelos e demais suposições do estudo) sugere ser improvável que os dados coletados sejam coletados no contexto de que a hipótese nula H_0 assumida é verdadeira. ¹⁹⁴

16.9.2 Como justificar o nível de significância estatística de um teste?

• .[REF]



O pacote $Superpower^{177}$ fornece a função $optimal_alpha^a$ para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/optimal_alpha



O pacote $Superpower^{177}$ fornece a função $ANOVA_compromise^a$ para calcular e justificar o nível de significância α por balanço dos erros tipo I e II em análise de variância (ANOVA).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/Superpower/versions/0.2.0/topics/ANOVA_compromise

16.9.3 O que é o P-valor?

- P-valor é a probabilidade, assumindo-se um dado modelo estatístico, de que um efeito calculado a partir dos dados seria igual ou mais extremo do que o seu valor observado.¹⁹⁵
- P-valor é uma variável aleatória que possui distribuição uniforme quando a hipótese nula H_0 é verdadeira. 196

16.9.4 Como interpretar o P-valor?

- P-valores podem indicar quantitativamente a incompatibilidade entre os dados obtidos e o modelo estatístico especificado a priori (geralmente constituído pela hipótese nula H_0). ¹⁹⁵
- P-valores menores/maiores do que o nível de significância estatístico pré-estabelecido não devem ser utilizados como única fonte de informação para tomada de decisão em ciência.

- P-valor resulta da coleta e análise de dados, e assim quantifica a plausibilidade dos dados observados sob a hipótese nula H_0 . ¹⁹⁷
- P-valores abaixo de um nível de significância estatística pré-especificado representam que um experimento merece ser repetido, com a rejeição da hipótese nula H_0) justificada apenas quando experimentos adicionais frequentemente reportem igualmente resultados positivos (rejeição da hipótese nula H_0). 179

16.9.5 O que o P-valor não é?

- P-valor não representa a probabilidade de que a hipótese nula H_0) seja verdadeira, nem a probabilidade de que os dados tenham sido produzidos pelo acaso. ¹⁹⁵
- P-valor não mede o tamanho do efeito ou a relevância da sua observação. 195
- P-valor sozinho não provê informação suficiente sobre a evidência sobre um modelo teórico. A sua interpretação correta requer uma descrição ampla sobre o delineamento, métodos e análises estatísticas aplicados no estudo.¹⁹⁵
- Evidência estatística de significância não provê informação sobre a magnitude do efeito observado e não necessariamente implica que o efeito é robusto. 137,196

16.9.6 Qual a origem do 'P<0,05'?

• .[REF]

16.9.7 Quais são os complementos ou alternativas ao P-valor?

- Intervalos de confiança, credibilidade ou predição. 195
- Razão de verossimilhança.¹⁹⁵
- Métodos Bayesianos, fator Bayes. 195

Parte 3 - Estatística Aplicada



Seleção de testes

17.1 Multiverso de análises estatísticas

17.1.1 Por que escolher o teste é um problema?

- Analisar a mesma hipótese com o mesmo banco de dados pode resultar em diferenças substanciais nas estimativas estatísticas e nas conclusões.¹⁹⁸
- As decisões para especificação das análises estatísticas podem ser tão minuciosas que muitas vezes nem sequer são registadas como decisões e, assim, podem impactar na reprodutibilidade do estudo.¹⁹⁸

17.2 Escolha de testes para análise inferencial

17.2.1 Como selecionar os testes para a análise estatística inferencial?

- 199
- 200
- .201
- 202
- 203
- 204
- .205
- .206



Testes estatísticos

18.1 Scripts compartilhados

18.1.1 Descricao

- extracolumn-es.R¹
- extracolumn-N.R²
- extracolumn-p.R³
- pilotdata_gopal.R4

18.1.2 Desempenho diagnostico

- diag-stats.R⁵
- dtROC.R⁶
- stROC.R⁷

18.1.3 Ensaio experimental aleatorizado

- RCT-Figure1.R⁸
- RCT-Missingness.R⁹
- RCT-Table1.R¹⁰
- RCT-Table2a.R11
- RCT-Table2b.R¹²
- RCT-Table3.R¹³

¹https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Descricao/extracolumn-es.R

²https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Descricao/extracolumn-N.R

³https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Descricao/extracolumn-p.R

⁴https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Descricao/pilotdata_gopal.R

⁵https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Desempenho%20diagnostico/diag-stats.R

⁶https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Desempenho%20diagnostico/dtROC.R

 $^{^{7}} https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Desempenho\%20 diagnostico/stROC.R$

⁸https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20aleatorizado/RCT-Figure1.R

⁹ https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20aleatorizado/RCT-Missingness.R

 $^{^{10}} https://github.com/Ferreira AS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio\% 20 experimental\% 20 aleatorizado/RCT-Table 1.R. and the communication of the commun$

¹¹ https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20aleatorizado/RCT-Table2a.R ¹² https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20aleatorizado/RCT-Table2b.R

¹³https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20aleatorizado/RCT-Table3.R

18.1.4 Ensaio experimental cruzado

- crossover.R14
- RSTR-crossover-trial.R¹⁵

18.1.5 Propriedades psicometricas

• reliability-kappa-icc.R¹⁶

18.1.6 Regressao

- mediation-analysis.R¹⁷
- regression-diagnosis.R¹⁸



O pacote *base*⁶³ fornece a função *source*^a para abrir um arquivo .R com script e executar seus comandos.

 ${\it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/source$

18.2 Testes de Qui-quadrado (χ^2)

```
# carrega os pacotes
library("dplyr")
library("gtsummary")
# tabela 2x2
tbl_cross <-
  # banco de dados
  trial %>%
  # cria a tabela de contingência
  gtsummary::tbl_cross(
    row = trt,
    col = response,
    statistic = \{n\},
    digits = 0,
    percent = "cell",
    margin = c("row", "column"),
    missing = "no",
    missing_text = "Dados perdidos",
    margin_text = "Total"
  # calcula o p-valor do teste
  gtsummary::add_p(
    test = "chisq.test",
    pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3)
  ) %>%
```

¹⁴https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20cruzado/crossover.R

¹⁵https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Ensaio%20experimental%20cruzado/RSTR-crossover-trial.R

 $^{^{16}} https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Propriedades\% 20 psicometricas/reliability-kappa-icc. Results for the complex of the complex$

 $^{^{17}} https://github.com/FerreiraAS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Regressao/mediation-analysis.R$

 $^{^{18}} https://github.com/Ferreira AS/Ciencia-com-R/blob/main/R/Regressao/regression-diagnosis. Regressao/regression-diagnosis. Regressao/r$

```
gtsummary::modify_header(
    p.value = "**P-valor**"
) %>%
# calcula o tamanho do efeito
gtsummary::modify_table_styling(
    rows = NULL,
    footnote = as.character(rstatix::cramer_v(trt, response))
) %>%
# formata o titulo em negrito
gtsummary::bold_labels() %>%
# cria titulo da tabela
gtsummary::modify_caption(
    "Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)"
)

# exibe a tabela
tbl_cross %>%
gtsummary::as_hux_table()
```

Tabela 18.1: Teste Qui-quadrado (com correção de Yates)

Tumor Response

		0	1	Total	P-valor
Chemothera	apy Treatment				
Drug A		67	28	95	
Drug B		65	33	98	
Total		132	61	193	

```
# carrega os pacotes
library("dplyr")
library("gtsummary")
# tabela 2x2
tbl_cross <-
  # banco de dados
  trial %>%
  # cria a tabela de contingência
  gtsummary::tbl_cross(
   row = trt,
    col = response,
    statistic = \{n\},
   digits = 0,
   percent = "cell",
   margin = c("row", "column"),
   missing = "no",
   missing_text = "Dados perdidos",
   margin_text = "Total"
  ) %>%
  \# calcula o p-valor do teste
  gtsummary::add_p(
   test = "chisq.test.no.correct",
    pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3)
```

```
) %>%
  gtsummary::modify_header(
   p.value = "**P-valor**"
  ) %>%
  # calcula o tamanho do efeito
  gtsummary::modify_table_styling(
    rows = NULL,
    footnote = as.character(rstatix::cramer_v(trt, response))
  ) %>%
  # formata o título em negrito
  gtsummary::bold_labels() %>%
  # cria título da tabela
  gtsummary::modify_caption(
    "Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)"
# exibe a tabela
tbl_cross %>%
  gtsummary::as_hux_table()
```

Tabela 18.2: Teste Qui-quadrado (sem correção de Yates)

Tumor Response

O 1 Total P-valor Chemotherapy Treatment Drug A 67 28 95 Drug B 65 33 98 Total 132 61 193

18.3 Teste exato de Fisher

```
# carrega os pacotes
library("dplyr")
library("gtsummary")
# tabela 2x2
tbl_cross <-
  # banco de dados
  trial %>%
  # cria a tabela de contingência
  gtsummary::tbl_cross(
    row = trt,
    col = response,
    statistic = \{n\},
    digits = 0,
    percent = "cell",
    margin = c("row", "column"),
    missing = "no",
    missing_text = "Dados perdidos",
```

```
margin_text = "Total"
  ) %>%
  # calcula o p-valor do teste
  gtsummary::add_p(
   test = "fisher.test",
   pvalue_fun = function(x) style_pvalue(x, digits = 3)
  gtsummary::modify_header(
   p.value = "**P-valor**"
  ) %>%
  # calcula o tamanho do efeito
  gtsummary::modify_table_styling(
   rows = NULL,
   footnote = as.character(rstatix::cramer_v(trt, response))
  # formata o título em negrito
  gtsummary::bold_labels() %>%
  # cria título da tabela
  gtsummary::modify_caption(
    "Teste exato de Fisher"
# exibe a tabela
tbl_cross %>%
  gtsummary::as_hux_table()
```

Tabela 18.3: Teste exato de Fisher

Tumor Response

	0	1	Total	P-valor
Chemotherapy Treatmen	nt			
Drug A	67	28	95	
Drug B	65	33	98	
Total	132	61	193	



Plano de análise

- 19.1 Plano de análise estatística
- 19.1.1 O que é plano de análise estatística?
 - .[REF]



Descrição

20.1 Análise de descrição

20.1.1 O que é análise de descrição de dados?

• .[REF]



O pacote *esquisse*²⁰⁷ fornece a função *esquisser*^a para executar uma interface interativa para visualização de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/esquisse/versions/1.1.2/topics/esquisser

20.2 Estimação

20.2.1 O que é estimativa?

• Estimativa é o valor de uma variável de interesse calculado a partir de uma amostra.[REF]

20.2.2 O que é estimativa pontual?

• Estimativa pontual é o valor único de uma variável de interesse calculado a partir de uma amostra.[REF]

20.2.3 O que é estimativa intervalar?

• Estimativa intervalar é um intervalo de valores de uma variável de interesse calculado a partir de uma amostra.[REF]

20.2.4 O que é estimativa de parâmetro?

• Estimativa de parâmetro é o valor de uma variável de interesse calculado a partir de uma amostra que representa o valor da população.[REF]



Comparação

21.1 Análise inferencial de comparação

21.1.1 O que é análise de comparação de dados?

• .[REF]



O pacote $cocor^{208}$ fornece as funções cocor.indep.groups^a, cocor.dep.groups.overlap^b e cocor.dep.groups.nonoverlap^c para comparar 2 coeficientes de correlação entre grupos independentes, grupos sobrepostos ou independentes, respectivamente.²⁰⁹

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test

^chttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test



Correlação

22.1 Análise inferencial de correlação

22.1.1 O que é covariância?

• .[REF]

22.1.2 O que é correlação?

• .[REF]

22.1.3 Qual é a interpretação das medidas de correlação?

- Os valores de correlação estão no intervalo [-1;1]. 105,210,211
- Valores de correlação positivos representam uma relação direta entre as variáveis, tal que valores maiores de uma variável estão associados a valores maiores de outra variável.^{210,211}
- Valores de correlação negativos representam uma relação indireta (ou inversa) entre as variáveis, tal que valores maiores (menores) de uma variável estão associados a valores maiores (menores) de outra variável.^{210,211}
- Valores de correlação próximos de 0 representam a inexistência de relação entre as variáveis.^{210,211}

22.1.4 Quais precauções devem ser tomadas na interpretação de medidas de correlação?

- Tamanhos de efeito grande (ou qualquer outro) não representam necessariamente uma relação causa-efeito entre as variáveis.²¹⁰
- Tamanhos de efeito grande (ou qualquer outro) não representam necessariamente uma relação de concordância ou confiabilidade entre as variáveis. ²¹⁰
- Uma escala de medição com representação agregada do constructo na coleta de dados pode subestimar o tamanho do efeito da correlação r em de cerca de 13% e do coeficiente de determinação R^2 de cerca de 30%. Neste caso, a correlação desatenuada $r_{x'y'}$ pode ser calculada pela equação (22.1), utilizando a correlação observada r_{xy} e os fatores de correção $r_{xx'}$ e $r_{yy'}$ para o número de intervalos nas variáveis X e Y, respectivamennte: 66

$$r_{x'y'} = \frac{r_{xy}}{r_{xx'}r_{m'}} \tag{22.1}$$




Figura 22.1: Exemplo de diferentes forças e direção de correlação entre duas variáveis X e Y.



O pacote $psychmeta^{212}$ fornece a função $correct_r_coarseness^a$ para calcular o coeficiente de correlação desatenuado $(r_{x'y'})$.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/correct_r_coarseness



O pacote $psychmeta^{212}$ fornece a função $correct_r^a$ para calcular o coeficiente de correlação em escala restrita e/ou com erro de mensuração $(r_{x'y'})$.

- Os coeficientes de correlação possuem suposições que, se violadas, podem levar a interpretações equivocadas. Nestes cenários, visualizar os dados e as relações entre as variáveis pode contribuir com a interpretação e utilidade dos coeficientes de correlação.²¹³
- O *quarteto de Anscombe* é um conjunto de quatro bancos de dados bivariados que possuem a mesma média, variância, correlação e regressão linear (até a 2a casa decimal), mas que são visualmente diferentes e, assim, demonstram a importância da análise gráfica da correlação.²¹³



O pacote *anscombiser*²¹⁴ fornece a função *anscombise*^a para gerar bancos de dados que compartilham os mesmos valores de parâmetros do Quarteto de Anscombe.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/correct_r

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/anscombiser/versions/1.1.0/topics/anscombise

ID	x1	x2	х3	x4	y1	y2	y3	y4
1	10	10	10	8	8.04	9.14	7.46	6.58
2	8	8	8	8	6.95	8.14	6.77	5.76
3	13	13	13	8	7.58	8.74	12.74	7.71
4	9	9	9	8	8.81	8.77	7.11	8.84
5	11	11	11	8	8.33	9.26	7.81	8.47
6	14	14	14	8	9.96	8.10	8.84	7.04
7	6	6	6	8	7.24	6.13	6.08	5.25
8	4	4	4	19	4.26	3.10	5.39	12.50
9	12	12	12	8	10.84	9.13	8.15	5.56
10	7	7	7	8	4.82	7.26	6.42	7.91
11	5	5	5	8	5.68	4.74	5.73	6.89

Tabela 22.1: Quarteto de Anscombe.

Tabela 22.2: Análise descritiva do Quarteto de Anscombe demostrando os conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos.

	X1Y1	X2Y2	X3Y3	X4Y4
Observações	11.00	11.00	11.00	11.00
Média x	9.00	9.00	9.00	9.00
Média y	7.50	7.50	7.50	7.50
Variância x	11.00	11.00	11.00	11.00
Variância y	4.13	4.13	4.12	4.12
Correlação	0.82	0.82	0.82	0.82
Coeficiente angular	0.50	0.50	0.50	0.50
Coeficiente linear	3.00	3.00	3.00	3.00
Coeficiente de determinação	0.67	0.67	0.67	0.67

22.2 Coeficientes de correlação

22.2.1 Quais coeficientes podem ser usados em análises de correlação?

- Coeficiente de correlação de Pearson (r). 210,211
 - O coeficiente de correlação de Pearson (r) avalia a força e direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. 210,211
 - Tipo: paramétrico.^{210,211}
 - Hipóteses:²¹¹
 - * Nula (H_0) : r = 0
 - * Alternativa (H_1) : $r \neq 0$
 - Tamanho do efeito:^{210,211}
 - * Coeficiente de correlação de Pearson (r)



O pacote stats⁶⁸ fornece a função cor.test^a para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test



O pacote $correlation^{215}$ do projeto $easystats^{216}$ fornece a função $correlation^a$ para calcular o coeficiente de correlação de Pearson (r).

^ahttps://cloud.r-project.org/web/packages/correlation/index.html




Figura 22.2: Gráfico de dispersão do Quarteto de Anscombe para representação gráfica de conjuntos de dados bivariados com parâmetros quase idênticos e relações muito distintas.

- Coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_s) . 210
 - O coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_s) avalia a força e direção da relação linear entre uma variável quantitativa e outra dicotômica.²¹⁰
 - Tipo: paramétrico.²¹⁰
 - Hipóteses:²¹⁰
 - * Nula (H_0) : $r_s = 0$
 - * Alternativa (H_1): $r_s \neq 0$
 - Tamanho do efeito:²¹⁰
 - * Coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_s)



O pacote $stats^{68}$ fornece a função $cor.test^a$ para calcular o coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_s) .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test



O pacote $correlation^{215}$ do projeto $easystats^{216}$ fornece a função $correlation^a$ para calcular o coeficiente de correlação ponto-bisserial (r_s) .

• Coeficiente de correlação de Spearman (ρ) . 210,211

^ahttps://cloud.r-project.org/web/packages/correlation/index.html

- O coeficiente de correlação de Spearman (ρ) avalia a força e direção da relação monotônica entre duas variáveis quantitativas. ^{210,211}
- O coeficiente de correlação de Spearman (ρ) pode ser também definida como a correlação de Pearson (r) entre as classificações (ranks) das duas variáveis quantitativas. ^{210,211}
- Tipo: não-paramétrico.^{210,211}
- Hipóteses:^{210,211}
 - * Nula (H_0) : $\rho = 0$
 - * Alternativa (H_1) : $\rho \neq 0$
- Tamanho do efeito: 210,211
 - * Coeficiente de correlação de Spearman (ρ)



O pacote $stats^{68}$ fornece a função $cor.test^a$ para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test



O pacote $correlation^{215}$ do projeto $easystats^{216}$ fornece a função $correlation^a$ para calcular o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) .

^ahttps://cloud.r-project.org/web/packages/correlation/index.html

- Coeficiente de Kendall (τ) . ^{210,211}
 - -O coeficiente Kendall τ avalia a força e direção da relação monotônica entre duas variáveis quantitativas ou qualitativas. 210,211
 - O coeficiente Kendall τ é definido como a proporção de todos os pares concordantes menos a proporção de todos os pares discordantes. 210,211
 - Tipo: não-paramétrico.^{210,211}
 - Hipóteses:^{210,211}
 - * Nula (H_0) : $\tau = 0$
 - * Alternativa (H_1) : $\tau \neq 0$
 - Tamanho do efeito:^{210,211}
 - * Kendall τ



O pacote $stats^{68}$ fornece a função $cor.test^a$ para calcular o coeficiente Kendall τ .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.6.2/topics/cor.test



O pacote $correlation^{215}$ do projeto $easystats^{216}$ fornece a função $correlation^a$ para calcular o coeficiente Centiciente Kendall τ .

^ahttps://cloud.r-project.org/web/packages/correlation/index.html

- Coeficiente de Cramér (V).[REF]
 - O coeficiente Cramér (V) avalia a força e direção da relação entre duas variáveis qualitativas.[REF]
 - Tipo: não-paramétrico.[REF]

- Hipóteses:[REF]
 - * Nula (H_0) : V = 0
 - * Alternativa (H_1) : $V \neq 0$
- Tamanho do efeito:[REF]
 - * Coeficiente Cramer (V)
- Coeficiente de Sheperd ϕ .[REF]
 - O coeficiente Phi (ϕ) avalia a força e direção da relação entre duas variáveis dicotômicas.[REF]
 - Tipo: não-paramétrico.[REF]
 - Hipóteses:[REF]
 - * Nula (H_0) : $\phi = 0$
 - * Alternativa (H_1) : $\phi \neq 0$
 - Tamanho do efeito:[REF]
 - * Coeficiente Phi (ϕ)



O pacote $correlation^{215}$ do projeto $easystats^{216}$ fornece a função $correlation^a$ para calcular o coeficiente coeficiente Sheperd ϕ .

^ahttps://cloud.r-project.org/web/packages/correlation/index.html



O pacote $corrplot^{217}$ fornece a função $cor.mtest^a$ para calcular os P-valores e intervalos de confiança da matriz de correlação.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/corrplot/versions/0.92/topics/cor.mtest



O pacote $corrplot^{217}$ fornece a função $corrplot^a$ para visualização da matriz de correlação.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/corrplot/versions/0.92/topics/corrplot/packages/corrplot$

Redes

23.1 Análise de redes

23.1.1 O que é análise de rede?

• .[REF]



O pacote $cooccur^{218}$ fornece a função $cooccur^a$ para criar calcular a coocorrência de objetos em um banco de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/cooccur/versions/1.3/topics/cooccur

116 CAPÍTULO 23. REDES



Associação

24.1 Análise inferencial de associação

24.1.1 O que é análise de associação?

• .[REF]

24.2 Associação bivariada

24.2.1 O que são análises de associação bivariada?

• .[REF]

24.2.2 Quais testes podem ser usados para análises de associação bivariada?

- Teste Qui-quadrado (χ^2) . 219,220
 - O teste qui-quadrado (χ^2) avalia uma hipótese global se a relação entre duas variáveis e/ou fatores é independente ou associada. ²²⁰
 - O teste qui-quadrado é utilizado para comparar a distribuição de uma variável categórica em uma amostra ou grupo com a distribuição em outro. Se a distribuição da variável categórica não for muito diferente nos diferentes grupos, pode-se concluir que a distribuição da variável categórica não está relacionada com a variável dos grupos. Pode-se também concluir que a variável categórica e os grupos são independentes.²²⁰
 - Tipo: não paramétrico.^{219,220}
 - Suposições:^{219,220}
 - * As variáveis são ordinais ou categóricas nominais, de modo que as células representem frequência.
 - * Os níveis dos fatores (variáveis categóricas) são mutuamente exclusivos.
 - * Tamanho de amostra grande e adequado porque é baseado em uma abordagem de aproximação.
 - * Menos de 20% das células com frequências esperadas < 5
 - * Nenhuma célula com frequência esperada < 1.
 - Hipóteses:²²⁰
 - st Nula (H_0) : independente (sem associação)
 - * Alternativa (H_1) : não independente (associação)
 - Tamanho do efeito:²²⁰
 - * Phi (ϕ) , para tabelas de contingência 2x2

- * Razão de chances (RC ou OR), para tabelas de contingência 2x2
- * Cramer V (V), para tabelas de contingência NxM



O pacote gtsummary²²¹ fornece a função tbl_cross^a para criar uma tabela NxM.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/gtsummary/versions/1.6.3/topics/tbl cross

- Teste Exato de Fisher (χ^2) . ^{219,220}
 - O teste exato de Fisher avalia a hipótese nula de independência aplicando a distribuição hipergeométrica dos números nas células da tabela.²²⁰
 - Hipóteses:^{219,220}
 - * Nula (H_0) : independente (sem associação)
 - * Alternativa (H_1) : não independente (associação)
 - Tamanho do efeito:^{219,220}
 - * Phi (ϕ) , para tabelas de contingência 2x2
 - * Razão de chances (RC ou OR), para tabelas de contingência 2x2
 - * Cramer V (V), para tabelas de contingência NxM



O pacote gtsummary²²¹ fornece a função tbl cross^a para criar uma tabela NxM.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/gtsummary/versions/1.6.3/topics/tbl_cross

24.3 Associação multivariada

- 24.3.1 O que são análises de associação multivariada?
 - .[REF]
- 24.3.2 Quais testes podem ser usados para análises de associação multivariada?
 - .[REF]

Modelos

25.1 Modelos estatísticos

25.1.1 O que são modelos?

 Modelos estatísticos são representações matemáticas de fenômenos naturais ou artificiais que descrevem a relação entre variáveis.[REF]



O pacote $equatiomatic^{222}$ fornece a função $extract_eq^a$ para extrair a equação dos modelos em formato LaTeX para visualização.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/equatiomatic/versions/0.3.1/topics/extract_eq

25.2 Predição via modelagem

25.2.1 O que são predições?

• .[REF]



O pacote *ggeffects*²²³ fornece a função *predict_response*^a para calcular valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/ggeffects/versions/1.6.0/topics/predict_response



O pacote *ggeffects*²²³ fornece a função *test_response*^a para testar valores preditos marginais ou ajustados das variáveis de desfecho.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/ggeffects/versions/1.6.0/topics/test_response}$

25.3 Suposições dos modelos

25.3.1 Quais suposições são feitas para modelagem?

• .[REF]

25.3.2 Como avaliar as suposições de um modelo?

• .[REF]



O pacote *performance*²²⁴ fornece a função *check_model*^a para analisar a colinearidade entre variáveis, a normalidade da distribuição das variáveis e a heteroscedasticidade.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/performance/versions/0.10.4/topics/check model

25.4 Avaliação de modelos

25.4.1 O que é qualidade de ajuste de um modelo?

• .[REF]

25.4.2 Como avaliar a qualidade de ajuste de um modelo?

• .[REF]



O pacote *performance*²²⁴ fornece a função *model_performance*^a para calcular as métricas de ajuste da regressão adequadas ao modelo pré-especificado.

 ${\it a} https://www.rdocumentation.org/packages/performance/versions/0.10.4/topics/model_performance/versions/0.10.4/to$



O pacote *performance*²²⁴ fornece a função *compare_performance*^a para comparar o desempenho e a qualidade do ajuste de diversos modelos de regressão pré-especificados.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/performance/versions/0.10.4/topics/compare_performance/versions/0$

Regressão

26.1 Análise de regressão

26.1.1 O que é regressão?

- Regressão refere-se a uma equação matemática que permite que uma ou mais variável(is) de desfecho (dependentes) seja(m) prevista(s) a partir de uma ou mais variável(is) independente(s). A regressão implica em uma direção de efeito, mas não garante causalidade. 180
- Para estimar os efeitos imparciais de um fator de exposição primária sobre uma variável de desfecho, frequentemente constroem-se modelos estatísticos de regressão.¹⁵⁸



O pacote $modelsummary^{225}$ fornece as funções $modelsummary^a$ e $modelplot^b$ para gerar tabelas e gráficos de coeficientes de regressão.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/modelsummary/versions/1.4.1/topics/modelsummary

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/modelsummary/versions/1.4.1/topics/modelplot



O pacote *gtsummary*¹⁵³ fornece a função *tbl_regression*^a para construção da 'Tabela 2' com dados do modelo de regressão.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/gtsummary/versions/1.6.3/topics/tbl_regression

26.1.2 Quais são os algoritmos de regressão?

- Linear.[REF]
- · Polinomial.[REF]
- Ridge.[REF]
- Lasso.[REF]

26.1.3 O que são análises de regressão simples?

 A análise de regressão simples consiste em modelos estatísticos com 1 variável dependente (desfecho) e 1 variável independente (preditor).²²⁶

26.1.4 O que são análises de regressão multivariável?

• A análise multivariável (ou múltiplo) consiste em modelos estatísticos com 1 variável dependente (desfecho) e duas ou mais variáveis independentes. ²²⁶

26.1.5 O que são análises de regressão multivariada?

 A análise multivariada consiste em modelos estatísticos com 2 ou mais variáveis dependente (desfechos) e duas ou mais variáveis independentes.²²⁶

26.1.6 O que são análises de regressão linear?

• .[REF]

26.1.7 O que são análises de regressão não-linear?

• .[REF]

26.1.8 O que são análises de regressão logística?

• .[REF]

26.2 Preparação de variáveis para regressão

26.2.1 Como preparar as variáveis categóricas para análise de regressão?

- Variáveis fictícias (dummy) compreendem variáveis criadas para introduzir, nos modelos de regressão, informações contidas em outras variáveis que não podem ser medidas em escala numérica.²²⁷
- Variáveis categóricas nominais, com 2 ou mais níveis, devem ser subdivididas em variáveis fictícias dicotômicas para ser usada em modelos de regressão.²²⁸
- Cada nível da variável categórica nominal será convertido em uma nova variável fictícias dicotômica, tal que a nova variável dicotômica assume valor 1 para a presença do nível correspondente e 0 em qualquer outro caso.²²⁸



O pacote *fastDummies*²²⁹ fornece a função *dummy_cols*^a para preparar as variáveis categóricas fictícias para análise de regressão.

26.3 Redução de dimensionalidade para regressão

26.3.1 Correlação bivariada pode ser usada para seleção de variáveis em modelos de regressão multivariável?

- Seleção bivariada de variáveis isto é, aplicação de testes de correlação em pares de variáveis candidatas e variável de desfecho afim de selecionar quais serão incluídas no modelo multivariável é um dos erros mais comuns na literatura. 197,230,231
- A seleção bivariada de variáveis torna o modelo mais suscetível a otimismo no ajuste se as variáveis de confundimento não são adequadamente controladas.^{230,231}

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/fastDummies/versions/1.7.3/topics/dummy columns

26.3.2 Variáveis sem significância estatística devem ser excluídas do modelo final?

- Eliminar uma variável de um modelo significa anular o seu coeficiente de regressão ($\beta=0$), mesmo que o valor estimado pelos dados seja outro. Desta forma, os resultados se afasTAM de uma solução de máxima verossimilhança (que tem fundamento teórico) e o modelo resultante é intencionalmente subótimo. 197
- Os coeficientes de regressão geralmente dependem do conjunto de variáveis do modelo e, portanto, podem mudam de valor ("mudança na estimativa" positiva ou negativa) se uma (ou mais) variável(is) for(em) eliminada(s) do modelo.¹⁹⁷

26.3.3 Por que métodos de regressão gradual não são recomendados para seleção de variáveis em modelos de regressão multivariável?

- Métodos diferentes de regressão gradual podem produzir diferentes seleções de variáveis de um mesmo banco de dados.²²⁸
- Nenhum método de regressão gradual garante a seleção ótima de variáveis de um banco de dados.²²⁸
- As regras de término da regressão baseadas em P-valor tendem a ser arbitrárias.

26.3.4 O que pode ser feito para reduzir o número de variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável?

• Verifique a existência de multicolinearidade entre as variáveis candidatas.²³¹




Figura 26.1: Multicolinearidade entre variáveis candidatas em modelos de regressão multivariável.

• Em caso de uma proporção baixa entre o número de participantes e de variáveis, use o conhecimento prévio da literatura para selecionar um pequeno conjunto de variáveis candidatas.²³¹

- Colapse categorias com contagem nula (células com valor igual a 0) de variáveis candidatas.²³¹
- Use simulações de dados para identificar qual(is) variável(is) está(ão) causando problemas de convergência do ajuste do modelo.²³¹
- A eliminação retroativa tem sido recomendada como a abordagem de regressão gradual mais confiável entre aquelas que podem ser facilmente alcançadas com programas de computador.

Árvore de decisão

- 27.1 Árvore de decisão
- 27.1.1 O que é árvore de decisão?



Aprendizagem de máquina

28.1 Aprendizagem de máquina

28.1.1 O que é aprendizagem de máquina?

• .[REF]

28.1.2 Quais são os principais algoritmos de aprendizagem de máquina?

- Regressão linear: .[REF]
- Árvores de decisão: .[REF]
- Máquinas de vetores de suporte: .[REF]
- Regressão logística: .[REF]
- K-médias: .[REF]
- K-vizinhos mais próximos: .[REF]
- Redes neurais: .[REF]
- Florestas aleatórias: .[REF]
- Análise de componentes principais: .[REF]
- Naive Bayes: .[REF]

28.2 Aprendizagem supervisionada

• .[REF]

28.3 Aprendizagem não-supervisionada

• .[REF]

28.4 Aprendizagem por reforço

28.5 Aprendizagem profunda



Parte 4 - Metodologia da Pesquisa Aplicada



Delineamento de estudos

29.1 Critérios de delineamento

- 29.1.1 Quais critérios são utilizados para classificar os delineamentos de estudos?
 - .[REF]
- 29.2 Alocação
- 29.2.1 O que é alocação?
 - .[REF]

29.3 Cegamento

- .[REF]
- 29.3.1 O que é cegamento?
- 29.4 Pareamento

29.4.1 O que é pareamento?

- Pareamento significa que para cada participante de um grupo (por exemplo, com alguma condição clínica), existe um (ou mais) participantes (por exemplo, grupo controle) que possui características iguais ou similares relativas a algumas variáveis de interesse.²³²
- As variáveis escolhidas para pareamento devem ter relação com as variáveis de desfecho, mas não são de interesse elas mesmas.²³²
- O ajuste por pareamento deve ser incluído nas análises estatísticas mesmo que as variáveis de pareamento não sejam consideradas prognósticas ou confundidores na amostra estudada.²³²
- A ausência de evidência estatística de diferença entre grupos não é considerada pareamento.²³²

29.5 Aleatorização

29.5.1 O que é aleatorização?

• .[REF]

29.6 Taxonomia de estudos

29.6.1 Como podem ser classificados os estudos científicos?

- Estudos científicos podem ser classificados em *básicos*, *observacionais*, *experimentais*, *acurácia diagnóstica*, *propriedades psicométricas*, *avaliação econômica* e *revisões de literatura*:^{233–242}
- Estudos básicos^{234,239}
 - Genética
 - Celular
 - Experimentos com animais
 - Desenvolvimento de métodos
- Estudos de simulação computacional^{240,242}
- Estudos de propriedades psicométricas^{235,237}
 - Validade
 - Concordância
 - Confiabilidade
- Estudos de desempenho diagnóstico^{238,241}
 - Transversal
 - Caso-Controle
 - Comparativo
 - Totalmente pareado
 - Parcialmente pareado com subgrupo aleatório
 - Parcialmente pareado com subgrupo não aleatório
 - Não pareado aleatório
 - Não pareado não aleatório
- Estudos observacionais^{234,239}
 - Descritivo
 - * Estudo de caso
 - * Série de casos
 - * Transversal
 - Analítico
 - * Transversal
 - * Caso-Controle
 - · Caso-Controle aninhado
 - · Caso-Coorte
 - Coorte prospectiva ou retrospectiva

- Estudos quase-experimentais²³⁶
 - Quase-aleatorizado controlado
 - Estimação de variável instrumental
 - Descontinuidade de regressão
 - Série temporal interrompida controlada
 - Série temporal interrompida
 - Diferença
- Estudos experimentais^{234,239}
 - Fases I a IV
 - * Aleatorizado controlado
 - * Não-aleatorizado controlado
 - * Autocontrolado
 - * Cruzado
 - * Fatorial
 - Campo
 - Comunitário
- Estudos de avaliação econômica²³⁴
 - Análise de custo
 - Análise de minimização de custo
 - Análise de custo-utilidade
 - Análise de custo-efetividade
 - Análise de custo-benefício
- Estudos de revisão²³³
 - Estado-da-arte
 - Narrativa
 - Crítica
 - Mapeamento
 - Escopo
 - Busca e revisão sistemática
 - Sistematizada
 - Sistemática
 - * Meta-análise
 - * Bibliométrica.^{243,244}
 - Sistemática qualitativa
 - Mista
 - Visão geral
 - Rápida
 - Guarda-chuva



Tamanho da amostra

30.1 Tamanho da amostra

30.1.1 O que é tamanho da amostra?

- Tamanho da amostra n é a quantidade de participantes (ou unidades de análise) necessárias para conduzir um estudo a fim de testar uma hipótese. ²⁴⁵
- 12

30.1.2 Por que determinar o tamanho da amostra é importante?

- É virtualmente impossível, devido a limitações de recursos tempo, acesso, custo, dentre outros coletar dados da população completa.⁷
- Uma amostra muito pequena para o estudo pode resultar em ajuste exagerado, imprecisão e baixo poder do teste.⁷²

30.1.3 Quais fatores devem ser considerados para determinar o tamanho da amostra?

- Tamanho da população (N): O tamanho da amostra depende parcialmente do tamanho da população de origem. Geralmente assume-se que a população tem tamanho desconhecido ou infinito. Em alguns estudos serão amostradas populações de tamanho finito (inferior a 100.000 indivíduos), geralmente em pesquisas descritivas, em que esse tamanho deve ser incorporado nos cálculos. 245
- Delineamento do estudo.²⁴⁵
- Quantidade e características (dependente vs. independente) dos grupos de participantes do estudo. 245
- Erros tipo I (α) e tipo II (β).²⁴⁵
- Tipo de variável a ser observada (contínua, intervalo, ordinal, nominal, dicotômica). 245
- Tamanho de efeito mínimo a ser observado. 245
- Variabilidade da(s) variável(eis) coletada(s). 245
- Lateralidade do teste de hipótese (uni- ou bicaudais). 245
- Perdas de dados durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.²⁴⁵



O pacote pwr^{175} fornece a função $plot.power.htest^a$ para apresentar graficamente a relação entre o tamanho da amostra e o poder de testes de hipóteses.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/plot.power.htest

30.1.4 Quais aspectos éticos estão envolvidos no tamanho da amostra?

- Determinar a priori o tamanho da amostra pode diminuir o risco de realizar testes ou intervenções desnecessários, de desperdício de recursos (tempo e dinheiro) associados e, por outro lado, de coletar dados insuficientes para testar as hipóteses do estudo.²⁴⁵
- O tratamento ético dos participantes do estudo, portanto, não exige que se considere se o poder do estudo é inferior à meta convencional de 80% ou 90%.²⁴⁶
- Estudos com poder <80% não são necessariamente antiéticos. ²⁴⁶
- Grandes estudos podem ser desejáveis por outras razões que não as éticas. ²⁴⁶

30.2 Cálculo do tamanho da amostra

30.2.1 Como calcular o tamanho da amostra?

- O tamanho amostral pode ser calculado por meio de fórmulas matemáticas que tendem a assegurar margens de erros tipos I (α) e II (β) para a estimação dos parâmetros populacionais (tamanho de efeito) a partir dos dados amostrais.²⁴⁵
- O tamanho da amostra deve ser calculado para cada um dos objetivos primários e/ou secundários, sendo escolhido o maior tamanho de amostra calculado para o estudo.²⁴⁵
- Geralmente é recomendado ser cético em relação às regras práticas para o tamanho da amostra, tais como a proporção entre o número de variáveis (ou eventos) e de participantes.⁷²

30.2.2 Como especificar o tamanho do efeito esperado?

- Estudo-piloto realizados nas mesmas condições do estudo, mas envolvendo um tamanho de amostra limitado pode ser útil na estimativa do tamanho da amostra a partir do tamanho do efeito estimado.²⁴⁵
- Utilizar os limites dos intervalos de confiança de estudos-piloto de ensaios clínicos como estimativa do tamanho do efeito pode aumentar o poder estatístico da análise se comparado ao uso das estimativas pontuais obtidas no mesmo piloto.²⁴⁷
- Embora os testes de hipótese considerem efeito nulo para a hipótese nula ex.: dferença de média $(H_0:\mu_1-\mu_2=0)$, correlação $(H_0:r=0)$, associação $(H_0:\beta=0)$ ou $H_0:OR=1)$ —, em geral é improvável que os efeitos populacionais sejam de fato nulos (isto é, exatamente 0). ²⁴⁸



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.2p.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção balanceados (2 amostras com mesmo número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.2p.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.2p2n.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção não balanceados (2 amostras com diferente número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.2p.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.anova.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de análise de variância balanceados (3 ou mais amostras com mesmo número de participantes).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.anova.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.chisq.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de qui-quadrado χ^2 .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.chisq.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.f2.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes com modelo linear geral.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.f2.test



O pacote *pwr*¹⁷⁵ fornece a função *pwr.norm.test*^a para cálculo do tamanho da amostra para a média de uma distribuição normal com variância conhecida.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.norm.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.p.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de proporção (1 amostra).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.p.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.r.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes de correlação (1 amostra).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.r.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.t.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes t de diferença de 1 amostra, 2 amostras dependentes ou 2 amostras independentes (grupos balanceados).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.t.test



O pacote pwr^{175} fornece a função $pwr.t2n.test^a$ para cálculo do tamanho da amostra para testes t de diferença de 2 amostras independentes (grupos não balanceados).

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pwr/versions/1.3-0/topics/pwr.t2n.test



O pacote *longpower*¹⁷⁶ fornece a função *power.mmrm*^a para calcular o tamanho da amostra para estudos com análises por modelo de regressão linear misto.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/longpower/versions/1.0.24/topics/power.mmrm

30.3 Perdas de amostra

30.3.1 O que é perda de amostra?

• Perda de amostra(s) — isto é, participante(s) ou unidade(s) de análise — pode ocorrer durante a coleta e/ou acompanhamento dos participantes do estudo.²⁴⁵

• Perda amostral pode ocorrer por: abandono ou desistência do participante, perda de contato com o participante, perda de informação, ocorrência de eventos adversos, morte do participante, entre outros.²⁴⁵

30.3.2 Por que a perda de amostra é um problema?

- A perda de amostra pode levar a uma redução do poder do estudo, aumentando a probabilidade de erro tipo II (β).[REF]
- A perda de amostra pode levar a um viés de seleção, pois os participantes que permanecem no estudo podem ser diferentes daqueles que foram perdidos.[REF]

30.3.3 Como evitar perda de amostra?

- A perda de amostra pode ser evitada por meio de um planejamento cuidadoso do estudo, incluindo a definição de critérios de inclusão e exclusão claros e apropriados, bem como a definição de estratégias para minimizar a perda de amostra.[REF]
- A perda de amostra pode ser compensada pelo aumento do tamanho da amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.²⁴⁵

30.4 Ajustes no tamanho da amostra

30.4.1 Por que ajustar o tamanho da amostra?

 O tamanho da amostra pode ser ajustado durante o estudo para compensar a perda de amostra, desde que o aumento seja suficiente para manter o poder do estudo.²⁴⁵

30.4.2 Como ajustar para perda amostral?

• Aumentar o tamanho da amostra estimada n pela porcentagem d de perdas esperada ou prevista, para obter o tamanho da amostra efetiva n' com base na equação (30.1):²⁴⁵

$$n' = \frac{n}{1 - d} \tag{30.1}$$

30.4.3 Como ajustar para confiabilidade?

• .[REF]

30.5 Justificativa do tamanho da amostra

30.5.1 Como justificar o tamanho da amostra de um estudo?

- Em estudos que envolvem condições raras, pode ser dificil recrutar o número necessário de participantes devido à limitada disponibilidade de casos da população. Mesmo assim, é aconselhável determinar o tamanho da amostra.²⁴⁵
- Quando um estudo deste tipo não é possível, as considerações referentes ao tamanho da amostra são justificadas de acordo com o número máximo de pacientes que podem ser recrutados no decorrer do estudo.²⁴⁵

Simulação computacional

31.1 Características

- 31.1.1 Quais são as características de estudos de simulação computacional?
 - .[REF]

31.2 Método de Monte Carlo

31.2.1 O que é o método de Monte Carlo?

• .[REF]



O pacote $base^{63}$ fornece a função $set.seed^a$ para especificar uma semente para reprodutibilidade de computações que envolvem números aleatórios.

 ${\it "https://www.rdocumentation.org/packages/base/versions/3.6.2/topics/Random} \\$



O pacote *simstudy*²⁴⁹ fornece as funções *defData^a* e *genData^b* para criar variáveis e simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado, respectivamente.

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/simstudy/versions/0.7.0/topics/genData



O pacote $faux^{250}$ fornece a função sim_design^a para simular um banco de dados de acordo com o delineamento pré-especificado.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/faux/versions/1.2.1/topics/sim_design



O pacote *InteractionPoweR*¹⁷⁸ fornece a função *generate_interaction*^a para simular bancos de dads com efeitos de interação.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/simstudy/versions/0.7.0/topics/defData

 $^{{\}it "https://www.rdocumentation.org/packages/InteractionPoweR/versions/0.2.1/topics/generate_interaction.org/packages/InteractionPoweR/versions/0.2.1/topics/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versionPoweR/versionPoweR/versions/generate_interactionPoweR/versi$

31.3 Diretrizes para redação

31.3.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de simulação computacional?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de estudo de simulação computacional.
 - Reporting Guidelines for Health Care Simulation Research: Extensions to the CONSORT and STROBE Statements: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/reporting-guidelines-for-health-care-simulation-research-extensions-to-the-consort-and-strobe-statements/

¹https://www.equator-network.org/

Propriedades psicométricas

32.1 Características

32.1.1 O que são propriedades psicométricas?

• .[REF]



O pacote $lavaan^{252}$ fornece a função cfa^a para implementar modelos de análise fatorial confirmatória.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/lavaan/versions/0.6-16/topics/cfa



O pacote *lavaan*²⁵² fornece a função *modificationIndices*^a para calcular os índices de modificação.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/lavaan/versions/0.6-16/topics/modificationIndices



O pacote *semTools*²⁵³ fornece a função *reliability*^a para analisar a confiabilidade de um instrumento.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/semTools/versions/0.5-6/topics/reliability-deprecated



O pacote $psych^{254}$ fornece a função icc^a para calcular a confiabilidade utilizando coeficientes de correlação intraclasse.

 ${\it ^a} https://www.rdocumentation.org/packages/psych/versions/2.3.6/topics/ICC$

Tabela 32.1: Tabela de confusão sobre propriedades psicométricas de instrumentos.

	Concordância alta	Concordância baixa	
Validade alta	Adequado	Inadequado	
Validade baixa	Inadequado	Inadequado	

32.2 Análise fatorial exploratória

32.2.1 O que é análise fatorial exploratória?

• .[REF]

32.3 Análise fatorial confirmatória

32.3.1 O que é análise fatorial confirmatória?

• .[REF]

32.4 Validade de conteúdo

32.4.1 O que é validade interna?

• .255

32.4.2 O que é validade externa?

• .255

32.4.3 Que fatores afetam a validade?

- A amostragem não probabilística pode dificultar a generalização dos achados da amostra para a população, diminuindo assim a validade externa do estudo.¹²
- Quando as características da amostra obtida por seleção não probabilística forem similares às da população, a validade externa pode ser maior.¹²

32.4.4 Como avaliar a validade de um estudo?

 As características da amostra apresentadas na Tabela 1 são úteis para interpretação da validade interna e externa dos achados do estudo.¹⁵⁴

32.5 Validade de face

32.5.1 O que é validade de face?

• .[RF]

32.6 Validade do construto

32.6.1 O que é construto?

32.7 Validade fatorial

32.7.1 O que é validade fatorial?

• .[RF]

32.8 Validade convergente

32.8.1 O que é validade convergente?

• .[RF]

32.9 Validade discriminante

32.9.1 O que é validade discriminante?

• .[RF]

32.10 Validade de critério

32.10.1 O que é validade de critério?

• .[RF]

32.11 Validade concorrente

32.11.1 O que é concorrente?

• .[RF]

32.11.2 O que é validade concorrente?

• .[RF]

32.11.3 O que é validade preditiva?

• .[RF]

32.12 Responsividade

32.12.1 O que é responsividade?

Tabela 32.2: Tabela de confusão 2x2 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

	Teste positivo	Teste negativo	Total
Teste positivo	a	b	g = a + b
Teste negativo	c	d	h = c + d
Total	e = a + c	f = b + d	N = a + b + c + d

32.13 Concordância

32.13.1 O que é concordância?

• .[REF]

32.13.2 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Coeficiente de Cohen κ : mede a concordância corrigida pelo acaso. 256,257
- Coeficiente de correlação tetracórica r_{tet} . ^{258,259}



O pacote $psych^{260}$ fornece a função $tetrachoric^a$ para calcular o coeficiente de correlação tetracórica (r_{tot}) .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psych/versions/2.3.6/topics/tetrachoric

32.13.3 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis dicotômicas?

- Concordância absoluta C_A quantidade de casos em que examinadores concordam não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso. ²⁵⁹
- Concordância percentual $C_{\%}$ proporção de casos em que examinadores concordam pela quantidade total de casos não é recomendada porque não corrige a estimativa para possíveis concordâncias ao acaso. 259
- Qui-quadrado χ^2 a partir da tabela de contigência não é recomendado porque tal teste analisa associação. 259
- A família de coeficientes de Cohen κ não é adequada para analisar concordância quando as variáveis são aparentemente (e não originalmente) dicotômicas. ²⁵⁹

32.13.4 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis categóricas?

- Coeficiente de Cohen κ : mede a concordância corrigida pelo acaso. 256,257
- Coeficiente de Cohen ponderado κ_w : mede a concordância corrigida pelo acaso. ^{256,257}
- Coeficiente de correlação policórica r_{nol} . 259



O pacote $psych^{260}$ fornece a função $tetrachoric^a$ para calcular o coeficiente de correlação policórica (r_{rod}) .

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psych/versions/2.3.6/topics/tetrachoric

32.13. CONCORDÂNCIA 145

	Grave	Moderado	Leve	Total
Grave	\overline{a}	b	c	j = a + b + c
Moderado	d	e	f	k = d + e + f
Leve	g	h	\ddot{i}	l = g + h + i
Total	j = a + d + g	k = b + e + h	l = c + f + i	N = a + b + c + d +
	·		·	e+f+q+h+i

Tabela 32.3: Tabela de confusão 3x3 para análise de concordância de testes e variáveis dicotômicas.

32.13.5 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis categóricas e contínuas?

• Coeficiente de correlação bisserial r_s . 259



O pacote $psych^{260}$ fornece a função $tetrachoric^a$ para calcular o coeficiente de correlação bisserial (r_s) .

32.13.6 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis ordinais?

• Coeficiente de Cohen ponderado κ_w : mede a concordância corrigida pelo acaso. 256,257

32.13.7 Quais métodos são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Gráfico de dispersão com a reta de regressão.⁷⁰
- Gráfico de limites de concordância (média dos testes vs. diferença entre testes) com a reta de regressão do viés e respectivo intervalo de confiança.



O pacote $BlandAltmanLeh^{261}$ fornece as funções $bland.altman.stats^a$ e $bland.altman.plot^b$ para calcular e apresentar, respectivamente, o gráfico com os limites de concordância entre dois métodos.

32.13.8 Quais métodos não são adequados para análise de concordância de variáveis contínuas?

- Comparação de médias: dois métodos apresentarem médias similares isto é, 'sem diferença estatística' após um teste inferencial de hipótese nula $H_0: \mu_1 = \mu_2$ não informa sobre a concordância deles. Métodos com maior erro de medida tendem a ter menos chance de rejeição da hipótese nula. ⁷⁰
- Correlação bivariada: o coeficiente de correlação dependente tanto da variação entre indivíduos (isto é, entre os valores verdadeiros) quanto da variação intraindividual (isto é, erro de medida). Se a variância dos erros de medida de ambos os métodos não for pequena comparadas à variância dos valores verdadeiros, o tamanho do efeito da correlação será pequeno mesmo que os métodos possuam boa concordância.⁷⁰
- Regressão linear: o teste da hipótese nula da inclinação da reta de regressão $(H_0:\beta=0)$ é equivalente a testar a correlação bivariada $(H_0:\rho=0)$. ⁷⁰

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psych/versions/2.3.6/topics/tetrachoric

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/BlandAltmanLeh/versions/0.3.1/topics/bland.altman.stats

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/BlandAltmanLeh/versions/0.3.1/topics/bland.altman.plot

32.13.9 Quais métodos são adequados para modelagem de concordância?

• Modelo log-linear.²⁵⁹

32.14 Confiabilidade

32.14.1 O que é confiabilidade?

• .[REF]

32.14.2 Quais métodos são adequados para análise de confiabilidade?

• .[REF]

32.15 Diretrizes para redação

32.15.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos de propriedades psicométricas?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de estudo de propriedades psicométricas.
 - COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/cosmin-reporting-guideline-for-studies-on-measurement-properties-of-patient-reported-outcome-measures/
 - Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing:²⁶³ https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/recommendations-for-reporting-the-results-of-studies-of-instrument-and-scale-development-and-testing/
 - Guidelines for reporting reliability and agreement studies (GRRAS) were proposed:²⁶⁴ https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/guidelines-for-reporting-reliability-and-agreement-studies-grras-were-proposed/>

¹https://www.equator-network.org/

Desempenho diagnóstico

33.1 Características

33.1.1 Quais são as características de estudos de desempenho diagnóstico?

• .[REF]

33.2 Tabelas **2x2**

33.2.1 O que é uma tabela de confusão 2x2?

 Tabela de confusão é uma matriz de 2 linhas por 2 colunas que permite analisar o desempenho de classificação de uma variável dicotômica (padrão-ouro ou referência) versus outra variável dicotômica (novo teste).

33.2.2 Como analisar o desempenho diagnóstico em tabelas 2x2?

- Verdadeiro-positivo (VP): caso com a condição presente e corretamente identificado como tal. 266
- Falso-negativo (FN): caso com a condição presente e erroneamente identificado como ausente. ²⁶⁶
- Verdadeiro-negativo (VN): controle sem a condição presente e corretamente identificados como tal.²⁶⁶
- Falso-positivo (FP): controle sem a condição presente e erroneamente identificado como presente. ²⁶⁶
- Tabelas de confusão também podem ser visualizadas em formato de árvores de frequência.²⁶⁵



O pacote *riskyr*²⁶⁷ fornece a função *plot_prism*^a para construir árvores de frequência a partir de diferentes cenários.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/riskyr/versions/0.4.0/topics/plot_prism

Tabela 33.1: Tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	Condição ausente	Total
Teste positivo	VP	FP	VP + FP
Teste negativo	FN	VN	FN + VN
Total	VP + FN	FP + VN	N = VP + VN + FP + FN

Scenario




Figura 33.1: Árvore de frequência do desempenho diagnóstico de uma tabela de confusão 2x2 representando um método novo (dicotômico) comparado ao método padrão-ouro ou referência (dicotômico).

33.2.3 Quais probabilidades caracterizam o desempenho diagnóstico de um teste em tabelas 2x2?

• Sensibilidade (SEN), equação (33.1): Proporção de verdadeiro-positivos dentre aqueles com a condição. 266

$$SEN = \frac{VP}{VP + FN} \tag{33.1}$$

• Especificidade (*ESP*), equação (33.2): Proporção de verdadeiro-negativos dentre aqueles sem a condição. ²⁶⁶

$$ESP = \frac{VN}{VN + FP} \tag{33.2}$$

• Acurácia (ACU), equação (33.3): Proporção de casos e controle corretamente identificados. ²⁶⁶

$$ACU = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \tag{33.3}$$

• Valor preditivo positivo (*VPP*), equação (33.4): Proporção de casos corretamente identificados como verdadeiro-positivos. ²⁶⁶

$$VPP = \frac{VP}{VP + FP} \tag{33.4}$$

• Valor preditivo negativo (VPN), equação (33.5): Proporção de controles corretamente identificados como verdadeiro-negativos. 266

Tabela 33.2: Probabilidades calculados a partir da tabela de confusão 2x2 para análise de desempenho diagnóstico de testes e variáveis dicotômicas.

	Condição presente	Condição ausente	Total	Probabilidades
Teste positivo	VP	FP	VP + FP	$VPP = \frac{VP}{VP + FP}$
Teste negativo	FN	VN	FN + VN	$VPP = \frac{VP}{VP+FP}$ $VPN = \frac{VN}{VN+FN}$
Total	VP + FN	FP + VN	N = VP + VN +	7 11 1 11
Probabilidades	$SEN = \frac{VP}{VP + FN}$	$ESP = \frac{VN}{VN + FP}$	FP + FN	$\begin{array}{c} ACU = \\ \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \end{array}$

$$VPN = \frac{VN}{VN + FN} \tag{33.5}$$



O pacote $riskyr^{267}$ fornece a função $comp_prob^a$ para estimar 13 probabilidades relacionadas ao desempenho diagnóstico em tabelas 2x2.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/riskyr/versions/0.4.0/topics/comp_prob



O pacote *caret*²⁶⁸ fornece a função *confusionMatrix*^a para estimar 11 probabilidades relacionadas ao desempenho diagnóstico em tabelas 2x2.

33.3 Gráficos crosshair

33.3.1 O que um gráfico crosshair?

• 269



O pacote *mada*²⁷⁰ fornece a função *crosshair*^a para criar um gráfico *crosshair*²⁶⁹ a partir de dados de verdadeiro-positivo, falso-positivo, verdadeiro-negativo e verdadeiro-positivo de tabelas de confusão 2x2.

33.4 Curvas ROC

33.4.1 O que é a área sob a curva (AUROC)?

 A área sob a curva ROC (AUC ou AUROC) quantifica o poder de discriminação ou desempenho diagnóstico na classificação de uma variável dicotômica.²⁷¹



O pacote proc²⁷² fornece a função plot.roc^a para criar uma curva ROC.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/pROC/versions/1.18.4/topics/plot.roc

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/caret/versions/3.45/topics/confusionMatrix

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/mada/versions/0.5.11/topics/crosshair

33.4.2 Como interpretar a área sob a curva (ROC)?

- A área sob a curva AUC varia no intervalo [0.5; 1], com valores mais elevados indicando melhor discriminação ou desempenho do modelo de classificação.²⁷¹
- As interpretações qualitativas (isto é: pobre/fraca/baixa, moderada/razoável/aceitável, boa ou muito boa/alta/excelente) dos valores de área sob a curva são arbitrários e não devem ser considerados isoladamente.²⁷¹
- Modelos de classificação com valores altos de área sob a curva podem ser enganosos se os valores preditos por esses modelos não estiverem adequadamente calibrados.²⁷¹

33.4.3 Como analisar o desempenho diagnóstico em desfechos com distribuição trimodal na população?

 Limiares duplos podem ser utilizados para análise de desempenho diagnóstico de testes com distribuição trimodal.²⁷³

33.5 Interpretação da validade de um teste

33.5.1 Que itens devem ser verificados na interpretação de um estudo de validade?

- O novo teste foi comparado junto ao método padrão-ouro. 266
- As probabilidades pontuais estimadas que caracterizam o desempenho diagnóstico do novo teste são altas e adequadas para sua aplicação clínica.²⁶⁶
- Os intervalos de confiança estimados para as probabilidades do novo teste são estreitos e adequadas para sua aplicação clínica.²⁶⁶
- O novo teste possui adequada confiabilidade intra/inter examinadores. ²⁶⁶
- O estudo de validação incluiu um espectro adequado da amostra. ²⁶⁶
- Todos os participantes realizaram ambos o novo teste e o padrão-ouro no estudo de validação.²⁶⁶
- Os examinadores do novo teste estavam cegados para o resultado do teste padrão-ouro. ²⁶⁶

33.6 Diretrizes para redação

33.6.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos diagnósticos?

- Visite a rede Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de estudo de desempenho diagnóstico.
 - STARD 2015: An Updated List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy Studies: 274 https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/

¹ https://www.equator-network.org/

Estudos observacionais

34.1 Características

34.1.1 Quais são as características de estudos observacionais?

• .[REF]

34.2 Diretrizes para redação

34.2.1 Quais são as diretrizes para redação de estudos observacionais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de estudo observacional.
 - The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/ strobe/

¹https://www.equator-network.org/



Ensaios quase-experimentais

35.1 Características

35.1.1 Quais são as características de ensaios quase-experimentais?

• .[REF]

35.2 Diretrizes para redação

35.2.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios quase-experimentais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de estudo de ensaio quase-experimental.
 - Guidelines for reporting non-randomised studies: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/guidelines-for-reporting-non-randomised-studies/

¹https://www.equator-network.org/



Ensaios experimentais

36.1 Ensaio clínico aleatorizado

36.1.1 Quais são as características de ensaios clínicos aleatorizados?

- A característica essencial de um ensaio clínico aleatorizado é a comparação entre grupos.²⁷⁷
- Quanto à unidade de alocação:²⁷⁸
 - Individual
 - Agrupado
- Quanto ao número de braços:²⁷⁸
 - Único*
 - Múltiplos
- Quanto ao número de centros:²⁷⁸
 - Único
 - Múltiplos
- Quanto ao cegamento:²⁷⁸
 - Aberto*
 - Simples-cego
 - Duplo-cego
 - Tripo-cego
 - Quádruplo-cego
- Quanto à alocação:²⁷⁸
 - Sem sorteio
 - Estratificada (centro apenas)
 - Estratificada
 - Minimizada
 - Estratificada e minimizada

36.2 Modelos de análise de comparação

36.2.1 Que modelos podem ser utilizados para comparações?

- As abordagens compreendem a comparação da variável de desfecho medida entre os momentos antes e depois ou da sua mudança (pré - pós) entre os momentos.²⁷⁹
- Se a média da variável é igual entre grupos no início do acompanhamento, ambas abordagens estimam o mesmo efeito. Caso contrário, o efeito será influenciado pela correlação entre as medidas antes e depois. A análise da mudança não controla para desbalanços no início do estudo.²⁷⁹
- A abordagem mais recomendada é a análise de covariância (ANCOVA) equação (36.1) pois ajusta os valores pós-intervenção (Y_{ij}) aos valores pré-intervenção (X_{ij}) para cada participante (i) de cada grupo $\{Z_{ij}\}$, e portanto não é afetada pelas diferenças entre grupos no início do estudo. 9,279

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 X_{ij} + \beta_2 Z_j + \epsilon_{ij} \tag{36.1}$$

- A ANCOVA modelando seja a mudança (pré pós: $\Delta = X_{ij} Y_{ij}$) quando o desfecho no pós-tratamento parece ser o método mais efetivo considerando-se o viés de estimação dos parâmetros, a precisão das estimativas, a cobertura nominal (isto é, intervalo de confiança) e o poder do teste. 280
- Quando a ANCOVA equação (36.2) é utilizada com a mudança (pré pós) com variável de desfecho (Y_{ij}) , o coeficiente de regressão β_1 é diminuído em 1 unidade. ^{9,281}

$$(X_{ij} - Y_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 Z_j + \epsilon_{ij}$$

$$(36.2)$$

- Análise de variância (ANOVA) e modelos lineares mistos (MLM) são outras opções de métodos, embora apresentem maior variância, menor poder, e cobertura nominal comparados à ANCOVA.²⁸⁰
- _ 282
- 283

36.3 Comparação na linha de base

36.3.1 O que são dados na linha de base?

- Dados sociodemográficos, clínicos e funcionais são coletados na linha de base sobre cada participante no momento da aleatorização.²⁸⁴
- Os dados de linha de base são usados para caracterizar os pacientes incluídos no estudo e para mostrar que os grupos de tratamento estão bem equilibrados.²⁸⁴
- Dados da linha de base podem ser utilizados para a aleatorização de modo a equilibrar ou estratificar os grupos considerando alguns fatores-chave.²⁸⁴
- Dados da linha de base podem ser utilizados como ajuste de covariável para análise do resultado por grupo de tratamento.²⁸⁴

36.3.2 O que é comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados?

- A comparação se refere ao teste de hipótese nula de não haver diferença ('balanço' ou 'equilibrio') entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base, geralmente apresentadas apenas de modo descritivo na 'Tabela 1'.²⁸⁵
- A interpretação isolada do P-valor da comparação entre grupos na linha de base não permite identificar as razões para eventuais diferenças.²⁸⁵

36.3.3 Para quê comparar grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados?

- Os P-valores estão relacionados à aleatorização dos participantes em grupos.
- Em ensaios clínicos aleatorizados, a comparação de (co)variáveis na linha de base é usada para avaliar se aleatorização foi 'bem sucedida'.²⁸⁶

36.3.4 Quais são as razões para diferenças entre grupos de tratamento nas (co)variáveis na linha de base?

- Acaso. 155,285
- Viés. 155,285
- Tamanho da amostra. 155,285
- Má conduta científica.¹⁵⁵

36.3.5 Quais cenários permitem a comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados?

- Em ensaios clínicos aleatorizados agregados, os P-valores possuem interpretação diferente de estudos aleatorizados individualmente.²⁸⁶
- Em ensaios clínicos com agrupamento, nos quais o recrutamento ocorreu após a aleatorização, os P-valores já não estão inteiramente relacionados ao processo de aleatorização, mas sim ao método de recrutamento, o que pode resultar na comparação de amostras não aleatórias.²⁸⁶

36.3.6 Por que não se deve comparar grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados?

- A interpretação errônea dos P-valores na comparação entre grupos, na linha de base, de um ensaio clínico aleatorizado constitui a 'falácia da Tabela 1'.¹⁵⁶
- Quando a aleatorização é bem-sucedida, a hipótese nula de diferença entre grupos na linha de base é verdadeira.²⁸⁷
- Testes de significância estatística na linha de base avaliam a probabilidade de que as diferenças observadas possam ter ocorrido por acaso; no entanto, já sabemos - pelo delineamento do experimento - que quaisquer diferenças são causadas pelo acaso.²⁸⁸

36.3.7 Quais estratégias podem ser adotadas para substituir a comparação entre grupos na linha de base em ensaios clínicos aleatorizados?

- Na fase de projeto: identifique as variáveis prognósticas do desfecho de acordo com a literatura.²⁸⁷
- Na fase de análise: inclua as variáveis prognósticas nos modelos para ajuste. 287

36.4 Comparação intragrupos

36.4.1 Por que não se deve comparar intragrupos (pré - pós) em ensaios clínicos aleatorizados?

• Testar por mudanças a partir da linha de base separadamente em cada grupos aleatorizados não permite concluir sobre diferenças entre grupos; não se pode fazer inferências a partir da comparação de P-valores.²⁷⁷

36.5 Comparação entre grupos

36.5.1 O que é comparação entre grupos em ensaios clínicos aleatorizados?

A comparação se refere ao teste de hipótese nula de não haver diferença ('alteração' ou 'mudança') póstratamento entre grupos de tratamento.

36.6 Comparação de subgrupos

36.6.1 O que é comparação de subgrupos em ensaios clínicos aleatorizados?

 Análises de subgrupos podem ser realizadas para avaliar se as diferenças no resultado do tratamento (ou a falta delas) dependem de algumas características na linha de base dos pacientes.²⁸⁴

36.6.2 Como realizar a comparação de subgrupos em ensaios clínicos aleatorizados?

 Testes estatísticos de interação (que avaliam se um efeito de tratamento difere entre subgrupos) devem ser usados, e não apenas a inspeção dos P-valores do subgrupo. Somente se o teste de interação estatística apoiar um efeito de subgrupo as conclusões poderão ser influenciadas.^{284,289}

36.6.3 Como interpretar a comparação de subgrupos em ensaios clínicos aleatorizados?

- Análises de subgrupos devem ser consideradas de natureza exploratória e raramente elas afetam as conclusões obtidas a partir do estudo.^{284,289}
- A credibilidade das análises de subgrupos é melhor se restrita ao desfecho primário e a alguns subgrupos predefinidos e baseadas em hipóteses biologicamente plausíveis. 284
- Deve-se verificar se o estudo possui poder estatístico suficiente para detectar tamanhos de efeitos realistas em subgrupos e interpretar com cautela uma diferença de tratamento em um subgrupo quando a comparação global do tratamento não é significativa.²⁸⁴

36.7 Efeito de interação

36.7.1 Por que analisar o efeito de interação?

- Em ensaios clínicos aleatorizados, o principal problema de pesquisa é se há uma diferença pré pós maior em um grupo do que em outro(s).²⁷⁷
- A comparação de subgrupos por meio de testes de significância de hipótese nula separados é enganosa por não testar (comparar) diretamente os tamanhos dos efeitos dos tratamentos.²⁹⁰
- 185

36.7.2 Quando usar o termo de interação?

- Análise de efeito de interação pode ser usada para testar se o efeito de um tratamento varia entre dois ou mais subgrupos de indivíduos, ou seja, se um efeito é modificado pelo(s) outros(s) efeito(s).¹⁸⁶
- A interação entre duas (ou mais) variáveis pode ser utilizada para comparar efeitos do tratamento em subgrupos de ensaios clínicos.²⁹¹
- O poder estatístico para detectar efeitos de interação é limitado. ²⁹¹

36.8 Ajuste de covariáveis

36.8.1 Quais variáveis devem ser utilizadas no ajuste de covariáveis?

 A escolha das características de linha de base pelas quais uma análise é ajustada deve ser determinada pelo conhecimento prévio de uma possível influência no resultado, em vez da evidência de desequilíbrio entre os grupos de tratamento no estudo.²⁸⁷

36.8.2 Quais os benefícios do ajuste de covariáveis?

- Ajustar por covariáveis ajuda a estimar os efeitos do tratamento para o indivíduo, assim como aumenta a
 eficiência dos testes para hipótese nula e a validade externa do estudo.²⁹²
- Incluir a variável de desfecho medida na linha de base como covariável independentemente de a análise ser realizada com a medida pós-tratamento da mesma variável ou a diferença para a linha de base - pode aumentar o poder estatístico do estudo.²⁹³
- Incluir outras variáveis medidas na linha de base, com potencial para serem desbalanceadas entre grupos após a aleatorização, diminui a chance de afetar as estimativas de efeito dos tratamentos.²⁹³

36.8.3 Quais os riscos do ajuste de covariáveis?

- Incluir covariáveis que não são prognósticas do desfecho pode reduzir o poder estatístico do estudo.²⁹³
- Incluir covariáveis com dados perdidos pode reduzir o tamanho amostral e consequentemente o poder estatístico do estudo (análise de casos completos) ou levar a desvios do plano de análise por exclusão de covariáveis prognósticas.

36.9 Imputação de dados perdidos

36.9.1 Como lidar com os dados perdidos em desfechos?

- Em dados longitudinais com um pequeno número de 'ondas' (medidas repetidas) e poucas variáveis, para análise com modelos de regressão univariados, a imputação paramétrica via especificação condicional completa também conhecido como imputação multivariada por equações encadeadas (*multivariate imputation by chained equations*, MICE) é eficiente do ponto de vista computacional e possui acurácia e precisão para estimação de parâmetros. 75,294
- Para dados perdidos em desfechos dicotômicos, o desempenho dos métodos de imputação multivariada por equações encadeadas (*multivariate imputation by chained equations*, MICE)⁸¹ e por correspondência média preditiva (*predictive mean matching*, PMM)^{82,83} é similar.⁸⁰

36.9.2 Como lidar com os dados perdidos em covariáveis?

Împutação de dados perdidos de uma covariável pela média dos dados do respectivo grupo permite estimativas não enviesadas dos efeitos do tratamento, preserva o erro tipo I e aumenta o poder estatístico comparado à análise de dados completos.²⁹³



Os pacotes *mice*⁸¹ e *miceadds*⁸⁴ fornecem funções *mice*^a e *mi.anova*^b para imputação multivariada por equações encadeadas, respectivamente, para imputação de dados.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/mice/versions/3.16.0/topics/mice

^bhttps://www.rdocumentation.org/packages/miceadds/versions/3.16-18/topics/mi.anova

36.10 Diretrizes para redação

36.10.1 Quais são as diretrizes para redação de ensaios experimentais?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de ensaio experimental.
 - CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials:²⁹⁵ https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/



O pacote $consort^{296}$ fornece a função $consort_plot^a$ para elaboração do fluxograma de ensaios experimentais no formato padrão.

^ahttps://search.r-project.org/CRAN/refmans/consort/html/consort_plot.html

¹https://www.equator-network.org/

Capítulo 37

Meta-análise

37.1 Características

37.1.1 O que é meta-análise?

• .[REF]



O pacote *metagear*²⁹⁷ fornece a função *plot_PRISMA*^a para gerar o fluxograma de uma revisão sistemática de acordo com o *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*²⁹⁸.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/metagear/versions/0.7/topics/plot_PRISMA



O pacote *PRISMA2020*^{299,300} fornece a função *PRISMA_flowdiagram*^a para elaboração do fluxograma de revisões sistemáticas no formato padrão.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/PRISMA2020/versions/1.1.1/topics/PRISMA flowdiagram

37.2 Interpretação de efeitos em meta-análise

37.2.1 Como avaliar a variação do tamanho do efeito?

- O intervalo de predição contém informação sobre a variação do tamanho do efeito.
- Se o intervalo de predição não contém a hipótese nula (H_0) , podemos concluir que (a) o tratamento funciona igualmente bem em todas as populações, ou que ele funciona melhor em algumas populações do que em outras. 301
- Se o intervalo de predição contém a hipótese nula (H_0) , podemos concluir que o tratamento pode ser benéfico em algumas populações, mas prejudicial em outras, de modo que a estimativa pontual (geralmente a média) torna-se amplamente irrelevante. Nesse caso, é recomendado investigar em que populações o tratamento seria benéfico e em quais causaria danos. 301

37.2.2 Como avaliar a heterogeneidade entre os estudos?

• A heterogeneidade - variação não-aleatória - no efeito do tratamento entre os estudos incluídos em uma meta-análise pode ser avaliada pelo I^2 . 301,302

- I^2 representa qual proporção da variância observada reflete a variância nos efeitos verdadeiros em vez do erro de amostragem. 301
- I^2 mede a proporção (%) da variância total que pode ser atribuída à heterogeneidade entre os estudos incluídos. 302
- I^2 não depende da quantidade de estudos incluídos na meta-análise. Entretanto, I^2 aumenta com a quantidade de participantes incluídos nos estudos meta-analisados. 302
- A heterogeneidade entre estudos é explicada de modo mais confiável utilizando dados de pacientes individuais, uma vez que a direção verdadeira da modificação de efeito não pode ser observada a partir de dados agregados no estudo.³⁰³



O pacote $psychmeta^{304}$ fornece a função ma_d^a para meta-analisar valores d.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/ma_d



O pacote $psychmeta^{304}$ fornece a função $ma \ r^a$ para meta-analisar correlações.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/ma_r



O pacote psychmeta³⁰⁴ fornece a função plot forest^a para criar figuras tipo forest plot.

 ${\it a} https://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/plot_forest$



O pacote psychmeta³⁰⁴ fornece a função plot funnel^a para criar figuras tipo funnel plot.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/psychmeta/versions/2.7.0/topics/plot_funnel

37.3 Diretrizes para redação

37.3.1 Quais são as diretrizes para redação de meta-análises?

- Visite a rede *Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research* EQUATOR Network¹ para encontrar diretrizes específicas para cada tipo de meta-análises.
 - The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews: https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/

¹https://www.equator-network.org/

Capítulo 38

Redação de resultados

38.1 Resultados da análise estatística

38.1.1 Como redigir os resultados da análise estatística?

• .[REF]



O pacote report³⁰⁶ fornece a função report^a para redigir a descrição de diversas análises estatísticas.

^ahttps://www.rdocumentation.org/packages/report/versions/0.5.8/topics/report

38.2 Diretrizes e Listas

38.2.1 Quais diretrizes estão disponíveis para redação estatística?

- Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals.³⁰⁷
- Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates. ³⁰⁸
- How to write statistical analysis section in medical research.²⁰⁰
- Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association. 309
- Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework.³¹⁰
- Guidelines for reporting of figures and tables for clinical research in urology. 311
- Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1. 157
- Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology.
- Reveal, Don't Conceal: Transforming Data Visualization to Improve Transparency. 164
- Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials. 313
- Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The 'Statistical Analyses and Methods in the Published Literature" or the SAMPL Guidelines. 314
- Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. 315
- STRengthening analytical thinking for observational studies: the STRATOS initiative. 316
- Research methods and reporting.³¹⁷
- How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer. 318

38.2.2 Quais listas de verificação estão disponíveis para redação estatística?

- A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration. 319
- Checklist for clinical applicability of subgroup analysis. 320
- Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features. 199

Bibliografia



Fontes externas

American Heart Association

• Statistical Reporting Recommendations - AHA/ASA journals 1

American Physiological Society

- Statistics²
- Exploration in Statistics³
- General Statistics⁴
- Reporting Statistics⁵

American Statistical Association

• Statistical Inference in the 21st Century: A World Beyond p < 0.05 - The American Statistical Association⁶

British Medicine Journal

- Statistics Latest from The BMJ⁷
- Statistics notes Latest from The BMJ⁸
- Statistics and research methods Latest from The BMJ⁹
- Statistics at Square One¹⁰
- Research methods & reporting 11

¹https://www.ahajournals.org/statistical-recommendations

²https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/statistics?seriesKey=&tagCode=&

³https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/explorations-in-statistics?seriesKey=&tagCode=&

⁴https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/general-statistics?seriesKey=&tagCode=&

 $^{^5} https://journals.physiology.org/topic/advances-collections/reporting-statistics? series Key=\&tagCode=\&tagC$

⁶https://www.tandfonline.com/toc/utas20/73/sup1?nav=tocList

⁷https://www.bmj.com/specialties/statistics

⁸https://www.bmj.com/specialties/statistics-notes

⁹https://www.bmj.com/specialties/statistics-and-research-methods

¹⁰https://www.bmj.com/about-bmj/resources-readers/publications/statistics-square-one

¹¹ https://www.bmj.com/research/research-methods-and-reporting

Enhancing the QUality And Transparency Of health Research Network

• Enhancing the Quality and Transparency of health research EQUATOR Network¹²

Journal of the Amercan Medical Association

• JAMA Guide to Statistics and Methods - JAMA¹³

Nature Publishing Group

• Statistics for Biologists - Nature Publising Group 14

Oxford Reference

• A Dictionary of Statistics¹⁵

Royal Statistical Society

 $\bullet \ \textit{Best Practices for Data Visualisation} - \textit{Royal Statistical Society} ^{16} \\$

Statistics in Medicine

• Tutorials in Biostatistics Papers 17

BMC Trials

• Design and analysis of n-of-1 trials¹⁸

The Journal of Applied Statistics in the Pharmaceutical Industry

• Tutorial Papers 19

¹²https://www.equator-network.org

¹³https://jamanetwork.com/collections/44042/jama-guide-to-statistics-and-methods

¹⁴https://www.nature.com/collections/qghhqm

¹⁵ https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199679188.001.0001/acref-9780199679188

¹⁶https://royal-statistical-society.github.io/datavisguide

¹⁷https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10970258/homepage/tutorials.htm

¹⁸ https://www.biomedcentral.com/collections/DANT

¹⁹https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15391612/homepage/tutorial_papers.htm

Referências

- 1. Grami A. Discrete probability. In: Elsevier; 2023:285-305. doi:10.1016/b978-0-12-820656-0.00016-2
- 2. Viti A, Terzi A, Bertolaccini L. A practical overview on probability distributions. *Journal of Thoracic Disease*. 2015;7(3). https://jtd.amegroups.org/article/view/4086.
- 3. Tversky A, Kahneman D. Belief in the law of small numbers. *Psychological Bulletin*. 1971;76(2):105-110. doi:10.1037/h0031322
- 4. Bishop DVM, Thompson J, Parker AJ. Can we shift belief in the 'Law of Small Numbers'? *Royal Society Open Science*. 2022;9(3). doi:10.1098/rsos.211028
- 5. Guy RK. The strong law of small numbers. *The American Mathematical Monthly*. 1988;95(8):697. doi:10.2307/2322249
- 6. Guy RK. The Second Strong Law of Small Numbers. *Mathematics Magazine*. 1990;63(1):3-20. doi:10.1080/0025570x.1990.11977475
- 7. Kwak SG, Kim JH. Central limit theorem: the cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2017;70(2):144. doi:10.4097/kjae.2017.70.2.144
- 8. Galton F. Regression towards mediocrity in hereditary stature. *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.* 1886;15:246. doi:10.2307/2841583
- 9. Barnett AG. Regression to the mean: what it is and how to deal with it. *International Journal of Epidemiology*. 2004;34(1):215-220. doi:10.1093/ije/dyh299
- 10. Senn S. Francis Galton and Regression to the Mean. *Significance*. 2011;8(3):124-126. doi:10.1111/j.1740-9713.2011.00509.x
- 11. Recchia D. Regtomean: Regression toward the mean. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=regtomean.
- 12. Banerjee A, Chaudhury S. Statistics without tears: Populations and samples. *Industrial Psychiatry Journal*. 2010;19(1):60. doi:10.4103/0972-6748.77642
- 13. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Bootstrap resampling methods. *BMJ*. 2015;350(jun02 13):h2622-h2622. doi:10.1136/bmj.h2622
- 14. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Units of analysis. *BMJ*. 1997;314(7098):1874-1874. doi:10.1136/bmj.314.7098.1874
- 15. Matthews JN, Altman DG, Campbell MJ, Royston P. Analysis of serial measurements in medical research. *BMJ*. 1990;300(6719):230-235. doi:10.1136/bmj.300.6719.230

- 16. Amatuzzi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: Parte 1. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(1):53-56. doi:10.1590/s1413-78522006000100012
- 17. Amatuzzi MLL, Barreto M do CC, Litvoc J, Leme LEG. Linguagem metodológica: Parte 2. *Acta Ortopédica Brasileira*. 2006;14(2):108-112. doi:10.1590/s1413-78522006000200012
- 18. Munafò MR, Nosek BA, Bishop DVM, et al. A manifesto for reproducible science. *Nature Human Behaviour*. 2017;1(1). doi:10.1038/s41562-016-0021
- 19. Resnik DB, Shamoo AE. Reproducibility and Research Integrity. *Accountability in Research*. 2016;24(2):116-123. doi:10.1080/08989621.2016.1257387
- 20. Hofner B, Schmid M, Edler L. Reproducible research in statistics: A review and guidelines for the *Biometrical Journal*. *Biometrical Journal*. 2015;58(2):416-427. doi:10.1002/bimj.201500156
- 21. Mair P. Thou shalt be reproducible! A technology perspective. *Frontiers in Psychology*. 2016;7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01079
- 22. Meng XL. Statistical paradises and paradoxes in big data (i): Law of large populations, big data paradox, and the 2016 US presidential election. *The Annals of Applied Statistics*. 2018;12(2). doi:10.1214/18-aoas1161sf
- 23. Abelson RP. A variance explanation paradox: When a little is a lot. *Psychological Bulletin*. 1985;97(1):129-133. doi:10.1037/0033-2909.97.1.129
- 24. Berkson J. Limitations of the application of fourfold table analysis to hospital data. *Biometrics Bulletin*. 1946;2(3):47. doi:10.2307/3002000
- 25. Ellsberg D. Risk, ambiguity, and the savage axioms. *The Quarterly Journal of Economics*. 1961;75(4):643. doi:10.2307/1884324
- 26. Freedman DA, Freedman DA. A Note on Screening Regression Equations. *The American Statistician*. 1983;37(2):152-155. doi:10.1080/00031305.1983.10482729
- 27. Freedman LS, Pee D. Return to a note on screening regression equations. *The American Statistician*. 1989;43(4):279. doi:10.2307/2685389
- 28. Hand DJ. On Comparing Two Treatments. *The American Statistician*. 1992;46(3):190-192. doi:10.1080/00031305.1992.10475881
- 29. LINDLEY DV. A STATISTICAL PARADOX. *Biometrika*. 1957;44(1-2):187-192. doi:10.1093/biomet/44.1-2.187
- 30. Lord FM. A paradox in the interpretation of group comparisons. *Psychological Bulletin*. 1967;68(5):304-305. doi:10.1037/h0025105
- 31. Lord FM. Statistical adjustments when comparing preexisting groups. *Psychological Bulletin*. 1969;72(5):336-337. doi:10.1037/h0028108
- 32. Simpson EH. The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*. 1951;13(2):238-241. doi:10.1111/j.2517-6161.1951.tb00088.x
- 33. Blyth CR. On Simpson's Paradox and the Sure-Thing Principle. *Journal of the American Statistical Association*. 1972;67(338):364-366. doi:10.1080/01621459.1972.10482387
- 34. Pearl J. Comment: Understanding Simpson's Paradox. *The American Statistician*. 2014;68(1):8-13. doi:10.1080/00031305.2014.876829

- 35. Stein C. INADMISSIBILITY OF THE USUAL ESTIMATOR FOR THE MEAN OF a MULTIVARIATE NORMAL DISTRIBUTION. In: University of California Press; 1956:197-206. doi:10.1525/9780520313880-018
- 36. De S, Sen A. The generalised Gamow-Stern problem. *The Mathematical Gazette*. 1996;80(488):345-348. doi:10.2307/3619568
- 37. Feld SL. Why Your Friends Have More Friends Than You Do. *American Journal of Sociology*. 1991;96(6):1464-1477. doi:10.1086/229693
- 38. Polin BA, Benisaac E. A longitudinal analysis of the hot hand and gambler's fallacy biases. *Judgment and Decision Making*. 2023;18. doi:10.1017/jdm.2023.23
- 39. Ihaka R, Gentleman R. R: A language for data analysis and graphics. *Journal of Computational and Graphical Statistics*. 1996;5(3):299. doi:10.2307/1390807
- 40. Introduction to r and RStudio. *Practical Machine Learning in R.* April 2020:25-52. doi:10.1002/9781119591542.ch2
- 41. Racine JS. RStudio: A Platform-Independent IDE for R and Sweave. *Journal of Applied Econometrics*. 2011;27(1):167-172. doi:10.1002/jae.1278
- 42. Aden-Buie G, Schloerke B, Allaire J, Rossell Hayes A. Learnr: Interactive tutorials for r. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=learnr.
- 43. Love J, Selker R, Marsman M, et al. **JASP**: Graphical Statistical Software for Common Statistical Designs. *Journal of Statistical Software*. 2019;88(2). doi:10.18637/jss.v088.i02
- 44. ŞAHİN M, AYBEK E. Jamovi: An easy to use statistical software for the social scientists. *International Journal of Assessment Tools in Education*. 2020;6(4):670-692. doi:10.21449/ijate.661803
- 45. Selker R, Love J, Dropmann D. Jmv: The 'jamovi' analyses. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=jmv.
- 46. Love J. Jmvconnect: Connect to the 'jamovi' statistical spreadsheet. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=jmvconnect.
- 47. Hinsen K. A data and code model for reproducible research and executable papers. *Procedia Computer Science*. 2011;4:579-588. doi:10.1016/j.procs.2011.04.061
- 48. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 49. Schwab, Simon, Held, Leonhard. Statistical programming: Small mistakes, big impacts. *Wiley-Blackwell Publishing, Inc.* 2021. doi:10.5167/UZH-205154
- 50. Eglen SJ, Marwick B, Halchenko YO, et al. Toward standard practices for sharing computer code and programs in neuroscience. *Nature Neuroscience*. 2017;20(6):770-773. doi:10.1038/nn.4550
- 51. Xie Y. formatR: Format r code automatically. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=formatR.
- 52. Müller K, Walthert L. Styler: Non-invasive pretty printing of r code. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=styler.
- 53. Hester J, Angly F, Hyde R, et al. Lintr: A 'linter' for r code. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=lintr.

- 54. Trisovic A, Lau MK, Pasquier T, Crosas M. A large-scale study on research code quality and execution. *Scientific Data*. 2022;9(1). doi:10.1038/s41597-022-01143-6
- 55. Allaire J, Xie Y, Dervieux C, et al. Rmarkdown: Dynamic documents for r. 2023. https://github.com/rstudio/rmarkdown.
- 56. Gohel D, Ross N. Officedown: Enhanced 'r markdown' format for 'word' and 'PowerPoint'. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=officedown.
- 57. Xie Y. Bookdown: Authoring books and technical documents with r markdown. 2023. https://github.com/rstudio/bookdown.
- 58. Allaire J, Xie Y, Dervieux C, et al. *Rmarkdown: Dynamic Documents for r.*; 2023. https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown.
- 59. Holmes DT, Mobini M, McCudden CR. Reproducible manuscript preparation with RMarkdown application to JMSACL and other Elsevier Journals. *Journal of Mass Spectrometry and Advances in the Clinical Lab.* 2021;22:8-16. doi:10.1016/j.jmsacl.2021.09.002
- 60. Ioannidis JPA. How to Make More Published Research True. *PLoS Medicine*. 2014;11(10):e1001747. doi:10.1371/journal.pmed.1001747
- 61. Krieger N, Perzynski A, Dalton J. Projects: A project infrastructure for researchers. 2021. https://CRAN.R-project.org/package=projects.
- 62. Schultze A, Tazare J. The role of programming code sharing in improving the transparency of medical research. *BMJ*. October 2023:p2402. doi:10.1136/bmj.p2402
- 63. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 64. Zhao Y, Xiao N, Anderson K, Zhang Y. Electronic common technical document submission with analysis using R. *Clinical Trials*. 2022;20(1):89-92. doi:10.1177/17407745221123244
- 65. Francisco Rodríguez-Sánchez, Connor P. Jackson, Shaurita D. Hutchins. Grateful: Facilitate citation of r packages. 2023. https://github.com/Pakillo/grateful.
- 66. Aguinis H, Pierce CA, Culpepper SA. Scale Coarseness as a Methodological Artifact. *Organizational Research Methods*. 2008;12(4):623-652. doi:10.1177/1094428108318065
- 67. Bryer J, Speerschneider K. Likert: Analysis and visualization likert items. 2016. https://CRAN.R-project.org/package=likert.
- 68. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 69. Healy MJR, Goldstein H. Regression to the mean. *Annals of Human Biology*. 1978;5(3):277-280. doi:10.1080/03014467800002891
- 70. Altman DG, Bland JM. Measurement in medicine: The analysis of method comparison studies. *The Statistician*. 1983;32(3):307. doi:10.2307/2987937
- 71. Olson K. What Are Data? *Qualitative Health Research*. 2021;31(9):1567-1569. doi:10.1177/10497323211015960
- 72. Smeden M van. A very short list of common pitfalls in research design, data analysis, and reporting. *PRi- MER*. 2022;6. doi:10.22454/PRiMER.2022.511416

- 73. Vetter TR. Fundamentals of Research Data and Variables. *Anesthesia & Analgesia*. 2017;125(4):1375-1380. doi:10.1213/ane.000000000002370
- 74. Altman DG, Bland JM. Missing data. *BMJ*. 2007;334(7590):424-424. doi:10.1136/bmj.38977.682025.2c
- 75. Heymans MW, Twisk JWR. Handling missing data in clinical research. *Journal of Clinical Epidemiology*. September 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.08.016
- 76. Carpenter JR, Smuk M. Missing data: A statistical framework for practice. *Biometrical Journal*. 2021;63(5):915-947. doi:10.1002/bimj.202000196
- 77. Yanagida T. Misty: Miscellaneous functions 't. yanagida'. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=misty.
- 78. Little RJA. A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values. *Journal of the American Statistical Association*. 1988;83(404):1198-1202. doi:10.1080/01621459.1988.10478722
- 79. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2022. https://www.R-project.org/.
- 80. Austin PC, Buuren S van. Logistic regression vs. predictive mean matching for imputing binary covariates. *Statistical Methods in Medical Research*. September 2023. doi:10.1177/09622802231198795
- 81. Buuren S van, Groothuis-Oudshoorn K. {Mice}: Multivariate imputation by chained equations in r. 2011;45:1-67. doi:10.18637/jss.v045.i03
- 82. Rubin DB. Statistical matching using file concatenation with adjusted weights and multiple imputations. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1986;4(1):87. doi:10.2307/1391390
- 83. Little RJA. Missing-Data Adjustments in Large Surveys. *Journal of Business & Economic Statistics*. 1988;6(3):287-296. doi:10.1080/07350015.1988.10509663
- 84. Robitzsch A, Grund S. Miceadds: Some additional multiple imputation functions, especially for 'mice'. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=miceadds.
- 85. Akl EA, Shawwa K, Kahale LA, et al. Reporting missing participant data in randomised trials: systematic survey of the methodological literature and a proposed guide. *BMJ Open.* 2015;5(12):e008431. doi:10.1136/bmjopen-2015-008431
- 86. FitzJohn R. Ids: Generate random identifiers. 2017. https://CRAN.R-project.org/package=ids.
- 87. Brown C. Hash: Full featured implementation of hash tables/associative arrays/dictionaries. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=hash.
- 88. Hendricks P. Anonymizer: Anonymize data containing personally identifiable information. 2023. https://github.com/paulhendricks/anonymizer.
- 89. Lucas DE with contributions by A, Tuszynski J, Bengtsson H, et al. Digest: Create compact hash digests of r objects. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=digest.
- 90. Nowok B, Raab GM, Dibben C. {Synthpop}: Bespoke creation of synthetic data in {r}. 2016;74. doi:10.18637/jss.v074.i11
- 91. Baillie M, Cessie S le, Schmidt CO, Lusa L, Huebner M. Ten simple rules for initial data analysis. *PLOS Computational Biology*. 2022;18(2):e1009819. doi:10.1371/journal.pcbi.1009819
- 92. Buttliere B. Adopting standard variable labels solves many of the problems with sharing and reusing data. *Methodological Innovations*. 2021;14(2):205979912110266. doi:10.1177/20597991211026616

- 93. Pebesma E, Mailund T, Hiebert J. Measurement units in {r}. 2016;8. doi:10.32614/RJ-2016-061
- 94. Firke S. Janitor: Simple tools for examining and cleaning dirty data. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=janitor.
- 95. Harrell Jr FE. Hmisc: Harrell miscellaneous. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=Hmisc.
- 96. Tierney N, Cook D. Expanding Tidy Data Principles to Facilitate Missing Data Exploration, Visualization and Assessment of Imputations. *Journal of Statistical Software*. 2023;105(7). doi:10.18637/jss.v105.i07
- 97. Hammill D. DataEditR: An interactive editor for viewing, entering, filtering & editing data. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=DataEditR.
- 98. Broman KW, Woo KH. Data Organization in Spreadsheets. *The American Statistician*. 2018;72(1):2-10. doi:10.1080/00031305.2017.1375989
- 99. Juluru K, Eng J. Use of Spreadsheets for Research Data Collection and Preparation: *Academic Radiology*. 2015;22(12):1592-1599. doi:10.1016/j.acra.2015.08.024
- 100. Dowle M, Srinivasan A. Data.table: Extension of 'data.frame'. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=data.table.
- 101. Altman DG, Bland JM. Statistics notes Variables and parameters. *BMJ*. 1999;318(7199):1667-1667. doi:10.1136/bmj.318.7199.1667
- 102. Ali Z, Bhaskar Sb. Basic statistical tools in research and data analysis. *Indian Journal of Anaesthesia*. 2016;60(9):662. doi:10.4103/0019-5049.190623
- 103. Dettori JR, Norvell DC. The Anatomy of Data. *Global Spine Journal*. 2018;8(3):311-313. doi:10.1177/2192568217746998
- 104. Kaliyadan F, Kulkarni V. Types of variables, descriptive statistics, and sample size. *Indian Dermatology Online Journal*. 2019;10(1):82. doi:10.4103/idoj.idoj 468 18
- 105. Barkan H. Statistics in clinical research: Important considerations. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2015;18(1):74. doi:10.4103/0971-9784.148325
- 106. Bland JM, Altman DG. Statistics Notes: Transforming data. *BMJ*. 1996;312(7033):770-770. doi:10.1136/bmj.312.7033.770
- 107. Fedorov V, Mannino F, Zhang R. Consequences of dichotomization. *Pharmaceutical Statistics*. 2009;8(1):50-61. doi:10.1002/pst.331
- 108. Osborne J. Improving your data transformations: Applying the box-cox transformation. *University of Massachusetts Amherst*. 2010. doi:10.7275/QBPC-GK17
- 109. Box GEP, Cox DR. An Analysis of Transformations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* (Methodological). 1964;26(2):211-243. doi:10.1111/j.2517-6161.1964.tb00553.x
- 110. Venables WN, Ripley BD. Modern applied statistics with s. 2002. https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/.
- 111. MacCallum RC, Zhang S, Preacher KJ, Rucker DD. On the practice of dichotomization of quantitative variables. *Psychological Methods*. 2002;7(1):19-40. doi:10.1037/1082-989x.7.1.19
- 112. Altman DG, Royston P. The cost of dichotomising continuous variables. *BMJ*. 2006;332(7549):1080.1. doi:10.1136/bmj.332.7549.1080

- 113. Royston P, Altman DG, Sauerbrei W. Dichotomizing continuous predictors in multiple regression: a bad idea. *Statistics in Medicine*. 2005;25(1):127-141. doi:10.1002/sim.2331
- 114. Collins GS, Ogundimu EO, Cook JA, Manach YL, Altman DG. Quantifying the impact of different approaches for handling continuous predictors on the performance of a prognostic model. *Statistics in Medicine*. 2016;35(23):4124-4135. doi:10.1002/sim.6986
- 115. Nelson SLP, Ramakrishnan V, Nietert PJ, Kamen DL, Ramos PS, Wolf BJ. An evaluation of common methods for dichotomization of continuous variables to discriminate disease status. *Communications in Statistics Theory and Methods*. 2017;46(21):10823-10834. doi:10.1080/03610926.2016.1248783
- 116. Bennette C, Vickers A. Against quantiles: categorization of continuous variables in epidemiologic research, and its discontents. *BMC Medical Research Methodology*. 2012;12(1). doi:10.1186/1471-2288-12-21
- 117. Barnier J, Briatte F, Larmarange J. Questionr: Functions to make surveys processing easier. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=questionr.
- 118. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. *Cancer*. 1950;3(1):32-35. doi:10.1002/1097-0142(1950)3:1<32::aid-cncr2820030106>3.0.co;2-3
- 119. Strobl C, Boulesteix AL, Augustin T. Unbiased split selection for classification trees based on the Gini Index. *Computational Statistics & Data Analysis*. 2007;52(1):483-501. doi:10.1016/j.csda.2006.12.030
- 120. Pearson K. X. On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1900;50(302):157-175. doi:10.1080/14786440009463897
- 121. Greiner M, Pfeiffer D, Smith RD. Principles and practical application of the receiver-operating characteristic analysis for diagnostic tests. *Preventive Veterinary Medicine*. 2000;45(1-2):23-41. doi:10.1016/s0167-5877(00)00115-x
- 122. Fleiss JL. Measuring nominal scale agreement among many raters. *Psychological Bulletin*. 1971;76(5):378-382. doi:10.1037/h0031619
- 123. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 124. Kay M. {Ggdist}: Visualizations of distributions and uncertainty in the grammar of graphics. 2024;30. doi:10.1109/TVCG.2023.3327195
- 125. Tang Y, Horikoshi M, Li W. Ggfortify: Unified interface to visualize statistical result of popular r packages. 2016;8. doi:10.32614/RJ-2016-060
- 126. Kanji G. 100 statistical tests. 2006. doi:10.4135/9781849208499
- 127. Curran-Everett D. Explorations in statistics: standard deviations and standard errors. *Advances in Physiology Education*. 2008;32(3):203-208. doi:10.1152/advan.90123.2008
- 128. Altman DG, Bland JM. Statistics Notes: Quartiles, quintiles, centiles, and other quantiles. *BMJ*. 1994;309(6960):996-996. doi:10.1136/bmj.309.6960.996
- 129. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. I: Different types of data need different statistical tests. *BMJ*. 1997;315(7104):364-366. doi:10.1136/bmj.315.7104.364
- 130. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.

- 131. R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing; 2023. https://www.R-project.org/.
- 132. Zuur AF, Ieno EN, Elphick CS. A protocol for data exploration to avoid common statistical problems. *Methods in Ecology and Evolution*. 2009;1(1):3-14. doi:10.1111/j.2041-210x.2009.00001.x
- 133. Komsta L. Outliers: Tests for outliers. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=outliers.
- 134. Chatfield C. Exploratory data analysis. *European Journal of Operational Research*. 1986;23(1):5-13. doi:10.1016/0377-2217(86)90209-2
- 135. Ferketich S, Verran J. Technical Notes. *Western Journal of Nursing Research*. 1986;8(4):464-466. doi:10.1177/019394598600800409
- 136. Kerr NL. HARKing: Hypothesizing After the Results are Known. *Personality and Social Psychology Review*. 1998;2(3):196-217. doi:10.1207/s15327957pspr0203 4
- 137. Landis SC, Amara SG, Asadullah K, et al. A call for transparent reporting to optimize the predictive value of preclinical research. *Nature*. 2012;490(7419):187-191. doi:10.1038/nature11556
- 138. Huebner M, Vach W, Cessie S le. A systematic approach to initial data analysis is good research practice. *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery*. 2016;151(1):25-27. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.09.085
- 139. Krasser R. Explore: Simplifies exploratory data analysis. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=explore.
- 140. Petersen AH, Ekstrøm CT. {dataMaid}: Your assistant for documenting supervised data quality screening in {r}. 2019;90. doi:10.18637/jss.v090.i06
- 141. Cui B. DataExplorer: Automate data exploration and treatment. 2020. https://CRAN.R-project.org/package=DataExplorer.
- Dayanand Ubrangala, R K, Prasad Kondapalli R, Putatunda S. SmartEDA: Summarize and explore the data. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=SmartEDA.
- 143. Mock T. gtExtras: Extending 'gt' for beautiful HTML tables. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=gtExtras.
- 144. Nijs V. Radiant: Business analytics using r and shiny. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=radiant.
- 145. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 146. Cummings P, Rivara FP. Reporting Statistical Information in Medical Journal Articles. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*. 2003;157(4):321. doi:10.1001/archpedi.157.4.321
- 147. Inskip H, Ntani G, Westbury L, et al. Getting started with tables. *Archives of Public Health*. 2017;75(1). doi:10.1186/s13690-017-0180-1
- 148. Kwak SG, Kang H, Kim JH, et al. The principles of presenting statistical results: Table. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2021;74(2):115-119. doi:10.4097/kja.20582
- 149. Barnett A. Automated detection of over- and under-dispersion in baseline tables in randomised controlled trials. *F1000Research*. 2023;11:783. doi:10.12688/f1000research.123002.2
- 150. Gohel D, Skintzos P. Flextable: Functions for tabular reporting. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=flextable.

- 151. Thériault R. {Rempsyc}: Convenience functions for psychology. 2023;8:5466. doi:10.21105/joss.05466
- 152. Rich B. table1: Tables of descriptive statistics in HTML. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=table1.
- 153. Sjoberg DD, Whiting K, Curry M, Lavery JA, Larmarange J. Reproducible summary tables with the gtsummary package. 2021;13:570-580. doi:10.32614/RJ-2021-053
- Westreich D, Greenland S. The Table 2 Fallacy: Presenting and Interpreting Confounder and Modifier Coefficients. *American Journal of Epidemiology*. 2013;177(4):292-298. doi:10.1093/aje/kws412
- 155. Chen H, Lu Y, Slye N. Testing for baseline differences in clinical trials. *International Journal of Clinical Trials*. 2020;7(2):150. doi:10.18203/2349-3259.ijct20201720
- 156. Pijls BG. The Table I Fallacy: P Values in Baseline Tables of Randomized Controlled Trials. *Journal of Bone and Joint Surgery*. 2022;104(16):e71. doi:10.2106/jbjs.21.01166
- 157. Hayes-Larson E, Kezios KL, Mooney SJ, Lovasi G. Who is in this study, anyway? Guidelines for a useful Table 1. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2019;114:125-132. doi:10.1016/j.jclinepi.2019.06.011
- 158. Bandoli G, Palmsten K, Chambers CD, Jelliffe-Pawlowski LL, Baer RJ, Thompson CA. Revisiting the Table 2 fallacy: A motivating example examining preeclampsia and preterm birth. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*. 2018;32(4):390-397. doi:10.1111/ppe.12474
- 159. Park JH, Lee DK, Kang H, et al. The principles of presenting statistical results using figures. *Korean Journal of Anesthesiology*. 2022;75(2):139-150. doi:10.4097/kja.21508
- 160. Wickham H. ggplot2: Elegant graphics for data analysis. 2016. https://ggplot2.tidyverse.org.
- 161. Sievert C. Interactive web-based data visualization with r, plotly, and shiny. 2020. https://plotly-r.com.
- 162. Wei T, Simko V. R package 'corrplot': Visualization of a correlation matrix. 2021. https://github.com/taiyun/corrplot.
- 163. Cumming G, Fidler F, Vaux DL. Error bars in experimental biology. *The Journal of Cell Biology*. 2007;177(1):7-11. doi:10.1083/jcb.200611141
- 164. Weissgerber TL, Winham SJ, Heinzen EP, et al. Reveal, Don't Conceal. *Circulation*. 2019;140(18):1506-1518. doi:10.1161/circulationaha.118.037777
- 165. Xiao N. Ggsci: Scientific journal and sci-fi themed color palettes for 'ggplot2'. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=ggsci.
- 166. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. 2023. https://www.R-project.org/.
- 167. Urbanek S, Johnson K. Tiff: Read and write TIFF images. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=tiff.
- 168. Curran-Everett D. Explorations in statistics: hypothesis tests and *P* values. *Advances in Physiology Education*. 2009;33(2):81-86. doi:10.1152/advan.90218.2008
- 169. Goodman SN. Toward Evidence-Based Medical Statistics. 1: The P Value Fallacy. *Annals of Internal Medicine*. 1999;130(12):995. doi:10.7326/0003-4819-130-12-199906150-00008
- 170. McCaskey K, Rainey C. Substantive importance and the veil of statistical significance. *Statistics, Politics and Policy*. 2015;6(1-2). doi:10.1515/spp-2015-0001

- 171. Vandenbroucke JP, Pearce N. From ideas to studies: how to get ideas and sharpen them into research questions. *Clinical Epidemiology*. 2018; Volume 10:253-264. doi:10.2147/clep.s142940
- 172. Lakens D, Scheel AM, Isager PM. Equivalence Testing for Psychological Research: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. 2018;1(2):259-269. doi:10.1177/2515245918770963
- 173. Sullivan GM, Feinn R. Using Effect Size—or Why the *P* Value Is Not Enough. *Journal of Graduate Medical Education*. 2012;4(3):279-282. doi:10.4300/jgme-d-12-00156.1
- 174. Heckman MG, Davis JM, Crowson CS. Post Hoc Power Calculations: An Inappropriate Method for Interpreting the Findings of a Research Study. *The Journal of Rheumatology*. 2022;49(8):867-870. doi:10.3899/jrheum.211115
- 175. Champely S. Pwr: Basic functions for power analysis. 2020. https://CRAN.R-project.org/package=pwr.
- 176. Iddi S, Donohue MC. Power and sample size for longitudinal models in r-the longpower package and shiny app. 2022;14:264-281.
- 177. Lakens D, Caldwell A. Simulation-based power analysis for factorial analysis of variance designs. 2021;4:251524592095150. doi:10.1177/2515245920951503
- 178. Baranger DAA, Finsaas MC, Goldstein BL, Vize CE, Lynam DR, Olino TM. Tutorial: Power analyses for interaction effects in cross-sectional regressions. 2022. doi:10.31234/osf.io/5ptd7
- 179. Goodman SN. Aligning statistical and scientific reasoning. *Science*. 2016;352(6290):1180-1181. doi:10.1126/science.aaf5406
- 180. Greenhalgh T. How to read a paper: Statistics for the non-statistician. II: Significant relations and their pitfalls. *BMJ*. 1997;315(7105):422-425. doi:10.1136/bmj.315.7105.422
- 181. Weintraub PG. The Importance of Publishing Negative Results. *Journal of Insect Science*. 2016;16(1):109. doi:10.1093/jisesa/iew092
- 182. Altman DG, Bland JM. Statistics notes: Absence of evidence is not evidence of absence. *BMJ*. 1995;311(7003):485-485. doi:10.1136/bmj.311.7003.485
- 183. Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: effect size. *Restorative Dentistry & Endodontics*. 2015;40(4):328. doi:10.5395/rde.2015.40.4.328
- 184. Ben-Shachar MS, Lüdecke D, Makowski D. {E} ffectsize: Estimation of effect size indices and standardized parameters. 2020;5:2815. doi:10.21105/joss.02815
- 185. Bours MJL. Using mediators to understand effect modification and interaction. *Journal of Clinical Epidemiology*. September 2023. doi:10.1016/j.jclinepi.2023.09.005
- 186. Altman DG, Matthews JNS. Statistics Notes: Interaction 1: heterogeneity of effects. *BMJ*. 1996;313(7055):486-486. doi:10.1136/bmj.313.7055.486
- 187. Pinheiro J, Bates D, R Core Team. Nlme: Linear and nonlinear mixed effects models. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=nlme.
- 188. Sabanes Bove D, Dedic J, Kelkhoff D, et al. Mmrm: Mixed models for repeated measures. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=mmrm.
- 189. Lenth RV. Emmeans: Estimated marginal means, aka least-squares means. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=emmeans.

- 190. Baron RM, Kenny DA. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1986;51(6):1173-1182. doi:10.1037/0022-3514.51.6.1173
- 191. GREENLAND S, SCHLESSELMAN JJ, CRIQUI MH. THE FALLACY OF EMPLOYING STANDARDIZED REGRESSION COEFFICIENTS AND CORRELATIONS AS MEASURES OF EFFECT. *American Journal of Epidemiology*. 1986;123(2):203-208. doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a114229
- 192. Greenland S, Maclure M, Schlesselman JJ, Poole C, Morgenstern H. Standardized Regression Coefficients. *Epidemiology*. 1991;2(5):387-392. doi:10.1097/00001648-199109000-00015
- 193. LATTER OH. THE EGG OF CUCULUS CANORUS: AN ENQUIRY INTO THE DIMENSIONS OF THE CUCKOO'S EGO AND THE RELATION OF THE VARIATIONS TO THE SIZE OF THE EGGS OF THE FOSTER-PARENT, WITH NOTES ON COLORATION, &c. *Biometrika*. 1902;1(2):164-176. doi:10.1093/biomet/1.2.164
- 194. Aylmer Fisher R. The arrangement of field experiments. *Ministry of Agriculture and Fisheries*. 1926. doi:10.23637/ROTHAMSTED.8V61Q
- 195. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA Statement on *p*-Values: Context, Process, and Purpose. *The American Statistician*. 2016;70(2):129-133. doi:10.1080/00031305.2016.1154108
- 196. Altman N, Krzywinski M. P values and the search for significance. *Nature Methods*. 2017;14(1):3-4. doi:10.1038/nmeth.4120
- 197. Heinze G, Dunkler D. Five myths about variable selection. *Transplant International*. 2016;30(1):6-10. doi:10.1111/tri.12895
- 198. Breznau N, Rinke EM, Wuttke A, et al. Observing many researchers using the same data and hypothesis reveals a hidden universe of uncertainty. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2022;(44):e2203150119. doi:10.1073/pnas.2203150119
- 199. Dwivedi AK, Shukla R. Evidence-based statistical analysis and methods in biomedical research (SAMBR) checklists according to design features. *CANCER REPORTS*. 2019;3(4). doi:10.1002/cnr2.1211
- 200. Dwivedi AK. How to Write Statistical Analysis Section in Medical Research. *Journal of Investigative Medicine*. 2022;70(8):1759-1770. doi:10.1136/jim-2022-002479
- 201. Kim N, Fischer AH, Dyring-Andersen B, Rosner B, Okoye GA. Research Techniques Made Simple: Choosing Appropriate Statistical Methods for Clinical Research. *Journal of Investigative Dermatology*. 2017;137(10):e173-e178. doi:10.1016/j.jid.2017.08.007
- 202. Marusteri M, Bacarea V. Comparing groups for statistical differences: How to choose the right statistical test? *Biochemia Medica*. 2010:15-32. doi:10.11613/bm.2010.004
- 203. Mishra P, Pandey C, Singh U, Keshri A, Sabaretnam M. Selection of appropriate statistical methods for data analysis. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2019;22(3):297. doi:10.4103/aca.aca_248_18
- 204. Ray A, Najmi A, Sadasivam B. How to choose and interpret a statistical test? An update for budding researchers. *Journal of Family Medicine and Primary Care*. 2021;10(8):2763. doi:10.4103/jfmpc.jfmpc_433_21
- 205. Nayak B, Hazra A. How to choose the right statistical test? *Indian Journal of Ophthalmology*. 2011;59(2):85. doi:10.4103/0301-4738.77005
- 206. Shankar S, Singh R. Demystifying statistics: How to choose a statistical test? *Indian Journal of Rheumatology*. 2014;9(2):77-81. doi:10.1016/j.injr.2014.04.002

- 207. Meyer F, Perrier V. Esquisse: Explore and visualize your data interactively. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=esquisse.
- 208. Diedenhofen B, Musch J. Cocor: A comprehensive solution for the statistical comparison of correlations. 2015;10:e0121945. doi:10.1371/journal.pone.0121945
- 209. Diedenhofen B, Musch J. Cocor: A comprehensive solution for the statistical comparison of correlations. 2015;10:e0121945. doi:10.1371/journal.pone.0121945
- 210. Khamis H. Measures of Association: How to Choose? *Journal of Diagnostic Medical Sonography*. 2008;24(3):155-162. doi:10.1177/8756479308317006
- 211. Allison JS, Santana L, (Jaco) Visagie IJH. A primer on simple measures of association taught at undergraduate level. *Teaching Statistics*. 2022;44(3):96-103. doi:10.1111/test.12307
- 212. Dahlke JA, Wiernik BM. {Psychmeta}: An r package for psychometric meta-analysis. 2019;43. doi:10.1177/0146621618795933
- 213. Anscombe FJ. Graphs in Statistical Analysis. *The American Statistician*. 1973;27(1):17-21. doi:10.1080/00031305.1973.10478966
- 214. Northrop PJ. Anscombiser: Create datasets with identical summary statistics. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=anscombiser.
- 215. Makowski D, Wiernik BM, Patil I, Lüdecke D, Ben-Shachar MS. {{Correlation}}: Methods for correlation analysis. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=correlation.
- 216. Lüdecke D, Ben-Shachar MS, Patil I, et al. Easystats: Framework for easy statistical modeling, visualization, and reporting. 2022. https://easystats.github.io/easystats/.
- 217. Wei T, Simko V. R package 'corrplot': Visualization of a correlation matrix. 2021. https://github.com/taiyun/corrplot.
- 218. Griffith DM, Veech JA, Marsh CJ. {Cooccur}: Probabilistic species co-occurrence analysis in {r}. 2016;69. doi:10.18637/jss.v069.c02
- 219. McHugh ML. The chi-square test of independence. *Biochemia Medica*. 2013:143-149. doi:10.11613/bm.2013.018
- 220. Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: Chi-squared test and Fisher's exact test. *Restorative Dentistry & Endodontics*. 2017;42(2):152. doi:10.5395/rde.2017.42.2.152
- 221. Sjoberg DD, Whiting K, Curry M, Lavery JA, Larmarange J. Reproducible summary tables with the gtsummary package. 2021;13:570-580. doi:10.32614/RJ-2021-053
- 222. Anderson D, Heiss A, Sumners J. Equatiomatic: Transform models into 'LaTeX' equations. 2024. https://CRAN.R-project.org/package=equatiomatic.
- 223. Lüdecke D. Ggeffects: Tidy data frames of marginal effects from regression models. 2018;3:772. doi:10.21105/joss.00772
- 224. Lüdecke D, Ben-Shachar MS, Patil I, Waggoner P, Makowski D. {Performance}: An {r} package for assessment, comparison and testing of statistical models. 2021;6:3139. doi:10.21105/joss.03139
- 225. Arel-Bundock V. {Modelsummary}: Data and model summaries in $\{r\}$. 2022;103. doi:10.18637/jss.v103.i01

- 226. Hidalgo B, Goodman M. Multivariate or Multivariable Regression? *American Journal of Public Health*. 2013;103(1):39-40. doi:10.2105/ajph.2012.300897
- 227. Suits DB. Use of Dummy Variables in Regression Equations. *Journal of the American Statistical Association*. 1957;52(280):548-551. doi:10.1080/01621459.1957.10501412
- Healy MJ. Statistics from the inside. 16. Multiple regression (2). *Archives of Disease in Childhood*. 1995;73(3):270-274. doi:10.1136/adc.73.3.270
- 229. Kaplan J. fastDummies: Fast creation of dummy (binary) columns and rows from categorical variables. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=fastDummies.
- DALES LG, URY HK. An Improper Use of Statistical Significance Testing in Studying Covariables. *International Journal of Epidemiology*. 1978;7(4):373-376. doi:10.1093/ije/7.4.373
- 231. Sun GW, Shook TL, Kay GL. Inappropriate use of bivariable analysis to screen risk factors for use in multivariable analysis. *Journal of Clinical Epidemiology*. 1996;49(8):907-916. doi:10.1016/0895-4356(96)00025-x
- 232. Bland JM, Altman DG. Statistics notes: Matching. *BMJ*. 1994;309(6962):1128-1128. doi:10.1136/bmj.309.6962.1128
- Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information & Libraries Journal. 2009;26(2):91-108. doi:10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x
- 234. Sut N. Study designs in medicine. Balkan Medical Journal. 2015;31(4):273-277. doi:10.5152/balkanmedj.2014.1408
- 235. Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B, Souza AC de, Alexandre NMC, Guirardello E de B. Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: avaliação da confiabilidade e da validade. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2017;26(3):649-659. doi:10.5123/s1679-49742017000300022
- 236. Reeves BC, Wells GA, Waddington H. Quasi-experimental study designs series—paper 5: a checklist for classifying studies evaluating the effects on health interventions—a taxonomy without labels. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2017;89:30-42. doi:10.1016/j.jclinepi.2017.02.016
- Echevarría-Guanilo ME, Gonçalves N, Romanoski PJ. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF MEASURE-MENT INSTRUMENTS: CONCEPTUAL BASIS AND EVALUATION METHODS - PART II. Texto & Contexto - Enfermagem. 2019;28. doi:10.1590/1980-265x-tce-2017-0311
- 238. Chassé M, Fergusson DA. Diagnostic Accuracy Studies. *Seminars in Nuclear Medicine*. 2019;49(2):87-93. doi:10.1053/j.semnuclmed.2018.11.005
- 239. Chidambaram AG, Josephson M. Clinical research study designs: The essentials. *PEDIATRIC INVESTI-GATION*. 2019;3(4):245-252. doi:10.1002/ped4.12166
- 240. Erdemir A, Mulugeta L, Ku JP, et al. Credible practice of modeling and simulation in healthcare: ten rules from a multidisciplinary perspective. *Journal of Translational Medicine*. 2020;18(1). doi:10.1186/s12967-020-02540-4
- 241. Yang B, Olsen M, Vali Y, et al. Study designs for comparative diagnostic test accuracy: A methodological review and classification scheme. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;138:128-138. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.04.013
- 242. Chipman H, Bingham D. Let's practice what we preach: Planning and interpreting simulation studies with design and analysis of experiments. *Canadian Journal of Statistics*. 2022;50(4):1228-1249. doi:10.1002/cjs.11719

- 243. Donthu N, Kumar S, Mukherjee D, Pandey N, Lim WM. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*. 2021;133:285-296. doi:10.1016/j.jbusres.2021.04.070
- 244. Lim WM, Kumar S. Guidelines for interpreting the results of bibliometric analysis: A sensemaking approach. *Global Business and Organizational Excellence*. August 2023. doi:10.1002/joe.22229
- 245. Rodríguez del Águila M, González-Ramírez A. Sample size calculation. *Allergologia et Immunopathologia*. 2014;42(5):485-492. doi:10.1016/j.aller.2013.03.008
- 246. Bacchetti P. Ethics and Sample Size. *American Journal of Epidemiology*. 2005;161(2):105-110. doi:10.1093/aje/kwi014
- 247. Ying X, Robinson KA, Ehrhardt S. Re-evaluating the role of pilot trials in informing effect and sample size estimates for full-scale trials: a meta-epidemiological study. *BMJ Evidence-Based Medicine*. 2023;28(6):383-391. doi:10.1136/bmjebm-2023-112358
- 248. Andrade C. Sample Size and its Importance in Research. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 2020;42(1):102-103. doi:10.4103/ijpsym.ijpsym 504 19
- 249. Goldfeld K, Wujciak-Jens J. Simstudy: Illuminating research methods through data generation. 2020;5:2763. doi:10.21105/joss.02763
- 250. DeBruine L. Faux: Simulation for factorial designs. 2023. doi:10.5281/zenodo.2669586
- 251. Cheng A, Kessler D, Mackinnon R, et al. Reporting Guidelines for Health Care Simulation Research. *Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare*. 2016;11(4):238-248. doi:10.1097/sih.000000000000150
- 252. Rosseel Y. {Lavaan}: An {r} package for structural equation modeling, 2012;48. doi:10.18637/jss.v048.i02
- 253. Contributors semTools. *semTools: Useful Tools for Structural Equation Modeling.*; 2016. https://CRAN.R-project.org/package=semTools.
- 254. William Revelle. Psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=psych.
- 255. Findley MG, Kikuta K, Denly M. External Validity. *Annual Review of Political Science*. 2021;24(1):365-393. doi:10.1146/annurev-polisci-041719-102556
- 256. Scott WA. Reliability of content analysis: The case of nominal scale coding. *Public Opinion Quarterly*. 1955;19(3):321. doi:10.1086/266577
- 257. Cohen J. A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*. 1960;20(1):37-46. doi:10.1177/001316446002000104
- 258. I. Mathematical contributions to the theory of evolution. —VII. On the correlation of characters not quantitatively measurable. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character.* 1901;195(262-273):1-47. doi:10.1098/rsta.1900.0022
- 259. Banerjee M, Capozzoli M, McSweeney L, Sinha D. Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. *Canadian Journal of Statistics*. 1999;27(1):3-23. doi:10.2307/3315487
- 260. William Revelle. Psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=psych.
- 261. Lehnert B. BlandAltmanLeh: Plots (slightly extended) bland-altman plots. 2015. https://CRAN.R-project.org/package=BlandAltmanLeh.

- 262. Gagnier JJ, Lai J, Mokkink LB, Terwee CB. COSMIN reporting guideline for studies on measurement properties of patient-reported outcome measures. *Quality of Life Research*. 2021;30(8):2197-2218. doi:10.1007/s11136-021-02822-4
- 263. Streiner DL, Kottner J. Recommendations for reporting the results of studies of instrument and scale development and testing. *Journal of Advanced Nursing*. 2014;70(9):1970-1979. doi:10.1111/jan.12402
- 264. Kottner J, Audigé L, Brorson S, et al. Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2011;64(1):96-106. doi:10.1016/j.jclinepi.2010.03.002
- 265. Steckelberg A, Balgenorth A, Berger J, Mühlhauser I. Explaining computation of predictive values: 2 × 2 table versus frequency tree. A randomized controlled trial [ISRCTN74278823]. *BMC Medical Education*. 2004;4(1). doi:10.1186/1472-6920-4-13
- 266. Greenhalgh T. How to read a paper: Papers that report diagnostic or screening tests. *BMJ*. 1997;315(7107):540-543. doi:10.1136/bmj.315.7107.540
- 267. Neth H, Gaisbauer F, Gradwohl N, Gaissmaier W. Riskyr: Rendering risk literacy more transparent. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=riskyr.
- 268. Kuhn, Max. Building predictive models in r using the caret package. *Journal of Statistical Software*. 2008;28(5):1-26. doi:10.18637/jss.v028.i05
- 269. Phillips B, Stewart LA, Sutton AJ. 'Cross hairs' plots for diagnostic meta-analysis. *Research Synthesis Methods*. 2010;1(3-4):308-315. doi:10.1002/jrsm.26
- 270. Sousa-Pinto PD with contributions from B. Mada: Meta-analysis of diagnostic accuracy. 2022. https://CRAN.R-project.org/package=mada.
- 271. Hond AAH de, Steyerberg EW, Calster B van. Interpreting area under the receiver operating characteristic curve. *The Lancet Digital Health*. 2022;4(12):e853-e855. doi:10.1016/s2589-7500(22)00188-1
- 272. Robin X, Turck N, Hainard A, et al. pROC: An open-source package for r and s+ to analyze and compare ROC curves. 2011;12:77.
- Ferreira ADS, Meziat-Filho N, Ferreira APA. Double threshold receiver operating characteristic plot for three-modal continuous predictors. *Computational Statistics*. 2021;36(3):2231-2245. doi:10.1007/s00180-021-01080-9
- 274. Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies. *BMJ*. October 2015:h5527. doi:10.1136/bmj.h5527
- 275. Elm E von, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. *Annals of Internal Medicine*. 2007;147(8):573. doi:10.7326/0003-4819-147-8-200710160-00010
- 276. Reeves BC, Gaus W. Guidelines for Reporting Non-Randomised Studies. *Complementary Medicine Research*. 2004;11(1):46-52. doi:10.1159/000080576
- 277. Bland JM, Altman DG. Comparisons within randomised groups can be very misleading. *BMJ*. 2011;342(may06 2):d561-d561. doi:10.1136/bmj.d561
- 278. Bruce CL, Juszczak E, Ogollah R, Partlett C, Montgomery A. A systematic review of randomisation method use in RCTs and association of trial design characteristics with method selection. *BMC Medical Research Methodology*. 2022;22(1). doi:10.1186/s12874-022-01786-4

- 279. Vickers AJ, Altman DG. Statistics Notes: Analysing controlled trials with baseline and follow up measurements. *BMJ*. 2001;323(7321):1123-1124. doi:10.1136/bmj.323.7321.1123
- 280. O Connell NS, Dai L, Jiang Y, et al. Methods for analysis of pre-post data in clinical research: A comparison of five common methods. *Journal of Biometrics & Biostatistics*. 2017;08(01). doi:10.4172/2155-6180.1000334
- 281. Laird N. Further Comparative Analyses of Pretest-Posttest Research Designs. *The American Statistician*. 1983;37(4a):329-330. doi:10.1080/00031305.1983.10483133
- 282. Cnaan A, Laird NM, Slasor P. Using the general linear mixed model to analyse unbalanced repeated measures and longitudinal data. *Statistics in Medicine*. 1997;16(20):2349-2380. doi:10.1002/(sici)1097-0258(19971030)16:20<2349::aid-sim667>3.0.co;2-e
- 283. Mallinckrodt CH, Lane PW, Schnell D, Peng Y, Mancuso JP. Recommendations for the Primary Analysis of Continuous Endpoints in Longitudinal Clinical Trials. *Drug Information Journal*. 2008;42(4):303-319. doi:10.1177/009286150804200402
- 284. Assmann SF, Pocock SJ, Enos LE, Kasten LE. Subgroup analysis and other (mis)uses of baseline data in clinical trials. *The Lancet*. 2000;355(9209):1064-1069. doi:10.1016/s0140-6736(00)02039-0
- 285. Stang A, Baethge C. Imbalance p values for baseline covariates in randomized controlled trials: a last resort for the use of p values? A pro and contra debate. *Clinical Epidemiology*. 2018; Volume 10:531-535. doi:10.2147/clep.s161508
- 286. Bolzern JE, Mitchell A, Torgerson DJ. Baseline testing in cluster randomised controlled trials: should this be done? *BMC Medical Research Methodology*. 2019;19(1). doi:10.1186/s12874-019-0750-8
- 287. Roberts C, Torgerson DJ. Understanding controlled trials: Baseline imbalance in randomised controlled trials. *BMJ*. 1999;319(7203):185-185. doi:10.1136/bmj.319.7203.185
- 288. Gruijters SLK. Baseline comparisons and covariate fishing: Bad statistical habits we should have broken yesterday. July 2020. http://dx.doi.org/10.31234/osf.io/qftwg.
- 289. Brookes ST, Whitely E, Egger M, Smith GD, Mulheran PA, Peters TJ. Subgroup analyses in randomized trials: risks of subgroup-specific analyses; *Journal of Clinical Epidemiology*. 2004;57(3):229-236. doi:10.1016/j.jclinepi.2003.08.009
- 290. Matthews JNS, Altman DG. Statistics Notes: Interaction 2: compare effect sizes not P values. *BMJ*. 1996;313(7060):808-808. doi:10.1136/bmj.313.7060.808
- 291. Altman DG. Statistics notes: Interaction revisited: The difference between two estimates. *BMJ*. 2003;326(7382):219-219. doi:10.1136/bmj.326.7382.219
- 292. Hauck WW, Anderson S, Marcus SM. Should We Adjust for Covariates in Nonlinear Regression Analyses of Randomized Trials? *Controlled Clinical Trials*. 1998;19(3):249-256. doi:10.1016/s0197-2456(97)00147-5
- 293. Kahan BC, Jairath V, Doré CJ, Morris TP. The risks and rewards of covariate adjustment in randomized trials: an assessment of 12 outcomes from 8 studies. *Trials*. 2014;15(1). doi:10.1186/1745-6215-15-139
- 294. Cao Y, Allore H, Vander Wyk B, Gutman R. Review and evaluation of imputation methods for multivariate longitudinal data with mixed-type incomplete variables. *Statistics in Medicine*. October 2022. doi:10.1002/sim.9592
- 295. Schulz KF. CONSORT 2010 Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomized Trials. *Annals of Internal Medicine*. 2010;152(11):726. doi:10.7326/0003-4819-152-11-201006010-00232

- 296. Dayim A. Consort: Create consort diagram. 2023. https://CRAN.R-project.org/package=consort.
- 297. Lajeunesse MJ. Facilitating systematic reviews, data extraction, and meta-analysis with the metagear package for r. 2016;7:323-330.
- 298. Moher D, Shamseer L, Clarke M, et al. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic Reviews*. 2015;4(1). doi:10.1186/2046-4053-4-1
- 299. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An r package and shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and open synthesis. 2022;18:e1230. doi:10.1002/c12.1230
- 300. Haddaway NR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An r package and shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and open synthesis. 2022;18:e1230. doi:10.1002/c12.1230
- 301. Borenstein M. In a meta-analysis, the I-squared statistic does not tell us how much the effect size varies. *Journal of Clinical Epidemiology*. October 2022. doi:10.1016/j.jclinepi.2022.10.003
- 302. Rücker G, Schwarzer G, Carpenter JR, Schumacher M. Undue reliance on I 2 in assessing heterogeneity may mislead. *BMC Medical Research Methodology*. 2008;8(1). doi:10.1186/1471-2288-8-79
- 303. Grooth HJ de, Parienti JJ. Heterogeneity between studies can be explained more reliably with individual patient data. *Intensive Care Medicine*. July 2023. doi:10.1007/s00134-023-07163-z
- 304. Dahlke JA, Wiernik BM. {Psychmeta}: An r package for psychometric meta-analysis. 2019;43. doi:10.1177/0146621618795933
- 305. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, et al. The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLOS Medicine*. 2021;18(3):e1003583. doi:10.1371/journal.pmed.1003583
- Makowski D, Lüdecke D, Patil I, Thériault R, Ben-Shachar MS, Wiernik BM. Automated results reporting as a practical tool to improve reproducibility and methodological best practices adoption. 2023. https://easystats.github.io/report/.
- 307. Wallisch C, Bach P, Hafermann L, et al. Review of guidance papers on regression modeling in statistical series of medical journals. Mathes T, ed. *PLOS ONE*. 2022;17(1):e0262918. doi:10.1371/journal.pone.0262918
- 308. Lynggaard H, Bell J, Lösch C, et al. Principles and recommendations for incorporating estimands into clinical study protocol templates. *Trials*. 2022;23(1). doi:10.1186/s13063-022-06515-2
- 309. Althouse AD, Below JE, Claggett BL, et al. Recommendations for Statistical Reporting in Cardiovascular Medicine: A Special Report From the American Heart Association. *Circulation*. 2021;144(4). doi:10.1161/circulationaha.121.055393
- 310. Lee KJ, Tilling KM, Cornish RP, et al. Framework for the treatment and reporting of missing data in observational studies: The Treatment And Reporting of Missing data in Observational Studies framework. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2021;134:79-88. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.01.008
- 311. Vickers AJ, Assel MJ, Sjoberg DD, et al. Guidelines for Reporting of Figures and Tables for Clinical Research in Urology. *Urology*. 2020;142:1-13. doi:10.1016/j.urology.2020.05.002
- 312. Assel M, Sjoberg D, Elders A, et al. Guidelines for Reporting of Statistics for Clinical Research in Urology. *Journal of Urology*. 2019;201(3):595-604. doi:10.1097/ju.0000000000000001

- 313. Gamble C, Krishan A, Stocken D, et al. Guidelines for the Content of Statistical Analysis Plans in Clinical Trials. *JAMA*. 2017;318(23):2337. doi:10.1001/jama.2017.18556
- 314. Lang TA, Altman DG. Basic statistical reporting for articles published in Biomedical Journals: The "Statistical Analyses and Methods in the Published Literature" or the SAMPL Guidelines. *International Journal of Nursing Studies*. 2015;52(1):5-9. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.09.006
- 315. Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. *PLOS Biology*. 2015;13(4):e1002128. doi:10.1371/journal.pbio.1002128
- 316. Sauerbrei W, Abrahamowicz M, Altman DG, Cessie S, Carpenter J. STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies: the STRATOS initiative. *Statistics in Medicine*. 2014;33(30):5413-5432. doi:10.1002/sim.6265
- 317. Groves T. Research methods and reporting. *BMJ*. 2008;337(oct22 1):a2201-a2201. doi:10.1136/bmj.a2201
- 318. Stratton IM, Neil A. How to ensure your paper is rejected by the statistical reviewer. *Diabetic Medicine*. 2005;22(4):371-373. doi:10.1111/j.1464-5491.2004.01443.x
- 319. Mansournia MA, Collins GS, Nielsen RO, et al. A CHecklist for statistical Assessment of Medical Papers (the CHAMP statement): explanation and elaboration. *British Journal of Sports Medicine*. 2021;55(18):1009-1017. doi:10.1136/bjsports-2020-103652
- 320. Gil-Sierra MD, Fénix-Caballero S, Abdel kader-Martin L, et al. Checklist for clinical applicability of subgroup analysis. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*. 2019;45(3):530-538. doi:10.1111/jcpt.13102

Ciência com R

Você está pronto para desbloquear o poder da análise estatística de dados e elevar sua pesquisa a novos patamares? Não procure mais. Em "Ciência com R", o Dr. Arthur de Sá Ferreira, um pesquisador experiente, oferece um guia indispensável que capacitará pesquisadores, analistas de dados e estudantes a tomarem decisões informadas e baseadas em evidências em seus empreendimentos científicos.

ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA: Beneficie-se da ampla experiência do Dr. Arthur de Sá Ferreira enquanto ele responde às perguntas mais fundamentais: O que é isso? Por que usá-lo? Quando usar? Quando não usar? Como fazer? Cada capítulo se aprofunda em questões específicas, oferecendo explicações claras e concisas e exemplos práticos.

FORMATO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: Mantenha uma conversa direta e objetiva com o autor. Descubra respostas para as perguntas comumente feitas por estudantes, pesquisadores e profissionais em todas as fases de sua jornada acadêmica e científica.

APRENDIZADO PROGRESSIVO: Navegue por uma progressão de conceitos e aplicações. Capítulos são estruturados didaticamente para maior clareza educacional, com referências cruzadas para garantir uma compreensão coesa dos tópicos inter-relacionados, reduzindo a fragmentação do conteúdo.

INSIGHTS ATUALIZADOS: Fique à frente da curva com as referências e insights mais recentes. Dr. [Seu nome] lança luz sobre preconceitos, paradoxos, mitos e práticas ilícitas na área, oferecendo uma clareza inestimável até mesmo para os pesquisadores mais experientes.

Quer você seja um estudante de pós-graduação em busca de métodos para analisar seus projetos de pesquisa, um pesquisador que precisa de informações e referências para o desenvolvimento de projetos ou um analista de dados experiente que deseja se manter atualizado, este livro é seu melhor companheiro. Além disso, pessoas de diversas áreas encontrarão neste livro uma porta de entrada para compreender a importância de fazer e responder perguntas no mundo da ciência.

Tome decisões informadas, evite armadilhas e destaque-se em sua pesquisa científica com "Ciência com R". Os insights profundos do Dr. Arthur de Sá Ferreira permitirão que você transforme seus dados em descobertas significativas, colocando você no caminho da excelência em pesquisa.