

Analisi II - 2020/21 - Corso di Studi in Fisica
Prova scritta - 7 settembre 2021

Esercizio 1. [3 pt] Si consideri la funzione

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2 + 1}}{\sqrt{2 - y}} + \log(4(x^2 + y^2) - 1).$$

- (a) Determinare il dominio D della funzione e disegnarlo. Stabilire, motivando la risposta, se D è un insieme aperto, chiuso o limitato del piano. D è compatto?
- (b) Calcolare, precisandone il campo di esistenza, la derivata parziale di f rispetto ad x .

Soluzione: (a) Il dominio $D = \{(x, y) : x^2 - 1 \leq y < 2, x^2 + y^2 > 1/4\}$ è la regione di piano delimitata inferiormente dalla parabola $y = x^2 - 1$ e superiormente dalla retta $y = 2$, privata della palla centrata nell'origine e di raggio $1/2$, $B_{1/2}(0)$. I punti della retta e quelli della circonferenza, pur essendo punti del bordo, non appartengono all'insieme: per questo motivo D non è chiuso. I punti del bordo di D e appartenenti alla parabola fanno invece parte dell'insieme: D non è dunque nemmeno aperto. L'insieme è limitato: è ad esempio contenuto in $B_{100}(0)$. D non è chiuso quindi non è compatto.

(b) La derivata parziale richiesta è definita in tutti i punti interni a D , ovvero in ogni $(x, y) \in D$ tale per cui $y - x^2 + 1 \neq 0$. Abbiamo

$$f_x(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2 - y}} \frac{-x}{\sqrt{y - x^2 + 1}} + \frac{8x}{4(x^2 + y^2) - 1}.$$

Esercizio 2. [4 pt] Calcolare o dimostrare che non esiste il seguente limite

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^a + y^a}{(x^2 + y^2)(x + y - 1)}$$

quando $a = 1$ e quando $a = 4$.

Soluzione: Nel caso $a = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, -x) = 0$ dunque il limite non esiste. Nel caso $a = 4$, il limite è 0, infatti vale la maggiorazione:

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^4 + y^4}{(x^2 + y^2)(x + y - 1)} \right| &\leq \left| \frac{(x^2 + y^2)^2}{(x^2 + y^2)(x + y - 1)} \right| \\ &\leq \left| \frac{x^2 + y^2}{x + y - 1} \right| \end{aligned}$$

e la funzione $g(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x + y - 1}$ è infinitesima quando ci si avvicina all'origine, infatti

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} -(x^2 + y^2) = 0.$$

Esercizio 3. [4 pt] a) Calcolare la derivata del campo scalare

$$f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2} + e^{x+y}$$

lungo la curva $\gamma(t) = (\sin t + 1, \log(t^2 + 1), 0)$ quando $t = 0$, giustificando se sia possibile farlo (ovvero $f \circ \gamma$ ben definita e soddisfacente alle ipotesi della regola della catena o, equivalentemente, della derivata di un campo scalare lungo una curva).

b) La curva γ è regolare?

Soluzione: a) Osserviamo che la curva $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ è di classe $C^1(\mathbb{R})$. Il dominio del campo scalare f è $\text{dom } f = \{(x, y, z) : (x, y) \neq (0, 0)\}$ e f è di classe C^1 sul suo dominio. Si ha $\gamma(0) = (1, 0, 0)$, dunque la composizione $f \circ \gamma$ è ben definita in un intorno di $t = 0$ e le funzioni sono di classe C^1 .

Grazie alla regola della derivata di un campo scalare lungo una curva (oppure la chain rule) si ha

$$\left[\frac{df}{dt} f(\gamma(t)) \right]_{|_{t=0}} = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0).$$

Essendo

$$\gamma'(t) = \left(\cos t, \frac{2t}{t^2+1}, 0 \right) \implies \gamma'(0) = (1, 0, 0),$$

$$\nabla f(x, y, z) = \left(-\frac{2xz}{(x^2+y^2)^2} + e^{x+y}, -\frac{2yz}{(x^2+y^2)^2} + e^{x+y}, \frac{1}{x^2+y^2} \right) \implies \nabla f(1, 0, 0) = (e, e, 1)$$

la derivata richiesta vale e .

b) γ è di classe $C^1(\mathbb{R})$ e $\gamma'(t) \neq (0, 0, 0)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, quindi la curva è regolare.

Esercizio 4. [4 pt] Si consideri il campo scalare

$$f(x, y) = \log(x - y) - \frac{y^3}{3} - x + 2y.$$

a) Determinare i punti critici di f e studiarne la natura.

b) Esistono punti di minimo assoluto?

Soluzione: a) Il vettore gradiente e la matrice hessiana di f in un generico punto del suo dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y\}$ sono rispettivamente

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{1}{x-y} - 1, -\frac{1}{x-y} - y^2 + 2 \right), \quad H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{(x-y)^2} & \frac{1}{(x-y)^2} \\ \frac{1}{(x-y)^2} & -\frac{1}{(x-y)^2} - 2y \end{pmatrix}.$$

Il campo è di classe C^2 nel suo dominio. I suoi punti critici sono le soluzioni del sistema

$$\begin{cases} \frac{1}{x-y} = 1 \\ -\frac{1}{x-y} = y^2 - 2, \end{cases}$$

ovvero $P_1 = (2, 1)$ e $P_2 = (0, -1)$. L'hessiana in tali punti è

$$H_f(P_1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad H_f(P_2) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dunque P_1 è un punto di massimo locale (il determinante dell'Hessiana è positivo, l'elemento in alto a sinistra negativo) mentre P_2 è un punto di sella (il determinante dell'Hessiana è negativo).

b) Osserviamo che non ci sono punti di minimo relativo quindi nemmeno assoluto.

Esercizio 5.[3 pt] Verificare che l'equazione

$$\frac{y^2}{2} - \log(1 + x^2 + y^2) + x + xy = 0$$

definisce, in un intorno del punto $(0, 0)$, un'unica funzione $x = \varphi(y)$ di classe C^1 tale che $\varphi(0) = 0$. Verificare che $y = 0$ è un punto stazionario per la funzione $\psi(y) = \varphi^2(y) + y\varphi(y)$.

Soluzione. Data $f(x, y) = \frac{y^2}{2} - \log(1 + x^2 + y^2) + x + xy$, è facile verificare che f è di classe $C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$ e che $f_x(x, y) = y - \frac{2x}{1+x^2+y^2} + 1$, pertanto $f_x(0, 0) = 1 \neq 0$. Per il teorema di Dini esiste un'unica funzione $x = \varphi(y)$ definita e di classe C^1 in un intorno di $y_0 = 0$ e tale che $\varphi(0) = 0$. Osserviamo inoltre che $\varphi'(0) = -f_y(0, 0)/f_x(0, 0)$. Poiché $f_y(x, y) = y + x - \frac{2y}{1+x^2+y^2}$, segue che $f_y(0, 0) = 0$ e dunque $\varphi'(0) = 0$. Osserviamo infine che $\psi'(y) = 2\varphi(y)\varphi'(y) + \varphi(y) + y\varphi'(y)$ pertanto $\psi'(0) = 0$.

Esercizio 6.[4 pt] Calcolare il seguente integrale doppio:

$$\int_A xye^{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}} dx dy, \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}.$$

Soluzione: Utilizzando le coordinate polari $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, si ottiene che

$$\int_A xye^{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}} dx dy = \int_{A'} \rho^3 \sin \theta \cos \theta e^{\rho \sin^2 \theta} d\rho d\theta,$$

dove

$$A' = \left\{(\rho, \theta) : 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right\}.$$

Inoltre si ha

$$\begin{aligned} \int_{A'} \rho^3 \sin \theta \cos \theta e^{\rho \cos^2 \theta} d\rho d\theta &= \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho^3 \cos \theta \cos \theta e^{\rho \cos^2 \theta} d\rho d\theta \\ &= - \int_1^2 \frac{\rho^2}{2} \left[e^{\rho \cos^2 \theta} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} d\rho = \frac{1}{2} \int_1^2 \rho^2 (e^\rho - 1) d\rho \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \int_1^2 \rho^2 e^\rho d\rho - \frac{7}{3} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ 4e^2 - e - 2 \left([\rho e^\rho]_1^2 - \int_1^2 e^\rho d\rho \right) - \frac{7}{3} \right\} \\ &= e^2 - \frac{e}{2} - \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

Esercizio 7.[4 pt] Calcolare il seguente integrale triplo

$$\int_A z(1 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz, \quad A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x^2 + y^2 \leq z^2\}.$$

Soluzione: Utilizzando le coordinate cilindriche $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, z = z$, si ha che

$$\int_A z(1 + \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz = \int_{A'} z\rho(1 + \rho) d\rho d\theta dz,$$

dove

$$A' = \{(\rho, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \rho \leq 1/\sqrt{2}, \rho \leq z \leq \sqrt{1 - \rho^2}\}.$$

Dunque risulta

$$\begin{aligned} \int_{A'} z\rho(1 + \rho) d\rho d\theta dz &= \pi \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\rho + \rho^2) \int_\rho^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz d\rho = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1 - 2\rho^2)(\rho + \rho^2) d\rho \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (\rho - 2\rho^3 + \rho^2 - 2\rho^4) d\rho = \frac{\pi}{2} \left[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{2} + \frac{\rho^3}{3} - \frac{2\rho^5}{5} \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{8} + \frac{1}{15\sqrt{2}} \right]. \end{aligned}$$

Esercizio 8.[4 pt] Discutere la convergenza semplice ed assoluta della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+2}{n^2+n+1}.$$

Soluzione. Osserviamo che si tratta di una serie a segni alterni. Per quanto riguarda la convergenza assoluta, la serie non converge assolutamente in quanto

$$\left| (-1)^n \frac{n+2}{n^2+n+1} \right| = \left| \frac{n+2}{n^2+n+1} \right| \sim \frac{1}{n}, \quad n \rightarrow \infty,$$

e la serie armonica $\sum \frac{1}{n}$ è divergente, quindi diverge anche la serie di partenza per il criterio del confronto asintotico. Per la convergenza semplice possiamo utilizzare il criterio di Leibniz. Infatti, osserviamo che la successione $b_n = \frac{n+2}{n^2+n+1} > 0$ tende a 0 per $n \rightarrow \infty$ ed è decrescente. Infatti, considerando la funzione $f(x) = \frac{x+2}{x^2+x+1}$, questa risulta derivabile su \mathbb{R} e

$$f'(x) = -\frac{x^2 + 4x + 1}{(x^2 + x + 1)^2} < 0 \quad \text{per } x \in [0, +\infty).$$

Dunque, f è decrescente su $(0, +\infty)$ e pertanto anche la successione b_n lo è. La serie è quindi una serie di Leibniz e pertanto converge.