

Simulazione 10 - calcoli

Serie

Si consideri la serie di potenze in campo complesso

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{z-3}{2} \right)^n.$$

1. Raggio di convergenza

Calcoliamo il limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{i^{n+1}}{3^{n+1} + 1} \frac{3^n + 1}{i^n} \right| = \frac{1}{3} = L.$$

Quindi $R = \frac{1}{L} = 3$. Il centro della serie $z = 3$, quindi il disco di convergenza è

$$D_3(3) = \{z \in \mathbb{C} : |z - 3| < 3\}.$$

2. Convergenza in $z = 4$ e in $z = 3 + 3i$.

In $z = 4$ la serie converge assolutamente e quindi semplicemente in quanto $4 \in D_3(3)$. Il punto $z = 3 + 3i$ si trova sul bordo del disco di convergenza, quindi studiamo la convergenza della serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{3i}{2} \right)^n. \quad (1)$$

Essendo $\left| \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{3i}{2} \right)^n \right| = \frac{3^n}{3^n + 1} \rightarrow 1$, $n \rightarrow +\infty$, la serie in $z = 3 + 3i$ non converge.

3. Convergenza semplice e assoluta.

Il teorema del disco di convergenza asserisce che gli insiemi di convergenza semplice, I_s , e assoluta, I_a , soddisfano le inclusioni

$$D_3(3) \subseteq I_a \subseteq I_s \subseteq \overline{D_3(3)}.$$

Studiamo il comportamento della serie nei punti del bordo $\partial D_3(3)$, ovvero in $z_{\vartheta} = 3 + 3e^{i\vartheta}$, $\vartheta \in [0, 2\pi]$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{z_{\vartheta} - 3}{2} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{3e^{i\vartheta}}{2} \right)^n.$$

Come al punto precedente, essendo $\left| \frac{(2i)^n}{3^n + 1} \left(\frac{3e^{i\vartheta}}{2} \right)^n \right| = \frac{3^n}{3^n + 1} \rightarrow 1$, $n \rightarrow +\infty$, la serie in z_{ϑ} non converge, per ogni valore di $\vartheta \in [0, 2\pi]$. Concludiamo quindi che $D_3(3) = I_a = I_s$.

Campo

Si consideri la forma differenziale

$$dF_a(x, y) = \frac{ax^2y}{x^6 + y^2} dx - \frac{x^3}{x^6 + y^2} dy$$

dove a un parametro reale.

1. *Dominio della forma.*

La forma è definita su tutto il piano tranne l'origine. Il dominio è quindi connesso, ma non semplicemente connesso. L'insieme non è nemmeno compatto, né stellato.

2. *Per quali valori di a la forma è chiusa.*

La forma è chiusa se è verificata la seguente condizione

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{ax^2y}{x^6 + y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x^3}{x^6 + y^2} \right)$$

ovvero se e solo se

$$ax^2(x^6 + y^2) - 2ax^2y^2 = -3x^2(x^6 + y^2) + 6x^8 \iff a = 3.$$

3. *Detta γ la curva parametrica di equazioni $\gamma(t) = (\sqrt[3]{\cos t}, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, per quali valori di a l'integrale curvilineo $\int_{\gamma} dF_a$ si annulla.*

Essendo

$$\gamma'(t) = \left(\frac{-\sin t}{3\cos^{2/3}t}, \cos t \right)$$

abbiamo che

$$\int_{\gamma} dF_a = \int_0^{2\pi} dF_a(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{a}{3} \sin^2 t - \cos^2 t \right) dt = \left(1 - \frac{a}{3} \right) \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt$$

quindi

$$\int_{\gamma} dF_a = -\left(1 + \frac{a}{3} \right) \pi.$$

L'integrale è quindi nullo se e solo se $a = -3$.

4. *Per quali valori di a la forma è esatta.*

Condizione necessaria per essere esatta è che la forma si achiusa, quindi la forma sarà esatta al più quando $a = 3$. D'altra parte in questo caso la circuitazione lungo γ non è nulla. Non esistono quindi valori del parametro per i quali la forma è esatta.


5. *Esattezza della forma sul semipiano $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y > 0\}$*

Il semipiano è un dominio semplicemente connesso pertanto in questo caso la forma è esatta se e solo se è chiusa, ovvero se e solo se $a = 3$.

Flusso

Siano:

- $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ la palla unitaria chiusa 3-dimensionale e $S = \partial B$ la sfera unitaria,
- $C = \{(x, y, z) \in B | z \geq \sqrt{x^2 + y^2}\}$,
- S_1 la calotta sferica data dall'intersezione di C con S , orientata con normale esterna alla sfera,
- S_2 la porzione della frontiera di C contenuta in B e orientata con normale uscente da C ,
- $F(x, y, z) = (3xz^2, xz + y^3, 3x^2z)$.



1. Area di S_1 .

Parametrizziamo S_1 in coordinate sferiche ($r = 1$)

$$\Phi(\vartheta, \varphi) = \begin{cases} x = \sin \vartheta \cos \varphi \\ y = \sin \vartheta \sin \varphi \\ z = \cos \vartheta \end{cases} \quad \text{con } \vartheta \in [0, \pi/4], \varphi \in [0, 2\pi].$$

Si ha quindi, essendo $|\Phi_\vartheta \wedge \Phi_\varphi| = |\sin \vartheta| = \sin \vartheta$,

$$\text{Area}(S_1) = \int_0^{\pi/4} \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi - \pi\sqrt{2}.$$

2. Area di S_2 .

Parametrizziamo S_2 come superficie cartesiana, ovvero

$$\Phi(x, y) = \begin{cases} x \\ y \\ \varphi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \quad \text{con } (x, y) \in D = \left\{ (x, y) : x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

Calcoliamo quindi

$$|\Phi_x \wedge \Phi_y| = \left| \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right) \right| = \sqrt{2}$$

da cui

$$\text{Area}(S_2) = \int_D |\Phi_x \wedge \Phi_y| dx dy = \sqrt{2} \frac{\pi}{2}.$$

3. Flusso del rotore di F attraverso S_1

Usiamo il teorema di Stokes:

$$\int_{S_1} (\operatorname{rot} F) \cdot N \, d\sigma = \int_{\Gamma} F \cdot ds$$

dove Γ è la circonferenza di parametrizzazione

$$\gamma(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos t, \frac{1}{\sqrt{2}} \sin t, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Calcoliamo

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} F \cdot ds &= \int_0^{2\pi} F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{3}{4} \sin t \cos t + \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos^2 t + \frac{1}{4} \sin^3 t \cos t \right] dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

4. Flusso del rotore di F attraverso S_2

Poiché il bordo di $S - 1$ ed S_2 è lo stesso, ma orientato in verso opposto, il teorema di Stokes garantisce che il flusso è opposto al flusso calcolato al punto precedente, ovvero vale $-\pi/2$.

5. Flusso di F uscente da C

Il flusso da calcolare vale

$$\int_{\partial C} F \cdot N \, d\sigma = \int_C (\operatorname{div} F) \, dx \, dy \, dz = 3 \int_C (x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz;$$

utilizzando le coordinate sferiche otteniamo

$$\int_{\partial C} F \cdot N \, d\sigma = 3 \int_0^1 r^4 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \vartheta \, d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{6\pi}{5} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).$$

Curva

Si considerino le curve piane

$$\gamma = \gamma_1 \cup (-\gamma_2) \cup (-\gamma_3) \cup \gamma_4 \quad e \quad \tilde{\gamma} = \gamma_3 \cup \gamma_2 \cup (-\gamma_1)$$

dove

$$\begin{cases} \gamma_1(t) = (t, -t^2 + 1), & t \in [-1, 1], \\ \gamma_2(t) = (\sqrt{1-t^2}, t), & t \in [-1, 0], \\ \gamma_3(t) = (t, -t-1), & t \in [-1, 0], \\ \gamma_4(t) = (t, 0), & t \in [-1, 1]. \end{cases}$$

1. Caratteristiche della curva γ .

γ non è una curva chiusa, infatti $\gamma_1(-1) = (-1, 0) \neq (1, 0) = \gamma_4(1)$. γ non è nemmeno una curva semplice, infatti $\gamma_1(-1) = (-1, 0) = -\gamma_3(-1)$. Inoltre γ passa per l'origine.

2. *Caratteristiche della curva $\tilde{\gamma}$.*

Banalmente si verifica che la curva è sia chiusa che semplice.

3. *Calcolo dell'integrale $\int_{\tilde{\gamma}} (-y dx + x^2 dy)$*

Usando la proprietà additiva dell'integrale abbiamo

$$\int_{\tilde{\gamma}} (-y dx + x^2 dy) = \int_{\gamma_3} \dots + \int_{\gamma_2} \dots - \int_{\gamma_1} \dots$$

Inoltre, al fine del calcolo è utile riparametrizzare γ_2 (arco di circonferenza unitaria) nel modo seguente

$$\gamma_2(\vartheta) = (\cos \vartheta, \sin \vartheta), \quad \vartheta \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right].$$

Essendo

$$\begin{cases} \gamma_1'(t) = (1, -2t), & t \in [-1, 1] \\ \gamma_2'(\vartheta) = (-\sin \vartheta, \cos \vartheta), & \vartheta \in \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right] \\ \gamma_3'(t) = (1, -1), & t \in [-1, 1], \end{cases}$$

otteniamo

$$\int_{\gamma_1} \dots = \int_{-1}^1 [(t^2 - 1) \cdot 1 + t^2 \cdot (-2t)] dt = -\frac{4}{3},$$

$$\int_{\gamma_2} \dots = \int_{3\pi/2}^{2\pi} [-\sin \vartheta (-\sin \vartheta) + \cos^3 \vartheta] d\vartheta = \int_{3\pi/2}^{2\pi} [\sin^2 \vartheta + \cos \vartheta (1 - \sin^2 \vartheta)] d\vartheta = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3},$$

$$\int_{\gamma_3} \dots = \int_{-1}^0 (t + 1 - t^2) dt = \frac{1}{6},$$

concludendo che l'integrale richiesto vale $\frac{\pi}{4} + \frac{13}{6}$.