

# Dimostrazioni per l'esame orale di Analisi Matematica A

Filippo Troncana, dalle note della professoressa A. Defranceschi con l'aiuto del collega D. Borra

A.A. 2022/2023

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
<b>I</b>	<b>Modulo 1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Irrazionalità di <math>\sqrt{2}</math></b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Funzioni in generale</b>	<b>2</b>
3.1	Funzione . . . . .	2
3.2	Immagine di una funzione . . . . .	2
3.3	Grafico di una funzione . . . . .	2
3.4	Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Insiemi numerici</b>	<b>3</b>
4.1	Disuguaglianza di Bernoulli . . . . .	3
4.2	Densità di $\mathbb{Q}$ . . . . .	3
4.3	Proprietà Archimedeana . . . . .	3
4.4	Destra e sinistra . . . . .	3
<b>II</b>	<b>Modulo 2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	

Per l'esame orale di Analisi Matematica A è richiesta la conoscenza di tutti gli enunciati e tutte le definizioni visti a lezione, oltre che la capacità di dimostrare i teoremi più importanti.

In questa trattazione sono presenti tutte le definizioni e i teoremi richiesti, e nell'indice sono evidenziati i teoremi di cui è richiesta la dimostrazione, gli unici di cui essa è allegata per garantire una trattazione più snella e orientata allo studio per l'esame.

## Parte I

# Modulo 1

## 2 Irrazionalità di $\sqrt{2}$

**Teorema.**  $\sqrt{2}$  è irrazionale, ovvero  $\nexists m, n \in \mathbb{Z} : MCD(m, n) = 1 \wedge \frac{m}{n} = \sqrt{2}$ .

*Dimostrazione.* Siano  $m, n \in \mathbb{Z}$  tali che  $MCD(m, n) = 1 \wedge \frac{m}{n} = \sqrt{2}$ . Allora  $m^2 = 2n^2$ , dunque  $m^2$  è pari e automaticamente  $m$  è pari.

Sia  $m = 2k$ , allora  $4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$ , dunque anche  $n$  è pari.

Ma allora  $MCD(m, n) \geq 2$ , assurdo, dunque non esistono tali  $m, n \in \mathbb{Z}$ .

## 3 Funzioni in generale

### 3.1 Funzione

**DEF** (Funzione). Dati due insiemi  $X, Y$ , una **funzione**  $f : X \rightarrow Y$  è una qualsiasi legge che ad ogni elemento  $x \in X$  associa un unico elemento  $y \in Y$ , e scriviamo  $y = f(x)$ .  
 $X$  si dice **dominio** di  $f$ ,  $Y$  si dice **codominio** di  $f$ .

### 3.2 Immagine di una funzione

**DEF** (Immagine). Dati due insiemi  $X, Y$  e una funzione  $f : X \rightarrow Y$ , essa induce una **funzione immagine** che indichiamo con lo stesso nome:

$$f : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(Y)$$

$$A \rightarrow \{y \in Y : \exists x \in A : y = f(x)\}$$

### 3.3 Grafico di una funzione

**DEF** (Grafico). Dati due insiemi  $X, Y$  e una funzione  $f : X \rightarrow Y$ , il **grafico** di  $f$  è l'insieme:

$$G_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

### 3.4 Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva

**DEF.** (Iniettività, suriettività e biiettività) Dati due insiemi  $X, Y$  e una funzione  $f : X \rightarrow Y$ , essa si dice:

**Iniettiva** se  $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$

**Suriettiva** se  $\forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x)$

**Biiettiva** se è sia iniettiva che suriettiva.

## 4 Insiemi numerici

### 4.1 Disuguaglianza di Bernoulli

**Proposizione 4.1** (Disuguaglianza di Bernoulli). *Sia  $x \in \mathbb{R}$  tale che  $x \geq -1$  e  $n \in \mathbb{N}$ . Allora vale:*

$$x^n \geq 1 + n(x - 1)$$

### 4.2 Densità di $\mathbb{Q}$

**Proposizione 4.2** (Densità di  $\mathbb{Q}$ ). *Siano  $x, y \in \mathbb{R}$  tali che  $x < y$ . Allora  $\exists z \in \mathbb{Q} : x < z < y$ .*

### 4.3 Proprietà Archimedeana

**Proposizione 4.3** (Proprietà Archimedeana). *Siano  $x, y \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ . Allora  $\exists n \in \mathbb{N} : y \leq nx$ .*

### 4.4 Destra e sinistra

**DEF** (Destra e sinistra). Dati  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  si dice che  $A$  sta **a sinistra** (destra) di  $B$  se  $\forall a \in A, b \in B : a \leq b$  ( $a \geq b$ ).

## Parte II

## Modulo 2