# Dimostrazioni per l'esame orale di Analisi Matematica A

Filippo Troncana, dalle note della professoressa A. Defranceschi con l'aiuto del collega D. Borra  ${\rm A.A.~2022/2023}$ 

## Indice

	$\mathbf{M}$	odulo 1
2	Irra	zionalità di $\sqrt{2}$
3	Fun	zioni in generale
	3.1	Funzione
	3.2	Immagine di una funzione
	3.3	Grafico di una funzione
	3.4	Funzione iniettiva, suriettiva e bijettiva
	Insi	iemi numerici
	4.1	Disuguaglianza di Bernoulli
	4.2	Densità di $\mathbb Q$
	4.3	Proprietà Archimedea
	4.4	Destra e sinistra
	4.5	Assioma di Dedekind

### 1 Introduzione

Per l'esame orale di Analisi Matematica A è richiesta la conoscenza di tutti gli enunciati e tutte le definizioni visti a lezione, oltre che la capacità di dimostrare i teoremi più importanti.

In questa trattazione sono presenti tutte le definizioni e i teoremi richiesti, e nell'indice sono evidenziati i teoremi di cui è richiesta la dimostrazione, gli unici di cui essa è allegata per garantire una trattazione più snella e orientata allo studio per l'esame.

#### Parte I

# Modulo 1

## 2 Irrazionalità di $\sqrt{2}$

**Teorema.**  $\sqrt{2}$  è irrazionale, ovvero  $\nexists m, n \in \mathbb{Z}$ :  $MCD(m, n) = 1 \land \frac{m}{n} = \sqrt{2}$ .

Dimostrazione. Siano  $m, n \in \mathbb{Z}$  tali che  $MCD(m, n) = 1 \wedge \frac{m^2}{n^2} = 2$ . Allora  $m^2 = 2n^2$ , dunque  $m^2$  è pari e automaticamente m è pari.

Sia m = 2k, allora  $4k^2 = 2n^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$ , dunque anche n è pari.

Ma allora  $MCD(m, n) \geq 2$ , assurdo, dunque non esistono tali  $m, n \in \mathbb{Z}$ .

## 3 Funzioni in generale

#### 3.1 Funzione

**DEF** (Funzione). Dati due insiemi X, Y, una **funzione**  $f : X \to Y$  è una qualsiasi legge che ad ogni elemento  $x \in X$  associa un unico elemento  $y \in Y$ , e scriviamo y = f(x). X si dice **dominio** di f, Y si dice **codominio** di f.

#### 3.2 Immagine di una funzione

**DEF** (Immagine). Dati due insiemi X,Y e una funzione  $f:X\to Y$ , essa induce una **funzione** immagine che indichiamo con lo stesso nome:

$$f: \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$$

$$A \to \{ y \in Y : \exists x \in A : y = f(x) \}$$

#### 3.3 Grafico di una funzione

**DEF** (Grafico). Dati due insiemi X, Y e una funzione  $f: X \to Y$ , il **grafico** di f è l'insieme:

$$G_f = \{(x, y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

#### 3.4 Funzione iniettiva, suriettiva e bijettiva

**DEF.** (Iniettività, suriettività e bijettività) Dati due insiemi X,Y e una funzione  $f:X\to Y,$  essa si dice:

**Iniettiva** se  $f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ 

**Suriettiva** se  $\forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x)$ 

Bijettiva se è sia iniettiva che suriettiva.

### 4 Insiemi numerici

#### 4.1 Disuguaglianza di Bernoulli

**Proposizione 4.1** (Disuguaglianza di Bernoulli). Sia  $x \in \mathbb{R}$  tale che  $x \ge -1$  e  $n \in \mathbb{N}$ . Allora vale:

$$x^n \ge 1 + n(x - 1)$$

#### 4.2 Densità di $\mathbb{Q}$

**Proposizione 4.2** (Densità di  $\mathbb{Q}$ ). Siano  $x, y \in \mathbb{R}$  tali che x < y. Allora  $\exists z \in \mathbb{Q} : x < z < y$ .

#### 4.3 Proprietà Archimedea

**Proposizione 4.3** (Proprietà Archimedea). Siano  $x, y \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ . Allora  $\exists n \in \mathbb{N} : y \leq nx$ .

#### 4.4 Destra e sinistra

 $\mathbf{DEF}$  (Destra e sinistra). Dati  $A,B\subseteq\mathbb{R}$  si dice che Asta a sinistra di B se

$$\forall a \in A, \forall b \in B, a \leq b$$

Analogamente, diciamo che B sta **a destra** di A.

#### 4.5 Assioma di Dedekind

**Assioma 1.** (Dedekind) Siano  $A, B \subseteq \mathbb{R}$  non vuoi tali che A stia a sinistra di B. Allora esiste  $c \in \mathbb{R}$  tale che:

$$\forall a \in A, \forall b \in B, a \le c \le b$$

.

### Parte II

# Modulo 2