

Categorie per il matematico disoccupato

Filippo L. Troncana, per il corso "Strumenti Informatici per la Matematica"

A.A. 2023/2024

1 Introduzione e prime definizioni

Durante la seconda metà del XX secolo la profondissima (sebbene apparentemente banale) osservazione del fatto che in fondo tutta la matematica è fatta di *così*¹ e frecce tra *così* ha motivato l'introduzione del concetto di Categoria.

Informalmente parlando una categoria è fatta da oggetti che condividono un certo senso di struttura e delle frecce che li collegano, che preservano questo tipo di struttura. Un esempio classico è la categoria **Set**, ovvero gli insiemi e le funzioni tra essi, oppure la categoria **Top** degli spazi topologici le cui frecce sono le funzioni continue. Procediamo a dare una definizione un po' più rigorosa.

Definizione 1.1. Una categoria \mathcal{C} consiste nelle seguenti:

- Una classe $\text{ob}(\mathcal{C})$ i cui elementi sono detti oggetti di \mathcal{C} .
- Una classe $\text{mor}(\mathcal{C})$ i cui elementi sono detti morfismi di \mathcal{C} . Ogni morfismo f ha un unico oggetto sorgente A e un unico oggetto di destinazione B , e si denota con $f : A \rightarrow B$. La classe dei morfismi tra due oggetti nella stessa categoria si indica con $\text{mor}(A, B)$.
- Per ogni terna di oggetti $A, B, C \in \text{ob}(\mathcal{C})$, è definita una legge di composizione tra morfismi, che a un morfismo $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ associa un unico morfismo $g \circ f : A \rightarrow C$. La composizione di morfismi deve rispettare le seguenti proprietà:
 - L'associatività: per qualsiasi terna di morfismi $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ e $h : C \rightarrow D$ vale $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.
 - L'esistenza del morfismo identità: per ogni oggetto $X \in \text{ob}(\mathcal{C})$ esiste un morfismo $\text{id}_X : X \rightarrow X$ tale che per ogni morfismo $f : A \rightarrow X$ e $g : X \rightarrow B$ valgono $\text{id}_X \circ f = f$ e $g \circ \text{id}_X = g$.

Osservazione 1.1. Dato che per ogni oggetto esiste un unico (la dimostrazione dell'unicità è banale) morfismo identità, una categoria risulta essere univocamente determinata dai suoi morfismi, e pertanto è possibile definire le categorie semplicemente in base alla classe dei morfismi.

Arricchiamo leggermente il nostro linguaggio

Definizione 1.2. Sia \mathcal{C} una categoria.

Se $\text{mor}(\mathcal{C})$ è un insieme (e dunque per l'osservazione precedente lo è anche $\text{ob}(\mathcal{C})$), allora \mathcal{C} si dice piccola, altrimenti si dice grande.

Una categoria in cui una volta fissati due $A, B \in \text{ob}(\mathcal{C})$ allora $\text{mor}(A, B)$ è un insieme si dice localmente piccola.

Definizione 1.3. Sia \mathcal{C} una categoria e sia $f : A \rightarrow B$ un morfismo. Esso si dice:

- Endomorfismo se $A = B$
- Isomorfismo se $\exists f' : B \rightarrow A$ tale che $f \circ f' = \text{id}_B$ e $f' \circ f = \text{id}_A$
- Automorfismo se è contemporaneamente endomorfismo e isomorfismo.

Al lettore dotato di un qualsivoglia $\varepsilon > 0$ piccolo a piacere di familiarità con l'algebra astratta, la definizione di categoria risulterà analoga a quella di monoide. In effetti un monoide $(M, +)$ non è altro che una categoria piccola con un unico oggetto (l'insieme M) e i cui morfismi corrispondono alle traslazioni degli elementi di M sugli altri elementi di M .

Inoltre, quasi sempre, quando si esprime l'unicità di qualcosa in teoria delle categorie la si considera a meno di isomorfismo, come vedremo più avanti.

¹termine tecnico

²Occasionalmente, scriveremo $A \in \mathcal{C}$ invece di $A \in \text{ob}(\mathcal{C})$ con un lieve abuso di notazione

2 Diagrammi commutativi

Ai *cat-boys*³ piace molto esprimere qualsiasi proprietà attraverso cosiddetti diagrammi commutativi, utili strumenti per esprimere le relazioni fra oggetti e morfismi in una categoria

Definizione 2.1. Un diagramma commutativo è un grafo diretto in cui i nodi sono costituiti da oggetti e i cui archi sono costituiti da morfismi tra essi in modo tale che percorrere un arco corrisponda ad applicare il morfismo a esso associato.

Ad esempio, i diagrammi commutativi possono essere usati per riformulare in modo visualmente intuitivo alcuni teoremi.

Teorema 2.1. Sia $\mathbb{K} \in \mathbf{Fld}$, siano $V, W \in \mathbf{Vec}(\mathbb{K})$ e sia $f \in \text{mor}(V, W)$. Allora $\exists! \phi \in \text{mor } V/\ker(f), \text{Im}(f)$ tale che ϕ sia un isomorfismo e si abbia $f = i \circ \phi \circ \pi$. Equivalentemente, $\exists! \phi \in \text{mor } V/\ker(f), \text{Im}(f)$ tale che il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad f \quad} & W \\ \downarrow \pi & & \uparrow i \\ V/\ker(f) & \xrightarrow{\quad \phi \quad} & \text{im}(f) \\ & \xleftarrow{\quad \phi^{-1} \quad} & \end{array}$$

3 Funtori e trasformazioni naturali

3.1 Funtori

Abbiamo parlato di oggetti e frecce tra oggetti. Ma se volessimo parlare di frecce tra le frecce?

Definizione 3.1. Siano \mathcal{C}, \mathcal{D} due categorie.

Un Funtore covariante è una mappa $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ tale che:

- $\forall X \in \text{ob}(\mathcal{C}), \exists! F(X) \in \text{ob}(\mathcal{D})$
- $\forall f : A \rightarrow B \in \text{mor}(\mathcal{C}), \exists! F(f) : F(A) \rightarrow F(B) \in \text{mor}(\mathcal{D})$

Un Funtore controvariante è una mappa G da \mathcal{C} a \mathcal{D} tale che:

- $\forall X \in \text{ob}(\mathcal{C}), \exists! G(X) \in \text{ob}(\mathcal{D})$
- $\forall f : A \rightarrow B \in \text{mor}(\mathcal{C}), \exists! G(f) : G(B) \rightarrow G(A) \in \text{mor}(\mathcal{D})$

Un Funtore (covariante o controvariante) $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ deve rispettare le seguenti proprietà:

- $\forall X \in \text{ob}(\mathcal{C}), F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$
- $\forall f, g \in \text{mor}(\mathcal{C}), F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$

La situazione che stiamo immaginando si traduce dunque in questo diagramma commutativo (dove F e G sono come nella definizione)

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \xrightarrow{\quad F(f) \quad} & & & F(Y) \\ & \uparrow F & & & \downarrow F(g) \\ & \parallel & & & \\ & \downarrow G & & & \\ & \parallel & & & \\ & \downarrow G(g) & & & \\ & \parallel & & & \\ & \downarrow G & & & \\ & \parallel & & & \\ & \downarrow F & & & \\ & \parallel & & & \\ & \downarrow F(g \circ f) & & & \\ F(X) & \xrightarrow{\quad F(g \circ f) \quad} & & & F(Z) \end{array}$$

Diagramma commutativo che mostra la relazione tra i funtori F e G e i morfismi f, g e le loro immagini $F(f), F(g), G(f), G(g)$. Le frecce verticali sono F (verso l'alto) e G (verso il basso). Le frecce orizzontali sono F (verso la destra) e G (verso la sinistra). Le frecce diagonali sono $\text{id}_{F(X)}, \text{id}_{F(Y)}, \text{id}_{F(Z)}$.

Vediamo degli esempi che ci permettano di chiarire:

³Teorici delle categorie

esistano unici $f_X : Z \rightarrow X$ e $f_Y : Z \rightarrow Y$ tali per cui il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & & \\ & \swarrow & \downarrow f & \searrow & \\ & f_X & & f_Y & \\ A & \xleftarrow{\pi_X} & X \amalg Y & \xrightarrow{\pi_Y} & Y \end{array}$$

In questo modo, generalizziamo le idee di prodotto cartesiano in **Set**, prodotto topologico in **Top** o prodotto tensoriale in **Vec**(\mathbb{K}): qualsiasi tipo di "prodotto" tra due strutture dello stesso tipo è completamente caratterizzato dalle proiezioni alle sue componenti.

5 Conclusione

In conclusione, il formalismo della teoria delle categorie fornisce una sorta di "grande teoria unificata" delle varie branche della matematica

6 Off topic

Durante il mio *spulciare* l'amplissima libreria di texlive, mi sono imbattuto nel pacchetto `rpgicons` che è semplicemente stupendo