

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Matematika – 1. stopnja

Filip Bezjak

Minimalni končni modeli prostorov

Delo diplomskega seminarja

Mentorica: dr. Petar Pavešić

Ljubljana, 2023

KAZALO

1. Uvod	4
2. Homotopska in šibka homotopska ekvivalenca	4
3. Simplicialni kompleksi	7
3.1. Poti v simplicialnem kompleksu	9
4. Končni topološki prostori in delno urejene množice	10
5. Minimalni modeli prostorov	14
6. Konstrukcije novih topoloških prostorov	18
7. Minimalni model sfere	19
8. Zanke v Hassejevem diagramu	20
9. Minimalni modeli grafov	23
Slovar strokovnih izrazov	26
Literatura	26

Minimalni končni modeli prostorov

POVZETEK

Rečemo, da je končni topološki prostor model prostora, če mu je šibko homotopsko ekvivalenten. Model je minimalen, če ima izmed vseh modelov najmanjšo kardinalnost. Končnim T_0 topološkim prostorom lahko priredimo simplicialne komplekse. Eden izmed glavnih izrekov v delu nam pa pove, da je geometrijska realizacija tega kompleksa šibko homotopsko ekvivalentna začetnemu prostoru. S tem dobimo orodje za iskanje končnih modelov prostorov. V tem delu bomo poiskali minimalne modele topoloških sfer in končnih grafov.

Minimal finite models

ABSTRACT

We say, that finite topological space is a model of a topological space, if they are weak homotopy equivalent. A model is minimal, if it has the smallest cardinality of all models of a space. Every finite T_0 space has its associated simplicial complex. One of the main theorems of this graduate thesis states, that the geometric realisation of the associated simplicial complex is weak homotopy equivalent to the initial space. This gives us a tool to find finite models of spaces. In this thesis, we will find minimal models of topological spheres and finite graphs.

Math. Subj. Class. (2020): 55U10

Ključne besede: Končni topološki prostori, šibka homotopska ekvivalenca, homotopska ekvivalenca, delno urejene množice, simplicialni kompleksi, grafi, sfere

Keywords: Finite topological spaces, weak homotopy equivalence, homotopy equivalence, partially ordered sets, simplicial complexes, graphs, spheres

1. UVOD

Tema sodi na področje algebraične topologije na končnih prostorih. Topologije na končnih prostorih so večkrat spregledane, saj je vsaka T_1 topologija na končnem prostoru diskretna. Če pa lastnosti T_1 ne zahtevamo, postanejo veliko bolj zanimive. Vsaka končna T_0 topologija nam enolično določa neko delno ureditev in obratno. Torej so končni topološki prostori in delne ureditve močno povezani. Tej povezanosti rečemo korenspodenca Alexandrova, ki jo bomo podrobneje predstavili v razdelku 4. Preden se lotimo minimalnih modelov prostorov, moramo najprej definirati homotopsko in šibko homotopsko ekvivalenco 2 ter simplicialne komplekse 3. V razdelku 5 je dokazan glavni izrek dela, izrek 5.7, ki pravi, da je končen topološki prostor šibko homotopsko ekvivalenten geometrijski realizaciji prirejenega simplicialnega kompleksa. Ker delno urejene množice predstavimo s Hassejevim diagramom, bomo tudi končne topološke prostore predstavljali na tak način. Ker pa je šibki homotopski tip enodimenzionalnega prostora odvisen le od fundamentalne grupe, bomo vpeljali poti oziroma zanke v Hassejeve diagrame 8. Grupa ekvivalenčnih razredov teh zank pa je izomorfna fundamentalni grupi prostora, kateremu smo priredili delno ureditev. Temeljni vir diplomskega dela je knjiga *Algebraic Topology of Finite Spaces and Applications* [2].

2. HOMOTOPSKA IN ŠIBKA HOMOTOPSKA EKVIVALENCA

Ena izmed glavnih nalog algebraične topologije je iskanje prostorov, ki so si na nek način podobni oziroma ekvivalentni. Prvi pojem podobnosti, ki ga spoznamo je homeomorfizem. Dva prostora sta homeomorfna, če lahko enega zvezno spremenimo v drugega in pri tem prostora ne lepimo in ga ne trgamo, oziroma če med njima obstaja homeomorfizem. Ekvivalenco med dvema prostoroma pa lahko definiramo na načine, ki so veliko širši kot homeomorfizem. Na primer torus $S^1 \times B^2$ in sfera S^1 imata podobno obliko, vendar nista homeomorfna. Zato bomo definirali homotopsko in šibko homotopsko ekvivalenco, ki bosta povezali prostore s podobnimi oblikami.

Spomnimo se, *homotopija* je taka družina preslikav $f_t(x) : X \rightarrow Y$, da je prirejena preslikava $F(x, t) : X \times I \rightarrow Y$, definirana kot $F(x, t) = f_t(x)$, zvezna. Rečemo, da sta preslikavi f_0 in f_1 homotopni in pišemo $f_0 \simeq f_1$.


Definicija 2.1. Preslikava $f : X \rightarrow Y$ je *homotopska ekvivalenca* prostorov X in Y , če obstaja preslikava $g : Y \rightarrow X$, taka da je $fg \simeq 1_Y$ in $gf \simeq 1_X$. Preslikavo g imenujemo *homotopski inverz od f* . Če taka preslikava f obstaja, rečemo, da sta prostora X in Y *homotopsko ekvivalentna*, oziroma, da imata isti *homotopski tip*.

Definicija 2.2. Naj bo $A \subseteq X$. Preslikavo $r : X \rightarrow A$ za katero velja $r|_A = 1_A$ imenujemo *retrakcija*, podprostor A pa reakt prostora X . Podprostor $A \subseteq X$ je *deformacijski reakt*, če obstaja homotopija $H : X \times I \rightarrow X$ med 1_X in preslikavo ir , kjer je $r : X \rightarrow A$ retrakcija, $i : A \rightarrow X$ pa inkluzija. Homotopijo H imenujemo *deformacijska retrakcija*. Če homotopija H miruje na množici A jo imenujemo *kreпка deformacijska retrakcija*, prostor A pa *kreпка deformacijski reakt* prostora X . Za prostor X rečemo, da je *kontraktibilen*, če obstaja deformacijska retrakcija na točko. Oziroma, če je identiteta homotopna kaki konstantni preslikavi.

Če je $A \subseteq X$ in je A deformacijski reakt od X , potem sta X in A homotopsko ekvivalentna prostora. Res, če je $i : A \rightarrow X$ inkluzija, $r : X \rightarrow A$ retrakcija, potem je $ri = 1_A$ in $ir \simeq 1_X$. Eden izmed načinov, da preverimo, ali sta prostora A in

B homotopsko ekvivalentna, je, da poiščemo prostor X , ki vsebuje A in B , kot deformacijska retrakta.

Homotopija $f_t : X \rightarrow X$, ki nam da krepko deformacijsko retrakcijo prostora X na podprostor A , ima lastnost, da velja $f_t|_A = 1_A$, za vse t . V splošnem, homotopija $f_t : X \rightarrow Y$, katere zožitev na podprostor $A \subseteq X$ je neodvisna od t imenujemo *homotopija relativno A* . Krepka deformacijska retrakcija X na A je torej homotopija med retractsom i in identiteto 1_X , relativno A , kjer je $r : X \rightarrow A$ retracts in $i : A \rightarrow X$ inkluzija.



SLIKA 1. Punktiran disk se deformacijsko retrakira na robno sfero S^1

Šibko homotopsko ekvivalenco pa opišemo preko homotopskih grup, ki jih bomo definirali v nadaljevanju. Prva homotopska grupa se imenuje fundamentalna grupa. Je grupa ekvivalenčnih razredov zank v prostoru, tj. poti z enako začetno in končno točko.

Pot v prostoru X je zvezna preslikava $f : I \rightarrow X$, pri čemer je I enotski interval $[0, 1]$. Poti sta homotopni, če lahko eno zvezno deformiramo v drugo, brez da bi premaknili krajišči poti.

Definicija 2.3. Homotopija poti v X je družina preslikav $f_t : I \rightarrow X, 0 \leq t \leq 1$, taka da

- sta krajišči $f_t(0) = x_0$ in $f_t(1) = x_1$ neodvisni od t in
- je prirejena preslikava $F : I \times X \rightarrow X$ definirana s $F(t, s) = f_t(s)$ zvezna.

Za poti f_1 in f_0 , ki sta povezani s homotopijo f_t rečemo, da sta homotopni in označimo $f_1 \simeq f_0$.

Trditev 2.4. Relacija homotopije na poteh s fiksnima krajiščema je ekvivalenčna relacija za vsak topološki prostor.

Dokaz. Preveriti moramo 3 lastnosti ekvivalenčnih relacij, reflektivnost, simetričnost in tranzitivnost.

Najprej preverimo reflektivnost. Naj bo $f : I \rightarrow X$ pot v prostoru X . Homotopijo definiramo kot $f_t(s) = f(s)$.

Naj velja $f \simeq g$ in naj bo $f_t(s)$ homotopija med f in g , torej $f_0 = f$ in $f_1 = g$. Homotopijo med g in f definiramo kot $g_t(s) = f_{1-t}(s)$. Velja $g_0 = f_1 = g$ in $g_1 = f_0 = f$. Ker je $g_t(s)$ kompozitum zveznih preslikav, je zvezna. Sledi, da je relacija homotopije simetrična.

Naj bodo f, g in h poti v X in naj velja $f \simeq g$ in $g \simeq h$. Naj bo $f_t(s)$ homotopija med f in g in $g_t(s)$ homotopija med g in h . Definirajmo

$$h_t(s) = \begin{cases} f_{2t}(s), & t \in [0, \frac{1}{2}] \\ g_{2t-1}(s), & t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Velja $h_0 = f_0 = f$ in $h_1 = g_1 = h$. Ker je $h_t(s)$ sestavljena iz dveh zveznih poti, ki se ujemata na preseku, je zvezna, sledi, da je relacija tranzitivna. \square

Za poljubni poti $f, g : I \rightarrow X$, za kateri velja $f(1) = g(0)$ lahko definiramo njen stik $f \cdot g$, ki preteče f in g z dvojno hitrostjo v enotskem intervalu.

$$f \cdot g(s) = \begin{cases} f(2s), & s \in [0, \frac{1}{2}] \\ g(2s-1), & s \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Definirajmo še *reparametrizacijo* poti f kot kompozitum $f\varphi$, kjer je $\varphi : I \rightarrow I$ neka zvezna preslikava, za katero velja $\varphi(0) = 0$ in $\varphi(1) = 1$. Reparametrizacija poti ohranja homotopski razred, saj sta $f\varphi$ in f povezani preko $f\varphi_t$, pri čemer je $\varphi_t(s) = (1-t)\varphi(s) + ts$. Vidimo, da $\varphi_t(s)$ leži med $\varphi(s)$ in s , torej na I , zato je $f\varphi_t(s)$ dobro definirana.

Če se omejimo samo na poti $f : I \rightarrow X$ z enako začetno in končno točko $f(0) = f(1) = x_0$, govorimo o zankah. Za x_0 rečemo, da je izhodišče. Množico vseh homotopskih razredov $[f]$, z izhodiščem x_0 označimo s $\pi_1(X, x_0)$.

Izrek 2.5. $\pi_1(X, x_0)$ opremljena s produktom $[f][g] = [f \cdot g]$ je grupa.

Dokaz. Najprej preverimo dobro definiranost produkta. Naj velja $[f] = [f']$, preko homotopije f_t in $[g] = [g']$ preko g_t . Potem sta $f \cdot g$ in $f' \cdot g'$ homotopni preko $h_t(s) = f_t \cdot g_t$. Vidimo, da $h_0 = f_0 \cdot g_0 = f \cdot g$ in $h_1 = f_1 \cdot g_1 = f' \cdot g'$. Ker je $f_t(1) = g_t(0)$ za vsak t in sta $f_t(s)$ in $g_t(s)$ zvezni, sledi, da je tudi $h_t(s)$ zvezna. Torej velja $[f \cdot g] = [f' \cdot g']$.

Naj bodo f, g in h poti v X in naj bo $f(1) = g(0)$ in $g(1) = h(0)$. Potem sta oba stika $(f \cdot g) \cdot h$ in $f \cdot (g \cdot h)$ definirana, $(f \cdot g) \cdot h$ pa je reparametrizacija poti $f \cdot (g \cdot h)$ preko odsekoma linearne funkcije

Naj bo f pot v X in naj bo c konstantna pot definirana s $c(s) = f(1)$, fc je reparametrizacija f preko

$$\varphi(s) = \begin{cases} 2s, & s \in [0, \frac{1}{2}] \\ 1, & s \in [\frac{1}{2}, 1], \end{cases}$$

zato velja $fc \simeq f$. Podobno velja tudi $cf \simeq f$, kjer je c konstantna pot $c(s) = f(0)$. Sklepamo, da je $c(s) = x_0$ dvostranska enota v grupi $\pi_1(X, x_0)$

Inverz poti f definiramo kot $\bar{f}(s) = f(1-s)$. Definirajmo $h_t = f_t \cdot \bar{f}_t$, pri čemer je

$$f_t(s) = \begin{cases} f(s), & s \in [0, 1-t] \\ f(1-t), & s \in [1-t, 1]. \end{cases}$$

Ker je $h_0 = f \cdot \bar{f}$ in $h_1 = f(0) = c$, sledi, da je $f \cdot \bar{f}$ homotopna konstantni poti v x_0 . Če f zamenjamo z \bar{f} , sledi, da $\bar{f} \cdot f \simeq c$, zato je $[f]$ obojestranski inverz od $[f]$. \square

Kot že povedano, tej grupi pravimo fundamentalna grupa prostora X , z izhodiščem x_0 . $\pi_1(X, x_0)$ je prva v zaporedju analogogno definiranih homotopskih grup $\pi_n(X, x_0)$, pri katerih namesto iz I slikamo iz n -dimenzionalne kocke I^n .

Naj bo I^n n -dimenzionalna kocka. Rob ∂I^n od I^n je podprostor točk pri katerih je vsaj ena koordinata enaka 1 ali 0. Definirajmo $\pi_n(X, x_0)$, množico homotopskih razredov preslikav $f : (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x_0)$, pri čemer velja $f(\partial I^n) = x_0$.

Za $n \geq 2$ posplošimo stik definiran pri fundamentalni grupi.

$$f \cdot g(s) \begin{cases} f(2s_1, s_2, \dots, s_n), & s_1 \in [0, \frac{1}{2}] \\ g(2s_1 - 1, s_2, \dots, s_n), & s_1 \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Izrek 2.6. $\pi_n(X, x_0)$ opremljena s produktom $[f][g] = [f \cdot g]$ je grupa za vsak $n \in \mathbb{N}$.

Dokaz te trditve je enak dokazu za $n = 1$, saj je v stik poti vpletena le prva komponenta poti.

Definicija 2.7. Topološka prostora X in Y sta šibko homotopsko ekvivalentna, če obstaja preslikava $f : X \rightarrow Y$, ki inducira izomorfizen $\pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$, za vsak $n \in \mathbb{N}$. Preslikavi f rečemo šibka homotopska ekvivalenca.

Homeomorfni prostori so homotopsko ekvivalentni, homotopsko ekvivalentni prostori so tudi šibko homotopsko ekvivalentni. Obratno v splošnem ne velja.

Šibke homotopske ekvivalence imajo lastnost 2 od 3, kar pomeni, da če sta dve od treh preslikav f , g in fg šibki homotopski ekvivalenci, potem je tudi tretja. Dokaz za to trditev lahko najdemo v [3].

3. SIMPLICIALNI KOMPLEKSI

Simplicialni kompleks je družina množic, ki je zaprta za podmnožice. Kar pomeni, da je vsaka podmnožica množice v družini, tudi v družini. Definicija simplicialnega kompleksa v tem delu je kombinatorična verzija simplicialnega kompleksa definirana v [3]. Formalno ga definiramo na naslednji način.

Definicija 3.1. *Simplicialni kompleks* K je sestavljen iz množice oglišč V_K in množice simpleksov S_K , sestavljene iz končnih nepraznih podmnožic od V_K , pri čemer je vsak element S_k simpleks in vsaka podmnožica simpleksa je simpleks. Pišemo $\sigma \in K$ in $v \in K$, če je $\sigma \in S_K$ ter $v \in V_K$.

Dimenzija simpleksa σ je enaka ena manj od števila njegovih oglišč. Simpleksu dimenzije n rečemo n -simpleks. Dimenzija simplicialnega kompleksa K je enaka maksimumu dimenzij njegovih simpleksov, n -dimenzionalnemu simplicialnemu kompleksu rečemo tudi n -kompleks. Omejili se bomo samo na končne komplekse, torej $n \in \mathbb{N}$.

Subkompleks $L \subseteq K$ simplicialnega kompleksa K je simplicialni kompleks, tak da $V_L \subseteq V_K$ in $S_L \subseteq S_K$.

Naj bo $\sigma = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ n -simpleks. Zaprt simpleks $\bar{\sigma}$ je množica formalnih konveksnih kombinacij $\sum_{i=0}^n \alpha_i v_i$ pri čemer je $\alpha_i \geq 0$ za vsak $0 \leq i \leq n$ in $\sum_{i=0}^n \alpha_i = 1$. Zaprt simpleks je metričen prostor z metriko

$$(1) \quad d\left(\sum_{i=0}^n \alpha_i v_i, \sum_{i=0}^n \beta_i v_i\right) = \sqrt{\sum_{i=0}^n (\alpha_i - \beta_i)^2}.$$

Če so v_i linearno neodvisne točke v \mathbb{R}^m za nek $m \geq n$, potem je $\bar{\sigma}$ homeomorfen prostoru $\{\sum_{i=0}^n \alpha_i v_i, \mid \sum_{i=0}^n \alpha_i = 1 \text{ in } \alpha_i \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^m$. To pomeni, da lahko vsak zaprt simpleks predstavimo kot podprostor \mathbb{R}^m z evklidsko topologijo.

Geometrijska realizacija $|K|$ simplicialnega kompleksa K je množica formalnih konveksnih kombinacij $\sum_{v \in K} \alpha_v v$, takih da je $\{v | \alpha_v > 0\}$ simpleks v K in $\sum_{v \in K} \alpha_v = 1$. Rečemo, da $|K|$ realizira K . Za točko $x \in |K|$ označimo $\text{supp}(x) = \{v | \alpha_v > 0\}$, tej množici pravimo nosilec od x . Topologijo na $\bar{\sigma}$ definiramo na naslednji način. $U \subseteq |K|$ je odprta, natanko tedaj, ko je $U \cap \bar{\sigma}$ odprta, za vsak $\sigma \in K$. Kot prej, če so $v \in K$ linearne neodvisne točke v \mathbb{R}^m za nek $m \geq |V_K|$, potem je $|K|$ homeomorfen prostoru $\{\sum_{v \in K} \alpha_v v | \sum_{v \in K} \alpha_v = 1, \alpha_i \geq 0 \text{ in } \{v | \alpha_v > 0\} \text{ je simpleks v } K\} \subseteq \mathbb{R}^m$. To spet pomeni, da lahko vsak simplicialni kompleks predstavimo kot podprostor v $\mathbb{R}^{|V_K|}$ z evklidsko topologijo. Če $L \subseteq K$, potem je $|L| \subseteq |K|$ zaprta podmnožica.

Opomba 3.2. Če je K n -kompleks, potem se ga da realizirati v \mathbb{R}^{2n+1} . To pomeni, da obstaja podprostor v \mathbb{R}^{2n+1} , ki je homeomorfen $|K|$. Vsak graf je geometrijska realizacija 1-kompleksa, zato ga lahko realiziramo v $\mathbb{R}^{2 \cdot 1 + 1} = \mathbb{R}^3$, kar je pa znano dejstvo iz teorije grafov.

Polieder je geometrijska realizacija Simplicialnega kompleksa $|K|$. *Triangulacija* poliedra X je simplicialni kompleks, katerega geometrijska realizacija je homeomorfna X .

Ker topologija na $|K|$ sovpada z topologijo na $\bar{\sigma}$, za vsak $\sigma \in K$ in je $U \subseteq |K|$ odprta, natanko tedaj, ko je $U \cap \bar{\sigma}$ odprta, za vsak $\sigma \in K$. Iz tega sledi, da je preslikava f iz $|K|$ v nek topološki prostor X zvezna, natanko tedaj, ko je $f|_{\bar{\sigma}} : \bar{\sigma} \rightarrow X$ zvezna za vsak $\sigma \in K$. Tudi $H : |K| \times I \rightarrow X$ je zvezna, natanko tedaj, ko je zvezna $H|_{\bar{\sigma} \times I} : \bar{\sigma} \times I \rightarrow X$, za vsak $\sigma \in K$.


Simplicialna preslikava $\varphi : K \rightarrow L$, med simplicialnima kompleksoma K in L , je preslikava med oglišči, $V_K \rightarrow V_L$, ki slika simplekse v simplekse. Preslikava φ inducira zvezno preslikavo med kompleksoma $|\varphi| : |K| \rightarrow |L|$, kot $|\varphi| : \sum_{v \in K} \alpha_v v \mapsto \sum_{v \in K} \alpha_v \varphi(v)$.

Baricentrična subdivizija simplicialnega kompleksa K je simplicialni kompleks K' , čigar oglišča so simpleksi $\sigma \in K$, simpleksi v K' so pa verige simpleksov v K , urejenih z inkluzijo. Torej $\sigma' \in K'$, če $\sigma' = \{\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ in $\sigma_0 \subsetneq \sigma_1 \subsetneq \dots \subsetneq \sigma_n$. Težišče simpleksa $\sigma \in K$ je točka $b(\sigma) = \sum_{v \in \sigma} \frac{v}{\#\sigma}$.

Definirajmo linearno preslikavo $S_K : |K'| \rightarrow |K|$, s predpisom $S_K(\sigma) = b(\sigma)$. Linearnost pomeni, da velja $S_K(\sum_{\sigma \in \sigma'} a_\sigma \sigma) = \sum_{\sigma \in \sigma'} a_\sigma S_K(\sigma)$.

Primer 3.3. Naj bo $K = \sigma = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

3-simpleks. Poglejmo si preslikavo $S_K : |K'| \rightarrow |K|$. Naj bo x tako kot na sliki.



Potem je $K'_x := \text{supp}(x) = \{\{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$ in $x = \sum_{\sigma \in K'_x} \alpha_{i_\sigma} \sigma$. Zato

$$\begin{aligned}
S_K(x) &= S_K\left(\sum_{\sigma \in K'_x} \alpha_{i_\sigma} \sigma\right) = \sum_{\sigma \in K'_x} \alpha_{i_\sigma} S_K(\sigma) \\
&= \alpha_1 S_K(\{a\}) + \alpha_2 S_K(\{a, b\}) + \alpha_3 S_K(\{a, b, c\}) \\
&= \alpha_1 a + \alpha_2 \frac{a+b}{2} + \alpha_3 \frac{a+b+c}{3}.
\end{aligned}$$

Preslikava S_K je očitno homeomorfizem. ◇

Trditev 3.4. *Naj bosta K in L simplicialna kompleksa in naj bosta $f, g : |K| \rightarrow |L|$ taki zvezni preslikavi, da za vsak $x \in |K|$ obstaja $\sigma \in L$, da $f(x), g(x) \in \bar{\sigma}$. Potem sta f in g homotopni.*

Dokaz. Preslikava $H : |K| \times I \rightarrow |L|$, definirana kot $H(x, t) = tg(x) + (1-t)f(x)$ je dobro definirana, ker $f(x)$ in $g(x)$ ležita v istem zaprtem simpleksu. H je zvezna, natanko tedaj, ko je zvezna $H|_{\bar{\sigma} \times I} : \bar{\sigma} \times I \rightarrow |L|$, za vsak $\sigma \in K$. Ocenimo

$$\begin{aligned}
d(H(x, t), H(y, s)) &\leq d(tg(x) + (1-t)f(x), sg(x) + (1-s)f(x)) \\
&\quad + d(sg(x) + (1-s)f(x), sg(y) + (1-s)f(y)) \\
&\leq 2|t-s| + d(f(x), f(y)) + d(g(x), g(y)).
\end{aligned}$$

Torej zveznost H sledi iz zveznosti f in g . □

Definicija 3.5. Simplicialni preslikavi $\varphi, \psi : K \rightarrow L$ sta *kontiguentni*, če je za vsak $\sigma \in K$, $\varphi(\sigma) \cup \psi(\sigma)$ simpleks v L .

Če sta φ in ψ kontiguentni, potem $|\varphi|$ in $|\psi|$ zadostita predpostavkam v trditvi 3.4, saj če $x \in \bar{\sigma}$, potem $|\varphi|(x)$ in $|\psi|(x)$ ležita v $\overline{\varphi(\sigma) \cup \psi(\sigma)}$. Takoj sledi naslednja posledica.

Posledica 3.6. *Če sta φ in ψ kontiguentni, sta $|\varphi|$ in $|\psi|$ homotopni.*

Simplicialni stožec z vrhom v je simplicialni kompleks K z ogliščem v , za katerega velja, da je $\sigma \cup \{v\}$, za vsak simpleks $\sigma \in K$.


Posledica 3.7. *Če je K simplicialni stožec, potem je $|K|$ kontraktibilen.*

Dokaz. Naj bo v vrh od $|K|$. Po definiciji simplicialnega stožca, je simplicialna preslikava, ki slika vsako oglišče v v , kontiguentna identiteti. Zato je identiteta v $|K|$ homotopna konstantni preslikavi. □

3.1. Poti v simplicialnem kompleksu. *Rob* simplicialnega kompleksa K je urejeni par $e = (v_0, v_1)$, tak da je $\{v_0, v_1\}$ Simpleks v K . Oglišču v_0 rečemo *začetek* e in označimo $v_0 = \mathbf{o}(e)$, oglišču v_1 pa *konec* od e , označimo $\mathbf{e}(e) = v_1$. *Lomljenka* dolžine n je zaporedje (e_0, e_1, \dots, e_n) robov v K (lahko tudi prazno), za katerega velja, da je $\mathbf{e}(e_i) = \mathbf{o}(e_{i+1})$, za vsak $0 \leq i \leq n-1$. Lomljenka je sklenjena, če $\mathbf{e}(e_0) = \mathbf{o}(e_n)$, v_0 rečemo izhodišče. Če sta $\xi = (e_0, e_1, \dots, e_n)$ in $\xi' = (e'_0, e'_1, \dots, e'_m)$, in velja $\mathbf{e}(e_n) = \mathbf{o}(e'_0)$ definiramo stik lomljenk $\xi\xi'$ kot $(e_0, e_1, \dots, e_n, e'_0, e'_1, \dots, e'_m)$.

Lomljenki $\dots(v_i, v_{i+1})(v_{i+1}, v_{i+2})\dots$ in $\dots(v_i, v_{i+2})\dots$ sta preprosto ekvivalentni, če je $\{v_i, v_{i+1}, v_{i+2}\}$ simpleks v K . Lomljenki ξ_0 in ξ_n sta ekvivalentni, če obstaja zaporedje lomljenk $\xi_0\xi_1\dots\xi_n$, pri katerem sta ξ_i in ξ_{i+1} preprosto ekvivalentni za vsak $0 \leq i < n$.

Naj bo K simplicialni kompleks in v_0 oglišče v K . Z $E(K, v_0)$ označimo množico ekvivalenčnih razredov sklenjenih lomljenk z izhodiščem v v_0 . Ekvivalenčni razred



SLIKA 2. lomljenki $(v_0, v_1)(v_1, v_2)$ in $(v_0, v_1)(v_1, v_0)(v_0, v_2)$ sta ekvivalentni.

sklenjene lomljenke ξ označimo z $[\xi]$. Ekvivalenčni razred prazne lomljenke $[\emptyset]$ je $[(v_0, v_0)]$.

Trditev 3.8. *Množica $E(K, v_0)$ z množenjem, ki ga inducira stik lomljenk, tvori grupo.*

Dokaz. Dobra definiranost množenja in asociativnost sta očitni. Identiteta je ekvivalenčni razred poti (v_0, v_0) . Inverz od $(e_0, e_1, \dots, e_{n-1}, e_n)$ je $(e^{-1}, e_{n-1}^{-1}, \dots, e_1^{-1}, e^{-1})$, kjer $(v_i, v_{i+1})^{-1} = (v_{i+1}, v_i)$. \square

Izrek 3.9. *$E(K, v_0)$ je izomorfna $\pi_1(|K|, v_0)$*

Dokaz lahko najdemo v [1]

4. KONČNI TOPOLOŠKI PROSTORI IN DELNO UREJENE MNOŽICE

Končni topološki prostor je topološki prostor s končno mnogo točkami, *šibko urejena* množica je množica s tranzitivno in z refleksivno relacijo. Če je relacija še antisimetrična, dobimo *delno* ureditev.

Naj bo X končni topološki prostor. Za vsako točko $x \in X$ obstaja najmanjša odprta množica U_x , ki jo vsebuje, oziroma presek vseh odprtih množic, ki vsebujejo x . Ta množica je odprta, saj je topologija zaprta za končne preseke. Točke uredimo s pravilom $x \leq y$, če $U_x \subseteq U_y$. S tem dobimo šibko ureditev. Antisimetričnost po definiciji sovпада z lastnostjo T_0 , zato, relacija postane delna ureditev, natanko takrat, ko je topologija T_0 .


Obratno, naj bo X šibko urejena množica. Na njej lahko definiramo topologijo z bazo $\{y \in X | y \leq x\}_{x \in X}$. Če je $y \leq x$, je y vsebovan v vsaki bazni množici, ki vsebuje x , torej je $y \in U_x$. Po drugi strani, če je $y \in U_x$, potem je $y \in \{y \in X | y \leq x\}$, torej velja, da je $y \leq x$ natanko tedaj, ko je $y \in U_x$. Iz tega je razvidno, da so končni prostori in šibke ureditve enaki objekti, gledani z drugačnega stališča.

Delno urejene množice praviloma predstavljamo s Hassejevimi diagrami.

Definicija 4.1. *Hassejev diagram* delno urejene množice X je usmerjen graf, katerega oglišča so točke, povezave pa so urejeni pari (x, y) , taki, da je $x < y$ in ne obstaja tak z , da bi veljalo $x < z < y$.

Povezave (x, y) ne rišemo s puščico iz x v y , ampak bomo x in y povezali z ravno črto in y pisali nad x . Če je (x, y) povezava v Hassejevem diagramu končne delno urejene množice, rečemo, da y *pokrije* x in pišemo $x \prec y$.

Primer 4.2. Naj bo $X = \{a, b, c, d\}$ končen prostor, s topologijo $\tau = \{\emptyset, X, \{b, d\}, \{c\}, \{d\}, \{b, c, d\}, \{c, d\}\}$. Topologija je T_0 , zato je X tudi delno urejena množica.



SLIKA 3. Odprte množice v X in prirejen Hassejev diagram.

◇

Definicija 4.3. Element $x \in X$ je *maksimalni element* delno urejene množice X , če $\forall y \in X, y \geq x \Rightarrow y = x$, x je *maksimum* v X , če $\forall y \in X, x \geq y$.

Končna delno urejena množica ima maksimum, natanko tedaj, ko ima enoličen maksimalni element. *Minimalni element* in *minimum* definiramo analogno.

Elementa x in y sta *primerljiva*, če je $x \leq y$ ali $y \leq x$. *Veriga* v X je podmnožica $S \subseteq X$, v kateri je vsak par elementov primerljiv, *antiveriga* v X je podmnožica $S \subseteq X$, v kateri ni noben par elementov primerljiv.

Odprtim množicam v X ustrezajo *navzdol zaprte množice*, zaprtim pa *navzgor zaprte množice*. Podmnožica U šibko urejene množice X je navzdol zaprta, če $\forall x \in X$, iz $y \leq x$, sledi da $y \in U$. Navzgor zaprte množice definiramo analogno. Z F_x definiramo zaprtje množice $\{x\}$. $F_x = \{y \in X; y \geq x\}$. Vidimo, da $y \in F_x \Leftrightarrow x \in U_y$.

Tudi morfizmi šibko urejenih množic in morfizmi končnih topoloških prostorov sovpadajo. Morfizem šibko urejene množice je preslikava, ki ohranja ureditev torej $f : X \rightarrow Y$, za katero iz $x \leq x'$ sledi $f(x) \leq f(x')$ za vsaka $x, x' \in X$. Morfizmi topoloških prostorov so pa zvezne preslikave.

Trditev 4.4. Funkcija $f : X \rightarrow Y$ med končnima prostoroma je zvezna, natanko tedaj, ko ohranja ureditev.

Dokaz. Naj bo f zvezna in naj $x \leq x'$ za $x, x' \in X$. Zaradi zveznosti je $f^{-1}(U_{f(x')})$ odprta. Ker velja $f(x') \in U_{f(x')}$, sledi, da $x' \in f^{-1}(U_{f(x')})$, ker je to navzdol zaprta množica, je tudi $x \in f^{-1}(U_{f(x')})$, na enakosti uporabimo f in dobimo $f(x) \in U_{f(x')}$, torej $f(x) \leq f(x')$ in f ohranja ureditev.

Naj bo zdaj f preslikava, ki ohranja ureditev. Pokažimo, da je $f^{-1}(U_y)$ down set za vsako bazno množico U_y . Naj bo $x \leq x'$ in $x' \in f^{-1}(U_y)$, torej $f(x') \in U_y$, ker f ohranja ureditev in je U_y navzdol zaprta, sledi da $f(x) \in U_y$, zato je $x \in f^{-1}(U_y)$, torej je $f^{-1}(U_y)$ navzdol zaprta, torej odprta. \square

Lema 4.5. *Za vsaki primerljivi točki $x, y \in X$ v končnem prostoru X obstaja pot od x do y , tj. preslikava $\alpha : I \rightarrow X$, za katero velja $\alpha(0) = x$ in $\alpha(1) = y$.*

Dokaz. Naj bo $x \leq y$. Definirajmo $\alpha : I \rightarrow X$, z $\alpha([0, 1)) = x$ in $\alpha(1) = y$ in naj bo $U \in X$ odprta. Če je U vsebuje y , mora vsebovati tudi x , zato je praslika od U ali \emptyset ali $[0, 1)$ ali pa I , ki so pa vse odprte v I , zato je α pot od x do y . \square

Ta lema nam pove, da v končnih prostorih obstajajo netrivialne poti, zato v splošnem fundamentalna grupa končnega prostora ni trivialna.

Naj bosta X in Y končni šibki ureditvi. Z Y^X označimo končno množico zveznih preslikav iz X v Y in jo opremimo z ureditvijo po točkah in sicer $f \leq g$, če velja $f(x) \leq g(x), \forall x \in X$. S tem dobimo na Y^X delno ureditev in topologijo. *Ograja* v X je zaporedje x_0, x_1, \dots, x_n točk v X , taka, da sta vsaki zaporedni točki primerljivi. X je *urejenostno povezan*, če za vsaki točki $x, y \in X$ obstaja ograja, ki se začne z x in konča z y .

Lema 4.6. *Naj bo X končen prostor. Naslednje trditve so ekvivalentne:*

- X je povezan prostor.
- X je urejenostno povezana šibka ureditev.
- X je povezan s potmi.

Dokaz. Če je X urejenostno povezan, potem je po lemi 4.5, povezan tudi s potmi. Dokazati je treba le še da urejenostno povezanost sledi iz povezanosti. Naj bo torej X povezan, $x \in X$ in $A = \{y \in X \mid \text{obstaja ograja med } x \text{ in } y\}$. Če je $z \leq x$, potem je tudi $z \in A$, zato je A navzdol zaprta. Analogno pokažemo, da je A navzgor zaprta. Ker je X povezan, sledi, da $A = X$, zato je X urejenostno povezan. \square

Trditev 4.7. *Naj bosta $f, g : X \rightarrow Y$ preslikavi med končnima prostoroma in $A \subseteq X$, potem je $f \simeq g \text{ rel } A$, natanko tedaj, ko obstaja ograja $f = f_0 \leq f_1 \leq \dots \leq f_n = g$, taka da $f_i|_A = f|_A$. Če je $A = \emptyset$, dobimo navadno homotopijo med f in g .*

Dokaz. Obstoj homotopije $H : f \simeq g \text{ rel } A$ je ekvivalenten obstoju take poti $\alpha : I \rightarrow Y^X$, da velja $\alpha(t)|_A = f|_A$, kar je ekvivalentno obstoju poti $\alpha : I \rightarrow M$, kjer je $M \subseteq Y^X$, taka množica, ki vsebuje preslikave, ki na A sovpadajo z f . Po lemi 4.6 to pomeni, da obstaja ograja med f in g v M . \square

Trditev 4.8. *Naj bo X končen prostor in naj bo X_0 kvocijent X/\sim , pri čemer $x \sim y \Leftrightarrow x \leq y$ in $y \leq x$. Potem je $X_0 \in T_0$, kvocijentna projekcija $q : X \rightarrow X_0$ pa je homotopska ekvivalenca.*

Dokaz. Naj bo $i : X_0 \rightarrow X$ katerakoli preslikava, da velja $qi = 1_{X_0}$, i ohranja ureditev, zato je zvezna. Ker velja tudi $iq \leq 1_X$, je i homotopski inverz od q .

Naj bosta $x, y \in X$ taka, da $q(x) \leq q(y)$. Po definiciji je $iq \leq 1_X$ in $iq \geq 1_X$, zato je $x \leq iq(x) \leq iq(y) \leq y$. Če velja še $q(y) \leq q(x)$, potem je tudi $y \leq x$, ampak potem je $q(x) = q(y)$, zato je šibka ureditev na X_0 antisimetrična, torej je $X_0 \in T_0$. \square

Ker je $iq \leq 1_X$ ter iq in 1_X sovpadata na X_0 je po trditvi 4.7 $iq \simeq 1_{X_0}$ rel X_0 , zato je X_0 krepki deformacijski retrakt od X .

Definicija 4.9. Točka $x \in X$ je *navzdol odvečna*, če ima $\bar{U}_x = \{y \in X | y < x\}$ maksimum in *navzgor odvečna*, če ima $\bar{F}_x = \{y \in X | y > x\}$ minimum. Točka je odvečna, če je eno ali drugo.

Navzgor odvečne točke v Hassejevem diagramu so tiste, ki imajo izhodno stopnjo enako ena, navzdol odvečne, pa tiste, ki imajo vhodno stopnjo enako ena.

Trditev 4.10. Naj bo X T_0 prostor in $x \in X$ odvečna točka, potem je $X \setminus \{x\}$ krepki deformacijski retrakt od X .

Dokaz. Recimo, da je x navzdol odvečna točka, in naj bo y maksimum v U_x . Definirajmo retrakcijo $r : X \rightarrow X \setminus \{x\}$ z $r(x') = x'$ za $x' \neq x$ in $r(x) = y$, r ohranja red, saj je $x \leq y$. Če z $i : X \setminus \{x\} \rightarrow X$ označimo inkluzijo, je $ir \leq 1_X$, zato je po lemi 4.7 je potem $ir \simeq 1_x$ rel $X \setminus \{x\}$. Če je x navzgor odvečna točka, je dokaz analogen. \square

Definicija 4.11. T_0 prostor je *minimalen*, če nima odvečnih točk. krepki deformacijski retrakt prostora X , ki je minimalen prostor imenujemo *jedro* končnega prostora X .

Končnemu prostoru X postopoma odstranjujemo odvečne točke in s tem v vsakem koraku dobimo prostor, ki je homotopsko ekvivalenten prostoru X , zato je jedro krepki deformacijski retrakt začetnega prostora, torej mu je homotopsko ekvivalenten. Seveda so tudi vsa jedra istega prostora homotopsko ekvivalentna.

Izrek 4.12. Naj bo X končen minimalen prostor. Preslikava $f : X \rightarrow X$ je homotopna identiteti, natanko tedaj, ko je $f = 1_X$.


Dokaz. Po izreku 4.7 lahko predpostavimo, ali $f \leq 1_X$ ali $f \geq 1_X$. Pa recimo, da $f \leq 1_X$. Naj bo $x \in X$, trditev dokažimo z indukcijo na število elementov v U_x . Če $U_x = \{x\}$, potem je $f(x) = x$, saj f ohranja ureditev, če $U_x \neq \{x\}$, potem je po indukcijski predpostavki $f|_{\hat{U}_x} = 1_{\hat{U}_x}$. Če $f(x) = x$, potem je $f(x) \in \hat{U}_x$ in $\forall y < x, y = f(y) \leq f(x)$, torej je $f(x)$ maksimum od \hat{U}_x in je x navzdol odvečna točka, kar je pa v protislovju z minimalnostjo prostora X . Če je $f \geq 1_X$, je dokaz podoben. \square

Posledica 4.13. Homotopska ekvivalenca med minimalnima končnima prostoroma je homeomorfizem. Jedro končnega prostora je enolično do homeomorfizma in dva končna prostora sta homotopsko ekvivalentna natanko tedaj, ko imata homeomorfno jedro.

Dokaz. Naj bo $f : X \rightarrow Y$ homotopska ekvivalenca med končnima prostoroma in $g : Y \rightarrow X$ njen inverz. Potem $fg \simeq 1_Y$ in $gf \simeq 1_X$, po trditvi 4.12 je potem $fg = 1_Y$ in $gf = 1_X$, torej je g inverz od f in f je homeomorfizem. Če sta X_0 in X_1 dve jedri končnega prostora X , sta sta homotopsko ekvivalentni, torej med njima obstaja homotopska ekvivalenca f , ki je tudi homeomorfizem, torej sta jedri homeomorfni. Prostora X in Y sta homotopsko ekvivalentna, natanko tedaj, ko imata homotopsko ekvivalentni jedri, kar pa je tedaj, ko sta jedri homeomorfni. \square

Primer 4.14. Naj bosta X in Y končna T_0 prostora.

Naslednjo zaporedje diagramov, nam pokaže, kako pridemo do jedra prostora X , z odstranjevanjem odvečnih točk. Točka b je navzgor odvečna v X , c je navzgor



odvečna v $X \setminus \{b\}$, e je pa navzgor odvečna v $X \setminus \{b, c\}$. Prostor $X \setminus \{b, c, e\}$ je minimalen končen prostor in je jedro od X .

Po drugi strani pa je a navzdol odvečna v Y in $Y \setminus \{a\}$ je minimalen. X in Y nista homotopsko ekvivalentna, saj njuni jedri nista homeomorfni. \diamond

5. MINIMALNI MODELI PROSTOROV

Definicija 5.1. Končni topološki prostor je *model* prostora X , če mu je šibko homotopsko ekvivalenten. Model je *minimalen*, če ima izmed vseh modelov najmanjšo kardinalnost.

Definicija 5.2. Naj bo X končen T_0 prostor. *Simplicialni kompleks* $\mathcal{K}(X)$ *prirejen* X , je simplicialni kompleks, čigar simpleksi so neprazne verige v X . Če je $f : X \rightarrow Y$ zvezna preslikava med dvema T_0 prostoroma. *prirejena simplicialna preslikava* $\mathcal{K}(f) : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathcal{K}(Y)$ definiramo kot $\mathcal{K}(f)(x) = f(x)$.

Vidimo, če je $f : X \rightarrow Y$ zvezna, je $\mathcal{K}(f) : \mathcal{K}(X) \rightarrow \mathcal{K}(Y)$ simplicialna, saj ohranja ureditev in slika verige v verige. Točka α v geometrijski realizaciji $|\mathcal{K}(X)|$ je konveksna kombinacija oblike $\alpha = t_1x_1 + t_2x_2 + \dots + t_rx_r$, pri čemer $\sum_{i=1}^r t_i = 1$, $t_i \geq 0$ in velja, da je $x_1 < x_2 < \dots < x_r$ veriga v X . Nosilec α je množica $\text{supp}(\alpha) = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$. Pomembno vlogo igra preslikava $\alpha \mapsto x_1$.

Definicija 5.3. Naj bo X končen T_0 prostor, Definirajmo *\mathcal{K} -McCordovo* preslikavo $\mu_X : |\mathcal{K}(X)| \rightarrow X$, z $\mu_X(\alpha) = \min(\text{supp}(\alpha))$.

Izrek 5.4. McCordov Naj bosta X in Y topološka prostora in naj bo $f : X \rightarrow Y$ zvezna. Če je zožitev

$$f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \rightarrow U$$

šibka homotopska ekvivalenca za vsako bazno množico U , potem je $f : X \rightarrow Y$ šibka homotopska ekvivalenca.

Opomba 5.5. Izrek ne velja le za zožitev na bazne množice, ampak tudi na vsako bazi podobno pokritje, torej za vsako pokritje, ki je baza za kako drugo topologijo.

Lema 5.6. Naj bo $x \in X$ in naj bo $L = X \setminus U_x \subseteq \mathcal{K}(X)$. Potem se vsak $\alpha \in |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$ da napisati, kot $\alpha = t\beta + (1-t)\gamma$, za $\beta \in |\mathcal{K}(U_x)|$, $\gamma \in |L|$ in $0 < t \leq 1$, pri čemer je α zvezno odvisna od β, γ in t . Koeficienti β, γ in t so enolično določeni.

Dokaz. L je subkompleks, ki ga napenjajo oglišča, ki niso v U_x . Za vsak $\alpha \in |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$,

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i + \sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i, \text{ za } \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1,$$

za $u_i \in U_x$, $v_i \in X \setminus U_x$ in za nek $r \in \{1, 2, \dots, n-1\}$. S t označimo $\sum_{i=1}^r \alpha_i$, torej je $1-t = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i$ in $0 < t \leq 1$. Potem $\beta = \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i / t \in |\mathcal{K}(U_x)|$, saj je $\sum_{i=1}^r \alpha_i / t = 1$ in podobno $\gamma = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i v_i / (1-t) \in |\mathcal{K}(X \setminus U_x)|$. Zveznost in enoličnost sledi iz konstrukcije. □

Izrek 5.7. \mathcal{K} -McCordova preslikava je šibka homotopska ekvivalenca za vsak končen T_0 -prostor.

Dokaz. Definirajmo retrakcijo $r : U_x \rightarrow \{x\}$ kot $r(y) = x$, za vsak $y \in U_x$. Ker je x maksimum v U_x , je $r \geq 1_X$, zato je po trditvi 4.7 $r \simeq 1_X$, torej je U_x kontraktibilna množica. Dokazali bomo, da je za vsak $x \in X$, $\mu_X^{-1}(U_x)$ odprta in kontraktibilna. S tem bomo pokazali, da je μ_X zvezna in da so zožitve $\mu_X|_{\mu_X^{-1}(U_x)} : \mu_X^{-1}(U_x) \rightarrow U_x$ šibke homotopske ekvivalence, kar pa po McCordovem izreku 5.4 pomeni, da je preslikava μ_X šibka homotopska ekvivalenca.

Naj bo $x \in X$ in naj bo $L = X \setminus U_x \subseteq \mathcal{K}(X)$. L je torej subkompleks, ki ga napenjajo oglišča, ki niso v U_x . Trdimo, da

$$\mu_X^{-1}(U_x) = |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|.$$

Pokažimo najprej, da $\mu_X^{-1}(U_x) \subseteq |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$. Naj bo $\alpha \in \mu_X^{-1}(U_x)$, torej je $\min(\text{supp}(\alpha)) \in U_x$, zato $\text{supp}(\alpha)$ vsebuje oglišče iz U_x , zato $\alpha \notin |L|$, torej $\alpha \in |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$.

Pokažimo še, da $|\mathcal{K}(X)| \setminus |L| \subseteq \mu_X^{-1}(U_x)$. Naj $\alpha \in |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$. Če $\alpha \notin |L|$, potem obstaja $y \in \text{supp}(\alpha)$, tak, da $y \in U_x$, zato je $\min(\text{supp}(\alpha)) \leq y \leq x$, zato je $\mu_X(\alpha) \in U_x$ in $\alpha \in \mu_X^{-1}(U_x)$. Ker je $|L|$ zaprta podmnožica $|\mathcal{K}(X)|$, je $\mu_X^{-1}(U_x)$ odprta.

Pokažimo, da je $\mu_X^{-1}(U_x)$ kontrabilna. Prvo pokažimo, da je $|\mathcal{K}(U_x)|$ krepki deformacijski reakt od $|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$. Naj bo $i : |\mathcal{K}(U_x)| \hookrightarrow |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$ inkluzija. Če je $\alpha \in |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$, potem je po lemi 5.6 $\alpha = t\beta + (1-t)\gamma$, za $\beta \in |\mathcal{K}(U_x)|$, $\gamma \in |L|$ in $0 < t \leq 1$. Definirajmo $r : |\mathcal{K}(X)| \setminus |L| \rightarrow |\mathcal{K}(U_x)|$ kot $r(\alpha) = \beta$. Ker je α zvezna in je zožitev $r|_{(|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|) \cap \bar{\sigma}} : (|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|) \cap \bar{\sigma} \rightarrow \bar{\sigma}$ zvezna, za vsak $\sigma \in \mathcal{K}(X)$, sledi da je r zvezna. Definirajmo zdaj linearno homotopijo $H : (|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|) \times I \rightarrow (|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|)$ med $1_{(|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|)}$ in ir kot

$$H(\alpha, s) = (1-s)\alpha + s\beta.$$


H je dobro definirana, in zvezna, saj je vsaka zožitev

$$H|_{((|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|) \cap \bar{\sigma}) \times I} : ((|\mathcal{K}(X)| \setminus |L|) \cap \bar{\sigma}) \times I \rightarrow \bar{\sigma}$$

dobro definirana in zvezna, $\sigma \in \mathcal{K}(X)$.

Ker je vsak element iz U_x primerljiv z x , je $\mathcal{K}(U_x)$ simplicialni stožec, zato je po trditvi 3.7 $|\mathcal{K}(U_x)|$ kontraktibilen in zato je kontraktibilna tudi $\mu_X^{-1}(U_x) = |\mathcal{K}(X)| \setminus |L|$. \square

Če imamo končen topološki prostor X , mu priredimo simplicialni kompleks $\mathcal{K}(X)$, Geometrijska realizacija $|\mathcal{K}(X)|$ tega kompleksa pa je šibko homotopsko ekvivalentna začetnemu prostoru X . Torej lahko za vsak prostor, ki je homeomorfen geometrijski realizaciji nekega simplicialnega kompleksa, najdemo njegov končen model tj. končen topološki prostor, ki mu je šibko homotopsko ekvivalenten.



SLIKA 4. Končen prostor in geometrijska realizacija prirejenega simplicialnega kompleksa v \mathbb{R}^2 , ki mu je šibko homotopsko ekvivalentna.

Definicija 5.8. Naj bo K končen simplicialni kompleks. Končen T_0 prostor $\chi(K)$ prirejen K , je delno urejena množica simpleksov v K , urejena glede na inkluzijo. Naj bo $\varphi : K \rightarrow L$ simplicialna preslikava, potem preslikavo $\chi(\varphi) : \chi(K) \rightarrow \chi(L)$ definiramo kot $\chi(\varphi)(\sigma) = \varphi(\sigma)$ za vsak simpleks $\sigma \in K$.

Lema 5.9. Naj bo $f : X \rightarrow Y$ zvezna preslikava med dvema T_0 prostoroma, potem naslednji diagram komutira

$$\begin{array}{ccc} |\mathcal{K}(X)| & \xrightarrow{|\mathcal{K}(f)|} & |\mathcal{K}(Y)| \\ \mu_X \downarrow & & \downarrow \mu_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

Dokaz.

$$\begin{aligned} f\mu_X(\alpha) &= f(\min(\text{supp}(\alpha))) \stackrel{*}{=} \min(f(\text{supp}(\alpha))) \\ &= \min(\text{supp}(|\mathcal{K}(f)|(\alpha))) = \mu_Y|\mathcal{K}(f)|(\alpha) \end{aligned}$$

Pri čemer $*$ velja zaradi zveznosti f , druge enakosti pa veljajo kar po definiciji. \square

Če je K končen kompleks, potem je $\mathcal{K}(\chi(K))$ prva baricentrična subdivizija. definirajmo χ -McCordova preslikavo $\mu_K = \mu_{\chi(K)} S_K^{-1} : |K| \rightarrow \chi(K)$. Ker je kompozitum dveh šibkih homotopskih ekvivalenc tudi šibka homotopska ekvivalenca, takoj sledi naslednji izrek.

Izrek 5.10. χ -McCordova preslikava μ_K je šibka homotopska ekvivalenca za vsak končen simplicialni kompleks K .

Trditev 5.11. Naj bo $\varphi : K \rightarrow L$ simplicialna preslikava med končnima kompleksoma. Potem naslednji diagram komutira do homotopije natančno

$$\begin{array}{ccc} |K| & \xrightarrow{|\varphi|} & |L| \\ \mu_K \downarrow & & \downarrow \mu_L \\ \chi(K) & \xrightarrow{\chi(\varphi)} & \chi(L) \end{array}$$

Dokaz. Najprej poiščimo homotopijo med $|\varphi|s_K$ in $s_L|\varphi'|$, kjer je $\varphi' = \mathcal{K}(\chi(\varphi))$ preslikava med baricentričnima subdivizijama K' in L' . Naj bo $S = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r\}$ simpleks v K' in naj bo $\sigma_1 \subsetneq \sigma_2 \subsetneq \dots \subsetneq \sigma_r$ veriga simpleksov iz K . Naj bo α točka v zaprtem simpleksu \overline{S} . Potem je $S_K(\alpha) \in \overline{\sigma_r} \subseteq |K|$ in $|\varphi|S_K(\alpha) \in \overline{\varphi(\sigma_r)} \subseteq |L|$. Velja pa tudi $|\varphi'|(\alpha) \in \{\varphi(\sigma_1), \varphi(\sigma_2), \dots, \varphi(\sigma_r)\}$ in potem $S_L|\varphi'|(\alpha) \in \overline{\varphi(\sigma_r)}$. Zato je linearna homotopija

$$H : |K'| \times I \rightarrow |L| H : (\alpha, t) \mapsto (1-t)|\varphi|S_K(\alpha) + tS_L|\varphi'|(\alpha)$$

zvezna in dobro definirana in zato $|\varphi|S_K(\alpha) \simeq S_L|\varphi'|$. Iz leme 5.9 sledi, da naslednji diagram komutira

$$\begin{array}{ccc} |\mathcal{K}(\chi(K))| & \xrightarrow{|\mathcal{K}(\chi(\varphi))|} & |\mathcal{K}(\chi(L))| \\ \mu_{\chi(K)} \downarrow & & \downarrow \mu_{\chi(L)} \\ \chi(K) & \xrightarrow{\chi(\varphi)} & \chi(L) \end{array}$$

in zato

$$\begin{aligned} \mu_L|\varphi| &= \mu_{\chi(L)} S_L^{-1} |\varphi| \simeq \mu_{\chi(L)} |\varphi'| S_K^{-1} \\ &= \chi(\varphi) \mu_{\chi(K)} S_K^{-1} = \chi(\varphi) \mu_K \end{aligned}$$

□

Iz lastnosti 2 od 3 in dejstva, da je preslikava, ki je homotopna šibki homotopski ekvivalenci isto šibka homotopska ekvivalenca, takoj sledi naslednja trditev.

Trditev 5.12. Naj bo $\varphi : K \rightarrow L$ simplicialna preslikava med končnima kompleksoma, potem je $|\varphi|$ šibka homotopska ekvivalenca, natanko tedaj, ko je $\chi(\varphi)$ šibka homotopska ekvivalenca.

Iz izrekov 5.10 in 5.7 pa takoj sledi naslednji posledici.

Posledica 5.13. • Naj bosta X in Y končna T_0 prostora. Potem sta X in Y šibko homotopsko ekvivalentna, natanko tedaj, ko sta $|\mathcal{K}(X)|$ in $|\mathcal{K}(Y)|$ homotopsko ekvivalentna.


- Naj bosta K in L končna simplicialna kompleksa. Potem sta $|K|$ in $|L|$ homotopsko ekvivalentna, natanko tedaj, ko sta $\chi(K)$ in $\chi(L)$ šibko homotopsko ekvivalentna

6. KONSTRUKCIJE NOVIH TOPOLOŠKIH PROSTOROV

V tem poglavju bomo definirali nekaj osnovnih konstrukcij iz algebraične topologije in jih uporabili na simplicialnih kompleksih ter končnih in splošnih topoloških prostorih. S S^n označimo n -dimenzionalno sfero.

Spoj Topoloških prostorov X in Y je topološki prostor $X * Y = X \times Y \times I / \sim$, pri čemer $(x, y_1, 0) \sim (x, y_2, 0)$ in $(x_1, y, 1) \sim (x_2, y, 1)$. Torej $X \times Y \times \{0\}$ strnemo na X in $X \times Y \times \{1\}$ na Y . Intuitivno, to pomeni, da vsako točko na X z intervalom povežemo z vsako točko na Y . Poseben primer spoja je *suspenzija* ΣX , ki je spoj X in prostora na dveh točkah, S^0 .

$$\Sigma X = S^0 * X = X \times I / (X \times \{0\}, X \times \{1\})$$



SLIKA 5. Suspenzija ΣS^0 je homeomorfna S^1 . V splošnem velja $\Sigma S^n = S^{n+1}$

Naj bosta X in Y topološka prostora. Naj $x_0 \in X$ in $y_0 \in Y$. Potem je šop $X \vee Y$ kvocient disjunktne unije $X \sqcup Y$, pri katerem identificiramo x_0 in y_0 . Na primer $S^1 \vee S^1$ je prostor, ki ga dobimo, če staknemo dve krožnici v eni točki in je homeomorfen "8".

Simplicialni spoj $K * L$ kompleksov K in L z disjunktima množicama oglišč je kompleks.

$$K * L = K \cup L \cup \{\sigma \cup \tau \mid \sigma \in K, \tau \in L\}$$

Simplicialni stožec aK z bazo K je simplicialni spoj K in oglišča $a \notin K$


Trditev 6.1. Naj bosta K in L končna simplicialna kompleksa, potem je geometrijska realizacija $|K * L|$ homeomorfna topološkemu spoju $|K| * |L|$.

Dokaz. Definirajmo $f : |K| \times |L| \times I \rightarrow |K * L|$, kot $f(k, l, j) = jk + (1 - j)l$. Če $k = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ in $l = \sum_{i=1}^m \beta_i u_i$, potem je $\{v_i \mid \alpha_i > 0\}$ simpleks v K in $\{u_i \mid \beta_i > 0\}$ simpleks v L ter $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \sum_{i=1}^m \beta_i = 1$. Zato je $\{v_i \mid \alpha_i > 0\} \cup \{u_i \mid \beta_i > 0\}$ simpleks v $K * L$ in $\sum_{i=1}^n \alpha_i j + \sum_{i=1}^m \beta_i (1 - j) = 1$. Torej je f dobro definirana. Velja tudi $f(k, l, 0) = l$, neodvisno od k in $f(k', l', 1) = k'$, neodvisno od l' , torej f slika ekvivalenčne razrede v točke. Ker sta K in L končna kompleksa, je $|K| \times |L| \times I$ kompaktna. Torej f slika iz kompakta v T_2 prostor in je zato zaprta. Preslikava f je zaprta in surjektivna, zato je kvocientna. Naredi iste identifikacije kot q , zato je inducirana preslikava \bar{f} dobro definirana in je homeomorfizem.

$$\begin{array}{ccc}
|K| \times |L| \times I & \xrightarrow{f} & |K * L| \\
q \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\
|K| * |L| & &
\end{array}$$

□

Če je K 0-kompleks z dvema ogliščema, potem je $|K * L| = |K| * |L| = S^0 * |L| = \Sigma|L|$.



SLIKA 6. Geometrijska realizacija simplicialnega spoja dveh 1-simpleksov je homeomorfna geometrijski realizaciji 3-simpleksa.

Definicija 6.2. *Ne-Hausdorffov spoj* $X \otimes Y$ dveh končnih T_0 -prostorov X in Y , je disjunktna unija $X \sqcup Y$, v kateri pustimo ureditev v X in v Y in nastavimo $x \leq y$ za vsaka $x \in X$ in $y \in Y$.

Ta spoj je asociativen in v splošnem ni komutativen. Tako kot pri topološkem in simplicialnem spoju imamo poseben primer ne-Hausdorffovega ne-Hausdorffovega Suspenzije $\mathbb{S}(X) = X \otimes S^0$.

Ne-Hausdorffova suspenzija reda n je definirana rekurzivno, kot $\mathbb{S}^n = \mathbb{S}(\mathbb{S}^{n-1}(X))$.

Opomba 6.3. Velja $\mathcal{K}(X \otimes Y) = \mathcal{K}(Y) * \mathcal{K}(X)$.

7. MINIMALNI MODEL SFERE

Definicija 7.1. Končni topološki prostor je *model* prostora X , če mu je šibko homotopsko ekvivalenten. Model je *minimalen*, če ima izmed vseh modelov najmanjšo kardinalnost.

Spomnimo se, da je minimalni končni prostor, prostor brez odvečnih točk. Ker je pa vsak končen prostor homotopsko ekvivalenten svojemu jedru, sledi, da je vsak minimalni končni model prostora tudi minimalen končen prostor.

Trditev 7.2. *Končen prostor $\mathbb{S}^n(S^0)$ je končni model n -dimenzionalne sfere S^n za vsak $n \geq 0$*

Dokaz. Vemo že, da je $\mathbb{S}^n(S^0)$ šibko homotopsko ekvivalenten $|\mathcal{K}(\mathbb{S}^n(S^0))|$, po opombi 6.3 in trditvi 6.1 pa velja $|\mathcal{K}(\mathbb{S}^n(S^0))| = |\mathcal{K}(S^0 \otimes S^0 \otimes \dots \otimes S^0)| = |\mathcal{K}(S^0) * \mathcal{K}(S^0) *$

$$\dots * \mathcal{K}(S^0)| = |\mathcal{K}(S^0)| * |\mathcal{K}(S^0)| * \dots * |\mathcal{K}(S^0)| = \underbrace{S^0 * S^0 * \dots * S^0}_{n+1\text{-krat}} = S^n$$

□

Zdaj bomo še dokazali, da je $\mathbb{S}^n(S^0)$ minimalni končni model za S^n . Še več, pokazali bomo, da ima vsak prostor, šibko homotopsko ekvivalenten S^n vsaj $2n + 2$ točk. Če ima pa natanko $2n + 2$ točk pa je homeomorfen $\mathbb{S}^n(S^0)$.

Definicija 7.3. Višina $\text{ht}(X)$ končne delno urejene množice je ena manj kot dožina najdaljše verige v X . Z $\#X$ pa označimo število elementov v X .

Dimenzija prirejenega kompleksa $\mathcal{K}(X)$ je enaka $\text{ht}(X)$.

Izrek 7.4. Naj bo $X \neq *$ minimalen prostor, potem ima vsaj $2\text{ht}(X) + 2$ točk. Če ima natanko $2\text{ht}(X) + 2$ točk, potem je homeomorfen $\mathbb{S}^{\text{ht}(X)}(S^0)$

Dokaz. Naj bo $x_0 < x_1 < \dots < x_h$ veriga dolžine $h = \text{ht}(X)$. Ker je X minimalen, x_i ni odvečna točka za noben $0 \leq i < h$. Potem za vsak $0 \leq i < h$ obstaja y_{i+1} , tak da $y_{i+1} > x_i$ (1) in $y_{i+1} \not\leq x_{i+1}$. Trdimo, da so vse točke y_i med seboj različne, za vsak $0 < i \leq h$ in da nobena ni enaka x_j za noben $0 \leq j \leq h$.

Ker $y_{i+1} > x_i$, sledi, da $y_{i+1} \neq x_j$ za noben $j \leq i$. Ker velja tudi $y_{i+1} \not\leq x_{i+1}$ pa sledi, da $y_{i+1} \neq x_j$ za noben $j > i$.

Če je $y_{i+1} = y_{j+1}$ za nek $i < j$, potem je $y_{i+1} = y_{j+1} \geq x_j \geq x_{i+1}$. To je pa v protislovju z $y_{i+1} \not\leq x_{i+1}$.

Ker je vsak končen prostor z minimumom ali z maksimumom kontraktibilen in je $X \neq *$, minimalen prostor, sledi da X nima minimuma. Zato mora obstajati točka $y_0 \in X$, za katero velja $y_0 \not\leq x_0$. Zato je y_0 različna od drugih $2h + 1$ točk in zato $\#X \geq 2h + 2$. Predpostavimo zdaj, da ima X natanko $2h + 2$ točk, torej

$$X = \{x_0, x_1, \dots, x_h, y_0, y_1, \dots, y_h\}.$$

Če bi bil $x_i < y_i$, za $0 < i \leq h$ bi bilo to v nasprotju z maksimalnostjo verige $x_0 < \dots < x_h$, saj bi potem veljalo $x_{i-1} < y_i < x_i$. Tudi $y_i \not\leq x_i$ za $0 \leq i \leq h$ zaradi (1), zato sta x_i in y_i neprimerljiva za $0 \leq i \leq h$.


Z indukcijo na j pokažimo, da $y_i < x_j$ in $y_i < y_j$ za vse $i < j$. Za $j = 0$ ni kaj za dokazovati. Naj bo $0 \leq k < h$ in recimo, da trditev drži za $j = k$, dokažimo, da drži tudi za $j = k + 1$. Ker x_{k+1} ni navzdol odvečna, obstaja z , da $z < x_{k+1}$ in $z \not\leq x_k$. Ker sta x_{k+1} in y_{k+1} neprimerljiva, velja tudi $z \neq y_{k+1}$. Iz indukcijske predpostavke sledi, da je vsaka točka, z izjemo y_k in y_{k+1} , večja od x_{k+1} ali manjša od x_k . Ker $y_{k+1} \not\leq x_{k+1}$, je potem $z = y_k$ in zato $y_k < x_{k+1}$. Dokažimo še, da $y_k \leq y_{k+1}$. Ker y_{k+1} ni navzdol odvečna, obstaja $w \in X$, da je $w < y_{k+1}$ in $w \not\leq x_k$. Iz indukcijske predpostavke in dejstva, da $y_{k+1} \not\leq x_{k+1}$, sklepamo, da $w = y_k$ in zato $y_k < y_{k+1}$. Za $i < k$ pa velja $y_i < x_k < x_{k+1}$ in $y_i < x_k < y_{k+1}$.

Dokazali smo, da za vsak $i < j$, velja $y_i < x_j$, $y_i < y_j$, $x_i < x_j$ in $x_i < y_j$ ter da sta x_i in y_i neprimerljiva za vsak $0 \leq j \leq h$. To je pa ureditev v $\mathbb{S}^h(S^0)$ in zato je X homeomorfen $\mathbb{S}^h(S^0)$. □

Ker je $\mathbb{S}^n(S^0)$ model za S^n , čigar višina je enaka n in ima $2n + 2$ točk, je $\mathbb{S}^n(S^0)$ minimalni model za S^n . Model je enoličen, saj je vsak model za S^n na $2n + 2$ točkah homeomorfen $\mathbb{S}^n(S^0)$.

8. ZANKE V HASSEJEVEM DIAGRAMU

Pokazali bomo, kako se fundamentalna grupa končnega T_0 prostora izraža preko prirejenega Hassejevega diagrama. Hassejev diagram končnega T_0 prostora X označimo z $\mathcal{H}(X)$, z $E(\mathcal{H}(X))$ pa označimo množico njegovih robov.




SLIKA 7. Minimalni modeli za S^0 , S^1 in S^2 .

Definicija 8.1. Naj bo (X, x_0) končen T_0 prostor z izhodiščno točko. Urejen par $e = (x, y)$ imenujemo \mathcal{H} –rob od X , če $(x, y) \in E(\mathcal{H}(X))$, ali $(y, x) \in E(\mathcal{H}(X))$. Točki x rečemo *začetek* x in označimo $x = \mathfrak{o}(e)$, točki y pa *konec* od e , označimo $\mathfrak{e}(e) = y$. Inverz \mathcal{H} –roba $e = (x, y)$ je \mathcal{H} –rob $e^{-1} = (y, x)$.

\mathcal{H} –pot v (X, x_0) je zaporedje (lahko tudi prazno), \mathcal{H} –robov $\xi = e_1 e_2 \cdots e_n$, za katerega velja, da je $\mathfrak{e}(e_i) = \mathfrak{o}(e_{i+1})$, za vsak $0 \leq i \leq n - 1$. Začetek \mathcal{H} –poti ξ je $\mathfrak{o}(\xi) = e_1$, konec pa $\mathfrak{e}(\xi) = e_n$. Začetek in konec prazne poti je $\mathfrak{o}(\emptyset) = \mathfrak{e}(\emptyset) = x_0$. Če je $\xi = e_1, e_2 \cdots e_n$ \mathcal{H} –pot, definiramo $\bar{\xi} = e_n^{-1}, \dots, e_2^{-1} e_1^{-1}$. Če sta ξ in ξ' \mathcal{H} –poti in velja $\mathfrak{e}(\xi) = \mathfrak{e}(\xi')$, lahko definiramo produktno \mathcal{H} –pot $\xi \xi'$, kot zaporednje \mathcal{H} –robov v ξ , ki mu sledi zaporednje \mathcal{H} –robov v ξ' .

Za \mathcal{H} –pot $\xi = e_1 e_2, \dots, e_n$ pravimo, da je *monotona*, če je $e_i \in E(\mathcal{H}(X))$ za vsak $1 \leq i \leq n$ ali pa je $e_i^{-1} \in E(\mathcal{H}(X))$ za vsak $1 \leq i \leq n$. Zanka iz x_0 je \mathcal{H} –pot, ki se začne in konča v x_0 . Za zanki ξ in ξ' rečemo, da sta blizu, če obstajajo monotone \mathcal{H} –poti $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$, take, da sta množici $\{\xi, \xi'\}$ in $\{\xi_1 \xi_2 \xi_3 \xi_4, \xi_1 \xi_4\}$ enaki.

Rečemo, da sta zanki ξ in ξ' \mathcal{H} –ekvivalentni, če obstaja končno zaporednje zank $\xi = \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n = \xi'$, tako da sta vsaki zaporedni zanki blizu. Z $\langle \xi \rangle$ označimo \mathcal{H} –ekvivalenčni razred zanke ξ in z $\mathcal{H}(X, x_0)$ množico teh razredov.



SLIKA 8. Primer poti ki sta blizu

Izrek 8.2. Naj bo (X, x_0) končen T_0 prostor z izhodiščno točko. Potem je množenje $\langle \xi \rangle \langle \xi' \rangle = \langle \xi \xi' \rangle$ dobro definirano in inducira grupno strukturo na $\mathcal{H}(X, x_0)$

Dokaz. Dobra definiranost in asociativnost sta očitni, enota je $\langle \emptyset \rangle$. Naj bosta ξ in ξ' poti, e \mathcal{H} –rob in $\mathfrak{e}(\xi) = \mathfrak{o}(\xi') = \mathfrak{o}(e)$. Potem sta poti $\langle \xi \xi' \rangle$ in $\langle \xi e e^{-1} \xi' \rangle$ blizu, saj je e monotona pot. Iz tega takoj sledi, da je inverz od $\langle e_1 e_2 \dots e_n \rangle$ enak $\langle e_n^{-1} \dots e_2^{-1} e_1^{-1} \rangle$. \square

Izrek 8.3. Naj bo (X, x_0) končen T_0 prostor z izhodiščno točko. Potem je grupa sklenjenih lomljenk $E(\mathcal{K}(X), x_0)$ izomorfna $\mathcal{H}(X, x_0)$.

Dokaz. Definirajmo

$$\begin{aligned}\varphi : \mathcal{H}(X, x_0) &\rightarrow E(\mathcal{K}(X), x_0) \\ \langle e_1 e_2 \dots e_n \rangle &\mapsto [e_1 e_2 \dots e_n] \\ \emptyset &\mapsto [(x_0, x_0)]\end{aligned}$$

Najprej pokažimo, da je φ dobro definiran. Naj bosta zanki $\xi_1 \xi_2 \xi_3 \xi_4$ in $\xi_1 \xi_4$ blizu in naj bosta $\xi_2 = e_1 e_2 \dots e_n$ in $\xi_3 = e'_1 e'_2 \dots e'_m$ monotoni \mathcal{H} -poti. Potem velja

$$\begin{aligned}[\xi_1 \xi_2 \xi_3 \xi_4] &= [\xi_1 e_1 e_2 \dots e_{n-1} (\mathbf{o}(e_n) \mathbf{e}(e_n)) \xi_3 \xi_4] \\ &= [\xi_1 e_1 e_2 \dots e_{n-2} (\mathbf{o}(e_{n-1}) \mathbf{e}(e_n)) \xi_3 \xi_4] = \dots = [\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(e_n)) \xi_3 \xi_4],\end{aligned}$$

saj je $\{\mathbf{o}(e_{n-1}), \mathbf{o}(e_{n-1+1}), \mathbf{e}(e_{n-i+1})\}$, analogno

$$[\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(e_n)) \xi_3 \xi_4] = [\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(e_n)) (\mathbf{o}(e'_1) \mathbf{o}(\xi_4)) \xi_4]$$

in zato

$$\begin{aligned}[\xi_1 \xi_2 \xi_3 \xi_4] &= [\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(e_n)) (\mathbf{o}(e'_n) \mathbf{o}(\xi_4)) \xi_4] \\ &= [\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(e_n)) (\mathbf{e}(e_n) \mathbf{e}(\xi_1)) \xi_4] = [\xi_1 (\mathbf{e}(\xi_1) \mathbf{e}(\xi_1)) \xi_4] = [\xi_1 \xi_4].\end{aligned}$$

Obratno, če je $\xi = (x_0, x_1)(x_1, x_2) \dots (x_{n-1}, x_n)$ lomljenka v $\mathcal{K}(X)$ z $x_0 = x_n$, potem sta x_i in x_{i-1} primerljiva za vsak $1 \leq i \leq n$. Zato lahko najdemo monotone \mathcal{H} -poti $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, take da $\mathbf{o}(x_{i-1}) = \mathbf{e}(x_i)$ za $1 \leq i \leq n$. Definirajmo

$$\begin{aligned}\psi : E(\mathcal{K}(X), x_0) &\rightarrow \mathcal{H}(X, x_0), \\ [\xi] &\mapsto \langle \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \rangle.\end{aligned}$$

Definicija je neodvisna od izbire \mathcal{H} -poti ξ_i , saj če se izbiri razlikujeta za kak $i = k$, potem sta $\xi_1 \dots \xi_k \dots \xi_n$ in $\xi_1 \dots \xi'_k \dots \xi_n$ \mathcal{H} -ekvivalentni, saj sta obe blizu $\xi_1 \dots \xi_k \xi_k^{-1} \xi_k \dots \xi_n$. Zato $\langle \xi_1 \dots \xi_k \dots \xi_n \rangle = \langle \xi_1 \dots \xi'_k \dots \xi_n \rangle$.

Definicija je neodvisna od izbire predstavnika. Recimo da sta $\xi(x, y)(y, z)\xi'$ in $\xi(x, z)\xi'$ ekvivalentni lomljenki v $\mathcal{K}(X)$, ki se začneta in končata v x_0 , pri čemer sta ξ in ξ' lomljenki, x, y in z pa so primerljivi. Če y leži med x in z , lahko najdemo monotono \mathcal{H} -pot od x do z , ki vsebuje y in nadomesti \mathcal{H} -pot od x do y in od y do z . Zato je ψ ekvivalentno definirana na $\xi(x, y)(y, x)\xi'$ in $\xi(x, z)\xi'$. Če je $z \leq x \leq y$ lahko poiščemo monotone \mathcal{H} -poti α od x do y in β od z do x , potem bo $\bar{\alpha}\bar{\beta}$ nadomestila pot (y, z) in $\bar{\beta}$ bo nadomestila pot (x, z) . Dokazati moramo le še, da velja $\langle \gamma \alpha \bar{\alpha} \bar{\beta} \gamma' \rangle = \langle \gamma \bar{\beta} \gamma' \rangle$, za \mathcal{H} -poti γ in γ' , kar je pa trivialno. Preostale kombinacije x, y in z dokažemo analogno.

Očitno sta φ in ψ drug drugemu inverzna in zato sta izomorfizma. \square

Ker sta grupi $E(\mathcal{K}(X), x_0)$ in $\pi_1(|\mathcal{K}(X)|, x_0)$ izomorfni, takoj sledi naslednji rezultat.

Posledica 8.4. Naj bo (X, x_0) končen T_0 prostor z izhodiščno točko, potem

$$\pi_1(X, x_0) = \mathcal{H}(X, x_0).$$

9. MINIMALNI MODELI GRAFOV

Graf v topologiji je topološki prostor, ki ga dobimo iz običajnega grafa $G = (E, V)$, če oglišča iz V zamenjamo s točkami in vsako povezavo $e \in E$, $e = xy$, za $x, y \in V$, zamenjamo z enotskim intervalom, pri čemer identificiramo 0 in x ter 1 in y . Graf je torej geometrijska realizacija enodimenzionalnega simplicialnega kompleksa. Graf je končen, če ima končno mnogo oglišč.

Brez dokaza bomo upoštevali dejstvo, da je za enodimenzionalne poliedre šibki homotopski tip odvisen le od fundamente grupe. To pomeni, da sta prostora šibko homotopsko ekvivalentna, natanko tedaj, ko imata izomorfní fundamentalni grupi.

Definicija 9.1. Naj bo K simplicialni kompleks dimenzije n in naj s_m označuje število m -simpleksov v K . Eulerjeva karakteristika $\chi(K)$ simplicialnega kompleksa K , je $\chi(K) = \sum_{i=0}^n (-1)^i s_i$

Če se omejimo na enodimenzionalne simplicialne komplekse oziroma grafe, potem je eulerjeva karakteristika enaka $V - E$, kjer je V število oglišč, E pa število robov v grafu. Eulerjeva karakteristika dreves je enaka 1.

Trditev 9.2. Naj bo G topološki graf in e njegova povezava. Potem je $G \times \{0\} \cup e \times I$ deformacijski retrakt od $G \times I$.

Dokaz. Obstaja retrakcija $r : I \times I \rightarrow I \times \{0\} \cup \partial I \times I$, na primer radialna projekcija iz točke $(1/2, 2) \in I \times \mathbb{R}$. Ta retrakcija nam porodi deformacijsko retrakcijo $r_t^1 = tr + (1-t)1$. Ta deformacijska retrakcija nam porodi deformacijsko retrakcijo $G \times I \rightarrow G \times \{0\} \cup V \cup e \times I$, kjer je V množica oglišč grafa. Ker je $\{v\} \times I$ kontraktibilna, obstaja deformacijska retrakcija $r_t^2 : G \times \{0\} \cup V \cup e \times I \rightarrow G \times \{0\} \cup e \times I$. Če izvedemo r_t^1 v času $[0, 1/2]$ in r_t^2 v $[1/2, 1]$, dobimo deformacijsko retrakcijo $r_t : G \times I \rightarrow G \times \{0\} \cup e \times I$. Retrakcija je zvezna, saj je zvezna kot zožitev na vse robove in na vsa oglišča v G , oziroma na vse zaprte simplekse. \square

Trditev 9.3. Naj bo G končen topološki graf in $e = \{u, v\}$ povezava v grafu za $u \neq v$, potem se vsak par preslikav $G \times \{0\} \rightarrow G$ in $e \times I \rightarrow G$, ki sovпада na $e \times \{0\}$, da razširiti do preslikave $G \times I \rightarrow G$.

Dokaz. Ker je e zaprt v G , lahko preslikavi združimo v preslikavo $G \times \{0\} \cup e \times I \rightarrow G$, ki je zvezna, saj je zvezna na zaprtih podprostorih $G \times \{0\}$ in $e \times I$. Če to komponiramo z retrakcijo $G \times I \rightarrow G \times \{0\} \cup e \times I$, dobimo razširitev $G \times I \rightarrow G$. \square

Recimo, da imamo preslikavo $f_0 : G \rightarrow G$ in homotopijo $f_t : e \rightarrow G$, preslikave $f_0|_A$. Potem nam ta trditev pove, da lahko to homotopijo razširimo do homotopije $f_t : G \rightarrow G$ dane preslikave f_0 .

Trditev 9.4. Naj bo G končen topološki graf in $e = \{u, v\}$ povezava v grafu za $u \neq v$. Potem sta prostora G in G/e homotopsko ekvivalentna.

Dokaz. Naj bo $i : e \rightarrow G$ inkluzija. Povezava e je kontraktibilna, torej obstaja homotopija $r_t : e \rightarrow e$ in $r_0 = 1_e$. Naj bo $f_t : G \rightarrow G$ razširitev homotopije ir_t in naj velja $f_0 = 1_G$.

Ker $f_t(e) \subseteq e$, zato kompozicija $qf_t : G \rightarrow G/e$ slika e v točko, zato obstaja $\bar{f}_t : G/e \rightarrow G/e$, taka da velja $gf_t = \bar{f}_t q$. Pri $t = 1$ je $f_1(e)$ enaka točki, v

katero se e kontrakira. Zato f_1 inducira preslikavo $g : G/e \rightarrow G$, da velja $gq = f_1$.

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f_t} & G \\ q \downarrow & & \downarrow q \\ G/e & \xrightarrow{\bar{f}_t} & G/e \end{array} \quad \begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f_1} & G \\ q \downarrow & \nearrow g & \downarrow q \\ G/e & \xrightarrow{\bar{f}_1} & G/e \end{array}$$

Ker velja $qg(\bar{x}) = qgq(x) = qf_1(x) = \bar{f}_1q(x) = \bar{f}_1(\bar{x})$, sledi, da je $qg = \bar{f}_1$. Zato sta q in g homotopska inverza, saj je $gq = f_1 \simeq f_0 = 1_G$ in $qg = \bar{f}_1 \simeq \bar{f}_0 = 1_{G/e}$. \square

Posledica 9.5. Naj bo G končen graf, in naj bo T vpeto drevo. Potem sta prostora G in G/T homotopsko ekvivalentna.

Naj bo T vpeto drevo grafa G . Velja $\chi(T) = 1$. G dobimo iz T tako, da mu dodajamo povezave oziroma 1-simplekse, zato $\chi(G) = 1 - n$, kjer je n število povezav v G , ki niso v T . Prostor G/e dobimo iz G , tako da krajšči povezave zlepimo v eno točko, povezavo pa izbrišemo. Torej ima nov prostor eno oglišče in eno povezavo manj, zato se eulerjeva karakteristika ohranja. G/T je prostor z enim ogliščem x_0 in n povezavami, ki se začnejo in končajo v istem oglišču. Torej je homeomorfen šopu $n = 1 - \chi(G)$ krožnic, kar označimo z $\bigvee_{i=1}^n S^1$.

Posledica 9.6. Šibki homotopski tip grafa je odvisen le od eulerjeve karakteristike.

Minimalni model grafa je torej enak minimalnemu modelu $\bigvee_{i=1}^n S^1$. Poglejmo si fundamentalno grupo $\pi_1(\bigvee_{i=1}^n S^1, x_0)$, kjer je x_0 točka, v kateri so krožnice staknjene. Vsak ekvivalenčni razred zank predstavimo z zaporedjem krožnic, ki jih prepotuje in s smerjo v kateri gre čez krožnico. Če s s_i označimo ekvivalenčni razred zanke čez i -to krožnico, potem lahko ekvivalenčni zank predstavimo kot zaporedje $s_{i_1}^{j_1} s_{i_2}^{j_2} \cdots s_{i_m}^{j_m}$, za $m \in \mathbb{N}$ in $j \in \{-1, 1\}$. Tu j označuje smer po kateri gremo čez krožnico. Stik zank $s_{i_1}^{j_1} \cdots s_{i_m}^{j_m}$ in $s_{k_1}^{l_1} \cdots s_{k'_m}^{l'_m}$ pa je ekvivalenten stiku zaporedij $s_{i_1}^{j_1} \cdots s_{i_m}^{j_m} s_{k_1}^{l_1} \cdots s_{k'_m}^{l'_m}$. Seveda velja $s_i s_i^{-1} = s_i^{-1} s_i = 1$, kjer 1 predstavlja trivialno zanko. Torej vidimo, da je fundamentalna grupa $\pi_1(\bigvee_{i=1}^n S^1, x_0)$ enaka prosti grupi z n generatorji, ki jo označimo z F_n .

Trditev 9.7. Naj bo X povezan topološki prostor in naj $x, x_0 \in X, x \neq x_0$, taka da x ni niti maksimalen, niti minimalen. Potem inkluzija asociiranih simplicialnih kompleksov $\mathcal{K}(X \setminus \{x\}) \subseteq \mathcal{K}(X)$ inducira epimorfizem

$$i_* : E(\mathcal{K}(X \setminus \{x\}), x_0) \rightarrow E(\mathcal{K}(X), x_0)$$

med njunima grupama sklenjenih lomljenk.

Dokaz. Pokazati moramo, da je vsaka lomljenka v $\mathcal{K}(X)$ z izhodiščem x_0 ekvivalentna neki drugi lomljenki, ki ne gre skozi x . Recimo, da je $y \leq x$ in je $(y, x)(x, z)$ lomljenka v $\mathcal{K}(X)$. Če je $x \leq z$, potem je $(y, z)(x, z) \equiv (y, z)$, saj je $\{x, y, z\}$ simpleks. Če je pa $z < x$, potem obstaja $w > x$, saj x ni maksimalen. Zato je $(y, x)(x, z) \equiv (y, x)(x, w)(w, x)(x, z) \equiv (y, w)(w, z)$. Če je $y \geq x$ je dokaz analogen. \square

Če povezanemu prostoru X postopoma odstranjujemo točke, ki niso minimalne ali maksimalne, v vsakem koraku dobimo epimorfizem med fundamentalnima grupama.

Epimorfizem ni nujno izomorfizem, saj imamo lahko v $\mathcal{K}(X \setminus \{x\})$ dve neekvivalentni zanki, ki sta v $\mathcal{K}(X)$ ekvivalentni.

Posledica 9.8. *Naj bo X povezan končen T_0 prostor. Potem obstaja povezan T_0 prostor $Y \subseteq X$, višine kvečjemu 1 in epimorfizem iz $\pi_1(Y, x)$ v $\pi_1(X, x)$.*

Trditev 9.9. *Naj bo $n \in \mathbb{N}$. Če je X minimalen model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$, potem $\text{ht}(X) = 1$.*

Dokaz. Naj bo X minimalen model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$. Potem obstaja povezan T_0 podprostor $Y \subseteq X$ višine 1 in epimorfizem iz $\pi_1(Y, x)$ v $\pi_1(X, x) = F_n$. Ker je $\text{ht}(Y) = 1$, je Y model grafa, torej $\pi_1(Y, x) = F_m$, za $m \geq n$.

V $\mathcal{H}(Y)$ imamo m robov, ki niso v vpetem drevesu prirejenega grafa $\mathcal{K}(Y)$, zato lahko odstranimo $m - n$ robov iz $\mathcal{H}(Y)$ tako, da ostane povezan. Dobljen prostor Z je model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$.

Velja $\#Z = \#Y \leq \#X$, ampak ker je X končen minimalen model, mora veljati $\#X \leq \#Z$ in zato $X = Z$, torej je višina X enaka 1. \square

$Z \#X$ bomo označevali število elementov v množici X .

Naj bo X minimalen model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$. Vpeljimo naslednje oznake, $i := \#\{y \in X | y \text{ je minimalen}\}$ in $j := \#\{y \in X | y \text{ je maksimalen}\}$. Potem $\#X = i + j$ in $\#E(\mathcal{H}(X)) \leq ij$. Ker je $\chi(X) = 1 - n$, velja $n \leq 1 - (i + j) + ij = (i - 1)(j - 1)$. Navedimo glavni izrek razdelka.

Izrek 9.10. *Naj bo $n \in \mathbb{N}$. Končen T_0 -prostor X je minimalni model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$ natanko tedaj, ko je $\text{ht}(X) = 1$, $\#X \geq \min\{i + j | (i - 1)(j - 1) \geq n\}$ in $\#E(\mathcal{H}(X)) = \#X + n - 1$.*

Dokaz. Pokazali smo že, da če je X minimalen model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$, potem $\text{ht}(X) = 1$ in $\#X = \min\{i + j | (i - 1)(j - 1) \geq n\}$. Če sta i in j taka, da $(i - 1)(j - 1) \geq n$, potem definiramo prostor $Y = \{x_1, x_2, \dots, x_i, y_1, y_2, \dots, y_j\}$ z ureditvijo $y_k < x_l$ za vse k in l , ki je model za $\bigvee_{i=1}^{(i-1)(j-1)} S^1$. Potem lahko odstranimo $(i - 1)(j - 1) - n$ robov iz $\mathcal{H}(X)$

in tako dobimo povezan prostor kardinalnosti $i + j$, ki je model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$. Torej $\#X \leq \#Y = i + j$. To drži za vsaka i in j , za katera velja $n \leq (i - 1)(j - 1)$, zato $\#X = \min\{i + j | (i - 1)(j - 1) \geq n\}$, zaradi minimalnosti X . $\#E(\mathcal{H}(X)) = \#X + n - 1$ pa sledi, ker $\chi(X) = 1 - n$.


Dokažimo še v drugo smer. Naj velja $\text{ht}(X) = 1$, $\#X = \min\{i + j | (i - 1)(j - 1) \geq n\}$ in $\#E(\mathcal{H}(X)) = \#X + n - 1$. Dokazati moramo le, da je X povezan, saj potem iz prve in tretje predpostavke sledi, da je X model za $\bigvee_{i=1}^n S^1$, iz druge pa sledi, da je model minimalen.

Naj bodo X_l komponente povezanosti od X , za $1 \leq l \leq k$. Z M_l označimo množico maksimalnih elementov v X_l , z m_l pa $X \setminus M_l$. Naj $i = \sum_{l=1}^k \#M_l$ in $j = \sum_{l=1}^k \#m_l$. Ker $i + j = \#X = \min\{s + t | (s - 1)(t - 1) \geq n\}$, sledi, da $(i - 2)(j - 1) < n = \#E(\mathcal{H}(X)) - \#X + 1 = \#E(\mathcal{H}(X)) - (i + j) + 1$ in zato $ij - \#E(\mathcal{H}(X)) < j - 1$. To pomeni, da se $\mathcal{K}(X)$ od polnega dvodelnega grafa $(\cup m_l, \cup M_l)$ razlikuje v manj

kot $j - 1$ robovih. Ker za $r \neq l$ ne obstaja povezava med ogliščem v m_l in ogliščem v M_r , velja

$$j - 1 > \sum_{l=1}^k \#M(j - \#m_l) \geq \sum_{l=1}^k (j - \#m_l) = (k - 1)j.$$

Zato $k = 1$ in dokaz je končan. \square



Primer 9.11. Graf na sliki ima eulerjevo karakteristiko enako -2 , zato je homotopsko ekvivalenten šopu 3 krožnic, $\bigvee_{i=1}^3 S^1$. Vsak model za $\bigvee_{i=1}^3 S^1$ ima 6 točk in 8 robov. Ker obstajajo trije nehomeomorfni končni prostori s temi lastnosti vidimo, da graf v splošnem nima enolično določenega minimalnega modela. \diamond

SLOVAR STROKOVNIH IZRAZOV

edge path lomljenka

edge path group grupa sklenjenih lomljenk

down set navzdol zaprta množica

Euler characteristic Eulerjeva karakteristika

homotopy equivalence homotopska ekvivalenca

join spoj

simplicial complex simplicialni kompleks

up set navzgor zaprta množica

weak homotopy equivalence šibka homotopska ekvivalenca

wedge sum šop

\mathcal{H} -path \mathcal{H} -pot

LITERATURA

- [1] E.H. Spanier, *Algebraic topology*, Springer, New York, 1995.
- [2] J.A. Barmak, *Algebraic topology of finite topological spaces and applications*, Lecture notes in mathematics, Springer, Berlin, 2011.
- [3] A. Hatcher, *Algebraic topology*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, Cambridge.