

Методы оптимизации.

Семинар 4. Сопряжённые множества.

Лемма Фаркаша.

Александр Катруца

Московский физико-технический институт,
Факультет Управления и Прикладной Математики

26 сентября 2016 г.

- Внутренность и относительная внутренность выпуклого множества
- Проекция точки на множество
- Отделимость выпуклых множеств
- Опорная гиперплоскость

Сопряжённое множество

Сопряжённое множество

Сопряжённым (двойственным) к множеству $X \subseteq \mathbb{R}^n$ называют такое множество X^* , что

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle \geq -1, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

Сопряжённый конус

Если $X \subseteq \mathbb{R}^n$ — конус, тогда

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle \geq 0, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

Сопряжённое подпространство

Если X — линейное подпространство в \mathbb{R}^n , тогда

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle = 0, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

Факты о сопряжённых множествах

Theorem

Пусть X — произвольное множество в \mathbb{R}^n . Тогда

$$X^{**} = \overline{\operatorname{conv}(X \cup \{0\})}.$$

Theorem

Пусть X — замкнутое выпуклое множество, включающее 0 . Тогда $X^{**} = X$.

Theorem

Пусть $X_1 \subset X_2$, тогда $X_2^* \subset X_1^*$.

Найти сопряжённые к следующим множествам:

- Неотрицательный октант: \mathbb{R}_+^n
- Конус положительных полуопределённых матриц: S_+^n
- $\{(x_1, x_2) \mid |x_1| \leq x_2\}$
- $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$
- $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| \leq t\}$

Лемма Фаркаша

Лемма (Фаркаш)

Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Тогда имеет решение одна и только одна из следующих двух систем:

$$1) \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0$$

$$2) \mathbf{pA} \geq 0, \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle < 0$$

Важное следствие

Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ и $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Тогда имеет решение одна и только одна из следующих двух систем:

$$1) \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

$$2) \mathbf{pA} = 0, \langle \mathbf{p}, \mathbf{b} \rangle < 0, \mathbf{p} \geq 0$$

Применение

Если в задаче линейного программирования на минимум допустимое непусто и целевая функция ограничена на нём снизу, то задача имеет решение.

- Сопряжённые множества
- Свойства сопряжённых множеств
- Лемма Фаркаша