

# Методы оптимизации.

## Семинар 3. Проекция точки на множество, отделимость, опорная гиперплоскость.

Александр Катруца

Московский физико-технический институт,  
Факультет Управления и Прикладной Математики

19 сентября 2016 г.

- Аффинная оболочка и аффинное множество
- Выпуклая оболочка и выпуклое множество
- Коническая оболочка и выпуклый конус
- Операции, сохраняющие выпуклость

# Внутренности множества

## Внутренность множества

Внутренность множества  $G$  состоит из точек из  $G$ , таких что:

$$\text{int} G = \{x \in G \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset G\},$$

где  $B(x, \varepsilon) = \{y \mid \|x - y\| \leq \varepsilon\}$

## Относительная внутренность

Относительной внутренностью множества  $G$  называют следующее множество:

$$\text{relint} G = \{x \in G \mid \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap \text{aff} G \subseteq G\}$$

Вопрос: зачем нужна концепция относительной внутренности?



# Проекция точки на множество

## Расстояние между точкой и множеством

Расстоянием  $d$  от точки  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  до замкнутого множества  $X \subset \mathbb{R}^n$  по норме  $\|\cdot\|$  является

$$d(\mathbf{a}, X, \|\cdot\|) = \inf\{\|\mathbf{a} - \mathbf{y}\| \mid \mathbf{y} \in X\}$$

## Проекция точки на множество

Проекцией точки  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  на множество  $X \subset \mathbb{R}^n$  по норме  $\|\cdot\|$  будем называть такую точку  $\pi_X(\mathbf{a}) \in X$ , что

$$\pi_X(\mathbf{a}) = \arg \min_{\mathbf{y} \in X} \|\mathbf{a} - \mathbf{y}\|$$

Вопросы: единственна ли проекция? Если нет, то в каких случаях единственна? Какая связь между единственностью проекции и выпуклостью множества?

# Факты о проекциях

## Критерий проекции

Точка  $\pi_X(\mathbf{a}) \in X$  является проекцией точки  $\mathbf{a}$  на множество  $X \Leftrightarrow \|\mathbf{a} - \mathbf{x}\| \geq \|\mathbf{a} - \pi_X(\mathbf{a})\|, \forall \mathbf{x} \in X$ .

## Критерий проекции для нормы $\ell_2$

Точка  $\pi_X(\mathbf{a}) \in X$  является проекцией точки  $\mathbf{a}$  на множество  $X \Leftrightarrow \langle \pi_X(\mathbf{a}) - \mathbf{a}, \mathbf{x} - \pi_X(\mathbf{a}) \rangle \geq 0, \forall \mathbf{x} \in X$ .

- Проекция на шар  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{x}\|_* \leq 1\}$  в различных нормах
- Проекция на аффинное множество  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{rank}(\mathbf{A}) = m\}$
- Проекция на аффинное множество  $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{S}\mathbf{y}, \mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n \times m}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^m, \text{rank}(\mathbf{S}) = m\}$

# Отделимость выпуклых множеств

## Определение

Пусть  $X_1, X_2 \subset \mathbb{R}^n$  произвольные множества. Они называются:

- отделимыми, если  $\exists \mathbf{p}, \beta : \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_1 \rangle \geq \beta \geq \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_2 \rangle, \forall \mathbf{x}_1 \in X_1$  и  $\forall \mathbf{x}_2 \in X_2$ .
- собственно отделимыми, если они отделимы и  $\exists \mathbf{x}_1^* \in X$  и  $\exists \mathbf{x}_2^* \in X : \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_1^* \rangle > \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_2^* \rangle$
- сильно отделимыми, если  $\exists \mathbf{p} \neq 0$  и  $\beta :$   
$$\inf_{\mathbf{x}_1 \in X_1} \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_1 \rangle > \beta > \sup_{\mathbf{x}_2 \in X_2} \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_2 \rangle$$
- строго отделимы, если  $\forall \mathbf{x}_1 \in X_1$  и  $\forall \mathbf{x}_2 \in X_2 :$   
$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_1 \rangle > \langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_2 \rangle.$$

## Разделяющая гиперплоскость

Разделяющей гиперплоскостью для множеств  $X_1, X_2$  является такая гиперплоскость  $\{\mathbf{x} | \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle = \beta\}$ , что  $\langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_1 \rangle \geq \beta$  для всех  $\mathbf{x}_1 \in X_1$  и  $\langle \mathbf{p}, \mathbf{x}_2 \rangle \leq \beta$  для всех  $\mathbf{x}_2 \in X_2$



# Факты об отделимости

## Существование

Пусть  $X_1$  и  $X_2$  выпуклые непересекающиеся множества, тогда существует разделяющая их гиперплоскость.

## Критерий для выпуклых множеств

Два выпуклых множества, таких что по крайней мере одно из них открыто, не пересекаются тогда и только тогда, когда существует разделяющая гиперплоскость.

## Критерий сильной отделимости

Два выпуклых множества сильно отделимы тогда и только тогда когда расстояние между ними положительно.



## Опорная гиперплоскость

### Теорема об опорной гиперплоскости

В любой граничной (относительно граничной) точке выпуклого множества существует опорная (собственно опорная) гиперплоскость.



- Внутренность и относительная внутренность выпуклого множества
- Проекция точки на множество
- Отделимость выпуклых множеств
- Опорная гиперплоскость