

Методы оптимизации.

Семинар 7. Субдифференциал.

Александр Катруца

Московский физико-технический институт,
Факультет Управления и Прикладной Математики

17 октября 2016 г.

- Выпуклая функция
- Надграфик и множество подуровня функции
- Критерии выпуклости функции
- Неравенство Йенсена

Зачем?

Для непрерывной выпуклой функции f важно знать такой вектор \mathbf{a} , что

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) \geq \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle$$

- Если f дифференцируема, то $\mathbf{a} = \nabla f(\mathbf{y})$.
- Что делать, если f недифференцируема?

Субградиент

Вектор \mathbf{a} называется субградиентом функции $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ в точке \mathbf{x} , если

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) \geq \langle \mathbf{a}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle$$

для всех $\mathbf{y} \in X$.

Субдифференциал

Множество субградиентов функции f в точке \mathbf{x} называется субдифференциалом f в \mathbf{x} и обозначается $\partial f(\mathbf{x})$.

Теорема Моро-Рокафеллара

Пусть $f_i(\mathbf{x})$ — выпуклые функции на выпуклых множествах G_i , $i = 1, \dots, n$. Тогда, если $\bigcap_{i=1}^n \text{ri } G_i \neq \emptyset$ то функция

$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n a_i f_i(\mathbf{x})$, $a_i > 0$ имеет субдифференциал $\partial_G f(\mathbf{x})$

на множестве $G = \bigcap_{i=1}^n G_i$ и $\partial_G f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n a_i \partial_{G_i} f_i(\mathbf{x})$.

Если функция — максимум

Если $f(\mathbf{x}) = \max_{i=1, \dots, m} (f_i(\mathbf{x}))$, тогда

$\partial_G f(\mathbf{x}) = \text{Conv} \left(\bigcup_{i \in \mathcal{J}(\mathbf{x})} \partial_G f_i(\mathbf{x}) \right)$, где

$\mathcal{J}(\mathbf{x}) = \{i = 1, \dots, m \mid f_i(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})\}$

Примеры

- Модуль: $f(x) = |x|$
- Норма ℓ_2 : $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2$
- Скалярный максимум: $f(x) = \max(e^x, 1 - x)$
- Векторный максимум: $f(\mathbf{x}) = |\mathbf{c}^T \mathbf{x}|$
- $f(\mathbf{x}) = |\mathbf{c}_1^T \mathbf{x}| + |\mathbf{c}_2^T \mathbf{x}|$

Условный субдифференциал

- Субградиент
- Субдифференциал
- Условный субдифференциал
- Методы вычислений