

# Методы оптимизации.

## Семинар 4. Сопряжённые множества.

### Лемма Фаркаша.

Александр Катруца

Московский физико-технический институт,  
Факультет Управления и Прикладной Математики

26 сентября 2016 г.

- Внутренность и относительная внутренность выпуклого множества
- Проекция точки на множество
- Отделимость выпуклых множеств
- Опорная гиперплоскость

# Сопряжённое множество

## Сопряжённое множество

Сопряжённым (двойственным) к множеству  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  называют такое множество  $X^*$ , что

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle \geq -1, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

## Сопряжённый конус

Если  $X \subseteq \mathbb{R}^n$  — конус, тогда

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle \geq 0, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

## Сопряжённое подпространство

Если  $X$  — линейное подпространство в  $\mathbb{R}^n$ , тогда

$$X^* = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{p}, \mathbf{x} \rangle = 0, \forall \mathbf{x} \in X\}.$$

# Факты о сопряжённых множествах

## Theorem

Пусть  $X$  — произвольное множество в  $\mathbb{R}^n$ . Тогда

$$X^{**} = \overline{\operatorname{conv}(X \cup \{0\})}.$$

## Theorem

Пусть  $X$  — замкнутое выпуклое множество, включающее  $0$ . Тогда  $X^{**} = X$ .

## Theorem

Пусть  $X_1 \subset X_2$ , тогда  $X_2^* \subset X_1^*$ .

Найти сопряжённые к следующим множествам:

- Неотрицательный октант:  $\mathbb{R}_+^n$
- Конус положительных полуопределённых матриц:  $S_+^n$
- $\{(x_1, x_2) \mid |x_1| \leq x_2\}$
- $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq r\}$
- $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| \leq t\}$

## Лемма (Фаркаш)



- Сопряжённые множества
- Свойства сопряжённых множеств
- Лемма Фаркаша