

Laporan Inventaris Obat

Klinik Posyandu Faskes 1 - Dicetak 18-05-2026 14:18 WIB

Ringkasan inventaris

Total jenis obat: 6
Total kategori farmakologi: 6

Distribusi per kategori

- ACE inhibitor: 1 obat
- Analgesik dan antipiretik: 1 obat
- Antibiotik penisilin: 1 obat
- Antidiabetik oral biguanid: 1 obat
- Antihistamin: 1 obat
- OAINS / antiinflamasi nonsteroid: 1 obat

Daftar obat

No	Nama obat	Kategori	Indikasi	Kehamilan
1	Paracetamol	Analgesik dan antipiretik	Demam, Nyeri ringan sampai sedang	Kategori B, umumnya
2	Ibuprofen	OAINS / antiinflamasi nonsteroid	Nyeri otot, Nyeri sendi, Demam	Hindari pada trime
3	Amoxicillin	Antibiotik penisilin	Infeksi saluran napas, Infeksi THT, Infe	Kategori B, gunaka
4	Captopril	ACE inhibitor	Hipertensi, Gagal jantung, Nefropati dia	Kontraindikasi pad
5	Cetirizine	Antihistamin	Alergi, Rinitis alergi, Urtikaria	Gunakan bila manfa
6	Metformin	Antidiabetik oral biguanid	Diabetes melitus tipe 2	Gunakan sesuai per

Detail dosis dan peringatan

1. Paracetamol

Dosis umum: 500 mg setiap 4-6 jam bila perlu, maksimal 4 gram per hari.
Bahan aktif: Paracetamol
Peringatan: Gunakan hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Hindari konsumsi alkohol berlebihan saat menggunakan obat ini.

2. Ibuprofen

Dosis umum: 200-400 mg, 3 kali sehari setelah makan.
Bahan aktif: Ibuprofen
Peringatan: Gunakan setelah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Perlu pemantauan pada pasien dengan riwayat maag atau gangguan ginjal.

3. Amoxicillin

Dosis umum: 500 mg, 3 kali sehari sesuai durasi terapi.
Bahan aktif: Amoxicillin
Peringatan: Pastikan tidak ada riwayat alergi penisilin. Obat harus dihabiskan sesuai durasi terapi.

4. Captopril

Dosis umum: 12.5-25 mg, 2-3 kali sehari sesuai evaluasi tekanan darah.
Bahan aktif: Captopril
Peringatan: Pantau tekanan darah terutama pada awal terapi. Perhatikan fungsi ginjal dan kadar kalium pada penggunaan berkala.

Laporan Inventaris Obat

Klinik Posyandu Faskes 1 - Dicetak 18-05-2026 14:18 WIB

5. Cetirizine

Dosis umum: 10 mg sekali sehari.

Bahan aktif: Cetirizine

Peringatan: Dapat menyebabkan kantuk pada sebagian pasien. Hati-hati saat mengemudi atau mengoperasikan mesin.

6. Metformin

Dosis umum: 500 mg 1-2 kali sehari setelah makan, dititrasi sesuai respons.

Bahan aktif: Metformin

Peringatan: Konsumsi bersama makanan untuk mengurangi keluhan saluran cerna. Perlu evaluasi fungsi ginjal secara berkala.