

不可压缩 Navier–Stokes 方程及相关模型研究的数学工具

Franck Boyer Pierre Fabrie

前言

本专著是先前一本法文著作 [24] 的修订扩充版, 该书出版于 2006 年. 我们有两个目标. 第一, 向读者介绍流体力学中的建模与数学分析. 我们处理的核心模型是不可压缩 Stokes 方程和 Navier–Stokes 方程, 它们的推导将在 Chapter I 给出. 第二, 以足够一般的方式介绍数学工具, 使读者能够用这些工具研究许多其他类型的非线性演化偏微分方程.

本着这一精神, 我们力求使本书尽可能自成体系. 开始阅读所需的先修知识仅为微积分, 积分和泛函分析中的基本结果. Chapter II 回顾本书所用的一些较为标准的分析结果, 其中包括 Banach 空间中弱收敛与弱-* 收敛的定义和性质, 分布理论简介, 基本紧性结果, Bochner 积分及相关空间, 谱理论的基本结果等.

在 Chapter III 中, 我们介绍并研究 $\mathbb{R}^d$ 中 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间. Section 1 包含这类区域的主要定义和性质. 特别地, 我们说明如何定义这类区域边界上所定义函数的积分, 并证明基本的 Stokes 公式. 随后在 Section 2 中介绍并深入研究 Sobolev 空间. 适当的磨光算子在其中发挥重要作用, 不仅在本章如此, 在后续各章亦然; 借助这些算子, 我们可以证明各种函数空间中光滑函数集合的稠密性. 我们还研究嵌入定理, 延拓算子, 迹算子与迹提升算子, Sobolev 空间的对偶理论, 以及十分重要的 Poincaré 不等式和 Hardy 不等式. Section 3 介绍充分光滑区域边界附近适当的法向/切向坐标. 这一框架可用于研究切向 Sobolev 空间, 从而证明椭圆问题解直至边界的正则性, 例如 Stokes 问题. Section 4 通过完整研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 问题来说明上述所有概念.

Chapter IV 讨论稳态 (不可压缩)Stokes 方程. 对任何不可压缩流体力学模型的研究而言, 这都是一个核心主题. 该理论的一个基本工具是 Nečas 不等式, Section 1 给出它的完整证明. Section 2 利用此不等式研究梯度场与无散向量场之间的关系, 这对于构造 Stokes 系统中的压力至关重要. Section 3 和 Section 4 讨论散度算子和旋度算子的特殊性质以及若干相关函数空间. Section 5 分析带 Dirichlet 边界条件的 Stokes 问题, 其中包括 Stokes 算子的定义, 以及通过半群方法对非稳态 Stokes 问题的应用. 我们将 Stokes 方程椭圆正则性性质的完整证明推迟到 Section 6. Section 7, Section 8 和 Section 9 讨论 Stokes 问题的一些非标准变体, 其中考虑不同类型的边界条件或界面条件.

Chapter V 研究稳态和非稳态 Navier–Stokes 方程. 对于非稳态问题, 我们证明全局弱解的存在性以及二维情形下的唯一性, 还研究更光滑的解并讨论系统的抛物正则化性质. 随后, 对于稳态问题, 我们讨论齐次与非齐次边界数据情形下的存在性和唯一性问题, 并处理这些解的一些非常基本的稳定性问题.

在 Chapter VI 中, 我们研究本书所考虑的最复杂模型, 即非均匀流体的 (非稳态) 不可压缩 Navier–Stokes 方程. 分析这一问题所需的第一个要素是研究输运方程的弱解. Section 1 以自成体系的方式介绍这类方程重整化解的 Di Perna–Lions 理论, 其中包括与相应迹问题有关的较新进展. 随后在 Section 2 中利用这些结果, 证明完整 Navier–Stokes 系统所对应初边值问题弱解的全局存在性.

Chapter VII 讨论不可压缩流数值模拟中出现的边界条件所涉及的两个不同问题. Section 1 处理出流边界条件问题. 当计算区域因实际原因小于真实物理区域时, 必须选择这类边界条件. 我们在此分析一种将出流边界上的法向应力与动量通量联系起来的非线性边界条件. Section 2 研究罚方法. 例如, 可以用这种方法在位于几何形状简单的计算区域内的障碍物边界上施加齐次 Dirichlet 边界条件. 通过描述一个适当的边界层, 我们证明当罚参数趋于 0 时,

罚解收敛于精确解. 除了实际意义之外, 对这两个问题的分析还提供了引入若干数学方法的机会, 读者可能会发现这些方法在其他情形中也很有用.

Marseille, 2012 年 8 月
Franck Boyer, Pierre Fabrie

目录

前言	2
1 流体力学方程	6
1.1 流体的连续描述	6
1.1.1 连续介质假设. 密度	6
1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标	7
1.2 输运定理	8
1.3 演化方程	10
1.3.1 平衡方程	10
1.3.2 Cauchy 应力定理	12
1.3.3 重新考察演化方程	15
1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律	17
1.4.1 静止流体	17
1.4.2 Newton 假设	17
1.4.3 热力学第二定律的推论	19
1.4.4 比内能方程	20
1.4.5 熵与温度表述	20
1.5 方程汇总	21
1.6 不可压缩模型	22
1.6.1 不可压缩假设	22
1.6.2 不可压缩模型概览	24
1.7 若干精确稳态解	25
1.7.1 管内 Poiseuille 流	25
1.7.2 平面剪切流	26
1.7.3 两圆柱间的 Couette 流	26
2 分析工具	27
2.1 主要记号	27
2.2 泛函分析的基本结果	28
2.2.1 Banach 空间	28
2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛	29
2.2.3 Lebesgue 空间	31
2.2.4 单位分解	37
2.2.5 分布理论简介	38
2.2.6 Lipschitz 连续函数	39
2.3 基本紧性结果	39
2.3.1 函数空间中的紧集	39
2.3.2 紧映射	40
2.3.3 Schauder 不动点定理	41

2.4	单实变量函数	42
2.4.1	微分与原函数	42
2.4.2	微分不等式与 Gronwall 引理	44
2.5	Banach 值函数空间	45
2.5.1	定义与主要性质	45
2.5.2	时间正则性	46
2.5.3	紧性定理	48
2.5.4	Banach 值 Fourier 变换	49
2.6	无界算子的若干谱分析结果	51
2.6.1	定义	51
2.6.2	谱理论的初等结果	51
2.6.3	半群理论的应用	53
3	Sobolev 空间	54
3.1	区域	55
3.1.1	一般定义	55
3.1.2	Lipschitz 区域	55
3.2	Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间	58
3.2.1	定义	58
3.2.2	磨光算子与 Friedrichs 交换子估计	59
3.2.3	变量替换	62
3.2.4	延拓算子	62
3.2.5	迹与迹提升算子	63
3.2.6	Sobolev 空间的对偶理论	65
3.2.7	平移估计	67
3.2.8	Sobolev 嵌入	67
3.2.9	Poincaré 与 Hardy 不等式	69
3.2.10	一阶微分算子的定义域	70
3.3	区域边界附近的微积分	72
3.3.1	边界的局部坐标图描述	72
3.3.2	到边界的距离与投影	73
3.3.3	正则化距离	73
3.3.4	$\partial\Omega$ 邻域的参数化	74
3.3.5	切向 Sobolev 空间	75
3.3.6	切向/法向坐标中的微分算子	78
3.4	Laplace 问题	78
3.4.1	Dirichlet 边界条件	78
3.4.2	Neumann 边界条件	80

1 流体力学方程

本章介绍流体力学方程以及后文将研究的各种模型. 关于流体力学, 以及更一般的连续介质力学, 已有大量著作出版. 如果读者希望更详细地了解各个概念, 我们建议参阅 [90], [66], [102], [127], [126] 和 [123]. 此外, 我们所使用的一些热力学概念在 Appendix B 中有非常简要的说明.

1.1 流体的连续描述

1.1.1 连续介质假设. 密度

流体由大量运动着的分子构成, 与固体不同, 它在静止时没有确定的形状. 研究流体的一种初步方法, 可以是在考虑各粒子相互作用的情况下写出每个粒子的运动方程. 这些相互作用既包括以平均自由程为特征的碰撞, 也包括长程相互作用. 这种所谓的统计方法产生了流体动力学理论, 并更一般地产生了统计力学. 这一方法可以追溯到十九世纪中叶 Maxwell 的工作.

在大量物理情形中, 如果所研究流体的平均密度不太低, 即问题的特征长度相对于粒子的平均自由程足够大, 那么可以把流体视为连续介质. 这意味着可以把粒子的运动作为整体来考察, 而不是分别考察每个粒子. 因此, 我们可以定义刻画系统的宏观量, 如密度和速度等.

连续介质的一种直观描述如下. 在所考察的流体中, 给定时刻 t 和点 M , 令 δV 表示点 M 周围的一个空间微元体积. 这里假定体积 δV 相对于所研究问题的尺度很小, 但相对于分子的平均自由程又足够大. 这意味着 δV 中包含大量分子. 现以 δm 表示该微元体积中所含的质量, 则时刻 t 点 M 处的流体密度可以直观地定义为比值

$$\rho \approx \frac{\delta m}{\delta V}.$$

如果测量能够证实, 只要 δV 的大小保持在上述范围内, 这个量就基本不依赖于时刻 t 点 M 周围所选的微元体积 δV , 那么称连续介质假设成立. 在这种情况下, 时刻 t 点 M 处流速的一个直观统计定义是 δV 中所含粒子质心的速度:

$$v \approx \frac{\sum_{i=1}^N m_i v_i}{\sum_{i=1}^N m_i},$$

其中 m_i 和 v_i 分别表示 δV 中各分子的质量和速度, N 是这些分子的数目. 同样, 期望这一比值基本不依赖于体积 δV 的大小. 文献 [125] 给出了连续介质假设有效性的交互式说明. 密度更形式化的定义如下.

Definition 1.1: 如果存在非负函数 $(t, X) \mapsto \rho(t, X)$, 使得时刻 t 任意流体体积 ω 中所含的质量可表示为

$$\text{时刻 } t \text{ 体积 } \omega \text{ 中的质量} = \int_{\omega} \rho(t, X) dX, \quad (1.1)$$

则称连续介质描述有效.

函数 ρ 称为所研究流体的密度场. 由上面的形式化讨论应当清楚, 只有当流体体积 ω 的尺度充分大于流体中分子的平均自由程时, 才能期望式(1.1)成立.

在正常温度和压力条件下, 常规气体 (氧气, 氢气, 氮气等) 中的平均自由程约为 $100 \text{ nm} = 10^{-7} \text{ m}$, 而水中的这一特征长度约为 10^{-10} m . 当然, 与大多数实际情形下所研究问题的特征尺度相比, 这些长度非常小. 然而, 在更极端的情形中, 例如高空空气稀薄处, 介质中的平均自由程可能长得多, 其数量级可能与所研究实际问题的尺度相当, 例如航天飞机在高层大气中的绕

流. 在这种情况下, 流体不能再被假定为连续介质, 必须采用介质的微观统计描述. 本书下文始终假定所处理的是连续介质.

Notation: 关于这里所用常见微分算子的主要记号和性质, 见 Appendix A.

1.1.2 Lagrangian 坐标与 Eulerian 坐标

在流体力学中, 可以用两个典范坐标系写出各种运动方程. 如下所述, Lagrangian 坐标与一个流体粒子 (或一个流体体积元) 相联系, 并在其整个演化过程中跟随它. 相比之下, Eulerian 坐标是与实验相关联的固定参考系中的坐标.

在某些情形下, 例如研究自由表面流或流固相互作用时, Lagrangian 坐标确实很有用. 然而, 自十八世纪 Euler 的工作以来, 使用 Eulerian 坐标写出流动方程更为常见也更为方便, 本书也将采用这种坐标.

连续介质假设使我们能够把流体分子的运动作为整体而不是逐个分子来考察. 设 $\omega \subset \mathbb{R}^3$ 是初始时刻流体占据的空间体积. 流动由定义在 ω 上的一族双射映射 $(\varphi_t)_t$ 描述, 使得对任意 $\Omega_0 \subset \omega$, 集合 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 在时刻 t 恰好包含初始时刻位于 Ω_0 中的那些流体分子. 本书始终假定系统中没有物质源或物质汇; 否则必须相应修改方程.

Definition 1.2: 由时间变量 t 标记且满足 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 的这样一族集合 $(\Omega_t)_t$ 称为流体元. 当 Ω_0 是单点集 $\Omega_0 = \{x_0\}$ 时, 称其为流体粒子.

这是一个纯粹的数学概念, 与流体中的任何特定分子无关. 在后一种情形中, 对任意 t 都有 $\Omega_t = \{\varphi_t(x_0)\}$. 因此, $\varphi_t(x_0)$ 是初始时刻 0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 相对于固定参考系的位置.

于是, 对任意 t, t_0 和 x_0 , 可以引入点

$$X(t, t_0, x_0) = \varphi_t(\varphi_{t_0}^{-1}(x_0)),$$

它表示在时刻 t_0 位于 x_0 的流体粒子在时刻 t 的位置. 映射 $t \mapsto X(t, t_0, x_0)$ 称为该流体粒子的轨迹.

知道 X 或 $(\varphi_t)_t$ 是等价的, 并且能够完全确定系统的演化. 不过, 我们通常并不关心在给定时刻识别系统中每个流体粒子的位置; 更适合使用由下列运动学关系定义的宏观速度场 v :

$$v(t, x) = \left. \frac{\partial X(s, t, x)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.2)$$

这意味着 $v(t, x)$ 是时刻 t 经过 x 的流体粒子的速度. 等价地, 对任意 t 和任意 x_0 , 此定义可写为

$$v(t, \varphi_t(x_0)) = \left. \frac{\partial \varphi_s(x_0)}{\partial s} \right|_{s=t}. \quad (1.3)$$

Remark 1.3: 由式(1.3)可见, 如果速度场 v 已知且足够光滑, 那么理论上可以通过求解下列微分方程来确定位置场 X ; 该方程有时称为特征方程:

$$\frac{\partial X(t, t_0, x_0)}{\partial t} = v(t, X(t, t_0, x_0)), \quad X(t_0, t_0, x_0) = x_0. \quad (1.4)$$

上面的坐标 (t, X) 构成所谓的 Eulerian 坐标系. 在 Eulerian 坐标中工作, 就是固定一个位置 X , 并在这个固定点写出力学平衡方程和热力学平衡方程.

设 $f(t, X)$ 是与流体描述有关的任意量, 如密度或温度等. 使用 Eulerian 坐标需要付出的代价是, f 关于时间的偏导数 $\partial f / \partial t$ 不能正确描述在时刻 t 经过固定位置 X 的粒子所携带的

量 f 随时间的变化, 因为它没有计入粒子的运动. 在这种情况下, Eulerian 描述中 f 的正确时间导数概念是物质导数, 定义为

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f. \quad (1.5)$$

这一定义来自下面对流体粒子所携带的量 f 关于时间变化的计算:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t, X(t, t_0, x_0)) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + \frac{\partial X}{\partial t}(t, t_0, x_0) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X(t, t_0, x_0)) + v(t, X(t, t_0, x_0)) \cdot \nabla f(t, X(t, t_0, x_0)) \\ &= \frac{Df}{Dt}(t, X(t, t_0, x_0)). \end{aligned}$$

1.2 输运定理

为简单起见, 在叙述和说明本章结果时, 我们对用于刻画流动的变量 (密度, 速度等) 的正则性作出若干假设. 不过应注意, 在某些情形下可以放宽这些假设.

我们首先叙述一个基本的微分结果, 在流体力学中称为输运定理. 它说明如何对流体元 $(\Omega_t)_t$ 上积分的标量值求导.

我们假设, 对每个 t , 映射 φ_t 是光滑微分同胚, 并且 $t \mapsto \varphi_t$ 是光滑的. 为略微简化记号, 还令

$$\varphi(t, x) = \varphi_t(x) = X(t, 0, x).$$

Theorem 1.4:

设函数 f 关于变量 $(t, X) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$ 属于 C^1 类. 则对任意时刻 t , 有

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX,$$

其中 v 是由式(1.2)定义的 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场.

Proof: 固定 t . 作变量替换 $x \in \Omega_0 \mapsto X = \varphi(t, x) \in \Omega_t$, 得

$$\int_{\Omega_t} f(t, X) dX = \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx,$$

其中 J 是映射 $x \mapsto \varphi(t, x)$ 的 Jacobian 行列式.

此外, 行列式关于其三行是三线性函数. 由式(1.3), 推得恒等式

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_i}{\partial t}(t, x) = \frac{\partial}{\partial x_j} (v_i(t, \varphi(t, x))).$$

省略导数取值点的书写, 得

$$\frac{d}{dt} J(t, x) = \begin{vmatrix} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} & \frac{\partial v_1}{\partial x_2} & \frac{\partial v_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x_1} & \frac{\partial v_2}{\partial x_2} & \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial v_3}{\partial x_1} & \frac{\partial v_3}{\partial x_2} & \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{vmatrix}.$$

应用链式法则, 得

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (v_k(t, \varphi(t, x))) = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) \frac{\partial \varphi_\ell}{\partial x_j}(t, x). \quad (1.6)$$

定义行向量 L_k 和 M_k 如下:

$$L_k = \left(\frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2}(t, x), \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_3}(t, x) \right),$$

$$M_k = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_2}(v_k(t, \varphi(t, x))), \frac{\partial}{\partial x_3}(v_k(t, \varphi(t, x))) \right).$$

式(1.6)表明

$$M_k = \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_k}{\partial X_\ell}(t, \varphi(t, x)) L_\ell,$$

因而

$$\begin{aligned} \det(M_1, L_2, L_3) &= \det \left(\sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} L_\ell, L_2, L_3 \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^3 \frac{\partial v_1}{\partial X_\ell} \det(L_\ell, L_2, L_3) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial X_1} \det(L_1, L_2, L_3) = \frac{\partial v_1}{\partial X_1}(t, \varphi(t, x)) J, \end{aligned}$$

这是因为行列式是三线性且交错的. 类似计算给出

$$\det(L_1, M_2, L_3) = \frac{\partial v_2}{\partial X_2}(t, \varphi(t, x)) J, \quad \det(L_1, L_2, M_3) = \frac{\partial v_3}{\partial X_3}(t, \varphi(t, x)) J.$$

另一方面, 已知

$$\frac{\partial J}{\partial t} = \det(M_1, L_2, L_3) + \det(L_1, M_2, L_3) + \det(L_1, L_2, M_3).$$

所以

$$\frac{\partial J(t, x)}{\partial t} = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J(t, x).$$

我们已经假定 $\varphi(t)$ 是连续依赖于 t 的 C^1 微分同胚, 因而其 Jacobian 行列式 J 不为零, 且其值全都位于 $\mathbb{R}_*^+$ 或全都位于 $\mathbb{R}_*^-$ 中. 在这些区域上, “绝对值” 函数为 C^∞ , 且导数为 “符号” 函数. 因此, 函数 $|J|$ 可微, 并且

$$\frac{\partial |J|}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) \frac{\partial J}{\partial t} = \operatorname{sgn}(J) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) J = (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) |J|.$$

应用积分号下求导理论, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \frac{d}{dt} \int_{\Omega_0} f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)| dx \\ &= \int_{\Omega_0} \frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) dx. \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial t} (f(t, \varphi(t, x)) |J(t, x)|) \\ &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) |J| + \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) \cdot \nabla f |J| + f(t, \varphi) \frac{\partial}{\partial t} |J| \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, \varphi) + v \cdot \nabla f + f(t, \varphi) (\operatorname{div} v)(t, \varphi(t, x)) \right) |J|. \end{aligned}$$

对上式作反向变量替换, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} f(t, X) dX &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla f + f \operatorname{div} v \right) dX \\ &= \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(fv) \right) dX.\end{aligned}$$

■

Remark 1.5: 这个标量方程的微分结果可以推广到向量方程. 为方便起见, 我们在下方以简洁形式给出此结果, 其中 $F(t, X)$ 是向量:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} F(t, X) dX = \int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial F}{\partial t} + \operatorname{div}(F \otimes v) \right) dX,$$

这里的向量场 v 与 Theorem 1.4 中的相同. 关于 $\operatorname{div}(F \otimes v)$ 的定义, 参见附录中的向量算子说明.

1.3 演化方程

本节介绍描述流体运动的一组方程. 它们是质量守恒方程, 动量守恒方程以及能量守恒方程. 我们采用运动的 Eulerian 描述, 并限于 Newtonian 流动的情形, 见 Section 1.4.

本节始终令 $(\Omega_t)_t$ 表示 Definition 1.2 所定义的任意流体元.

1.3.1 平衡方程

质量守恒. 回顾我们的假设: 所考察的流动内部既没有物质汇, 也没有物质源. 因此, 质量守恒性质可表述如下: 对任意给定的初始体积 Ω_0 , 时刻 t 包含在 $\Omega_t = \varphi_t(\Omega_0)$ 中的物质总质量, 与初始时刻包含在 Ω_0 中的物质总质量相同.

利用 Definition 1.1 中引入的密度概念, 此性质可表示为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dX = 0.$$

为避免方程过于冗长, 除非确有必要, 下文不再写出问题中各未知量对 (t, X) 的依赖关系.

利用输运定理 Theorem 1.4, 上式等价于

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) \right) dX = 0.$$

此式必须对任意时刻 t 以及随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立. 假定 ρ 和 v 是正则函数, 显然得到如下偏微分方程, 它称为质量守恒方程, 连续性方程或质量平衡方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0. \quad (1.7)$$

线动量方程. 本节应用 Newton 第二运动定律来表示流体元 $(\Omega_t)_t$ 的线动量演化. 时刻 t 流体元内包含的总线动量为

$$\int_{\Omega_t} \rho v dX.$$

Newton 第二运动定律指出, 此总动量的变化率等于作用于该流体元的外力之和. 一般而言, 这些力分为两类:

- 体力

$$\int_{\Omega_t} \rho f \, dX,$$

其中在许多情形下, 力的质量密度 f (表示流体所受的外力) 就是重力加速度.

- 表面力

$$\int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy,$$

其中 ν 是 Ω_t 的表面 $\partial\Omega_t$ 上指向外部的单位法向量. 这些力由其余流体作用于所考察的流体元 $(\Omega_t)_t$, 称为应力. 向量 $\tau(\nu)$ 当然也依赖于 (t, y) , 但方程中未将其明确写出.

因此, 一般的线动量方程可利用向量场的输运定理 Remark 1.5 写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \, dy, \quad (1.8)$$

并且必须对任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立.

角动量方程. 现在把角动量理论应用于流体元 $(\Omega_t)_t$. 该理论指出, 相对于某个给定固定点计算的流体元总角动量的变化率, 等于相对于同一点计算的作用力矩之和.

考虑一个固定点 O , 并定义位置向量 $r = \overrightarrow{OX}$, 则可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho v) \, dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

由于在 Eulerian 坐标中位置向量 r 不依赖于时间, 输运定理 Theorem 1.4 告诉我们, 上式可写成

$$\int_{\Omega_t} \left[r \wedge \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) \right] dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy.$$

此外, 利用 Appendix A 中的 Formula (A.10), 有

$$\begin{aligned} \operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) &= (\operatorname{div} v)(r \wedge \rho v) + (v \cdot \nabla)(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i \partial_{x_i}(r \wedge \rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + \sum_{i=1}^3 v_i (r \wedge \partial_{x_i}(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) \\ &= r \wedge ((\operatorname{div} v)\rho v) + r \wedge (v \cdot \nabla(\rho v)) + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v). \end{aligned}$$

然而, 由于点 O 固定, 有 $\partial r / \partial x_i = e_i$, 其中 e_i 是 $\mathbb{R}^3$ 典范基的第 i 个向量. 因而上式最后一项为

$$\sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial r}{\partial x_i} \wedge (\rho v) = \sum_{i=1}^3 v_i e_i \wedge (\rho v) = v \wedge (\rho v) = 0.$$

再次应用该公式, 得

$$\operatorname{div}((r \wedge \rho v) \otimes v) = r \wedge \operatorname{div}(\rho v \otimes v).$$

综上, 角动量守恒方程可写成

$$\int_{\Omega_t} r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} r \wedge (\rho f) \, dX + \int_{\partial\Omega_t} r \wedge \tau(\nu) \, dy. \quad (1.9)$$

能量演化. 先回顾热力学第一定律: 一个系统总能量的变化率等于机械力的功率与系统同外界热交换率之和.

单位体积的总能量为 $\rho E \equiv \rho(e + \frac{1}{2}|v|^2)$, 其中 e 是与流体热力学状态有关的比内能, 即单位质量的内能, 而 $\frac{1}{2}\rho|v|^2$ 表示单位体积的动能.

外力功率可分解为两项, 一项与体力有关, 另一项与表面上的应力有关:

$$\dot{W} = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy.$$

假定体积内部没有热源, 例如辐射热源, 则体积 Ω_t 中的热输入率具有形式

$$\dot{Q} = - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(t, y, \nu) \, dy,$$

这里假定跨越 Ω_t 表面的热传递项 Φ 仅依赖于位置, 时间以及所考察点处 Ω_t 的外法向量. 与应力 τ 一样, 仅在必要时写出其对 (t, y) 的依赖.

能量平衡现在可写为

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho E \, dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy.$$

对时间导数应用输运定理, 得到守恒方程

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v \, dX + \int_{\partial\Omega_t} \tau(\nu) \cdot v \, dy - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) \, dy. \quad (1.10)$$

1.3.2 Cauchy 应力定理

本节研究应力 $\tau(\nu)$ 的一般形式, 更确切地说, 证明下面的基本定理. 它指出, 应力关于所考察体积元表面的法向量是线性的. 本节明确写出应力对 (t, y) 的依赖, 因而记作 $\tau(t, y, \nu)$.

Theorem 1.6:

[Cauchy's stress] 假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力密度 f 是正则的. 另假定当向量 ν 固定时, 函数 $(t, y) \mapsto \tau(t, y, \nu)$ 连续. 则存在张量值函数 $(t, y) \mapsto \sigma(t, y)$, 使得对所有 (t, y) 和所有单位向量 ν 都有

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu.$$

Proof: 证明的关键是齐次性论证: 在线动量平衡方程中, 对尺度趋于 0 的基本控制体比较表面积分和体积分的量级. 下面给出计算细节.

首先证明对所有 (t, y, ν) 都有 $\tau(t, y, \nu) = -\tau(t, y, -\nu)$. 令

$$h = \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f,$$

使得动量守恒方程(1.8)对任意区域 ω 写为

$$\int_{\omega} h \, dX = \int_{\partial\omega} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.11)$$

任取点 y_0 和单位向量 ν_0 . 考虑以 y_0 为球心的球 ω , 并以经过 y_0 且垂直于 ν_0 的平面 Σ 将其分成两个半球 ω_1 和 ω_2 , 其中 ν_0 从 ω_1 指向 ω_2 . 分别对 ω , ω_1 和 ω_2 应用上面的守恒方程, 再利用 $\omega = \omega_1 \cup \omega_2$ 及其边界的相应分解, 得

$$\int_{\partial\omega_1 \cap \Sigma} (\tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)) \, dy = 0.$$

此式对以 y_0 为球心且任意小的球均成立. 由 $y \mapsto \tau(t, y, \nu_0) + \tau(t, y, -\nu_0)$ 的连续性, 得

$$\tau(t, y_0, -\nu_0) = -\tau(t, y_0, \nu_0).$$

函数 $\tau(t, y, \nu)$ 先验地仅对单位向量 ν 定义. 利用上述性质, 可将其延拓到 $\mathbb{R}^3$ 的所有向量 ξ :

$$\tau(t, y, \xi) = |\xi| \tau\left(t, y, \frac{\xi}{|\xi|}\right), \quad \tau(t, y, 0) = 0.$$

由此可见该函数关于 ξ 是一阶齐次的. 对任意 λ , 有

$$\tau(t, y, \lambda\xi) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \frac{\lambda\xi}{|\lambda\xi|}\right) = |\lambda||\xi| \tau\left(t, y, \operatorname{sgn}(\lambda) \frac{\xi}{|\xi|}\right) = \lambda \tau(t, y, \xi).$$

下面证明函数 $\xi \mapsto \tau(t, y, \xi)$ 的可加性. 取 $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^3$. 若它们共线, 上述齐次性足以得到结论. 现设 ξ_1 与 ξ_2 不共线, 并固定点 y_0 . 由点 y_0 和向量 ξ_1, ξ_2 生成一个定向平面 $\mathcal{P}$, 这等价于选择该平面的单位法向量 ν_0 . 记 $\xi_i^\perp$ 为将 ξ_i 沿正向旋转 $\pi/2$ 所得到的向量.




图 1: 棱柱 Ω_ε

引入点

$$x_1 = y_0 + \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 = y_0 - \varepsilon \xi_2^\perp,$$

以及

$$\tilde{y}_0 = y_0 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_1 = x_1 + \varepsilon \nu_0, \quad \tilde{x}_2 = x_2 + \varepsilon \nu_0.$$

于是 $y_0 x_1 x_2 \tilde{y}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 构成高度为 ε 且以三角形 $y_0 x_1 x_2$ 为底面的直棱柱 Ω_ε , 见 Figure 1 和 Figure 2. 将式(1.11)应用于 Ω_ε 并除以 ε^2 , 得


$$\frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\Omega_\varepsilon} h \, dX = \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \tau(t, y, \nu) \, dy. \quad (1.12)$$

表面项分成五部分: 三个棱柱侧面和两个底面. 两个底面的外单位法向量为 $\pm\nu_0$, 侧面的外单位法向量与平面 $\mathcal{P}$ 中三角形 $y_0 x_1 x_2$ 的外单位法向量相同. 因为

$$x_1 - y_0 = \varepsilon \xi_1^\perp, \quad x_2 - y_0 = -\varepsilon \xi_2^\perp, \quad x_2 - x_1 = -\varepsilon(\xi_1^\perp + \xi_2^\perp),$$

所以存在与 ε 无关的 $\eta \in \{-1, 1\}$, 使三个侧面的外单位法向量依次为

$$\eta \frac{\xi_1}{|\xi_1|}, \quad \eta \frac{\xi_2}{|\xi_2|}, \quad -\eta \frac{\xi_1 + \xi_2}{|\xi_1 + \xi_2|}.$$

图 2: 平面 $\mathcal{P}$ 中的三角形 $y_0x_1x_2$

利用 τ 关于 ξ 的齐次性, 式(1.12)右端可写为

$$\begin{aligned} & -\frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_1 + \xi_2|} \int_{x_1x_2\tilde{x}_2\tilde{x}_1} \tau(t, y, \xi_1 + \xi_2) dy \\ & + \frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_1|} \int_{y_0x_1\tilde{x}_1\tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_1) dy + \frac{\eta}{\varepsilon^2|\xi_2|} \int_{y_0x_2\tilde{x}_2\tilde{y}_0} \tau(t, y, \xi_2) dy \\ & + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{y_0x_1x_2} \tau(t, y, -\nu_0) dy + \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{\tilde{y}_0\tilde{x}_1\tilde{x}_2} \tau(t, y, \nu_0) dy. \end{aligned}$$

两个底面的面积相等, 均为 $\varepsilon^2|\xi_1 \wedge \xi_2|/2$. 由 $\tau(t, y, -\nu_0) = -\tau(t, y, \nu_0)$, 连续性和积分中值定理, 两个底面项之和在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时趋于 0. 每个矩形侧面的面积为相应的 $\varepsilon^2|\xi_i|$, 连续性保证三个侧面项分别趋于 $\eta\tau(t, y_0, \xi_1)$, $\eta\tau(t, y_0, \xi_2)$ 和 $-\eta\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2)$.

最后考察式(1.12)中的体积项. 根据假设, ρ 和 v 是正则场, 因而 h 局部有界. 棱柱 Ω_ε 的体积与 ε^3 成正比, 所以

$$\frac{1}{\varepsilon^2} \left| \int_{\Omega_\varepsilon} h dX \right| \leq C\varepsilon \rightarrow 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$0 = \eta\tau(t, y_0, \xi_1) + \eta\tau(t, y_0, \xi_2) - \eta\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2),$$

即

$$\tau(t, y_0, \xi_1 + \xi_2) = \tau(t, y_0, \xi_1) + \tau(t, y_0, \xi_2).$$

以上论证证明了应力 $\tau(t, y, \xi)$ 关于 ξ 的线性, 因而证明存在张量 $\sigma(t, y)$, 使每个单位向量 ν 都满足 $\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu$. ■

Definition 1.7: 对每个点 (t, y) , 由关系

$$\tau(t, y, \nu) = \sigma(t, y) \cdot \nu, \quad \text{对所有单位向量 } \nu,$$

定义的张量 $\sigma(t, y)$ 称为流动的应力张量.

为避免方程冗长, 下文不再标明应力张量对 (t, y) 的依赖, 并把应力写为 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$. 利用散度定理, 即 Stokes 公式 Theorem III.1.8, 能量守恒方程(1.10)中的表面项可写为

$$\int_{\partial\Omega_t} (\sigma \cdot \nu) \cdot v dy = \int_{\partial\Omega_t} \nu \cdot ({}^t\sigma \cdot v) dy = \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX.$$

因此, 能量演化方程变为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\partial\Omega_t} \Phi(\nu) dy. \quad (1.13)$$

现在可以对热传递项 Φ 建立一个与 Cauchy 定理类似的结果.

Theorem 1.8:

假定 ρ , E , v 和 f 是正则函数. 进一步假定对每个 ν , 函数 $(t, y) \mapsto \Phi(t, y, \nu)$ 连续. 则存在连续向量场 ϕ , 使得

$$\Phi(t, y, \nu) = \phi(t, y) \cdot \nu.$$

此向量场称为流动中的热通量. 该结果的证明与 Cauchy 定理的证明在形式上完全相同, 只需使用形式为(1.13)的能量守恒方程. 再次应用散度定理, 得

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f \cdot v dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) dX - \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \phi dX.$$

由于此式对随流动演化的任意流体元 $(\Omega_t)_t$ 成立, 得到局部形式

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}({}^t\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.14)$$

1.3.3 重新考察演化方程

由 Cauchy 定理可知应力具有张量形式 $\tau(\nu) = \sigma \cdot \nu$, 因而可推导出动量守恒方程的较简单形式. 散度定理 Theorem III.1.8 告诉我们, 对任意区域 Ω ,

$$\int_{\partial\Omega} \sigma \cdot \nu dy = \int_{\Omega} \operatorname{div} \sigma dX.$$

因此式(1.8)可写为

$$\int_{\Omega_t} \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) \right) dX = \int_{\Omega_t} \rho f dX + \int_{\Omega_t} \operatorname{div} \sigma dX.$$

此关系必须对任意流体元成立, 因而得到线动量方程的局部形式

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.15)$$

下面考察角动量守恒关系. 先计算表面项, 并尝试将 $r \wedge (\sigma \cdot \nu)$ 写成 $T \cdot \nu$ 的形式, 其中 T 是待定张量. 对典范基的第 i 个向量, 有

$$r \wedge (\sigma \cdot e_i) = (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) e_1 + (r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i}) e_2 + (r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i}) e_3.$$

这表明张量矩阵 T 的第 i 列为

$$\begin{pmatrix} r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i} \\ r_3 \sigma_{1i} - r_1 \sigma_{3i} \\ r_1 \sigma_{2i} - r_2 \sigma_{1i} \end{pmatrix}.$$

对 T 应用散度定理, 式(1.9)中的表面项成为体积分, 从而得到角动量方程的局部形式

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f \right) - \operatorname{div} T = 0. \quad (1.16)$$

利用 $\partial r_i / \partial x_j = \delta_{ij}$, 计算 T 的散度. 例如第一分量为

$$\begin{aligned} (\operatorname{div} T)_1 &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} (r_2 \sigma_{3i} - r_3 \sigma_{2i}) \\ &= \sum_{i=1}^3 \left(r_2 \frac{\partial \sigma_{3i}}{\partial x_i} - r_3 \frac{\partial \sigma_{2i}}{\partial x_i} \right) + \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial r_2}{\partial x_i} \sigma_{3i} - \frac{\partial r_3}{\partial x_i} \sigma_{2i} \right) \\ &= (r \wedge \operatorname{div} \sigma)_1 + (\sigma_{32} - \sigma_{23}). \end{aligned}$$

另外两个分量的类似计算给出

$$\operatorname{div} T = r \wedge \operatorname{div} \sigma + \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix}.$$

因此式(1.16)可写成

$$r \wedge \left(\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \rho f - \operatorname{div} \sigma \right) - \begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

由式(1.15), 上式中的向量积恒为零. 因而

$$\begin{pmatrix} \sigma_{32} - \sigma_{23} \\ \sigma_{13} - \sigma_{31} \\ \sigma_{21} - \sigma_{12} \end{pmatrix} = 0.$$

这一基本性质可表述如下.

Theorem 1.9:

假定密度场 ρ , 速度场 v 和体力场 f 光滑. 则作用于流动中流体的应力张量是对称的.

此结果有若干基本推论. 其中之一是: 对每个点 (t, y) , 存在 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基, 使张量 σ 对角化. 这些基向量称为张量的主轴, 相应的特征值称为与张量 σ 相关的主应力.

Remark 1.10: 既然已经证明应力张量对称, 线动量演化方程显然蕴含角动量演化方程. 因此从现在起, 不必再把后一个方程加入控制流体运动的方程组.

利用应力张量的对称性, 能量演化方程(1.14)可写成

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.17)$$

Remark 1.11: 目前得到的式(1.15)和(1.17)称为守恒形式, 因为它们写成 (t, x) 中某个量的散度等于源项的形式. 对形式计算或物理解读而言, 有时更适合使用下面的非守恒形式.

线动量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \operatorname{div} \sigma = \rho f. \quad (1.18)$$

能量方程:

$$\rho \left(\frac{\partial E}{\partial t} + (v \cdot \nabla) E \right) - \operatorname{div}(\sigma \cdot v) + \operatorname{div} \phi = \rho f \cdot v. \quad (1.19)$$

这些方程从前面的方程出发, 利用质量平衡方程(1.7)以及 Formulae (A.4), (A.10) 作代数运算得到. 从形式观点看, 两种写法完全等价. 从数学观点看, 当处理正则性不高的弱解时, 两种表述是否等价, 甚至非守恒形式是否有意义, 并不总是清楚的.

1.4 基本定律: Newtonian 流体与热力学定律

上一节给出了质量守恒, 线动量和能量演化方程的一般形式, 用以描述受体力作用且所研究区域内部没有物质源或热源的流体流动. 这些方程仍包含若干尚未确定的量: 应力张量 σ (目前只知道它对称), 热通量 ϕ 和比内能 e . 后两个量通过热力学定律与描述流动的其他场相联系, 我们将在 Section 1.4.4 回到这些量.

1.4.1 静止流体

Definition 1.12: 在静止流体中, 作用于流体元表面微元上的应力方向与该表面的外法向量方向相反. 此外, 应力的模与方向无关. 其模记为 p , 称为流体的静水压力.

由此定义, 对静止流体的每一点都有 $\tau(\nu) = -p\nu$, 其中 $p \geq 0$. 因而应力张量写为 $\sigma = -p\text{Id}$. 当流体运动时, 将应力张量表示成

$$\sigma = T - p\text{Id},$$

以分离压力效应和运动效应. 新张量 T 显然对称, 称为黏性应力张量. 这里假定静水压力 p 与 Appendix B 中由材料分子状态定义的热力学压力 P 完全一致.

1.4.2 Newton 假设

考虑黏性流体的平面 Couette 流, 另见 Section 1.7.3. 流体位于两块假定为无限大的平行平板之间. 在大小恒定且沿 e_1 方向的应力 $F e_1$ 作用下, 上板以速度 $U_0 e_1$ 运动, 下板保持静止. 对水等经典流体, 实验表明使平板以速度 U_0 运动所需的黏性应力为

$$F = \mu \frac{U_0}{d}, \quad (1.20)$$

其中常数 μ 仅依赖于所考察的流体. 换言之, 应力 F 与流动中的速度梯度 U_0/d 成正比.

这种应力效应是流体对剪切的一种阻力. 若停止施加驱动力 F , 流体经过一段时间后将恢复静止. 例如水的速度会随时间衰减. 这样的流体称为黏性流体. 黏性效应在流体发生形变时出现. 对 Couette 流可直观地说, 高度 $x_3 = C + h$ 处粒子的水平速度大于高度 $x_3 = C$ 处粒子的速度, 从而产生流体形变.

Definition 1.13: 考虑速度场为 v 的流动. 任取三个彼此很近的点 $x_0, x_1 = x_0 + (\delta x)\xi_1$ 和 $x_2 = x_0 + (\delta x)\xi_2$. 记 $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 为时刻 t 分别位于 x_0, x_1, x_2 的流体粒子在时刻 $t + \delta t$ 的位置.

若对方向 ξ_1, ξ_2 的任意选择, 三角形 $x_0 x_1 x_2$ 与 $\tilde{x}_0 \tilde{x}_1 \tilde{x}_2$ 在关于 δt 和 δx 的一阶精度内可以重合, 则称流体在时刻 t 点 x_0 表现为刚体. 更确切地说, 对所有 i, j, k ,

$$\overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_j} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_i \tilde{x}_k} = (\overrightarrow{x_i x_j} \cdot \overrightarrow{x_i x_k}) (1 + O(\delta t^2 + \delta x^2)). \quad (1.21)$$

Proposition 1.14: [Definition and Proposition] 流体在 (t, x) 表现为刚体, 当且仅当张量

$$D(v) = \frac{1}{2}(\nabla v + {}^t\nabla v) = \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \right)_{1 \leq i, j \leq 3}$$

在 (t, x) 为零. 张量 $D(v)$ 称为流动的应变率张量.

Proof: 记 $s \mapsto x_i(s)$ 为时刻 t 从 x_i 出发的轨迹, 因而 $\tilde{x}_i = x_i(t + \delta t)$. 由特征方程(1.4),

$$x'_i(s) = v(s, x_i(s)), \quad x''_i(s) = \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla)v \right)(s, x_i(s)).$$

对每个 $j \in \{0, 1, 2\}$ 作 Taylor 展开, 并利用特征方程的解对初值的连续依赖以及速度场的正则性, 得

$$\tilde{x}_j - \tilde{x}_i = x_j - x_i + \delta t(v(t, x_j) - v(t, x_i)) + O(\delta t^2 \delta x).$$

再对 $v(t, x_j) - v(t, x_i)$ 作一阶展开, 得

$$\overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} = \overrightarrow{x_0 x_1} + \delta t \delta x \nabla v(t, x_0) \cdot \xi_1 + O(\delta t \delta x^2) + O(\delta t^2 \delta x),$$

以及对 ξ_2 的相同公式. 取内积后得到

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_1} \cdot \overrightarrow{\tilde{x}_0 \tilde{x}_2} &= \overrightarrow{x_0 x_1} \cdot \overrightarrow{x_0 x_2} \\ &\quad + \delta t \delta x^2 ((\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1) \\ &\quad + O(\delta t \delta x^3) + O(\delta t^2 \delta x^2). \end{aligned}$$

因此条件(1.21)等价于对所有 ξ_1, ξ_2 有

$$(\nabla v(t, x_0) \xi_1) \cdot \xi_2 + (\nabla v(t, x_0) \xi_2) \cdot \xi_1 = 0.$$

这恰好说明 $\nabla v(t, x_0)$ 反对称, 等价地, $D(v)$ 在 (t, x_0) 为零. ■

Remark 1.15: 可以证明, 见 Lemma IV.7.5, 若速度场 v 对所有 (t, x) 满足 $D(v) = 0$, 则必有

$$v(t, x) = v_0(t) + \omega(t) \wedge r,$$

其中 r 是固定参考系中的位置向量. 这意味着运动是空间上一致速度的平移与绕固定轴旋转的叠加, 正是刚体可能具有的运动.

Remark 1.16: 直接计算给出

$$\text{Tr}(D(v)) = \text{Tr}(\nabla v) = \text{div } v, \quad \text{div}({}^t \nabla v) = \nabla(\text{div } v),$$

$$\text{div}(2D(v)) = \Delta v + \nabla(\text{div } v), \quad \text{div}((\text{div } v) \text{Id}) = \nabla(\text{div } v).$$

这些公式将在后文使用.

流体形变率的全部信息都包含在速度梯度张量 ∇v 的对称部分 $D(v)$ 中. 流体的标准黏性行为概括为: 黏性应力张量 T 仅依赖于 $D(v)$; T 对 $D(v)$ 的依赖是线性的; 连接 T 与 $D(v)$ 的关系是各向同性的. 实验上满足这些性质的流体称为 Newtonian 流体. 在温度, 压力或速度的极端条件下, Newtonian 流体也可能表现出非 Newtonian 行为.

第一条假设来自前面的考虑. 线性假设是式(1.20)的推广, 可写为 $T = L(D(v))$, 其中 L 是对称张量空间到自身的线性映射. 各向同性表示改变标准正交参考系时流体的流变性质不变. 其确切含义是: 对所有正交矩阵 P 和所有对称张量 d ,

$$L({}^t P d P) = {}^t P L(d) P. \tag{1.22}$$

Proposition 1.17: 对 Newtonian 流体, 黏性应力张量关于应变率张量的定律必具有形式

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\text{div } v) \text{Id},$$

其中 λ 和 μ 是实系数.

Proof: 令 d 为对称张量, x 为 d 对应特征值 Λ 的特征向量. 取关于垂直于 x 的超平面的对称变换矩阵 P , 即 $Px = -x$, 且 P 在 x 的正交补上的限制为恒等映射. 由 ${}^tPdP = d$ 和式(1.22), 得 $L(d)P = PL(d)$. 将其作用于 x , 可知 $L(d)x$ 与 x 共线, 所以 x 也是 $L(d)$ 的特征向量.

记 E_i 为除 (i, i) 元为 1 外其余系数均为零的矩阵. 存在 λ, μ 使 $L(E_1) = 2\mu E_1 + \lambda \text{Id}$. 令 Q_i 为交换指标 1 与 i 的置换矩阵, 则 $E_i = {}^tQ_i E_1 Q_i$. 再用式(1.22), 得 $L(E_i) = 2\mu E_i + \lambda \text{Id}$. 因对任意对角张量 d ,

$$L(d) = 2\mu d + \lambda(\text{Tr } d) \text{Id}.$$

对任意对称张量 d , 取正交矩阵 Q 使 tQdQ 对角, 再次应用各向同性即得同一公式. 最后利用 $\text{Tr}(D(v)) = \text{div } v$, 得所述结论. ■

Newtonian 流体的应力张量一般形式为

$$\sigma = T - p \text{Id} = 2\mu D(v) + (\lambda \text{div } v - p) \text{Id}.$$

1.4.3 热力学第二定律的推论

热力学第二定律意味着黏性应力必然是耗散的, 即这些力的功率必须非负. 利用 Appendix B 中回顾的结果, 局部比熵方程可写成守恒形式

$$\frac{\partial(\rho s)}{\partial t} + \text{div}(\rho s v) + \text{div} \left(\frac{\phi}{T} \right) - \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} = 0,$$

其中 s 是流动中的比熵, T 是温度. 对任意随流动演化的流体元 $(\Omega_t)_t$, 输运定理给出总熵演化. 在时刻 t 与 $t + \delta t$ 之间积分, 并令 $S(t) = \int_{\Omega_t} \rho s \, dX$, 得

$$\begin{aligned} S(t + \delta t) - S(t) - \int_t^{t+\delta t} \int_{\partial\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nu}{T} \, dy \, ds &= \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{-\phi \cdot \nabla T}{T^2} \, dX \, ds \\ &\quad + \int_t^{t+\delta t} \int_{\Omega_s} \frac{\text{Tr}(TD(v))}{T} \, dX \, ds. \end{aligned} \quad (1.23)$$

左端为 $\Delta S - \Delta Q/T$, 其中 ΔQ 是该流体元在两个时刻之间通过边界获得的热量. Clausius 定理指出此量非负, 若过程不可逆则为正. 由此与式(1.23)推出

$$\phi \cdot \nabla T \leq 0, \quad \text{对任意可能的 } \nabla T, \quad (1.24)$$

以及

$$\text{Tr}(TD(v)) \geq 0, \quad \text{对任意可能的 } D(v). \quad (1.25)$$

用上一段记号, 式(1.25)表示对称张量空间上的二次型 $d \mapsto P(d) = L(d) : d$ 必须半正定. 由各向同性, 只需研究对角张量. 在向量 $(1, -1, 0)^t, (1, 0, -1)^t, (1, 1, 1)^t$ 构成的基中, 相应矩阵为

$$\begin{pmatrix} 4\mu & 2\mu & 0 \\ 2\mu & 4\mu & 0 \\ 0 & 0 & 6\mu + 9\lambda \end{pmatrix}.$$

因此半正定当且仅当

$$\mu \geq 0, \quad 2\mu + 3\lambda \geq 0. \quad (1.26)$$

系数 μ 称为动力黏度, $2\mu/3 + \lambda$ 称为体积黏度. 在许多情形下体积黏度很小, 可忽略, 这就是 Stokes 假设:

$$\lambda = -\frac{2}{3}\mu. \quad (1.27)$$

此时

$$T = 2\mu \left(D(v) - \frac{1}{3}(\operatorname{div} v) \operatorname{Id} \right),$$

且其迹为零, 所有应力的各向同性分量都包含在压力 p 中. 若动力黏度 μ 很小且可忽略, 令 $\mu = 0$, 流体称为理想流体或无黏流体.

最后给出热通量 ϕ 的一般表达式. 若假定 ϕ 只依赖于温度及其梯度, 且对 ∇T 的依赖在惯性参考系变换下不变, 则 Fourier 定律指出 ϕ 与温度梯度成正比. 式(1.24)进一步说明二者方向相反, 因而

$$\phi = -k\nabla T, \quad (1.28)$$

其中 $k \geq 0$ 称为流体的热导率, 它可以依赖于温度或压力等流体特性.

1.4.4 比内能方程

总能量与比内能满足 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$. 将非守恒动量方程(1.18)与 v 作内积, 得到动能演化方程. 从能量方程(1.19)中减去它, 并利用 σ 的对称性以及 $\sigma = T - p\operatorname{Id}$, 得

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) + \operatorname{div} \phi + p \operatorname{div} v - \operatorname{Tr}(T\nabla v) = 0.$$

对 Newtonian 流体,

$$\operatorname{Tr}(T\nabla v) = \operatorname{Tr}(TD(v)) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu D(v) : D(v) = \lambda(\operatorname{div} v)^2 + 2\mu|D(v)|^2.$$

在条件(1.26)下, 此量总是非负, 与热力学第二定律一致. 应用 Fourier 定律(1.28), 比内能的演化方程为

$$\rho \left(\frac{\partial e}{\partial t} + v \cdot \nabla e \right) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0. \quad (1.29)$$

其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k\nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.4.5 熵与温度表述

利用 Appendix B 中的热力学概念, 可以用比熵和温度作为变量写出等价的守恒方程. 假定流体粒子内部结构的弛豫时间远短于流体整体运动的特征时间, 因而流体在每一点和每一时刻均处于热力学平衡.

将 $(s, \rho) \mapsto e(s, \rho)$ 的微分写为

$$de = T ds - p d\left(\frac{1}{\rho}\right).$$

在 Lagrangian 层次使用物质导数并利用质量守恒方程(1.7), 得

$$\frac{De}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} + \frac{p}{\rho^2} \frac{D\rho}{Dt} = T \frac{Ds}{Dt} - \frac{p}{\rho} \operatorname{div} v.$$

所以式(1.29)成为比熵方程

$$\rho T \frac{Ds}{Dt} - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

为得到温度方程, 使用比内能关于温度和比容的微分式

$$de = c_v dT + \left(T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho - p \right) d \left(\frac{1}{\rho} \right).$$

再次利用质量守恒方程,

$$\frac{De}{Dt} = c_v \frac{DT}{Dt} + \frac{1}{\rho} T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - p \frac{1}{\rho} \operatorname{div} v.$$

因此温度形式为

$$\rho c_v \frac{DT}{Dt} + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

若 c_v 为常数, 其守恒形式为

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

1.5 方程汇总

考虑黏度系数 λ, μ 为常数的 Newtonian 流体. 黏性应力张量为

$$T = 2\mu D(v) + \lambda(\operatorname{div} v) \operatorname{Id},$$

其中 λ, μ 满足条件(1.26). 利用 Remark 1.16, 流动由下列方程控制.

- 质量守恒:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v) = 0.$$

- 线动量演化:

$$\frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho v \otimes v) - \mu \Delta v + \nabla(p - (\lambda + \mu) \operatorname{div} v) - \rho f = 0.$$

动能方程可由前两个方程推出, 不必另加到流动演化模型中. 本书后文研究流体力学方程的数学方法均以此性质为基础, 通常称为能量方法.

- 系统总能量的演化. 依所选热力学未知量不同, 该方程有多种形式上等价的写法, 每一种又有守恒和非守恒形式:

– 对单位质量总能量 $E = e + \frac{1}{2}|v|^2$,

$$\frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho E v) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \operatorname{div}(T \cdot v) + \operatorname{div}(p v) - \rho f \cdot v = 0.$$

– 对内能,

$$\frac{\partial(\rho e)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho e v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + p \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对比熵,

$$\rho T \left(\frac{\partial s}{\partial t} + v \cdot \nabla s \right) - \operatorname{div}(k \nabla T) - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

– 对温度, 并假定定容比热容 c_v 为常数,

$$\frac{\partial(\rho c_v T)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho c_v T v) - \operatorname{div}(k \nabla T) + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_\rho \operatorname{div} v - \lambda(\operatorname{div} v)^2 - 2\mu|D(v)|^2 = 0.$$

因此, 三个演化方程完全确定运动. 当然, 还必须加入一个把系统中各热力学变量联系起来的方程, 如理想气体定律 $p = k\rho T$, Van der Waals 定律 $(p + a\rho^2)(1 - b\rho) = k\rho T$, 或其他状态方程, 以使系统封闭. 这组方程称为完整 Navier–Stokes–Fourier 系统. 还必须配以初始条件和边界条件, Section 1.6.2 将作简要讨论.

最后, 若与流动相关的所有场, 即密度, 压力, 速度和能量, 都与时间 t 无关, 则称流动是稳态的. 但这绝不意味着流体静止, 后者要求 $v = 0$.

1.6 不可压缩模型

在许多情形下, 求解完整 Navier–Stokes–Fourier 方程既无必要也不可取, 因为在所考虑的应用中某些物理现象可以忽略. 本书研究不可压缩模型. 这类简化模型适用于标准条件下的液体和低速气流; 其他情形通常需要可压缩模型. 不同渐近区域及由完整系统导出的简化模型可参见 [127].

1.6.1 不可压缩假设

Proposition 1.18: [Definition and Proposition] 若下列等价性质之一成立, 则称流体流动不可压缩:

1. 任意流体元的体积随时间保持不变.

2. 速度场 v 无散, 即

$$(\operatorname{div} v)(t, x) = 0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

3. 密度 ρ 沿速度场 v 的轨迹保持不变.

更准确的名称应当是等体积流动或等容流动, 但文献普遍使用不可压缩流动, 本书沿用这一惯例.

Proof: 对任意流体元 $(\Omega_t)_t$, 在输运定理中取 $f = 1$, 得

$$\frac{d}{dt} |\Omega_t| = \int_{\Omega_t} \operatorname{div} v \, dx.$$

因此对任意流体元保持体积等价于 $\operatorname{div} v = 0$. 另一方面, 质量平衡方程(1.7)写为

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho \operatorname{div} v = 0.$$

连续介质假设下 ρ 不会消失, 所以 $\operatorname{div} v = 0$ 当且仅当 $D\rho/Dt = 0$, 后者恰表示密度沿特征曲线保持不变.

Remark 1.19: 即使密度不是常数, 流动仍可不可压缩; 只要求每个流体粒子的密度在演化中保持不变. 海水的密度依赖盐度, 但海水流动仍可视作非齐次不可压缩流动.

Remark 1.20: 若不可压缩流动的初始密度齐次, 即 $\rho(0, x) = \rho_0$ 为常数, 则

$$\rho(t, x) = \rho_0, \quad \text{对所有 } (t, x).$$

因为密度沿轨迹保持不变, 且对固定 t , 映射 $x_0 \mapsto X(t, 0, x_0) = \varphi_t(x_0)$ 是双射.

下面考察何时可以作不可压缩假设. 状态方程给出 $\rho = \rho(p, T)$, 因而

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho} \frac{D\rho}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \frac{Dp}{Dt} - \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p \frac{DT}{Dt}. \quad (1.30)$$

不可压缩条件相当于压缩项与热膨胀项均为零或可忽略, 因为没有理由认为描述不同现象的两项会彼此抵消. 后文假定流体的热膨胀系数可忽略, 例如正压流体, 或温度沿流体粒子轨迹近似恒定, 例如等温流动.

压缩项足够小有两种情形. 第一, 等温压缩系数

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T \approx 0.$$

这适用于标准温压下的液体. 例如液态水的 β 约为 10^{-10} Pa^{-1} . 第二, β 不够小, 如气体中约为 10^{-5} Pa^{-1} , 但典型速度远小于等温声速时仍可采用不可压缩假设.

等温声速 c 定义为

$$\frac{1}{c^2} = \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T.$$

引入 Reynolds 数 $\operatorname{Re} = \rho v_0 l_0 / \mu$, 其中 l_0, v_0 是特征长度和速度. 忽略热膨胀后, 式(1.30)成为

$$\operatorname{div} v = -\frac{1}{\rho c^2} \frac{Dp}{Dt}. \quad (1.31)$$

在稳态且高 Reynolds 数时, 黏性效应可忽略, 动量方程给出 $-\nabla p / \rho \approx (v \cdot \nabla)v$. 因而若 Mach 数 $\operatorname{Ma} = v_0 / c$ 满足

$$\operatorname{Ma} \ll 1, \quad (1.32)$$

则 $\operatorname{div} v$ 相对典型速度梯度可忽略. 通常认为 $\operatorname{Ma} < 0.3$ 是判断是否需要考虑可压缩性的良好准则.

在低 Reynolds 数时, 非线性惯性项相对黏性效应可忽略. 使用 Stokes 假设(1.27), 类似量纲估计表明不可压缩条件变为

$$\operatorname{Ma} \ll \sqrt{\operatorname{Re}}, \quad (1.33)$$

它可能比式(1.32)严格得多.

在两种情形中声速都很大, 对应 $(\partial \rho / \partial p)_T \approx 0$. 因而不可压缩渐近区域中不能利用状态方程求出 $p = p(\rho, T)$. 压力成为与其他热力学变量无关的未知量, 与新增的无散约束相配. 数学上, 动量方程中的压力梯度是无散约束的 Lagrange 乘子. 压力可任加常数而不改变方程, 只有压力梯度具有物理意义.

在 $\text{Ma} \rightarrow 0$ 的形式极限中, 热力学压力 p_{Ma} 趋于常数 p_0 , 并存在函数 π 使

$$p_{\text{Ma}} - p_0 \sim \text{Ma}^2 \pi, \quad \nabla p_{\text{Ma}} \sim \text{Ma}^2 \nabla \pi.$$

因此不可压缩方程中的压力应理解为真实热力学压力在均值附近的波动, 不具有特定符号. 低 Mach 数极限的严格结果超出本书范围, 参见 [4, 46, 58, 4].

1.6.2 不可压缩模型概览

从现在起忽略温度变化的影响并专注于不可压缩流动. 系统中不再有能量演化方程, 压力也不由状态方程定义, 而是通过无散约束间接确定.

非齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 本书 Chapter VI 研究的最一般系统为

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho v) = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \text{div}(\rho v \otimes v) - 2 \text{div}(\mu(\rho) D(v)) + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases}$$

形式上前两个方程可写成非守恒形式, 但定义弱解时守恒形式更合适, 且两者未必等价.

齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程. 密度为正常数时, 质量方程与无散约束完全相同, 只剩

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + (v \cdot \nabla) v \right) - \mu \Delta v + \nabla p = \rho f, \\ \text{div } v = 0, \end{cases}$$

以及其稳态形式. 本书 Chapter V 分析这些系统.

无量纲方程. 选择时间尺度 t_0 , 空间尺度 l_0 , 特征速度 $v_0 = l_0/t_0$ 和体力尺度 f_0 , 并令

$$\tilde{t} = \frac{t}{t_0}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{l_0}, \quad \tilde{v} = \frac{v}{v_0}, \quad \tilde{f} = \frac{f}{f_0}, \quad \tilde{p} = \frac{p}{\rho v_0^2}.$$

无量纲系统只依赖 Reynolds 数和 Froude 数

$$\text{Re} = \frac{\rho v_0 l_0}{\mu}, \quad \text{Fr} = \frac{v_0/t_0}{f_0}.$$

Reynolds 数度量惯性项与黏性项的量级之比. 小 Reynolds 数时黏性效应占主导, 流动称为层流; 大 Reynolds 数时惯性效应占主导, 流动称为湍流. 二者转变依具体物理情形而定, 参见 [59]. 对重力体力, Froude 数度量平均流动加速度与浮力加速度之比. 后文取 $\text{Fr} = 1$, 并省略无量纲变量上的波浪号, 得

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla) v + \nabla p = f, \\ \text{div } v = 0. \end{cases} \quad (1.34)$$

齐次 Stokes 问题. 当非线性效应可忽略时, 式(1.34)形式上约化为线性常系数 Stokes 方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \frac{1}{\text{Re}} \Delta v + \nabla p = f, \quad \text{div } v = 0.$$

主要数学困难已包含在相应稳态问题中, 特别是压力的存在性和性质. Chapter IV 在不同边界条件下研究这些方程.

初始数据与边界数据. 非稳态模型需要给定初始密度 (非齐次情形) 和初始速度. 压力是不可压缩约束的 Lagrange 乘子, 对其指定初值没有数学意义. 最常用的速度边界条件是

$$v = v_b, \quad \text{在边界上.}$$

$v_b = 0$ 时称为齐次 Dirichlet 条件或无滑移条件. 压力不需要边界条件. 对非齐次流体, 若 v 与边界相切, 特征曲线不穿过边界, 密度无需边界条件; 若 v 不与边界相切, 则需要在流入边界点给定 ρ . Chapter VI 详细讨论这两种情形. 后文还研究应力, 涡量和流出边界条件.

补充说明. 当 Reynolds 数很大时, 式(1.34)形式上成为不可压缩 Euler 系统. 它是双曲型系统, 与抛物型 Navier–Stokes 系统性质很不相同, 本书不作研究, 参见 [88, 86, 41]. 本书也不分析可压缩 Navier–Stokes 方程和完整 Navier–Stokes–Fourier 系统, 相关结果见 [87, 57, 93].

1.7 若干精确稳态解

在后续各章精确分析方程之前, 本节给出若干存在显式公式的稳态例子. 我们求解齐次不可压缩 Navier–Stokes 方程(1.34)的稳态形式

$$\begin{cases} -\frac{1}{\text{Re}} \Delta v + (v \cdot \nabla)v + \nabla p = g & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \text{div } v = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ v = v_b & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.} \end{cases} \quad (1.35)$$

其中 g 是浮力, v_b 是 Dirichlet 边界数据. 若 $\nabla \pi_0 = g$, 令 $\pi = p - \pi_0$ 即可化为零源项情形. 显式解要求区域具有简单几何. 当 Reynolds 数较大时, 这些解析解未必就是实际观察到的解, 还需研究稳定性; 本书不讨论这一重要问题, 参见 [40, 53, 127, 43].

1.7.1 管内 Poiseuille 流

考虑轴向为 e_3 且截面为椭圆的无限长管. 截面 E 定义为

$$\left(\frac{x_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{x_2}{R_2}\right)^2 \leq 1. \quad (1.36)$$

由对称性设 $v = (u_1(x_1, x_2), u_2(x_1, x_2), u_3(x_1, x_2))$. 令 $\tilde{v} = (u_1, u_2)$, 则 $\tilde{v}$ 满足二维稳态 Navier–Stokes 方程和边界条件 $\tilde{v} = 0$. 用 $\tilde{v}$ 乘方程并在 E 上积分, 分部积分及无散条件给出

$$\frac{1}{\text{Re}} \int_E (|\nabla u_1|^2 + |\nabla u_2|^2) dx_1 dx_2 = 0.$$

故 $u_1 = u_2 = 0$, π 与 x_1, x_2 无关, 且 $v = (0, 0, u(x_1, x_2))$. 此时 $(v \cdot \nabla)v = 0$. 记常数 $\partial\pi/\partial x_3 = p_1$, 则

$$-\frac{1}{\text{Re}} \Delta u + p_1 = 0 \quad \text{在 } E \text{ 中,} \quad u = 0 \quad \text{在 } \partial E \text{ 上.}$$

唯一解为

$$u = \frac{-\operatorname{Re} p_1}{R_1^{-2} + R_2^{-2}} \left(1 - \frac{x_1^2}{R_1^2} - \frac{x_2^2}{R_2^2} \right), \quad \pi = p_1 x_3.$$

所以压力梯度驱动流动. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$, 其中 π_0 是重力势.

1.7.2 平面剪切流

考虑两块水平平板之间的二维 Newtonian 黏性流体. 上板以速度 $U \geq 0$ 运动, 下板以速度 $-V \leq 0$ 运动, $\Omega = \mathbb{R} \times (-h, h)$. 几何和无散条件给出 $v = (u(x_2), 0)$. 惯性项自动为零, 且

$$-\frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta u + \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = 0.$$

记常数 $\partial \pi / \partial x_1 = p_1$, 并用 $u(h) = U$, $u(-h) = -V$, 得

$$u = \frac{\operatorname{Re} p_1}{2} (h^2 - x_2^2) + \frac{U + V}{2h} x_2 + \frac{U - V}{2}, \quad \pi = p_1 x_1.$$

这里压力梯度和边界条件共同驱动流动, 实际压力仍为 $p = \pi + \pi_0$.

1.7.3 两圆柱间的 Couette 流

考虑由两个轴向为 e_3 的同轴无限长圆柱限定的区域. 外圆柱固定, 内圆柱以与 e_3 共线的旋转向量 Ω 匀速旋转. 仿照刚体旋转速度 $v = \Omega \wedge r$, 设

$$v = f(r) \Omega \wedge e_r.$$

该向量场无散. 利用向量恒等式和柱坐标公式,

$$\operatorname{curl} v = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r f(r)) \Omega. \quad (1.37)$$

从而 $v \wedge \operatorname{curl} v$ 是梯度, 惯性项可写为 $(v \cdot \nabla) v = \nabla \tilde{\pi}(r)$, 其中

$$\tilde{\pi}'(r) = -\frac{|\Omega|^2}{r} f^2(r).$$

稳态方程化为

$$-\frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta(\Omega \wedge f(r) e_r) + \nabla(\pi + \tilde{\pi}) = 0.$$

取 $\Delta(\Omega \wedge f(r) e_r) = 0$ 和 $\pi = -\tilde{\pi}$. 若 $F' = f$, 则 $\Delta F = a$, 因而

$$F(r) = \frac{a}{4} r^2 + b \ln r + c, \quad f(r) = \frac{a}{2} r + \frac{b}{r}.$$

令内外圆柱半径分别为 R_1, R_2 , 边界条件 $f(R_1) = R_1, f(R_2) = 0$ 给出

$$f(r) = \frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{r}{R_2^2} \right), \quad v = f(r) |\Omega| e_\theta.$$

函数 f 递减且为凸函数. 压力为

$$\pi(r) = |\Omega|^2 \left(\frac{R_1^2 R_2^2}{R_2^2 - R_1^2} \right)^2 \left(\frac{r^2}{2R_2^4} - \frac{1}{2r^2} - \frac{2}{R_2^2} \ln r \right).$$

它随 r 增加, 因而外圆柱附近压力高于内圆柱附近压力. 实际压力为 $p = \pi + \pi_0$. 与前两个例子不同, 此解析解与 Reynolds 数无关: 惯性项恰被压力项抵消, 黏性项恒为零.

2 分析工具

本章旨在介绍后续各章将使用的分析工具. 我们汇集了研究许多线性或非线性演化偏微分方程所需的基本概念, 这类方程来自物理学和生物学等多个领域.

首先, 在 Section 2 中, 我们不加证明地介绍若干经典泛函分析结果, 如开映射定理, Banach–Steinhaus 定理和 Lax–Milgram 定理. 这些定理的证明很容易在文献中找到, 例如 [27, 104, 105]. 我们还给出弱收敛与弱-* 收敛的定义, 它们在偏微分方程分析中经常使用. 我们特别关注这些结果在一些基本空间, 即 Lebesgue 空间中的表述. 本节最后简要介绍分布理论, 并说明 Lipschitz 连续函数的一些基本性质.

Section 3 旨在介绍与紧性概念有关的若干工具. 在处理偏微分方程中的非线性项时, 紧性至关重要. 我们特别回顾 Schauder 不动点定理.

在演化问题分析中, 建立存在性定理的一种常用方法是先获得能量估计. 通常, 这些估计由涉及单个实变量的实函数的初等微分不等式推出; 对我们关注的问题而言, 这个变量就是时间 t . 因此, 本章 Section 4 说明单实变量数值函数的弱微分与通常微分之间的联系. 最后证明各种 Gronwall 型不等式, 它们在多数情形下能给出所需估计.

Section 5 介绍并研究定义在 $\mathbb{R}$ 的区间上且取值于 Banach 空间的可积函数空间, 这也称为 Bochner 积分理论. 特别地, 我们证明 Aubin–Lions–Simon 紧性定理 [14, 84, 109], 它是研究非线性问题的一个基本结果. 证明的主要工具是在本章开头回顾的 Ascoli 定理. 我们还介绍这类函数的 Fourier 变换及其主要性质.

最后, 在 Section 6 中, 我们非常简要地介绍具有紧预解式的自伴无界算子的谱理论.

2.1 主要记号

本书始终用 $d \in \mathbb{N}^*$ 表示空间维数; 在流体力学应用中通常有 $d = 2$ 或 $d = 3$. $\mathbb{R}^d$ 上的 Euclidean 范数记为 $x \mapsto |x|$, 相应的内积记为 $(x, y) \mapsto x \cdot y$.

对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$, 记其长度为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$. 对任意函数 f , 只要相应偏导数以经典或弱意义存在, 定义

$$\partial^\alpha f = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} f.$$

对任意开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, 使用下列标准函数空间:

- $C^k(\Omega)$, $k \geq 0$, 表示直到 k 阶的偏导数均连续的函数集合.
- $C_b^k(\Omega) \subset C^k(\Omega)$, 表示直到 k 阶的所有偏导数均有界的函数集合.
- $C^{0,\alpha}(\Omega)$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 α -Hölder 连续函数集合. 当 $\alpha = 1$ 时, $C^{0,1}(\Omega)$ 是 Lipschitz 连续函数集合. 这类函数的 Lipschitz 半范数定义为

$$\text{Lip}(f) = \sup_{\substack{x, y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} < +\infty.$$

- $C^{k,\alpha}(\Omega)$, $k \geq 0$, $\alpha \in (0, 1]$, 表示 $C^k(\Omega)$ 中所有 k 阶偏导数均为 α -Hölder 连续的函数集合.
- $C_c^\infty(\Omega)$ 表示 $C^\infty(\Omega)$ 中在 Ω 内具有紧支集的函数集合. 在分布理论中, 这一空间通常也记为 $\mathcal{D}(\Omega)$.

- $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 表示 $C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ 中函数限制到 Ω 后所得的集合.

此外, 对定义在 Ω 上的任意函数 u , 记 $\bar{u}$ 为其在全空间上的零延拓:

$$\bar{u}(x) = \begin{cases} u(x), & x \in \Omega, \\ 0, & x \notin \Omega. \end{cases}$$

定义边界的符号距离函数 δ 为

$$\delta(x) = \begin{cases} d(x, \partial\Omega), & x \in \Omega, \\ -d(x, \partial\Omega), & x \notin \Omega. \end{cases} \quad (2.1)$$

由三角不等式容易验证, δ 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续, 且 $\text{Lip}(\delta) \leq 1$.

2.2 泛函分析的基本结果

2.2.1 Banach 空间

本节回顾泛函分析的基本结果, 不给出证明. 读者可在有关这一主题的经典专著中找到证明, 如 [27, 104, 105].

对任意赋范向量空间 E , 记其拓扑对偶为 E' , 即 E 上连续线性泛函的空间. 对 $f \in E'$ 和 $x \in E$, 引入对偶括号

$$\langle f, x \rangle_{E', E} = f(x).$$

记号 $(\cdot, \cdot)_H$ 专用于 Hilbert 空间 H 中的内积.

设 E, F 是两个赋范向量空间, $S : E \rightarrow F$ 是连续线性映射. 定义其伴随或转置映射 ${}^tS : F' \rightarrow E'$ 为

$$\langle {}^tSf, x \rangle_{E', E} = \langle f, Sx \rangle_{F', F}, \quad \text{对所有 } f \in F' \text{ 和 } x \in E.$$

由 Hahn-Banach 定理, 赋范向量空间中元素的范数可通过对偶表示如下.

Proposition 2.1: 设 E 是赋范向量空间. 则对所有 $x \in E$,

$$\|x\|_E = \sup_{\substack{f \in E' \\ f \neq 0}} \frac{|\langle f, x \rangle_{E', E}|}{\|f\|_{E'}} = \sup_{\|f\|_{E'} \leq 1} |\langle f, x \rangle_{E', E}|.$$

Hahn-Banach 定理的另一个推论给出子空间的一个有用稠密性判据.

Proposition 2.2: 设 E 是赋范向量空间, F 是 E 的向量子空间. 假定 E 上任何在 F 上为零的连续线性泛函都恒为零. 则 F 在 E 中稠密.

下面由 Banach 得到的结果刻画 Banach 空间之间的同构.

Theorem 2.3:

[Open mapping] 设 E, F 是两个 Banach 空间. 若 $u : E \rightarrow F$ 是满射连续线性映射, 则 u 是开映射, 即 E 中任意开集在 u 下的像是 F 中的开集. 特别地, 若 u 是双射, 则其逆映射连续, 因而 E, F 在代数和拓扑意义下同构.

下面有时称为一致有界原理的结果表明, 若定义在 Banach 空间上的一族连续线性映射逐点有界, 则它一致有界.

Theorem 2.4:

[Banach–Steinhaus] 设 $(u_i)_{i \in I}$ 是从 Banach 空间 E 到赋范向量空间 F 的一族连续线性映射. 假定对每个 $x \in E$, 族 $(u_i(x))_{i \in I}$ 在 F 中有界. 则 $(u_i)_{i \in I}$ 在算子范数意义下一致有界, 即

$$\sup_{i \in I} \|u_i\|_{\mathcal{L}(E, F)} < +\infty.$$

等价地, 存在 $C > 0$, 使

$$\|u_i(x)\|_F \leq C\|x\|_E, \quad \text{对所有 } i \in I \text{ 和 } x \in E.$$

最后介绍 Lax–Milgram 定理, 它是研究变分形式线性偏微分问题的重要工具.

Theorem 2.5:

[Lax–Milgram] 设 V 是 Hilbert 空间, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性形式, $L : V \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性形式. 假定 a, L 连续, 且 a 强制, 即

$$\text{存在 } \alpha > 0, \text{ 使 } a(v, v) \geq \alpha\|v\|_V^2, \quad \text{对所有 } v \in V.$$

则问题

$$a(v, w) = L(w), \quad \text{对所有 } w \in V, \quad (2.2)$$

存在唯一解 $v \in V$. 此外,

$$\|v\|_V \leq \frac{\|L\|_{V'}}{\alpha}. \quad (2.3)$$

2.2.2 弱收敛与弱-* 收敛

这里不详述弱拓扑和弱-* 拓扑的一般理论, 更完整的讨论见 [27]. 我们只回顾这些拓扑的序列性质, 后文主要在 Lebesgue 空间和 Sobolev 空间中使用它们.

Definition 2.6: 设 E 是 Banach 空间, E' 是其对偶空间.

- 若对每个 $f \in E'$ 都有

$$f(u_n) = \langle f, u_n \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E 中序列 $(u_n)_n$ 弱收敛到 $u \in E$.

- 若对每个 $u \in E$ 都有

$$f_n(u) = \langle f_n, u \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle f, u \rangle_{E', E} = f(u),$$

则称 E' 中序列 $(f_n)_n$ 弱-* 收敛到 $f \in E'$.

无限维空间中的闭有界集对范数拓扑未必紧, 但下面的结果给出闭有界集的弱紧性.

Theorem 2.7:

[Weak and Weak-* compactness]

- 设 E 是自反 Banach 空间, 即通过自然嵌入 E 与 E'' 同构. 则 E 中任意有界序列

都可抽取一个在 E 中弱收敛的子序列.

- 设 E 是可分 Banach 空间. 则 E' 中任意有界序列都可抽取一个在 E' 中弱-* 收敛的子序列.

Banach–Steinhaus 定理 Theorem 2.4 的一个重要推论是范数关于弱拓扑和弱-* 拓扑的下半连续性.

Corollary 2.8: 设 E 是 Banach 空间, $(u_n)_n$ 是 E 中弱收敛到 $u \in E$ 的序列. 则 $(u_n)_n$ 在 E 中有界, 且

$$\|u\|_E \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_E.$$

相应地, 若 $(u_n)_n$ 是 E' 中弱-* 收敛到 $u \in E'$ 的序列, 则它在 E' 中有界, 且

$$\|u\|_{E'} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{E'}.$$

下面的命题常用于证明整个序列弱收敛或弱-* 收敛.

Proposition 2.9: 设 E 是自反 Banach 空间, 或者是可分 Banach 空间的对偶, $(x_n)_n$ 是 E 中有界序列. 假定存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 的每个弱收敛子序列, 或相应地每个弱-* 收敛子序列, 都以 x 为极限. 则整个序列 $(x_n)_n$ 弱收敛, 或相应地弱-* 收敛到 x .

Proof: 只证明自反情形, 另一情形类似. 假设 $(x_n)_n$ 不弱收敛到 x . 则存在 $f \in E'$, 使 $\langle f, x_n \rangle_{E', E}$ 不收敛到 $\langle f, x \rangle_{E', E}$. 因而存在 $\varepsilon > 0$ 和子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$, 满足

$$|\langle f, x_{\varphi(n)} - x \rangle_{E', E}| \geq \varepsilon, \quad \text{对所有 } n \geq 0. \quad (2.4)$$

由于该子序列在自反空间 E 中有界, Theorem 2.7 保证它还有一个弱收敛子序列 $(x_{\varphi(\psi(n))})_n$. 由假设, 其弱极限只能是 x , 所以

$$\langle f, x_{\varphi(\psi(n))} - x \rangle_{E', E} \longrightarrow 0,$$

这与式(2.4)矛盾. ■

下面的结果说明, 在较小空间中的有界性与在较大空间中的弱收敛, 蕴含在较小空间中的弱收敛.

Proposition 2.10: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $E \subset G, F \subset G$, 且嵌入连续. 假定 F 自反. 设 $(x_n)_n \subset E \cap F$, 并存在 $x \in E$, 使 $(x_n)_n$ 在 F 中有界且在 E 中弱收敛到 x . 则 $(x_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 x .

Proof: 根据 Proposition 2.9, 只需证明 x 是 $(x_n)_n$ 的子序列在 F 中可能具有的唯一弱极限. 若子序列 $(x_{\varphi(n)})_n$ 在 F 中弱收敛到 $y \in F$, 则由 $F \subset G$ 的连续嵌入, 它在 G 中弱收敛到 y . 另一方面, 由假设和 $E \subset G$ 的连续嵌入, 同一子序列在 G 中弱收敛到 x . 因而 $y = x$. ■

Remark: 上述结果容易推广到弱-* 收敛情形.

下面给出 Hilbert 空间中弱收敛序列强收敛的一个有用判据.

Proposition 2.11: 设 H 是 Hilbert 空间, $(u_n)_n$ 在 H 中弱收敛到 u . 若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_H \leq \|u\|_H,$$

则 $(u_n)_n$ 在 H 中强收敛到 u .

Proof: 只需写出

$$\|u - u_n\|_H^2 = \|u\|_H^2 + \|u_n\|_H^2 - 2(u, u_n)_H.$$

弱收敛给出 $(u_n, u)_H \rightarrow \|u\|_H^2$, 所以由假设

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u - u_n\|_H^2 \leq \|u\|_H^2 + \|u\|_H^2 - 2\|u\|_H^2 = 0.$$

■

后文将证明这一结果在某些 Banach 空间中也成立, 例如 $1 < p < +\infty$ 时的 $L^p(\Omega)$, 见 Proposition II.2.32.

弱收敛虽然更容易使用, 但通常不能对非线性项取极限. 例如在 $(0, 1)$ 上定义 $u_n(x) = \sin(nx)$. 由 Riemann–Lebesgue 引理, $(u_n)_n$ 在 $L^2(0, 1)$ 中弱收敛到 0, 但

$$\int_0^1 u_n^2 dx \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $(u_n^2)_n$ 不弱收敛到 0; 它实际上弱收敛到常值函数 $1/2$.

不过, 强收敛序列与弱收敛序列的乘积型双线性像仍弱收敛到极限的相应乘积.

Proposition 2.12: 设 E, F, G 是 Banach 空间, $B : E \times F \rightarrow G$ 是连续双线性映射. 若 $(u_n)_n$ 在 E 中强收敛到 u , $(v_n)_n$ 在 F 中弱收敛到 v , 则 $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中弱收敛到 $B(u, v)$.

Proof: 任取 $\varphi \in G'$. 由双线性,

$$\begin{aligned} |\langle \varphi, B(u_n, v_n) - B(u, v) \rangle_{G', G}| &\leq \|\varphi\|_{G'} \|B(u_n - u, v_n)\|_G \\ &\quad + |\langle \varphi, B(u, v_n - v) \rangle_{G', G}|. \end{aligned}$$

由 Corollary 2.8, $(v_n)_n$ 有界. B 的连续性和 $u_n \rightarrow u$ 说明第一项趋于 0. 映射 $x \mapsto \langle \varphi, B(u, x) \rangle_{G', G}$ 是 F 上的连续线性泛函, 因而 $v_n \rightharpoonup v$ 说明第二项也趋于 0.

■

Remark: 若 G 自反, 且 $(u_n)_n, (v_n)_n$ 仅分别弱收敛到 u, v , 则 $(B(u_n, v_n))_n$ 在 G 中有界, 从而可抽取弱收敛子序列. 但没有强收敛时, 一般不能断定其极限就是 $B(u, v)$, 上面的正弦函数例子已经说明这一点. 为处理非线性, 必须通过某种方式获得强收敛. 一种方法是使用 Section 3 中的紧性性质.

2.2.3 Lebesgue 空间

定义与主要性质. **Definition 2.13:** [Conjugate exponent] 对每个 $1 \leq p \leq +\infty$, 以

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

定义 p 的共轭指数 p' , 并对 $p = 1$ 和 $p = +\infty$ 采用自然约定.

本书始终使用这一记号, 并且对每个 p 都有 $(p')' = p$.

当 $1 \leq p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 是开集 Ω 上所有实值 Lebesgue 可测函数中, 其绝对值的 p 次幂关于 Lebesgue 测度可积的函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} = \left(\int_{\Omega} |f|^p dx \right)^{1/p}.$$

$L^\infty(\Omega)$ 是本质有界的 Lebesgue 可测函数集合, 并定义

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} = \operatorname{ess\,sup}_\Omega |f|.$$

严格说来, 这些空间的元素是除一个 Lebesgue 零测集外彼此相等的函数所构成的等价类.

由 Proposition 2.21 和 Remark 2.2.3 可知, $\|\cdot\|_{L^p}$ 是 $L^p(\Omega)$ 上的范数, 且这些空间都是 Banach 空间. 当 $1 < p < +\infty$ 时, $L^p(\Omega)$ 可分且自反, 其对偶同 $L^{p'}(\Omega)$ 同构. $L^1(\Omega)$ 可分但不自反, 其对偶同 $L^\infty(\Omega)$ 同构. 相比之下, $L^\infty(\Omega)$ 既不可分也不自反, 且其对偶严格大于 $L^1(\Omega)$.

Definition 2.14: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集. 映射 $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 称为 Lipschitz 微分同胚, 当且仅当 T 是双射, 且 T, T^{-1} 都 Lipschitz 连续.

这样的映射一般不是通常意义下的微分同胚, 特别是它不一定处处可微.

Proposition 2.15: 设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集, $T: \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 是 Lipschitz 微分同胚. 对任意可测函数 $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $1 \leq p \leq \infty$,

$$u \in L^p(\Omega) \iff u \circ T \in L^p(\tilde{\Omega}).$$

此外, 存在只依赖于 T 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使

$$C_1 \|u\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u \circ T\|_{L^p(\tilde{\Omega})} \leq C_2 \|u\|_{L^p(\Omega)}.$$

初等不等式. 下面给出 Young 和 Hölder 不等式的较一般版本. 后文将反复使用它们, 而不一定每次明确引用.

Proposition 2.16: [Young's inequality] 设 $n \geq 2$, $x_1, \dots, x_n$ 是非负实数, $p_1, \dots, p_n$ 是满足

$$\frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$$

的正实数. 则

$$x_1 \cdots x_n \leq \frac{x_1^{p_1}}{p_1} + \dots + \frac{x_n^{p_n}}{p_n}.$$

其证明只需应用对数函数的凹性. 直接得到如下实用版本.

Corollary 2.17: 设 $p_1, \dots, p_n$ 满足 Proposition 2.16 的假设. 对任意正数 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}$, 存在 $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) > 0$, 使对所有正数 $x_1, \dots, x_n$,

$$x_1 \cdots x_n \leq \varepsilon_1 x_1^{p_1} + \dots + \varepsilon_{n-1} x_{n-1}^{p_{n-1}} + C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}) x_n^{p_n}.$$

换言之, Young 不等式中除一个系数外的所有系数都可预先指定. 当某个 $\varepsilon_i \rightarrow 0$ 时, $C(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})$ 趋于无穷.

Proposition 2.18: [Hölder's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $p_1, \dots, p_n$ 是正实数, 允许取无穷, 并设 $r \in [1, +\infty]$ 满足

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_n}.$$

若 $f_i \in L^{p_i}(\Omega)$, 则 $f_1 \cdots f_n \in L^r(\Omega)$, 且

$$\|f_1 \cdots f_n\|_{L^r} \leq \|f_1\|_{L^{p_1}} \cdots \|f_n\|_{L^{p_n}}.$$

还需要下面的 Fubini 定理推广.

Proposition 2.19: 设 $d \geq 2$, $f_1, \dots, f_d : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 均属于 $L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})$. 定义

$$f(x) = f_1(x_2, \dots, x_d) f_2(x_1, x_3, \dots, x_d) \cdots f_d(x_1, \dots, x_{d-1}).$$

则 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 且

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \prod_{i=1}^d \|f_i\|_{L^{d-1}(\mathbb{R}^{d-1})}.$$

Proof: $d = 2$ 时结论由 Fubini 定理直接得到, 且不等式实际为等式. 只证明 $d = 3$ 的情形, 一般情形由 Hölder 不等式归纳得到. 对 x_3 积分并应用 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |f|(x_1, x_2, x_3) dx_3 &\leq |f_3(x_1, x_2)| \left(\int_{\mathbb{R}} |f_1(x_2, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\int_{\mathbb{R}} |f_2(x_1, x_3)|^2 dx_3 \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

再应用一次 Cauchy-Schwarz 不等式和 Fubini 定理, 得

$$\|f\|_{L^1(\mathbb{R}^3)} \leq \|f_3\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_1\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} \|f_2\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}.$$

Proposition 2.20: [Jensen's inequality] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集, $\eta \in L^1(\Omega)$ 非负. 若对某个 $1 \leq p < +\infty$ 有 $|f|^p \eta \in L^1(\Omega)$, 则 $f\eta \in L^1(\Omega)$, 且

$$\left| \int_{\Omega} f\eta dx \right|^p \leq \|\eta\|_{L^1}^{p-1} \int_{\Omega} |f|^p \eta dx.$$

Proof: 写成 $f\eta = (f\eta^{1/p})\eta^{1/p'}$, 并以指数 p 和 $p' = p/(p-1)$ 应用 Hölder 不等式.

Proposition 2.21: [Minkowski's inequality] 设 (X_1, μ_1) 和 (X_2, μ_2) 是两个 σ -有限测度空间. 对定义在 $X_1 \times X_2$ 上的任意非负可测函数 f 和任意 $r \geq 1$,

$$\left(\int_{X_1} \left(\int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2 \right)^r d\mu_1 \right)^{1/r} \leq \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r d\mu_1 \right)^{1/r} d\mu_2.$$

Remark: 若取 $X_2 = \{0, 1\}$ 且 μ_2 为计数测度, 则对任意非负 f, g 和 $r \geq 1$,

$$\|f + g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^r} + \|g\|_{L^r}.$$

Proof: 令 $J(x_1) = \int_{X_2} f(x_1, x_2) d\mu_2$. 利用 Hölder 不等式和 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{X_1} J(x_1)^r d\mu_1 &= \int_{X_2} \int_{X_1} J(x_1)^{r-1} f(x_1, x_2) d\mu_1 d\mu_2 \\ &\leq \left(\int_{X_1} J(x_1)^r d\mu_1 \right)^{(r-1)/r} \int_{X_2} \left(\int_{X_1} f(x_1, x_2)^r d\mu_1 \right)^{1/r} d\mu_2. \end{aligned}$$

约去公共因子即得结论.

Proposition 2.22: 设 $0 < q < 1$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是开集. 对任意非负可测函数 $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\|f + g\|_{L^q} \geq \|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}.$$

Proof: 令 $\theta = \|f\|_{L^q} / (\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q})$. 则

$$\frac{f(x) + g(x)}{\|f\|_{L^q} + \|g\|_{L^q}} = \theta \frac{f(x)}{\|f\|_{L^q}} + (1 - \theta) \frac{g(x)}{\|g\|_{L^q}}.$$

因为 $s \mapsto s^q$ 在 $\mathbb{R}_+$ 上为凹函数, 对上式应用凹性并在 Ω 上积分, 右端积分等于 1, 立即得到结论. ■

磨光核与稠密性结果. 磨光是泛函分析中的核心步骤. 它特别用于证明与数学流体力学有关的适当函数空间中的稠密性结果, 也是 Chapter VI 详细介绍的输运方程重整化解理论中的关键工具.

Definition 2.23: 若映射 $\eta : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$, 且 $\text{Supp } \eta \subset B$, 其中 B 是 $\mathbb{R}^d$ 的单位球;
- $\eta \geq 0$, 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \eta \, dx = \int_B \eta \, dx = 1$;
- $\eta(x)$ 只依赖于 $|x|$,

则称 η 为磨光核.

最后一个条件不是必需的, 但有时能简化计算. 这样的函数确实存在. 对任意 $\varepsilon > 0$, 定义

$$\eta_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad (\nabla \eta)_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^d} (\nabla \eta)\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

于是 $\nabla \eta_\varepsilon = \varepsilon^{-1} (\nabla \eta)_\varepsilon$.

Definition 2.24: 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $1 \leq p \leq \infty$, 以及任意 $\varepsilon > 0$, 定义卷积

$$\begin{aligned} (f * \eta_\varepsilon)(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \eta_\varepsilon(x - y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(x - y) \eta_\varepsilon(y) \, dy = \int_B f(x - \varepsilon z) \eta(z) \, dz. \end{aligned} \tag{2.5}$$

由于 η 有界且具有紧支集, 上述积分均有意义.

Proposition 2.25: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$f * \eta_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^d), \quad \|f * \eta_\varepsilon\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{d/p}} \|f\|_{L^p},$$

$$\|\nabla(f * \eta_\varepsilon)\|_{L^\infty} \leq \frac{C}{\varepsilon^{1+d/p}} \|f\|_{L^p},$$

并且

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p} \leq C \|f\|_{L^p}, \tag{2.6}$$

其中 $C > 0$ 只依赖于 η, p . 最后, 若 $p < +\infty$, 则

$$f * \eta_\varepsilon \longrightarrow f \quad \text{在 } L^p(\mathbb{R}^d) \text{ 中, 当 } \varepsilon \rightarrow 0.$$

Proof: $f * \eta_\varepsilon$ 的正则性来自核 η 的正则性和积分号下求导. L^∞ 估计由 Hölder 不等式及

$$\|\eta_\varepsilon\|_{L^{p'}} = \frac{\|\eta\|_{L^{p'}}}{\varepsilon^{d/p}}$$

直接得到.

为证明 $p < +\infty$ 时的式(2.6), 对任意 $x \in \mathbb{R}^d$ 应用 Jensen 不等式 Proposition 2.20, 得

$$|(f * \eta_\varepsilon)(x)|^p \leq \int_B |f(x - \varepsilon z)|^p \eta(z) dz.$$

对 x 积分并使用 Fubini 定理,

$$\|f * \eta_\varepsilon\|_{L^p}^p \leq \int_B \eta(z) \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x - \varepsilon z)|^p dx \right) dz = \|f\|_{L^p}^p.$$

再证明收敛性. 因 $p < +\infty$, $C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 中稠密. 取 $f_n \in C_c^0(\mathbb{R}^d)$ 使 $f_n \rightarrow f$ 于 L^p , 并以 ω_n 表示 f_n 的连续模. 由磨光核性质,

$$|f_n * \eta_\varepsilon(x) - f_n(x)| \leq \int_B |f_n(x - \varepsilon z) - f_n(x)| \eta(z) dz \leq \omega_n(\varepsilon).$$

由于 f_n 具有紧支集,

$$\|f_n * \eta_\varepsilon - f_n\|_{L^p} \leq C_n \omega_n(\varepsilon).$$

由三角不等式和式(2.6),

$$\|f * \eta_\varepsilon - f\|_{L^p} \leq (1 + C) \|f - f_n\|_{L^p} + C_n \omega_n(\varepsilon).$$

先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 即得结论. ■

Theorem 2.26:

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω 和任意 $1 \leq p < +\infty$, $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 取 $f \in L^p(\Omega)$. 对 $n \geq 1$, 令

$$\Omega_n = \{x \in \Omega : d(x, \partial\Omega) > 1/n\}, \quad f_n = f \mathbf{1}_{\Omega_n}.$$

由控制收敛定理, $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 再令 $f_{n,\varepsilon} = f_n * \eta_\varepsilon$. Proposition 2.25 给出 $f_{n,\varepsilon} \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$. 当 $\varepsilon < 1/n$ 时, $f_{n,\varepsilon}$ 的支集包含于 Ω , 故 $f_{n,\varepsilon} \in \mathcal{D}(\Omega)$. 先令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到稠密性. ■

L^p 空间中的弱收敛与弱-* 收敛 **Proposition 2.27:** 设 $(u_n)_n$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的有界序列, 其中 $1 < p < +\infty$. 则可抽取子序列 $(u_{n_k})_k$ 以及 $u \in L^p(\Omega)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_\Omega u_{n_k} \varphi dx = \int_\Omega u \varphi dx, \quad \forall \varphi \in L^{p'}(\Omega).$$

$L^1(\Omega)$ 不是自反空间, 因而上述结论在其中不成立. 但 $L^\infty(\Omega)$ 是可分空间 $L^1(\Omega)$ 的对偶空间, 对弱-* 拓扑有如下结论.

Proposition 2.28: 设 $(u_n)_n$ 是 $L^\infty(\Omega)$ 中的有界序列. 则可抽取子序列 $(u_{n_k})_k$ 以及 $u \in L^\infty(\Omega)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_\Omega u_{n_k} \varphi dx = \int_\Omega u \varphi dx, \quad \forall \varphi \in L^1(\Omega).$$

Theorem 2.29:

对 $\mathbb{R}^d$ 中任意开集 Ω , $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于弱-* 拓扑在 $L^\infty(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 取 $f \in L^\infty(\Omega)$, 令 $\psi_n = \mathbf{1}_{B(0,n)}$. 由 Theorem 2.26, 存在 $f_n \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使

$$\|f_n - f\psi_n\|_{L^1} \leq 1/n, \quad \|f_n\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty}.$$

对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left| \int_{\Omega} (f_n - f)\varphi \, dx \right| \leq \int_{\Omega} |f_n - f\psi_n| |\varphi| \, dx + \int_{\Omega} |\psi_n - 1| |f| |\varphi| \, dx.$$

右端两项分别由构造和 Lebesgue 控制收敛定理趋于 0. 再由 $(f_n)_n$ 在 L^∞ 中有界以及 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^1(\Omega)$ 中稠密, 对每个 $g \in L^1(\Omega)$ 都有 $\int_{\Omega} (f_n - f)g \, dx \rightarrow 0$. ■

Proposition 2.30: 设 $p, q, r \in [1, +\infty)$ 且 $1/r = 1/p + 1/q$. 若 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$, 且 $v_n \rightharpoonup v$ 于 $L^q(\Omega)$, 则 $u_n v_n \rightharpoonup uv$ 于 $L^r(\Omega)$.

Lemma 2.31: [Clarkson's inequalities] 设 $1 < p < +\infty$, 且 $f, g \in L^p(\Omega)$. 若 $p \geq 2$, 则

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^p \leq \frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p.$$

若 $p < 2$, 则

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_{L^p}^{p'} \leq \left(\frac{1}{2} \|f\|_{L^p}^p + \frac{1}{2} \|g\|_{L^p}^p \right)^{1/(p-1)}.$$

Proposition 2.32: 设 $1 < p < +\infty$, 且 $u_n \rightharpoonup u$ 于 $L^p(\Omega)$. 若

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_{L^p} \leq \|u\|_{L^p},$$

则 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 令 $p \geq 2$ 时 $\alpha = 1$, $p < 2$ 时 $\alpha = 1/(p-1)$. 将 Lemma 2.31 应用于 u_n 和 u , 得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \|u\|_{L^p}^{\alpha p}, \quad (2.7)$$

其中 a_n 为 Clarkson 不等式左端. 又有

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n - u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n - \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n + u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p}. \quad (2.8)$$

由于 $(u_n + u)/2 \rightharpoonup u$, 弱下半连续性给出

$$\|u\|_{L^p}^{\alpha p} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{u_n + u}{2} \right\|_{L^p}^{\alpha p}. \quad (2.9)$$

合并式(2.7)–(2.9), 即得结论. ■

L^p 空间之间的插值 **Lemma 2.33:** 设 $u \in L^p(\Omega) \cap L^q(\Omega)$, $1 \leq p, q \leq +\infty$, 且

$$\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

则 $u \in L^r(\Omega)$ 且

$$\|u\|_{L^r} \leq \|u\|_{L^p}^\theta \|u\|_{L^q}^{1-\theta}.$$

Proof: 由 $1 = \theta r/p + (1-\theta)r/q$ 和 Hölder 不等式,

$$\int_{\Omega} |u|^r dx \leq \left(\int_{\Omega} |u|^p dx \right)^{r\theta/p} \left(\int_{\Omega} |u|^q dx \right)^{r(1-\theta)/q}.$$

Corollary 2.34: 设 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^{p_1}(\Omega)$, 且 u_n 在 $L^{p_2}(\Omega)$ 中弱收敛到 u (若 $p_2 = +\infty$, 则为弱-* 收敛). 对严格位于 p_1 与 p_2 之间的每个 p , $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 取 $\theta \in (0, 1)$ 使 $1/p = \theta/p_1 + (1-\theta)/p_2$. Lemma 2.33 给出

$$\|u - u_n\|_{L^p} \leq \|u - u_n\|_{L^{p_1}}^\theta \|u - u_n\|_{L^{p_2}}^{1-\theta}.$$

第二因子有界, 第一因子趋于 0.

局部 Lebesgue 空间 **Definition 2.35:** $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$ 表示绝对值的 p 次幂在 Ω 的每个紧子集上可积的可测函数空间. $L_{\text{loc}}^\infty(\Omega)$ 表示在每个这样的紧集上本质有界的可测函数空间.

若对每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\omega)$, 则称 $u_n \rightarrow u$ 于 $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$.

Proposition 2.36: 设 Ω 有界, $q > 1$, $(u_n)_n$ 在 $L^q(\Omega)$ 中有界, 且对某个 $1 \leq p < q$, $u_n \rightarrow u$ 于 $L_{\text{loc}}^p(\Omega)$. 则 $u \in L^q(\Omega)$ 且 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 由 Propositions 2.27 和 2.28, 可抽取子序列在 $L^q(\Omega)$ 中弱收敛 (若 $q = +\infty$, 则弱-* 收敛) 到 $v \in L^q(\Omega)$. 局部强收敛说明 $u = v$. 令 $\omega_k = \{x \in \Omega : d(x, \partial\Omega) > 1/k\}$. 则 $\|u_n - u\|_{L^p(\omega_k)} \rightarrow 0$, 且

$$\|u_n - u\|_{L^p(\Omega \setminus \omega_k)} \leq 2C|\Omega \setminus \omega_k|^{(q-p)/(pq)}.$$

先令 $k \rightarrow \infty$, 再令 $n \rightarrow \infty$.

2.2.4 单位分解

Lemma 2.37: 设 Ω 非空, ω 有界且 $\bar{\omega} \subset \Omega$. 则存在 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $0 \leq \varphi \leq 1$, 且 $\varphi = 1$ 于 ω .

Proof: 令 $\delta = d(\bar{\omega}, \mathbb{R}^d \setminus \Omega) > 0$ 及 $U = \{x \in \Omega : d(x, \omega) < \delta/2\}$. 则 $\mathbf{1}_U * \eta_{\delta/4}$ 满足结论.

Lemma 2.38: [Partition of unity] 设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 非空, 且 $A \subset \bigcup_{i \in I} \omega_i$, 其中 ω_i 均为开集. 则存在非负函数族 $(\psi_i)_{i \in I} \subset C^\infty(\mathbb{R}^d)$, 使

$$\text{Supp } \psi_i \subset \omega_i, \quad \sum_{i \in I} \psi_i(x) = 1, \quad \forall x \in A,$$

且该和局部有限. 除至多可数个指标外, ψ_i 恒为零.

Proof: 取可数球族 $(B_n)_n$ 覆盖 A , 每个球都包含于某个 ω_i 中; 令 V_n 为同心半径减半的球. 由 Lemma 2.37, 取 $\varphi_n \in C_c^\infty(B_n)$, $0 \leq \varphi_n \leq 1$, 且 $\varphi_n = 1$ 于 V_n . 定义

$$\alpha_0 = \varphi_0, \quad \alpha_n = (1 - \varphi_0) \cdots (1 - \varphi_{n-1}) \varphi_n.$$

则

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n(x) = 1, \quad \forall x \in A, \quad (2.10)$$

且该和局部有限. 把支集落在同一 ω_i 中的 α_n 分组相加, 即得 $(\psi_i)_{i \in I}$. ■

2.2.5 分布理论简介

若存在同一紧集包含 φ 和所有 φ_n 的支集, 且对每个多重指标 α , $\partial^\alpha \varphi_n$ 一致收敛到 $\partial^\alpha \varphi$, 则称 $\varphi_n \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$.

Definition 2.39: [Distributions] 连续线性映射 $T : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 称为分布. 分布空间记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$, 并记 $\langle T, \varphi \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} = T(\varphi)$.

Definition 2.40: [Convergence of distributions] 若对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 都有 $\langle T_n, \varphi \rangle \rightarrow \langle T, \varphi \rangle$, 则称 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Definition 2.41: [Derivatives of distributions] 对 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和多重指标 α , 定义

$$\langle \partial^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, \partial^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

对 $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, 定义 $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 为

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f \varphi \, dx.$$

Proposition 2.42: 映射 $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega) \mapsto T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 是单射且序列连续.

Proof: 若 $T_f = T_g$, 对 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 令 $h = \text{sgn}(f - g)$. 由 Theorem 2.29, 取 $\varphi_n \in \mathcal{D}(\omega)$ 弱-* 收敛到 h . 于是 $\int_{\omega} (f - g) \varphi_n = 0$, 令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\int_{\omega} |f - g| = 0$. 因 ω 任意, $f = g$ 几乎处处. 若 $f_n \rightarrow f$ 于 L_{loc}^1 , 则对每个测试函数 φ , $\varphi f_n \rightarrow \varphi f$ 于 L^1 , 故 $T_{f_n} \rightarrow T_f$. ■

由此把 $L_{\text{loc}}^1(\Omega)$ 视为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 的子空间. 对充分光滑的 f , 分布导数与经典导数一致.

Proposition 2.43: 若 $1 \leq p < +\infty$ 且 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$, 则 $f_n \rightarrow f$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$. 若 $f_n \rightharpoonup^* f$ 于 $L^\infty(\Omega)$, 同样有 $f_n \rightarrow f$ 于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

Lemma 2.44: 设 Ω 连通, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\nabla T = 0$. 则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $T = \alpha$.

Proof: 先设 $\Omega = (0, 1)^d$. 固定非负 $\theta \in \mathcal{D}((0, 1))$ 且 $\int_0^1 \theta = 1$. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 逐坐标积分, 并依次使用 $\partial T / \partial x_i = 0$, 得

$$\langle T, \varphi \rangle = \langle T, \theta(x_1) \cdots \theta(x_d) \rangle \int_{\Omega} \varphi.$$

平移和位似给出任意立方体情形. 对一般连通 Ω , 取局部有限的立方体覆盖及由 Lemma 2.38 给出的单位分解. T 在每个立方体上为常数 α_i , 因而与光滑函数 $\sum_i \alpha_i \psi_i$ 相同. 该函数梯度为零, 由连通性知其为常数. ■

2.2.6 Lipschitz 连续函数

Proposition 2.45: [McShane–Whitney extension] 设 $A \subset \mathbb{R}^d$ 非空, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Lipschitz 连续函数. 则存在 $F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $F|_A = f$ 且 $\text{Lip}(F) = \text{Lip}(f)$.

Proof: 令 $L = \text{Lip}(f)$, 则 $F(x) = \inf_{y \in A} (f(y) + L|x - y|)$ 满足要求. ■

Theorem 2.46:

[Rademacher] 定义在 $\mathbb{R}^d$ 开集上的任意局部 Lipschitz 连续函数几乎处处可微.

Proposition 2.47: 设 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上 Lipschitz 连续. 则 $\text{Lip}(f * \eta_\varepsilon) \leq \text{Lip}(f)$; 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $f * \eta_\varepsilon$ 一致收敛到 f ; 且在 f 的每个可微点 x ,

$$\nabla(f * \eta_\varepsilon)(x) \longrightarrow \nabla f(x).$$

Proof: 前两项由

$$|f * \eta_\varepsilon(x) - f * \eta_\varepsilon(y)| \leq \text{Lip}(f)|x - y|,$$

以及

$$|f * \eta_\varepsilon(x) - f(x)| \leq \varepsilon \text{Lip}(f) \int_B |z| \eta(z) dz$$

得到. 若 f 在 x 可微, 写成

$$|f(x + h) - f(x) - \nabla f(x) \cdot h| \leq |h| \tau(h), \quad \tau(h) \rightarrow 0.$$

由式(2.5) 以及

$$\int_B \partial_{z_i} \eta = 0, \quad \int_B z \partial_{z_i} \eta = -e_i,$$

得到

$$|\partial_{x_i}(f * \eta_\varepsilon)(x) - \partial_{x_i} f(x)| \leq \int_B |z| |\tau(\varepsilon z)| |\partial_{z_i} \eta(z)| dz \longrightarrow 0.$$
■

2.3 基本紧性结果

在证明某些非线性偏微分方程解的存在性时, 揭示集合或映射的紧性通常是关键步骤. 本节汇集后文使用的基本定义与结果.

2.3.1 函数空间中的紧集

Theorem 3.1:

[Ascoli] 设 E 是紧度量空间, F 是度量空间, 并以一致距离

$$d(f, g) = \sup_{x \in E} d(f(x), g(x))$$

赋予 $C^0(E, F)$ 度量. 设 $K \subset C^0(E, F)$, 并假设:

1. 对每个 $x \in E$, 集合 $K(x) = \{f(x) : f \in K\}$ 在 F 中相对紧.
2. K 等度连续, 即对任意 $x \in E$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 使对所有满足 $d(x, y) < \eta$ 的

$y \in E$ 以及所有 $f \in K$, 都有 $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

则 K 在 $C^0(E, F)$ 中相对紧.

Theorem 3.2:

[Kolmogorov] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, F 是 $L^p(\Omega)$ 的有界子集, $1 \leq p < +\infty$. 假设:

1. 对每个 $\varepsilon > 0$ 和每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 存在 $0 < \alpha < d(\omega, \mathbb{R}^d \setminus \Omega)$, 使

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\omega)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in F, \quad \forall h \in \mathbb{R}^d, |h| \leq \alpha. \quad (2.11)$$

2. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 使

$$\|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)} \leq \varepsilon, \quad \forall f \in F. \quad (2.12)$$

其中 $\tau_h f(x) = f(x+h)$. 则 F 在 $L^p(\Omega)$ 中相对紧.

Proof: 给定 $\varepsilon > 0$, 取满足式(2.12)的 ω , 再取满足式(2.11)的 α . 对 $f \in F$ 的零延拓 $\bar{f}$, Jensen 和 Fubini 定理给出

$$\|\bar{f} * \eta_\alpha - f\|_{L^p(\omega)} \leq \int_B \eta(z) \|\tau_{-\alpha z} f - f\|_{L^p(\omega)} dz \leq \varepsilon. \quad (2.13)$$

记 $F_\alpha = \{\bar{f} * \eta_\alpha : f \in F\}$. 由于 F 有界,

$$\|\nabla(\bar{f} * \eta_\alpha)\|_{L^\infty} \leq C\alpha^{-1-d/p} \|f\|_{L^p} \leq C'\alpha^{-1-d/p}.$$

故 F_α 在紧集 $\bar{\omega}$ 上满足 Theorem 3.1 的条件, 从而在 $L^p(\omega)$ 中相对紧. 因此有限个半径 2ε 的 $L^p(\omega)$ 球覆盖 $F|_\omega$. 将球心以零延拓, 并用式(2.12), 得

$$\|f - g_i\|_{L^p(\Omega)}^p = \|f\|_{L^p(\Omega \setminus \omega)}^p + \|f - g_i\|_{L^p(\omega)}^p \leq \varepsilon^p + (2\varepsilon)^p \leq (3\varepsilon)^p.$$

故 F 对每个 ε 都可由有限个半径 3ε 的球覆盖, 结论成立. ■

2.3.2 紧映射

Definition 3.3: 设 E, F 为 Banach 空间. 若映射 $S : E \rightarrow F$ 把 E 的每个有界子集映为 F 的相对紧子集, 则称 S 为紧映射.

特别地, 若 $(u_n)_n$ 在 E 中有界且 S 紧, 则存在子序列 $(u_{n_k})_k$, 使 $(Su_{n_k})_k$ 在 F 中收敛.

Proposition 3.4: 设 $u_n \rightharpoonup u$ 于 E , 且 $S : E \rightarrow F$ 为紧线性映射. 则 $Su_n \rightarrow Su$ 于 F .

Proof: 对任意 $f \in F'$,

$$\langle f, Su_n \rangle_{F', F} = \langle {}^t S f, u_n \rangle_{E', E} \longrightarrow \langle {}^t S f, u \rangle_{E', E} = \langle f, Su \rangle_{F', F},$$

故 $Su_n \rightharpoonup Su$. 弱收敛序列有界, 而紧性说明 $(Su_n)_n$ 位于 F 的一个紧子集中. 其每个聚点都因弱极限唯一而等于 Su , 因而整个序列强收敛到 Su .

Lemma 3.5: 设 E, F, G 为 Banach 空间, $S : E \rightarrow F$ 和 $T : F \rightarrow G$ 为连续线性映射. 若 S 或 T 是紧映射, 则 $T \circ S$ 是紧映射.

Proof: 连续线性映射把有界集映为有界集, 把紧集映为紧集, 结论随即成立.

Lemma 3.6: 设 $S : E \rightarrow F$ 为紧线性映射. 则伴随映射 ${}^tS : F' \rightarrow E'$ 是紧映射.

Proof: 设 $(f_n)_n$ 在 F' 中有界, 并令 $K = \overline{S(B_E(0,1))}$, 则 K 紧. 把 f_n 限制在 K 上, 得 $C^0(K, \mathbb{R})$ 中的有界等度连续族. 由 Theorem 3.1, 存在子序列 $(f_{n_k})_k$ 在 K 上一致收敛. 因

$$\langle {}^tS f_{n_k}, u \rangle_{E', E} = \langle f_{n_k}, S u \rangle_{F', F},$$

该收敛在 E 的单位球上一致, 即 ${}^tS f_{n_k}$ 在 E' 中强收敛.

Proposition 3.7: 设 Banach 空间 E 连续且稠密嵌入 F . 定义

$$T : F' \rightarrow E', \quad \langle T f, u \rangle_{E', E} = \langle f, u \rangle_{F', F}, \quad \forall u \in E.$$

则 T 是从 F' 到 E' 的单射连续嵌入. 若 $E \hookrightarrow F$ 紧, 则 T 也紧. 若 E 自反, 则 $T(F')$ 在 E' 中稠密.

Proof: 连续嵌入给出 $\|u\|_F \leq C\|u\|_E$, 故 $T f \in E'$. 若 $T f = 0$, 则 f 在稠密子空间 E 上为零, 从而 $f = 0$. 紧性由 Lemma 3.6 得到. 最后设 E 自反. 若 E' 上的连续线性泛函在 $T(F')$ 上为零, 则它可写成 $g \mapsto \langle g, u \rangle_{E', E}$, 其中 $u \in E$, 且 $\langle f, u \rangle_{F', F} = 0$ 对所有 $f \in F'$ 成立. 由对偶范数刻画, $u = 0$, 故 Proposition 2.2 给出稠密性.

Corollary 3.8: 设 Hilbert 空间 V 稠密嵌入 H . 通过 Riesz 定理把 H 与其对偶等同, 则有双重稠密嵌入

$$V \subset H \subset V',$$

其中第二个嵌入由

$$f \in H \mapsto T_f \in V', \quad \langle T_f, v \rangle_{V', V} = (f, v)_H$$

定义. 若 $V \hookrightarrow H$ 紧, 则 $H \hookrightarrow V'$ 也紧.

在上述情形中, H 称为枢轴空间. 我们把 $f \in H$ 与 $T_f \in V'$ 等同, 并写成

$$\langle f, v \rangle_{V', V} = (f, v)_H, \quad \forall f \in H, \forall v \in V.$$

2.3.3 Schauder 不动点定理

求解非线性偏微分方程时常采用不动点方法. 后文对定常 Navier–Stokes 方程和非齐次非定常 Navier–Stokes 方程的研究都使用这一策略.

Theorem 3.9:

[Schauder fixed-point theorem] 设 E 为 Banach 空间, $C \subset E$ 为凸紧集. 若连续映射 $T : C \rightarrow C$, 则 T 在 C 中至少有一个不动点.

该定理不保证不动点唯一, 而 $T(C) \subset C$ 是关键条件.

Theorem 3.10:

设 E 为 Banach 空间, $C \subset E$ 为凸闭有界集. 若 $T: C \rightarrow C$ 连续且紧, 则 T 在 C 中至少有一个不动点.

Proposition 3.11: 设 $P: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 连续, 且存在 $\rho > 0$ 使

$$\xi \cdot P(\xi) \geq 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N, |\xi| = \rho.$$

则存在 $\xi \in \mathbb{R}^N, |\xi| \leq \rho$, 使 $P(\xi) = 0$.

Proof: 反设 $P(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \in B(0, \rho)$ 成立. 连续映射

$$Q(\xi) = -\frac{\rho}{|P(\xi)|} P(\xi)$$

把紧凸集 $B(0, \rho)$ 映入自身. 由 Theorem 3.9, 存在 $\xi \in B(0, \rho)$ 使

$$\xi = Q(\xi). \quad (2.14)$$

必有 $|\xi| = \rho$. 对式(2.14)两端与 ξ 作内积, 得

$$\rho^2 = -\frac{\rho}{|P(\xi)|} \xi \cdot P(\xi),$$

从而 $\xi \cdot P(\xi) < 0$, 与假设矛盾. ■

2.4 单实变量函数

本节回顾弱导数与通常导数之间的联系, 限于后文所需的单实变量函数情形. 最后给出若干 Gronwall 型不等式, 它们用于建立演化偏微分方程解的先验估计.

2.4.1 微分与原函数

设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$. 空间 $W^{1,1}((a, b))$ 由 $L^1((a, b))$ 中分布导数仍属于 $L^1((a, b))$ 的函数组成.

Lemma 4.1: 设 $g \in L^1((a, b))$, $C \in \mathbb{R}$, 并定义

$$f(t) = C + \int_a^t g(s) \, ds.$$

则 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f \in W^{1,1}((a, b))$, 且其分布导数为 g .

Proof: 对 $t_0 \in [a, b)$ 和充分小的 $h > 0$,

$$f(t_0 + h) - f(t_0) = \int_a^b g(s) \mathbf{1}_{[t_0, t_0+h]}(s) \, ds \longrightarrow 0.$$

控制收敛定理以及 $h < 0$ 的同样论证给出连续性. 对 $\varphi \in \mathcal{D}((a, b))$, 由 Fubini 定理,

$$-\int_a^b f(t) \varphi'(t) \, dt = -\int_a^b \int_a^t g(s) \varphi'(t) \, ds \, dt = \int_a^b g(s) \varphi(s) \, ds.$$

故分布导数为 g . ■

Corollary 4.2: 每个 $f \in W^{1,1}((a,b))$ 都几乎处处等于 $[a,b]$ 上某个连续函数 $\tilde{f}$, 且

$$\tilde{f}(y) = \tilde{f}(x) + \int_x^y f'(s) ds, \quad \forall x, y \in [a, b].$$

Proof: 令 $g(t) = \int_a^t f'(s) ds$. 由 Lemma 4.1, g 连续且分布导数为 f' . 因而 $f - g$ 的分布导数为零. 由 Lemma 2.44, $f - g = C$ 几乎处处. 取 $\tilde{f} = C + g$, 直接相减即得公式. ■

对 $t_0 \in [a, b]$, 以 $V_\eta(t_0)$ 表示 $[a, b]$ 中包含 t_0 且测度小于 η 的开邻域全体.

Definition 4.3: [Lebesgue points] 设 $f \in L^1((a, b))$, $t_0 \in (a, b)$. 若

$$\sup_{\omega \in V_\eta(t_0)} \frac{1}{|\omega|} \int_\omega |f(t) - f(t_0)| dt \rightarrow 0 \quad (\eta \rightarrow 0),$$

则称 t_0 为 f 的 Lebesgue 点.

Proposition 4.4: 设 $f \in L^1((a, b))$, 且 t_0 是 f 的 Lebesgue 点. 则任意原函数

$$F(t) = C + \int_a^t f(s) ds$$

在 t_0 按经典意义可微, 且 $F'(t_0) = f(t_0)$.

Proof: 有

$$\left| \frac{F(t_0 + h) - F(t_0)}{h} - f(t_0) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{t_0}^{t_0+h} |f(s) - f(t_0)| ds,$$

右端由 Lebesgue 点定义趋于 0. ■

Theorem 4.5:

若 $f \in L^1((a, b))$, 则 (a, b) 中几乎每一点都是 f 的 Lebesgue 点.

因此 L^1 函数的原函数几乎处处可微, 且满足微积分基本定理.

Proposition 4.6: 设 $f \in L^1((a, b))$. f 的每个连续点都是 Lebesgue 点. 特别地, f 的任意原函数在每个连续点 t_0 可微, 且导数为 $f(t_0)$.

Remark 4.1: $W^{1,1}((a, b))$ 中的函数恰好是 (a, b) 上的绝对连续函数.

Lemma 4.7: [Hardy's inequality] 对 $1 < p < +\infty$ 、非负 $f \in L^p((0, +\infty))$ 以及任意 $M \in [0, +\infty]$,

$$\int_0^M \left(\frac{1}{x} \int_0^x f(s) ds \right)^p dx \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \int_0^M f(s)^p ds.$$

Proof: 只需证明 $M = +\infty$ 的情形, 一般情形可应用于 $f \mathbf{1}_{[0, M]}$. 由稠密性可设 $f \in C_c^\infty((0, +\infty))$, 并令 $F(x) = x^{-1} \int_0^x f(s) ds$. 分部积分给出

$$\int_0^{+\infty} F(x)^p dx = \frac{p}{p-1} \int_0^{+\infty} F(x)^{p-1} f(x) dx.$$

再用 Hölder 不等式即得结论. ■

Corollary 4.8: 设 $f \in W^{1,p}((a,b))$, $1 < p < +\infty$, 且 $f(a) = 0$. 则 $g(x) = f(x)/(x-a)$ 属于 $L^p((a,b))$, 且

$$\|g\|_{L^p} \leq C \|f'\|_{L^p}.$$

2.4.2 微分不等式与 Gronwall 引理

Lemma 4.9: 设 $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$, $y \in C^1([0, +\infty), \mathbb{R})$ 且

$$y'(t) + \alpha y(t) \leq \beta, \quad \forall t \geq 0.$$

则

$$y(t) \leq y(0)e^{-\alpha t} + \frac{\beta}{\alpha}, \quad \forall t \geq 0.$$

Proof: 将不等式乘以 $e^{\alpha t}$ 后积分. ■

Lemma 4.10: [Gronwall–Bellman] 设 $y \in L^\infty((0, T))$, $g \in L^1((0, T))$ 非负, 且对几乎处处的 $t \in (0, T)$,

$$y(t) \leq y_0 + \int_0^t g(s)y(s) \, ds.$$

则

$$y(t) \leq y_0 \exp \left(\int_0^t g(s) \, ds \right)$$

对几乎处处的 $t \in (0, T)$ 成立.

Proof: 令 $h(t) = y_0 + \int_0^t g(s)y(s) \, ds$. 则 $h \in W^{1,1}$ 且 $h' = gy \leq gh$ 几乎处处. 因而

$$z(t) = h(t) \exp \left(- \int_0^t g(s) \, ds \right)$$

满足 $z' \leq 0$. 由 Corollary 4.2, $z(t) \leq z(0) = y_0$, 再用 $y \leq h$ 得结论. ■

Lemma 4.11: [Uniform Gronwall lemma] 设非负函数 $g_1, g_2 \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}_+)$ 满足

$$\int_t^{t+1} g_1(s) \, ds \leq k_1, \quad \int_t^{t+1} g_2(s) \, ds \leq k_2, \quad \forall t \geq 0.$$

设 $y \in C^1([0, +\infty), \mathbb{R}_+)$ 且

$$y'(t) \leq g_1(t) + g_2(t)y(t), \quad \text{a.e. } t \geq 0, \quad (2.15)$$

$$y(0) \leq k_3, \quad \int_t^{t+1} y(s) \, ds \leq k_3, \quad \forall t \geq 0. \quad (2.16)$$

则

$$y(t) \leq (k_1 + k_3)e^{k_2}, \quad \forall t \geq 0.$$

Proof: 在 $0 \leq s \leq t$ 上积分并应用 Lemma 4.10, 得

$$y(t) \leq \left(y(s) + \int_s^t g_1(\tau) \, d\tau \right) \exp \left(\int_s^t g_2(\tau) \, d\tau \right).$$

当 $t \leq 1$ 时取 $s = 0$. 当 $t \geq 1$ 时取 $s \in [t-1, t]$, 再对 s 积分, 两种情形都给出所述上界. ■

Lemma 4.12: [Bihari's inequality] 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 连续且非减, 在 $(0, +\infty)$ 上为正, 并满足 $\int_1^{+\infty} 1/f(x) dx < +\infty$. 以 F 表示在 $+\infty$ 处为零的 $-1/f$ 的原函数. 设 y 在 $[0, +\infty)$ 上连续非负, $g \in L^1_{\text{loc}}([0, +\infty))$ 非负, 且存在 $y_0 > 0$ 使

$$y(t) \leq y_0 + \int_0^t g(s) ds + \int_0^t f(y(s)) ds, \quad \forall t \geq 0.$$

则方程

$$T^* = F\left(y_0 + \int_0^{T^*} g(s) ds\right) \quad (2.17)$$

有唯一解 T^* , 且对每个 $T < T^*$,

$$\sup_{t \leq T} y(t) \leq F^{-1}\left(F\left(y_0 + \int_0^T g(s) ds\right) - T\right).$$

Proof: F 非增且在 $+\infty$ 趋于 0, g 非负, 因而 T^* 存在且唯一. 固定 $0 < T < T^*$, 令

$$z_T(t) = y_0 + \int_0^T g(s) ds + \int_0^t f(y(s)) ds. \quad (2.18)$$

则 $y(t) \leq z_T(t)$, 且 $z'_T = f(y) \leq f(z_T)$. 因此

$$\frac{z'_T(t)}{f(z_T(t))} \leq 1.$$

积分后得到 $F(z_T(T)) - F(z_T(0)) \geq -T$. 由于 F 非增,

$$z_T(T) \leq F^{-1}\left(F\left(y_0 + \int_0^T g(s) ds\right) - T\right). \quad (2.19)$$

再由 $y(t) \leq z_T(t) \leq z_T(T)$ 得结论. ■

2.5 Banach 值函数空间

2.5.1 定义与主要性质

Definition 5.1: 设 X 为 Banach 空间, $I \subset \mathbb{R}$ 为区间. 若 $f: I \rightarrow X$ 满足: X 的每个开集在 f 下的逆像都是 I 的 Borel 集; 并且可在零测集上修改 f , 使其值落在 X 的某个可分子空间中, 则称 f 为 Lebesgue 可测函数.

这一定义保证 f 几乎处处是 X 值简单函数序列的极限, 从而可以定义 Bochner 积分.

Proposition 5.2: 设 X 为 Banach 空间, $I \subset \mathbb{R}$ 为区间. 对 $1 \leq p < +\infty$, $L^p(I, X)$ 是满足 $t \mapsto \|f(t)\|_X^p$ 可积的可测函数组成的 Banach 空间, 范数为

$$\|f\|_{L^p(I, X)} = \left(\int_I \|f(t)\|_X^p dt \right)^{1/p}.$$

当 $p = +\infty$ 时, 以 $\|f\|_{L^\infty(I, X)} = \operatorname{ess\,sup}_{t \in I} \|f(t)\|_X$ 定义 Banach 空间 $L^\infty(I, X)$.

Proposition 5.3: 若 $p < +\infty$, 则 I 上的连续 X 值函数在 $L^p(I, X)$ 中稠密.

对 $f \in L^p(I, X)$, 以 $\tilde{f}$ 表示其在 $\mathbb{R}$ 上的零延拓, 并定义

$$\tau_h f(\cdot) = \tilde{f}(\cdot + h). \quad (2.20)$$

Corollary 5.4: [Continuity of the translation operator] 若 $p < +\infty$ 且 $f \in L^p(I, X)$, 则 $\tau_h f \rightarrow f$ 于 $L^p(I, X)$ 当 $h \rightarrow 0$.

对 $f \in L^1(I, X)$ 可定义 $\int_I f(t) dt \in X$, 且对 $\varphi \in X'$,

$$\int_I \langle \varphi, f(t) \rangle dt = \left\langle \varphi, \int_I f(t) dt \right\rangle.$$

Theorem 5.5:

设 $f \in L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega)) \cap L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))$ 且 $0 < \theta < 1$. 定义

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_2}, \quad \frac{1}{q} = \frac{\theta}{q_1} + \frac{1-\theta}{q_2}. \quad (2.21)$$

则 $f \in L^p(I, L^q(\Omega))$, 且

$$\|f\|_{L^p(I, L^q)} \leq \|f\|_{L^{p_1}(I, L^{q_1})}^\theta \|f\|_{L^{p_2}(I, L^{q_2})}^{1-\theta}.$$

Proof: 由 Lemma 2.33, 对几乎处处的 t ,

$$\|f(t)\|_{L^q}^p \leq \|f(t)\|_{L^{q_1}}^{p\theta} \|f(t)\|_{L^{q_2}}^{p(1-\theta)}.$$

再以共轭指数 $p_1/(p\theta)$ 和 $p_2/(p(1-\theta))$ 应用 Hölder 不等式. 无穷指数情形直接得到. ■

Corollary 5.6: 沿用 Theorem 5.5 的记号, 并设 $p_1, q_1 < +\infty, p_2, q_2 > 1$. 若 $u_n \rightarrow u$ 于 $L^{p_1}(I, L^{q_1}(\Omega))$, 且 u_n 在 $L^{p_2}(I, L^{q_2}(\Omega))$ 中弱收敛到 u (出现无穷指数时为弱-* 收敛), 则对 $0 < \theta \leq 1$, $u_n \rightarrow u$ 于由式(2.21)定义的 $L^p(I, L^q(\Omega))$.

Proof: 对 $u - u_n$ 应用 Theorem 5.5. 强收敛因子趋于 0, 弱收敛因子有界. ■

2.5.2 时间正则性

弱时间导数 **Definition 5.7:** 设 Banach 空间 X 连续嵌入 $Y, 1 \leq p, q \leq +\infty$. 若 $u \in L^p(I, X)$ 且存在 $g \in L^q(I, Y)$ 使

$$\int_I \varphi'(t) u(t) dt = - \int_I \varphi(t) g(t) dt, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(I), \quad (2.22)$$

则称 u 在 $L^q(I, Y)$ 中有弱导数, 并记 $du/dt = g$.

Remark 5.1: 在适当的稠密嵌入和可分性条件下, 同一函数在不同目标空间中得到的弱导数几乎处处相同.

弱连续性 **Definition 5.8:** 设 Y 为 Banach 空间. 若对每个 $\psi \in Y'$, 映射 $t \mapsto \langle \psi, u(t) \rangle$ 连续, 则称 $u: [0, T] \rightarrow Y$ 弱连续. 此类函数空间记为 $C^0([0, T], Y_{\text{weak}})$.

Lemma 5.9: 设 X 为可分自反 Banach 空间, X 连续嵌入 Banach 空间 Y . 则

$$L^\infty((0, T), X) \cap C^0([0, T], Y_{\text{weak}}) = C^0([0, T], X_{\text{weak}}).$$

Proof: 若 $u \in C^0([0, T], X_{\text{weak}})$, 则 Y' 中泛函限制到 X 后属于 X' , 故 u 在 Y 中弱连续. 可分性给出可测性, Banach–Steinhaus 定理和对偶范数刻画给出 $\sup_t \|u(t)\|_X < +\infty$.

反之, 延拓 u 到 $\mathbb{R}$ 并令 $u_n = u * \eta_{1/n}$. 对固定 t_0 , $(u_n(t_0))_n$ 在自反空间 X 中有界, 可抽取弱收敛子序列. Y 中的弱连续性说明该极限只能是 $u(t_0)$, 因而 $u(t_0) \in X$ 且

$$\|u(t)\|_X \leq C, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (2.23)$$

若 $t_n \rightarrow t$, 则式(2.23)和自反性允许抽取在 X 中弱收敛的子序列; Y 中弱极限的唯一性说明所有聚点均为 $u(t)$, 故整个序列在 X 中弱收敛到 $u(t)$. ■

Remark 5.2: 若 X, Y 可分且 Y 稠密嵌入 X , 则 $L^\infty((0, T), X') \cap C^0([0, T], Y'_{\text{weak}-*}) \subset C^0([0, T], X'_{\text{weak}-*})$.

强连续性 设 X 连续且稠密嵌入 Y , 并定义

$$E_{p,q} = \left\{ u \in L^p((0, T), X) : \frac{du}{dt} \in L^q((0, T), Y) \right\}.$$

Lemma 5.10: $E_{p,q}$ 配以

$$\|u\|_{E_{p,q}} = \|u\|_{L^p((0,T),X)} + \left\| \frac{du}{dt} \right\|_{L^q((0,T),Y)}$$

后为 Banach 空间. 若 $p, q < +\infty$, 则 $C^\infty([0, T], X)$ 在其中稠密.

Proof: 完备性直接由定义得到. 取和为 1 的光滑单位分解分别支撑于区间两端, 将函数平移后再以磨光核卷积. Corollary 5.4 同时给出函数和弱导数的收敛. ■

Remark 5.3: 当某个指数为 $+\infty$ 且相应空间为对偶空间时, 同一构造在该 L^∞ 因子上给出弱-* 稠密性.

Proposition 5.11: 每个 $u \in E_{p,q}$ 都有取值于 Y 的连续代表元, 且 $E_{p,q} \hookrightarrow C^0([0, T], Y)$ 连续. 对任意 $t_1, t_2 \in [0, T]$,

$$u(t_2) - u(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{du}{dt} dt.$$

Theorem 5.12:

[Lions–Magenes] 设 Hilbert 空间 V 连续且稠密嵌入 H , 并作 $V \subset H \subset V'$ 的枢轴空间等

同. 若 $u \in E_{p,q'}$ 且 $v \in E_{q,p'}$, 则 $t \mapsto (u(t), v(t))_H$ 在 $[0, T]$ 上有连续代表元, 且

$$(u(t_2), v(t_2))_H - (u(t_1), v(t_1))_H = \int_{t_1}^{t_2} \left(\left\langle \frac{du}{dt}, v \right\rangle_{V', V} + \left\langle \frac{dv}{dt}, u \right\rangle_{V', V} \right) dt.$$

Proof: 对光滑 u, v 这是内积的通常乘积法则. Lemma 5.10 给出光滑逼近; Hölder 不等式说明内积映射和右端双线性映射连续进入 $L^1(0, T)$. 传递到极限后, $t \mapsto (u(t), v(t))_H$ 属于 $W^{1,1}(0, T)$, Corollary 4.2 给出结论. ■

Theorem 5.13:

空间

$$E_{2,2} = \left\{ u \in L^2((0, T), V) : \frac{du}{dt} \in L^2((0, T), V') \right\}$$

连续嵌入 $C^0([0, T], H)$.

Proof: 在 Theorem 5.12 中取 $u = v$, 得 $t \mapsto \|u(t)\|_H^2$ 连续, 且

$$\|u(t)\|_H^2 \leq C \|u\|_{E_{2,2}}^2. \quad (2.24)$$

Proposition 5.11 给出 V' 值连续性, Lemma 5.9 给出 H 值弱连续性. 范数连续与弱连续合起来给出 H 值强连续性. ■

Theorem 5.14:

设 V, W 为 Hilbert 空间. 则

$$\left\{ v \in L^2((0, T), V) : \frac{dv}{dt} \in L^2((0, T), W) \right\} \hookrightarrow C^0([0, T], [V, W]_{1/2}),$$

其中 $[V, W]_{1/2}$ 是 V, W 的 $1/2$ 阶插值空间.

2.5.3 紧性定理

Lemma 5.15: 设 $B_0 \hookrightarrow B_1 \hookrightarrow B_2$, 其中 $B_1 \hookrightarrow B_2$ 连续且 $B_0 \hookrightarrow B_1$ 紧. 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $C(\varepsilon)$ 使

$$\|u\|_{B_1} \leq \varepsilon \|u\|_{B_0} + C(\varepsilon) \|u\|_{B_2}, \quad \forall u \in B_0.$$

Proof: 反设不成立. 经归一化可取序列 $\|u_n\|_{B_1} = 1$, 同时 $(u_n)_n$ 在 B_0 中有界且 $\|u_n\|_{B_2} \leq 1/n$. 紧嵌入给出在 B_1 中收敛到 u_∞ 的子序列, 于是 $\|u_\infty\|_{B_1} = 1$ 而 $\|u_\infty\|_{B_2} = 0$, 矛盾. ■

Theorem 5.16:

[Aubin–Lions–Simon] 沿用 Lemma 5.15 的空间, 并定义

$$E_{p,r} = \left\{ v \in L^p((0, T), B_0) : \frac{dv}{dt} \in L^r((0, T), B_2) \right\}.$$

若 $p < +\infty$, 则 $E_{p,r} \hookrightarrow L^p((0,T), B_1)$ 紧; 若 $p = +\infty$ 且 $r > 1$, 则 $E_{p,r} \hookrightarrow C^0([0,T], B_1)$ 紧.

Proof: 只证第一种情形, 且可设 $r = 1$. 对 $E_{p,1}$ 中有界序列 $(u_n)_n$, Lemma 5.15 表明, 只需抽取在 $L^p((0,T), B_2)$ 中 Cauchy 的子序列. 用光滑截断把 u_n 分成在 T 端消失和在 0 端消失的两项, 两项处理相同.

对在 T 端消失并以零延拓的 v_n , 令

$$v_n(t) = \frac{1}{h} \int_t^{t+h} v_n(s) ds + \frac{1}{h} \int_t^{t+h} (v_n(t) - v_n(s)) ds = a_{n,h}(t) + b_{n,h}(t).$$

固定 $h > 0$. 序列 $(a_{n,h})_n$ 等度连续, 且其值位于 B_0 的同一有界集, 从而位于 B_2 的紧集. Theorem 3.1 给出在 $C^0([0,T], B_2)$ 中收敛的子序列. Jensen 和 Fubini 定理给出

$$\|b_{n,h}\|_{L^p((0,T), B_2)} \leq C_T h^{1/p}. \quad (2.25)$$

取 $h_k = 1/k$, 对各 $(a_{n,h_k})_n$ 逐次抽取并作对角选择. 式(2.25)说明所得子序列在 $L^p((0,T), B_2)$ 中为 Cauchy 序列, 再由 Lemma 5.15 得到 $L^p((0,T), B_1)$ 中的 Cauchy 性. ■

对 $1 \leq q < +\infty$ 和 $0 < \sigma < 1$, 定义 Nikolskii 空间

$$N_q^\sigma((0,T), E) = \left\{ f \in L^q((0,T), E) : \sup_{0 < h < T} \frac{\|\tau_h f - f\|_{L^q((0,T-h), E)}}{h^\sigma} < +\infty \right\}. \quad (2.26)$$

Theorem 5.17:

[Simon] 设 $B_0 \hookrightarrow B_1 \hookrightarrow B_2$, 其中 $B_1 \hookrightarrow B_2$ 连续且 $B_0 \hookrightarrow B_1$ 紧. 对 $1 \leq q \leq +\infty$ 和 $0 < \sigma < 1$,

$$L^q((0,T), B_0) \cap N_q^\sigma((0,T), B_2) \hookrightarrow L^q((0,T), B_1)$$

为紧嵌入.

2.5.4 Banach 值 Fourier 变换

Definition 5.18: 设 X 为复 Banach 空间, $f \in L^1(\mathbb{R}, X)$. 定义

$$\mathcal{F}(f)(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-it\tau} dt.$$

Theorem 5.19:

[Hausdorff-Young] 设 $X = \mathbb{C}^n$. Fourier 变换唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)$ 上的等距映射. 此外, 对 $1 \leq p \leq 2$, 存在 $C > 0$ 使

$$\|\mathcal{F}(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}, \mathbb{C}^n)}.$$

Theorem 5.20:

[Hausdorff–Young for Lebesgue spaces] 设 (E, μ) 为紧的局部分离拓扑空间, μ 为 Borel 集上的正则测度, $X = L^q(E, \mu)$. 若 $1 \leq p \leq 2$ 且 $p \leq q \leq p'$, 则

$$\|\mathcal{F}(f)\|_{L^{p'}(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}, L^q(E, \mu))}.$$

Proof: 对光滑 f , 先以指数 $p'/q \geq 1$ 应用 Minkowski 不等式, 再对固定 x 的标量函数应用 Theorem 5.19, 最后以指数 $q/p \geq 1$ 再用 Minkowski 不等式, 即得估计. 一般情形由稠密性得到. ■

Corollary 5.21: 若 $X = H$ 为 Hilbert 空间, 则 $\mathcal{F}$ 延拓为 $L^2(\mathbb{R}, H)$ 上的可逆等距映射, 且

$$\mathcal{F}^{-1}(g)(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} g(\tau) e^{i\tau t} d\tau.$$

Proposition 5.22: 设 $f \in W^{1,1}(\mathbb{R}, X)$. 则

$$\mathcal{F}\left(\frac{df}{dt}\right)(\tau) = i\tau \mathcal{F}(f)(\tau).$$

若 $\tilde{f}$ 是 $f \in W^{1,1}((0, T), X)$ 的零延拓, 则分布意义下

$$i\tau \mathcal{F}(\tilde{f}) = \mathcal{F}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(0) - \frac{e^{-i\tau T}}{\sqrt{2\pi}} f(T). \quad (2.27)$$

Proposition 5.23: 设 H 为 Hilbert 空间, $f \in L^2((0, T), H)$, 且对某个 $0 < \sigma \leq 1$,

$$\int_{\mathbb{R}} |\tau|^{2\sigma} \|\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau)\|_H^2 d\tau \leq C^2. \quad (2.28)$$

则 $f \in N_2^\sigma((0, T), H)$, 且

$$\|f\|_{N_2^\sigma((0, T), H)} \leq M_\sigma(1 + C),$$

其中 M_σ 只依赖于 σ, T .

Proof: 对 $0 < h < T$, 令 $g_h(t) = \tilde{f}(t+h) - \tilde{f}(t)$. 则

$$\mathcal{F}(g_h)(\tau) = (e^{i\tau h} - 1)\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau).$$

函数 $(e^{ix} - 1)/x^\sigma$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界, 故

$$\|\mathcal{F}(g_h)(\tau)\|_H \leq K_\sigma h^\sigma |\tau|^\sigma \|\mathcal{F}(\tilde{f})(\tau)\|_H.$$

由 Corollary 5.21 和式(2.28),

$$\int_0^{T-h} \|f(t+h) - f(t)\|_H^2 dt \leq K_\sigma^2 C^2 h^{2\sigma},$$

这正是式(2.26)中的估计. ■

2.6 无界算子的若干谱分析结果

为把有限维谱理论推广到无限维, 考虑从 Hilbert 空间 H 到自身、但只在子空间 $D(A)$ 上定义的算子 A . 后文将其应用于 Stokes 算子.

2.6.1 定义

无界算子由 Hilbert 空间 H 、线性子空间 $D(A) \subset H$ 以及线性映射 $A : D(A) \rightarrow H$ 给出. 本书假设 $D(A)$ 在 H 中稠密, 且图像

$$G(A) = \{(u, Au) : u \in D(A)\}$$

在 $H \times H$ 中闭.

Remark 6.1: 若闭算子 A 的稠密定义域 $D(A) \neq H$, 则不存在 $C > 0$ 使 $\|Au\|_H \leq C\|u\|_H$ 对所有 $u \in D(A)$ 成立. 否则由稠密性和图像闭性可推出每个 $u \in H$ 都属于 $D(A)$.

Definition 6.1: 设 $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ 有稠密定义域. 定义

$$D(A^*) = \{u \in H : v \in D(A) \mapsto (Av, u)_H \text{ 关于 } H \text{ 范数连续}\}.$$

对 $u \in D(A^*)$, 唯一元素 $A^*u \in H$ 由

$$(Av, u)_H = (v, A^*u)_H, \quad \forall v \in D(A)$$

确定. 称 A^* 为 A 的伴随算子.

Definition 6.2: 若 $D(A^*) = D(A)$ 且 $A^*u = Au$ 对所有 $u \in D(A)$ 成立, 则称 A 自伴.

Proposition 6.3: 设无界算子 A 自伴, $A : D(A) \rightarrow H$ 为双射, 且 $A^{-1} : H \rightarrow H$ 连续. 则有界算子 A^{-1} 自伴.

Proof: 连续性给出 $D((A^{-1})^*) = H$. 对 $u, v \in H$, $A^{-1}u, A^{-1}v \in D(A)$, 且

$$(u, A^{-1}v)_H = (A(A^{-1}u), A^{-1}v)_H = (A^{-1}u, A(A^{-1}v))_H = (A^{-1}u, v)_H.$$

■

Proposition 6.4: 设 A 为 H 中定义域为 $D(A)$ 的闭无界算子. 赋予 $D(A)$ 内积

$$(u, v)_{D(A)} = (u, v)_H + (Au, Av)_H. \quad (2.29)$$

则 $D(A)$ 是 Hilbert 空间, $D(A) \hookrightarrow H$ 连续, 且 $A : D(A) \rightarrow H$ 连续.

Remark 6.2: 上述范数等价于图范数 $\|u\|_H + \|Au\|_H$.

2.6.2 谱理论的初等结果

Theorem 6.5:

[Compact self-adjoint operators] 设 H 为可分无限维 Hilbert 空间, $T : H \rightarrow H$ 为紧自伴有界算子. 则 H 有一组由 T 的特征向量组成的标准正交基. 其特征值均为实数, 可排列成趋于 0 的序列.

Theorem 6.6:

[Operators with compact inverse] 设 H 为可分无限维 Hilbert 空间, $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ 自伴, 从 $D(A)$ 到 H 为双射, 且 $D(A) \hookrightarrow H$ 紧. 则存在 H 的标准正交基 $(w_k)_{k \geq 1}$ 以及实数 λ_k , 使

$$w_k \in D(A), \quad Aw_k = \lambda_k w_k,$$

并可使 $(|\lambda_k|)_k$ 单调递增且趋于 $+\infty$. 此外, $(w_k)_k$ 在 $D(A)$ 中为完备正交族.

Proof: 由 Proposition 6.3, A^{-1} 是紧自伴有界算子. Theorem 6.5 给出 H 的标准正交基 $(w_k)_k$ 以及非零特征值 $\mu_k \rightarrow 0$. 令 $\lambda_k = 1/\mu_k$, 则 $Aw_k = \lambda_k w_k$ 且 $|\lambda_k| \rightarrow +\infty$.

对 $k \neq l$,

$$(w_k, w_l)_{D(A)} = (1 + \lambda_k \lambda_l)(w_k, w_l)_H = 0.$$

若 $u \in D(A)$ 与所有 w_k 在 $D(A)$ 中正交, 则

$$0 = (u, w_k)_{D(A)} = (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H,$$

故 $u = 0$, 从而该族在 $D(A)$ 中完备. ■

Proposition 6.7: 在 Theorem 6.6 的假设下,

$$D(A) = \left\{ u \in H : \sum_{k \geq 1} \lambda_k^2 (u, w_k)_H^2 < +\infty \right\}.$$

Proof: $(w_k / \|w_k\|_{D(A)})_k$ 是 $D(A)$ 的标准正交基, 且

$$(u, w_k)_{D(A)} = (1 + \lambda_k^2)(u, w_k)_H, \quad \|w_k\|_{D(A)}^2 = 1 + \lambda_k^2.$$

Parseval 恒等式给出必要性. 反之, 若加权级数收敛, 则 $\sum_k (u, w_k)_H w_k$ 在 $D(A)$ 中收敛到某个 $\tilde{u}$. 连续嵌入说明它在 H 中也收敛, 标准正交基的完备性给出 $u = \tilde{u} \in D(A)$. ■

以下假设 A 非负. 对 $s \geq 0$, 定义

$$D(A^s) = \left\{ u \in H : \sum_{k \geq 1} \lambda_k^{2s} (u, w_k)_H^2 < +\infty \right\}, \quad A^s u = \sum_{k \geq 1} \lambda_k^s (u, w_k)_H w_k.$$

Proposition 6.8: 有:

1. $A^1 = A$, $D(A^0) = H$, 且 A^0 为恒等算子.
2. 对 $s > 0$, $D(A^s)$ 为 Hilbert 空间, A^s 是从 $D(A^s)$ 到 H 的非负自伴同构, $(w_k)_k$ 在 $D(A^s)$ 中完备.
3. 若 $0 \leq s < s'$, 则 $D(A^{s'}) \subsetneq D(A^s)$, 且该嵌入紧.

Proof: 只证紧性. 若 $(u_j)_j$ 在 $D(A^{s'})$ 中有界, 则对充分大的 n_0 ,

$$\sum_{n \geq n_0} \lambda_n^{2s} |(u_j, w_n)_H|^2 \leq \varepsilon^2/2, \quad (2.30)$$

对所有 j 一致成立. 前 n_0 个坐标位于有限维有界集, 可由有限个小球覆盖, 即

$$\sum_{n < n_0} \lambda_n^{2s} |(u_j - v^i, w_n)_H|^2 \leq \varepsilon^2/2 \quad (2.31)$$

对某个有限集合中的 v^i 成立. 两式相加得到 $D(A^s)$ 中的有限 ε -覆盖. ■

对 $s < 0$, 以范数 $\|u\|_{D(A^s)}^2 = \sum_k \lambda_k^{2s} (u, w_k)_H^2$ 完备化 H , 得到大于 H 的 Hilbert 空间 $D(A^s)$.

Proposition 6.9: 对 $s \geq 0$, 把 H 与其对偶等同后,

$$D(A^s)' \simeq D(A^{-s}),$$

且

$$\langle u, v \rangle_{D(A^{-s}), D(A^s)} = \sum_{k \geq 1} (u, w_k)_H (v, w_k)_H.$$

2.6.3 半群理论的应用

设 A 满足上述自伴、双射、非负和紧逆条件. 考虑

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = 0, \\ u(0) = u_0. \end{cases} \quad (2.32)$$

Proposition 6.10: [Definition and proposition] 若 $u_0 = \sum_{k \geq 1} u_{0,k} w_k \in H$, 则对 $t \geq 0$ 可定义

$$e^{-tA} u_0 = \sum_{k \geq 1} u_{0,k} e^{-t\lambda_k} w_k \in H.$$

对任意 $s \geq 0$ 和 $t > 0$, $e^{-tA} u_0 \in D(A^s)$.

Remark 6.3: $e^{-(t+s)A} = e^{-tA} e^{-sA} = e^{-sA} e^{-tA}$, 因而 $(e^{-tA})_{t \geq 0}$ 称为与 $-A$ 关联的半群.

Proof: 因 $\lambda_k, t \geq 0$, 级数在 H 中有定义. 对 $s > 0$,

$$\lambda_k^s e^{-t\lambda_k} = (t\lambda_k)^s e^{-t\lambda_k} t^{-s} \leq C_s t^{-s}.$$

故

$$\sum_{k \geq 1} (\lambda_k^s u_{0,k} e^{-t\lambda_k})^2 \leq C_s^2 t^{-2s} \sum_{k \geq 1} |u_{0,k}|^2 < +\infty.$$

■

Theorem 6.11:

对每个 $u_0 \in H$, 问题(2.32)有唯一解

$$u \in C^0([0, +\infty), H) \cap C^1((0, +\infty), D(A)),$$

且

$$u(t) = e^{-tA}u_0. \quad (2.33)$$

Proof: 若 $u_0 = 0$, 对 $0 < \varepsilon < T$ 应用 Theorem 5.12,

$$\|u(T)\|_H^2 - \|u(\varepsilon)\|_H^2 = -2 \int_{\varepsilon}^T (Au(t), u(t))_H dt \leq 0.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得 $u(T) = 0$, 故解唯一. 式(2.33)定义的级数具有所述正则性, 且对 $t > 0$ 可逐项求导:

$$\frac{du}{dt} = - \sum_{k \geq 1} \lambda_k u_{0,k} e^{-t\lambda_k} w_k = -Au(t).$$

■

Theorem 6.12:

设 $u_0 \in H$, $f \in C^1([0, +\infty), H)$. 则问题

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} + Au = f, \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (2.34)$$

有唯一解 $u \in C^0([0, +\infty), H) \cap C^1((0, +\infty), H) \cap C^0((0, +\infty), D(A))$, 且

$$u(t) = e^{-tA}u_0 + \int_0^t e^{-(t-s)A}f(s) ds. \quad (2.35)$$

Proof: 在式(2.35)的积分中作变量代换 $s \mapsto t - s$, 得

$$u(t) = e^{-tA}u_0 + \int_0^t e^{-sA}f(t-s) ds.$$

f 为 C^1 的假设允许逐项求导, 再分部积分即得方程和初值. 唯一性由齐次问题得到.

■

Remark 6.4: 式(2.35)对正则性较低的源项仍成立, 但需相应减弱解的概念.

3 Sobolev 空间

本章首先给出 $\mathbb{R}^d$ 中区域的基本定义与性质, 特别研究 Lipschitz 区域上的边界积分、外法向量和 Stokes 公式. 随后定义并研究这些区域上的 Sobolev 空间, 包括光滑函数稠密性、迹理论、Sobolev 嵌入以及 Poincaré 和 Hardy 不等式. 第 3 节研究光滑区域边界邻域的切向和法向坐标, 包括符号距离及其正则化. 最后研究带 Dirichlet 或 Neumann 边界条件的 Laplace 问题.

3.1 区域

对开集 Ω , 仍以式(2.1)中的 $\delta(x)$ 表示到 $\partial\Omega$ 的符号距离. 对 $\xi \geq 0$, 记

$$O_\xi = \{x \in \Omega : \delta(x) < \xi\}, \quad \Omega_\xi = \{x \in \Omega : \delta(x) > \xi\}.$$

3.1.1 一般定义

以下 k 为非负整数, $\alpha \in [0, 1]$, 且 $k + \alpha \geq 1$.

Definition 1.1: $[C^{k,\alpha}$ half-spaces] 对紧支集的 $C^{k,\alpha}$ 映射 $a : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$, 定义

$$H_a = \{(\bar{x}, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_d > a(\bar{x})\},$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 中的 $C^{k,\alpha}$ 半空间. $\mathbb{R}_+^d = \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}_+^* = H_0$ 称为平坦半空间.

Definition 1.2: 若对每个 $\sigma \in \partial\Omega$, 存在开邻域 U_σ , 旋转 $R_\sigma \in O_d^+(\mathbb{R})$ 以及 $C^{k,\alpha}$ 半空间 H_{a_σ} , 使

$$\Omega \cap U_\sigma = (R_\sigma H_{a_\sigma}) \cap U_\sigma, \quad \partial\Omega \cap U_\sigma = (R_\sigma \partial H_{a_\sigma}) \cap U_\sigma,$$

且 $\Omega^c \cap U_\sigma = (R_\sigma H_{a_\sigma}^c) \cap U_\sigma$, 则称 Ω 为 $C^{k,\alpha}$ 区域. $k = 0, \alpha = 1$ 时称为 Lipschitz 区域.




图 III.1: $C^{k,\alpha}$ 区域局部为 $C^{k,\alpha}$ 半空间.

3.1.2 Lipschitz 区域

Lipschitz 半空间 固定磨光核 $\eta : \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$, 并令

$$M_\eta = \int_B |z| \eta(z) dz, \quad M_{\nabla\eta,k} = \int_B |z|^k |\nabla\eta(z)| dz.$$

取 $\gamma > 0$ 使 $\gamma \text{Lip}(a) M_\eta \leq 1/2$, 并定义

$$a_\gamma(\bar{x}, x_d) = (a * \eta_{\gamma|x_d|})(\bar{x}) = \int_B a(\bar{x} - \gamma|x_d|z) \eta(z) dz. \quad (3.1)$$

Proposition 1.3: a_γ 在 $x_d \neq 0$ 处光滑, $a_\gamma(\bar{x}, 0) = a(\bar{x})$, 并满足

$$|\partial_{x_d} a_\gamma| \leq \gamma \text{Lip}(a) M_\eta, \quad |\partial_{x_i} a_\gamma| \leq \text{Lip}(a), \quad |\partial_{x_i} \partial_{x_j} a_\gamma| \leq C_\gamma |x_d|^{-1}.$$

在 a 的每个可微点, $\partial_{x_i} a_\gamma(\bar{x}, x_d) \rightarrow \partial_{x_i} a(\bar{x})$ 当 $x_d \rightarrow 0$. 对固定 $\bar{x}$, 映射 $x_d \mapsto x_d + a_\gamma(\bar{x}, x_d)$ 单调递增且映满 $\mathbb{R}$. 映射

$$T_a(\bar{x}, x_d) = (\bar{x}, x_d + a_\gamma(\bar{x}, x_d))$$

是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lipschitz 微分同胚, 把 $\mathbb{R}_+^d$, $\mathbb{R}_-^d$ 和 $\partial\mathbb{R}_+^d$ 分别映到 H_a , H_a^c 和 ∂H_a . 其 Jacobian 行列式及逆映射的 Jacobian 行列式分别位于 $[1/2, 3/2]$ 和 $[2/3, 2]$.

Proof: 正则性和极限由 Proposition 2.47 得到. 利用 a 的 Lipschitz 性可得一阶导数估计; 对卷积表达式求导并使用 $\int \partial_i \eta = 0$ 与 $\int z \cdot \nabla \eta = -(d-1)$, 得二阶导数估计. 又

$$(y_1 + a_\gamma(\bar{x}, y_1)) - (y_2 + a_\gamma(\bar{x}, y_2)) \geq (1 - \gamma \text{Lip}(a)M_\eta)|y_1 - y_2|,$$

从而得到单调性、满射性和 T_a 的可逆性. 最后 $J_{T_a} = 1 + \partial_{x_d} a_\gamma$ 给出 Jacobian 估计. ■

锥性质及其推论

Theorem 1.4:

边界紧的 Lipschitz 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 满足锥性质: 存在 $\partial\Omega$ 的有限开覆盖 $(U_i)_{1 \leq i \leq N}$, $\theta \in (0, \pi/2)$ 和 $\delta_0 > 0$, 使 $O_{\delta_0} \subset \bigcup_i U_i$, 且对每个 i 存在单位向量 $\tilde{v}_i$, 若

$$C_i = \{z \in \mathbb{R}^d : \sin \theta |z| \leq z \cdot \tilde{v}_i \leq \delta_0\},$$

则

$$x + C_i \subset \Omega \quad (x \in \Omega \cap U_i), \quad x - C_i \subset \Omega^c \quad (x \in \Omega^c \cap U_i), \quad (3.2)$$

并且

$$x - t\tilde{v}_i \in U_i, \quad x \in \Omega \cap U_i, \quad 0 \leq t \leq \delta_0/2. \quad (3.3)$$




图 III.2: 半空间 H_a 及其内锥.

Proof: 由边界紧性只需在一个 Lipschitz 半空间 H_a 上证明. 取 $\tilde{v} = e_d$, $\theta = \arctan(\text{Lip}(a))$, 并取

$$U = \bigcup_{|\bar{x}| < \alpha} \{\bar{x}\} \times (a(\bar{x}) - \alpha, a(\bar{x}) + \alpha). \quad (3.4)$$

若 $y - x$ 位于对应的无限锥中, 则 Lipschitz 估计给出 $y_d > a(\bar{y})$, 故 $x + C \subset H_a$; 补集情形相同. 取充分小的 $\delta_0 < 2\alpha$ 即得式(3.3). ■

令 $U_0 = \Omega_{\delta_0/2}$ 和 $\nu_0 = 0$.

Proposition 1.5: 在 Theorem 1.4 的记号下, 存在 $M > 0$ 和 $\varepsilon_0 > 0$, 使对 $\nu_i = M\tilde{v}_i$ 和 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$:

$$B(y + \varepsilon\nu_i, \varepsilon) \subset B(y + \varepsilon\nu_i, 2\varepsilon) \subset \Omega, \quad y \in U_i \cap \Omega, \quad (3.5)$$

且对 $i \geq 1$ 及 $y \in U_i$ 满足 $d(y, \partial\Omega) \leq \varepsilon/M$,

$$B(y - \varepsilon\nu_i, \varepsilon) \subset \Omega^c. \quad (3.6)$$




图 III.3: 球 $B(y + \varepsilon \nu_i, 2\varepsilon)$ 包含于锥 C_i .

Proof: 取 $M > 2$ 使 $\sin^2 \theta = (M^2 - 4)/M^2$, 并令 $\varepsilon_0 = \delta_0/(M + 2)$. 对 $i \geq 1$, 直接验证 $B(\varepsilon M \tilde{\nu}_i, 2\varepsilon) \subset C_i$, 再用式(3.2)得到第一式. 对第二式, 沿 $-\nu_i$ 方向把 y 移到 $U_i \cap \Omega^c$, 再应用同一锥论证. $i = 0$ 的情形由 U_0 到边界的距离得到.

Definition 1.6: 若存在 $x_0 \in A$ 使对每个 $x \in A$, 线段 $[x_0, x] \subset A$, 则称 A 关于 x_0 星形.

Lemma 1.7: 有界 Lipschitz 区域 Ω 可由有限个星形开集覆盖. 无界 Lipschitz 区域可由局部有限的星形开集族覆盖.

Proof: 内部点附近可取包含于 Ω 的球. 对 $a \in \partial\Omega \cap U_i$, 取

$$O = \bigcup_{x \in \partial\Omega \cap U_i, |x-a| < \varepsilon} (x + \overset{\circ}{C}_i \cup \{0\}).$$

当 ε 充分小时, O 关于 $a + (\delta_0/2)\tilde{\nu}_i$ 星形. 紧性给出有限覆盖, 无界情形给出局部有限覆盖.

Lipschitz 区域边界上的积分 对 Lipschitz 半空间 H_a 和紧支集连续函数 φ , 定义

$$\int_{\partial H_a} \varphi d\sigma = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \varphi(\bar{x}, a(\bar{x})) J_a(\bar{x}) d\bar{x}, \quad J_a = \sqrt{1 + \sum_{i=1}^{d-1} (\partial_{x_i} a)^2}. \quad (3.7)$$

由 Theorem 2.46, J_a 几乎处处有定义. 外单位法向量为

$$\nu_{H_a}(\bar{x}, a(\bar{x})) = \frac{1}{J_a(\bar{x})} (\partial_{x_1} a, \dots, \partial_{x_{d-1}} a, -1)^T. \quad (3.8)$$

对一般边界紧的 Lipschitz 区域, 通过有限图覆盖和单位分解定义 $\partial\Omega$ 上的 Radon 测度 $d\sigma$ 及外单位法向量 $\nu \in (L^\infty(\partial\Omega))^d$; 该定义与覆盖、图和单位分解的选择无关.

Stokes 公式

Theorem 1.8:

[Stokes formula. Divergence theorem] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为边界紧的 Lipschitz 区域. 对任意 $\Phi \in (C_c^1(\mathbb{R}^d))^d$,

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \Phi dx = \int_{\partial\Omega} \Phi \cdot \nu d\sigma. \quad (3.9)$$

因此对 $\psi \in C_c^1(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{\Omega} \psi \operatorname{div} \Phi dx + \int_{\Omega} \Phi \cdot \nabla \psi dx = \int_{\partial\Omega} \psi \Phi \cdot \nu d\sigma. \quad (3.10)$$

Proof: 线性和单位分解把一般情形约化到 Lipschitz 半空间. 对光滑图 a , Fubini 定理和 $\bar{x}$ 方向分部积分给出

$$\int_{H_a} \operatorname{div} \Phi \, dx = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \Phi(\bar{x}, a(\bar{x})) \cdot (\nabla a(\bar{x}), -1)^T \, d\bar{x},$$

再用式(3.7)和(3.8)得到结论.



图 III.4: Lipschitz 半空间 H_a 及其光滑逼近.

对 Lipschitz 图, 使用式(3.1)构造光滑半空间 $H_{a_\gamma(\cdot, \epsilon)}$. 当 $\epsilon \rightarrow 0$, 特征函数、图函数和几乎处处的切向导数收敛, 并具有统一有界控制. Lebesgue 控制收敛定理允许在体积分和边界积分中传递到极限, 得式(3.9). 对向量场 $\psi\Phi$ 应用该式即得式(3.10). ■

3.2 Lipschitz 区域上的 Sobolev 空间

下面给出 Sobolev 空间的主要定义和结果.

3.2.1 定义

Definition 2.1: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集, m 为非负整数, $1 \leq p \leq +\infty$. 定义

$$W^{m,p}(\Omega) = \{f \in L^p(\Omega) : \partial^\alpha f \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq m\},$$

其中导数取分布意义. 当 $p < +\infty$ 时赋予范数

$$\|f\|_{W^{m,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^p}^p \right)^{1/p},$$

而 $p = +\infty$ 时取 $\|f\|_{W^{m,\infty}} = \sup_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty}$. 这是 Banach 空间. 记 $H^m(\Omega) = W^{m,2}(\Omega)$; 对 $p < +\infty$, 记 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的闭包.

Remark 2.1: 对任意 $s \geq 0$, 可用 Fourier 变换定义

$$H^s(\mathbb{R}^d) = \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^d)\}. \quad (3.11)$$

Definition 2.2: 设 f 在开集 Ω 上可测. 若对每个满足 $\bar{\omega} \subset \Omega$ 的有界开集 ω , 均有 $f|_\omega \in W^{m,p}(\omega)$, 则称 $f \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega)$.

Proposition 2.3: 在 Definition 2.2 的记号下,

$$f \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega) \iff \varphi f \in W^{m,p}(\mathbb{R}^d), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

其中 φf 在 Ω 外延拓为零.

Proof: 结论直接由 Lemma 2.37 得到. ■

Proposition 2.4: 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为任意开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为有界 Lipschitz 连续函数. 由 Rademacher 定理, ∇f 几乎处处有定义. 则 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$, 且其分布梯度就是 ∇f . 若存在连续函数 $G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足 $G = \nabla f$ 几乎处处成立, 则 $f \in C^1(\Omega)$, 且 G 是其经典梯度.

Proof: 取 Proposition 2.45 给出的 Lipschitz 延拓 $F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $\Phi \in \mathcal{D}(\Omega)^d$ 有

$$\int_{\Omega} (F * \eta_{\varepsilon}) \operatorname{div} \Phi \, dx = - \int_{\Omega} \nabla (F * \eta_{\varepsilon}) \cdot \Phi \, dx.$$

利用 Proposition 2.47 和控制收敛定理令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即得分布梯度断言. 又 $\nabla (F * \eta_{\varepsilon}) = G * \eta_{\varepsilon}$ 在 Ω 的紧子集上一致趋于 G , 故 f 处处可微且经典梯度为 G . ■

3.2.2 磨光算子与 Friedrichs 交换子估计

以下固定边界紧的 Lipschitz 区域 Ω . 取非负递减的 $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$, 使其在 $\mathbb{R}_-$ 上等于 1, 在 $(1, +\infty)$ 上等于 0, 并令 $\beta_{\varepsilon}(x) = \beta(|x| + \ln \varepsilon)$. 则

$$\beta_{\varepsilon} = 1 \text{ 于 } B(0, |\ln \varepsilon|), \quad \operatorname{Supp}(\beta_{\varepsilon}) \subset B(0, 1 + |\ln \varepsilon|), \quad (3.12)$$

$$\|\beta_{\varepsilon}\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq C_{p,d}(1 + |\ln \varepsilon|)^{d/p}, \quad 1 \leq p < +\infty, \quad (3.13)$$

并且

$$\|\beta_{\varepsilon} f - f\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad f \in L^p(\Omega), \quad (3.14)$$

$$\|(\partial^{\alpha} \beta_{\varepsilon}) f\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0, \quad |\alpha| \geq 1. \quad (3.15)$$

令 $(U_i)_{0 \leq i \leq N}$ 和 $(\psi_i)_{0 \leq i \leq N}$ 分别为 Section 3.1.2 构造的覆盖及其单位分解.

Lemma 2.5: 对任意 $y \in \Omega$,

$$\sum_{i=0}^N \psi_i(y) \int_{\Omega} \eta_{\varepsilon}(y - x + \varepsilon \nu_i) \, dx = 1, \quad (3.16)$$

$$\sum_{i=0}^N \psi_i(y) \int_{\mathbb{R}^d} \eta_{\varepsilon}(y - x - \varepsilon \nu_i) \, dx = 1. \quad (3.17)$$

Proof: 若 $\psi_i(y) > 0$, 则 $y \in U_i$, 且式(3.5)给出 $B(y + \varepsilon \nu_i, \varepsilon) \subset \Omega$. 因而每个有关积分等于 1, 再用 $\sum_i \psi_i = 1$. 第二式在全空间积分, 由变量替换立即得到. ■

Definition 2.6: 对 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\varepsilon < \varepsilon_0$, 定义

$$S_{\varepsilon} f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_{\varepsilon}(y) \psi_i(y) \langle f, \eta_{\varepsilon}(y + \varepsilon \nu_i - \cdot) \rangle, \quad y \in \Omega. \quad (3.18)$$

Remark 2.2: 式(3.5)保证配对中的测试函数紧支于 $\Omega_{\varepsilon/2}$, 故定义有意义, 且 $S_{\varepsilon} f$ 实际定义于 $\bar{\Omega}$ 的一个开邻域上.

Definition 2.7: 对 $f \in L^1(\Omega) + L^{\infty}(\Omega)$, 定义

$$\tilde{S}_{\varepsilon} f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_{\varepsilon}(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_{\varepsilon}(y - x - \varepsilon \nu_i) \, dx.$$

等价地,

$$\tilde{S}_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \int_{\Omega} \beta_\varepsilon(x) \psi_i(x) f(x) \eta_\varepsilon(y - x - \varepsilon \nu_i) dx. \quad (3.19)$$

Remark 2.3: S_ε 与 $\tilde{S}_\varepsilon$ 的差别是核中 $\varepsilon \nu_i$ 的符号. 因此 $\tilde{S}_\varepsilon f$ 紧支于 Ω , 但它不能直接定义在一般分布上. 对函数 f 还有

$$S_\varepsilon f(y) = \sum_{i=0}^N \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx. \quad (3.20)$$

Proposition 2.8: 有 $S_\varepsilon f \in C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 对每个 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 成立, 且 $\tilde{S}_\varepsilon f \in C_c^\infty(\Omega)$ 对每个 $f \in L^1 + L^\infty$ 成立. 对 $1 \leq p \leq +\infty$,

$$\|S_\varepsilon f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}, \quad \|\tilde{S}_\varepsilon f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}, \quad (3.21)$$

且两者梯度的 L^p 范数均不超过 $C\varepsilon^{-1}\|f\|_{L^p}$. 若 $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, $1/r = 1/p + 1/q$, 则对 $\alpha \in L^q$ 和 $f \in L^p$,

$$\|S_\varepsilon(\alpha f) - \alpha S_\varepsilon f\|_{L^r} \rightarrow 0, \quad \|\tilde{S}_\varepsilon(\alpha f) - \alpha \tilde{S}_\varepsilon f\|_{L^r} \rightarrow 0.$$

此外, 对 $p < +\infty$, $S_\varepsilon f \rightarrow f$ 和 $\tilde{S}_\varepsilon f \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$.

Proof: 支集与光滑性来自核的支集性质和式(3.12). 式(3.16)–(3.20)表明两算子的绝对值由卷积的凸组合控制, 从而由 Jensen 不等式得到式(3.21). 对式(3.20)求导得

$$\begin{aligned} \nabla S_\varepsilon f(y) &= \sum_i \nabla(\beta_\varepsilon \psi_i)(y) \int_{\Omega} f(x) \eta_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx \\ &\quad + \sum_i \beta_\varepsilon(y) \psi_i(y) \int_{\Omega} f(x) (\nabla \eta)_\varepsilon(y - x + \varepsilon \nu_i) dx. \end{aligned} \quad (3.22)$$

由 Young 不等式即得梯度界. 收敛性先对 $C_c^0(\Omega)$ 验证, 再用稠密性和一致算子界推广. 交换子收敛也先对连续有界的 α 验证, 再以 L^q 逼近并使用 Hölder 与 Young 不等式. ■

Proposition 2.9: 若 Ω 是边界紧的 Lipschitz 区域, 则每个 $f \in W^{1,\infty}(\Omega)$ 几乎处处等于一个 Lipschitz 连续函数, 且

$$\text{Lip}(S_\varepsilon f) \leq C\|f\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}, \quad (3.23)$$

因而 $\text{Lip}(f) \leq C\|f\|_{W^{1,\infty}(\Omega)}$.

Proof: 在式(3.22)的末项中分部积分, 并使用单位分解, 得到式(3.23). 由 Proposition 2.8, $S_\varepsilon f \rightarrow f$ 于每个有限 L^p 空间. 一致 Lipschitz 界和逐点子列极限给出所需代表元. ■

Theorem 2.10:

设 $k \geq 1$, $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, $1/r = 1/p + 1/q$, 且 $\alpha_j \in W^{1,q}(\Omega)^k$. 定义

$$Du = \sum_{j=1}^d \frac{\partial}{\partial x_j} (\alpha_j \cdot u), \quad u \in L^p(\Omega)^k. \quad (3.24)$$

则

$$\|S_\varepsilon Du - DS_\varepsilon u\|_{L^r} \leq C\|u\|_{L^p}\|\alpha\|_{W^{1,q}}, \quad (3.25)$$

且该交换子在 $L^r(\Omega)$ 中趋于零.

Remark 2.4: 相同结论对局部 Sobolev 系数和局部 Lebesgue 空间仍成立.

Theorem 2.11:

若 Ω 是边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$, $m \geq 1$, 则 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Proof: 只写 $m = 1$ 的情形. 在 Theorem 2.10 中取 $\alpha_j = \delta_{j\ell}$, 得 $\partial_\ell S_\varepsilon u \rightarrow \partial_\ell u$ 于 L^p . 再结合 $S_\varepsilon u \rightarrow u$ 即得结论. 高阶情形逐阶应用同一交换子估计. ■

Remark 2.5: 若 $u \geq 0$, 可取非负的光滑逼近; 若 $u \in L^\infty$, 逼近还可保持一致 L^∞ 界.

Proof: [Theorem 2.10 的证明] 将 $R_\varepsilon = S_\varepsilon Du - DS_\varepsilon u$ 展开为单位分解各项. 零阶项满足

$$R_{\varepsilon,0} \longrightarrow \sum_{i,j} (\alpha_j \psi_i) \cdot u = \sum_j \alpha_j \cdot u \quad \text{于 } L^r, \quad (3.26)$$

且

$$\|R_{\varepsilon,0}\|_{L^r} \leq C\|u\|_{L^p} \sum_j \|\alpha_j\|_{W^{1,q}}. \quad (3.27)$$

其余项利用平移估计、Hölder 不等式及核的一阶矩得到

$$\|R_{\varepsilon,j}\|_{L^r} \leq C\|u\|_{L^p} \|\nabla \alpha_j\|_{L^q}, \quad (3.28)$$

以及

$$R_{\varepsilon,j} \longrightarrow -u \cdot \frac{\partial \alpha_j}{\partial x_j} \quad \text{于 } L^r. \quad (3.29)$$

合并各项即有

$$\|R_\varepsilon(u, \alpha)\|_{L^r} \leq C\|u\|_{L^p}\|\alpha\|_{W^{1,q}}, \quad (3.30)$$

并且对光滑 u, α 可直接验证 $R_\varepsilon \rightarrow 0$. 再分别以光滑函数逼近 u 和 α , 使用式(3.30), 即得一般情形. ■

Remark 2.6: 上述稠密性论证要求 p, q, r 有限; 端点情形需另行处理.

Theorem 2.12:

在 Theorem 2.10 的假设下, 若 $u \in L^p(\Omega)^k$ 且 $D\bar{u} \in L^r(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\|\tilde{S}_\varepsilon Du - D\tilde{S}_\varepsilon u\|_{L^r(\Omega)} \rightarrow 0, \quad D\tilde{S}_\varepsilon u \rightarrow Du.$$

这里 $D\bar{u} = f$ 表示

$$-\int_\Omega \alpha_j(x) \cdot u(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) dx = \int_\Omega f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d). \quad (3.31)$$

Proof: 用式(3.31)测试由外移核构造的函数. 核中法向平移的符号与 S_ε 相反, 计算恰好化为 Theorem 2.10 的交换子估计, 因而结论成立. ■

3.2.3 变量替换

Theorem 2.13:

设 $\Omega, \tilde{\Omega}$ 为 Lipschitz 区域, $m \geq 1$, 且 $T : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 为同胚, 满足 $T \in C^{m-1,1}(\tilde{\Omega})^d$, $T^{-1} \in C^{m-1,1}(\Omega)^d$, 并且到 m 阶的导数均有界. 则

$$u \in W^{m,p}(\Omega) \iff u \circ T \in W^{m,p}(\tilde{\Omega}),$$

且存在与 u 无关的 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leq \|u \circ T\|_{W^{m,p}(\tilde{\Omega})} \leq C_2 \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

Proof: 对光滑函数应用链式法则和变量替换公式, 并利用 T, T^{-1} 的 Jacobian 与导数界. 再由 Theorem 2.11 逼近一般 u . 高阶情形重复链式法则. ■

3.2.4 延拓算子

目标是构造与 p 无关的线性算子 E_Ω , 对 $1 < p < +\infty$ 满足

$$E_\Omega : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^d) \quad \text{连续}, \quad (3.32)$$

$$(E_\Omega u)|_\Omega = u, \quad (3.33)$$

$$(E_\Omega u)|_{\Omega^c} = 0, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega). \quad (3.34)$$

Remark 2.7: 当 $p = 1$ 时, 同时满足式(3.32)–(3.34)的算子一般不存在; 但可构造满足前两式的延拓.

在平坦半空间中, 对 $u \in C^{0,1}(\mathbb{R}_+^d)$ 定义

$$[E_{\mathbb{R}_+^d} u](x) = \begin{cases} u(x), & x \in \mathbb{R}_+^d, \\ \varphi(x_d) \int_B u(\bar{x} - x_d z, 0) \eta(z) dz, & x \in \mathbb{R}_-^d, \end{cases}$$

其中 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\varphi(0) = 1$.

Proposition 2.14: 对 $1 < p < +\infty$, $E_{\mathbb{R}_+^d}$ 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 恒等性质显然. 对 $u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^d})$, Fubini 定理、Jensen 不等式和一维 Hardy 不等式给出

$$\|E_{\mathbb{R}_+^d} u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}.$$

其中切向导数通过 $\int_B \partial_{z_i} \eta = 0$ 写成差商, 法向导数同理处理. 利用 Theorem 2.11 的稠密性即可唯一延拓到整个 $W^{1,p}$, 并保持零延拓性质. ■

Proposition 2.15: 对 Proposition 1.3 中的微分同胚 T_a , 定义

$$E_{H_a} u = [E_{\mathbb{R}_+^d}(u \circ T_a)] \circ T_a^{-1}.$$

则 E_{H_a} 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 由 Proposition 1.3、Theorem 2.13 和 Proposition 2.14 立即得到. ■

Theorem 2.16:

令 (U_i) 为边界覆盖, (ψ_i) 为单位分解, $R_i H_{a_i}$ 为相应局部半空间. 定义

$$E_\Omega u = \sum_i [E_{H_{a_i}}((u\psi_i) \circ R_i^{-1})] \circ R_i.$$

则 E_Ω 满足式(3.32)–(3.34).

Proof: 每个 $u\psi_i$ 支持于 $\Omega \cap U_i = R_i H_{a_i} \cap U_i$. 将其旋转后在 H_{a_i} 外延拓为零, 其 $W^{1,p}$ 范数由 $\|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$ 控制. 对有限个局部延拓求和即得结论. ■

3.2.5 迹与迹提升算子

迹算子 Proposition 2.17: 设 $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C > 0$, 使每个紧支的 $\varphi \in C^{0,1}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\|\varphi|_{\partial\mathbb{R}_+^d}\|_{L^p(\partial\mathbb{R}_+^d)} \leq C \|\varphi\|_{L^p(\mathbb{R}_+^d)}^{1-1/p} \|\varphi\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^d)}^{1/p}.$$

Proof: 先取 $\varphi \in C_c^\infty$. 对 $x = (\bar{x}, x_d)$ 使用微积分基本定理,

$$|\varphi(\bar{x}, 0)|^p = -p \int_0^{+\infty} |\varphi|^{p-2} \varphi \partial_{x_d} \varphi \, ds.$$

对 $\bar{x}$ 积分并应用 Hölder 不等式即得结论. 一般情形由光滑逼近得到. ■

Proposition 2.18: 设 H_a 为 Lipschitz 半空间, $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C_a > 0$, 使每个紧支 Lipschitz 函数 φ 满足

$$\|\varphi|_{\partial H_a}\|_{L^p(\partial H_a)} \leq C_a \|\varphi\|_{L^p(H_a)}^{1-1/p} \|\varphi\|_{W^{1,p}(H_a)}^{1/p}.$$

Proof: 对 $\varphi \circ T_a$ 应用 Proposition 2.17, 再用 Theorem 2.13 及边界面积元 $J_a(\bar{x}) \, d\bar{x}$ 的上下界. ■

Theorem 2.19:

设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$. 存在 $C > 0$ 使

$$\|\varphi|_{\partial\Omega}\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|\varphi\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|\varphi\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{1/p}, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d).$$

因而存在唯一连续线性算子

$$\gamma_0 : W^{1,p}(\Omega) \longrightarrow L^p(\partial\Omega),$$

它在 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 上等于边界限制, 称为迹算子.

Remark 2.8: Theorem 2.46 将证明 $\ker \gamma_0 = W_0^{1,p}(\Omega)$.

Proof: 取边界的有限开覆盖及单位分解, 对每个 $\varphi\psi_i$ 旋转到 Lipschitz 半空间并应用 Proposition 2.18. 对有限项求和即得估计; 再利用 Theorem 2.11 延拓算子. ■

Definition 2.20: 设 $1 < p < +\infty$. 定义

$$W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) = \gamma_0(W^{1,p}(\Omega)), \quad \|v\|_{W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)} = \inf_{\substack{u \in W^{1,p}(\Omega) \\ \gamma_0 u = v}} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

这是 Banach 空间.

Remark 2.9: 此空间只依赖流形 $\partial\Omega$, 不依赖选取边界哪一侧的区域. 它也可由边界图上的分数 Sobolev 范数内蕴定义. 当 $p = 1$ 时约定 $W^{0,1}(\partial\Omega) = L^1(\partial\Omega)$.

Theorem 2.21:

在 Definition 2.20 的记号下:

- γ_0 从 $W^{1,p}(\Omega)$ 连续满射到 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$;
- $C^{0,1}(\partial\Omega)$ 包含且稠密于 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$;
- $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 稠密于 $L^p(\partial\Omega)$.

Proof: 第一点由范数定义得到. 对 $v = \gamma_0 u$, $S_\varepsilon u$ 的迹为 Lipschitz 函数, 并在迹空间中趋于 v , 得第二点. 第三点由 Lipschitz 函数在 $L^p(\partial\Omega)$ 中稠密得到. ■

对 $\varphi \in W^{1,p'}(\Omega)$ 和 $\Phi \in W^{1,p}(\Omega)^d$, Stokes 公式延拓为

$$\int_{\Omega} \varphi \operatorname{div} \Phi \, dx + \int_{\Omega} \Phi \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\partial\Omega} \gamma_0(\varphi)(\gamma_0(\Phi) \cdot \nu) \, d\sigma. \quad (3.35)$$

迹提升算子 令 $\tilde{\Omega} = \Omega^c$. 用内外两个延拓算子定义

$$\tilde{R}_0 u = E_{\tilde{\Omega}}((E_{\Omega} u)|_{\tilde{\Omega}})|_{\Omega}.$$

由式(3.34), $\tilde{R}_0$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上为零, 因而只依赖 u 的迹.

Theorem 2.22:

[Lifting operator] 设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 < p < +\infty$. 存在线性连续算子

$$R_0 : W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \longrightarrow W^{1,p}(\Omega), \quad \gamma_0 \circ R_0 = \operatorname{Id}.$$

Proof: 对 $v = \gamma_0 u$ 定义 $R_0 v = \tilde{R}_0 u$. 定义与代表元无关. 连续性由

$$\|R_0 v\|_{W^{1,p}} \leq \|\tilde{R}_0\| \|u\|_{W^{1,p}}$$

并对所有满足 $\gamma_0 u = v$ 的 u 取下确界得到. ■

Remark 2.10: 当 $p = 1$ 时不存在这样的连续线性提升, 但存在从 $L^1(\partial\Omega)$ 到 $W^{1,1}(\Omega)$ 的连续非线性提升.

高阶迹 对 $k \geq 1$ 和 $1 < p < +\infty$, 定义 $W^{k-1/p,p}(\partial\Omega) = \gamma_0(W^{k,p}(\Omega))$. 若 Ω 为 $C^{k-1,1}$ 区域, 则 R_0 连续映入 $W^{k,p}(\Omega)$. 关键估计是

$$\|(E_\Omega u)|_{\Omega^c}\|_{W^{k,p}(\Omega^c)} \leq C \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)}. \quad (3.36)$$

Remark 2.11: 一般不能断言 $E_\Omega u \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$; 可构造具有该性质但不满足式(3.34)的其他延拓算子.

若 Ω 为 $C^{1,1}$ 区域, 对 $u \in W^{2,p}(\Omega)$ 定义 $\gamma_\nu(u) = \gamma_0(\nabla u) \cdot \nu$.

Theorem 2.23:

设 Ω 为边界紧的 $C^{1,1}$ 区域. 存在连续线性算子

$$R_\nu : W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \longrightarrow W^{2,p}(\Omega)$$

满足 $\gamma_\nu \circ R_\nu = \text{Id}$ 且 $\gamma_0 \circ R_\nu = 0$.

其证明推迟到 Section 3.3.3.

Remark 2.12: 因而

$$R(g_0, g_1) = R_0 g_0 + R_\nu(g_1 - \gamma_\nu(R_0 g_0))$$

同时满足 $\gamma_0 R(g_0, g_1) = g_0$ 和 $\gamma_\nu R(g_0, g_1) = g_1$.

3.2.6 Sobolev 空间的对偶理论

对 $m \geq 1$ 定义

$$W^{-m,p'}(\Omega) = \left\{ u \in \mathcal{D}'(\Omega) : u = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha, f_\alpha \in L^{p'}(\Omega) \right\}, \quad (3.37)$$

并赋予商范数

$$\|u\|_{W^{-m,p'}} = \inf_{u = \sum \partial^\alpha f_\alpha} \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|f_\alpha\|_{L^{p'}}^{p'} \right)^{1/p'}, \quad (3.38)$$

$p' = +\infty$ 时以相应的上确界代替求和范数.

Theorem 2.24:

对所有 $m \geq 1$:

1. $W^{-m,p'}(\Omega)$ 是 Banach 空间;
2. 若 $1 < p \leq +\infty$, 则 $W^{-m,p'}(\Omega)'$ 与 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 同构;
3. 若 $1 \leq p < +\infty$, 则 $W_0^{m,p}(\Omega)'$ 与 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 同构.

Proof: 令 $\Phi : (L^{p'}(\Omega))^{N_m} \rightarrow W^{-m,p'}(\Omega)$ 把 (f_α) 映到 $\sum \partial^\alpha f_\alpha$. 该映射连续满射, 式(3.38)正是商空间范数, 故像空间完备. 对 Φ 取伴随并识别 $(L^{p'})'$ 与 L^p , 可知消去 $\ker \Phi$ 的泛函恰对应 $(\partial^\alpha v)_{|\alpha| \leq m}$, 其中 $v \in W_0^{m,p}(\Omega)$. 这给出后两项同构. ■

相应对偶作用写为

$$\left\langle \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha, \varphi \right\rangle = \int_\Omega \sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} f_\alpha \partial^\alpha \varphi \, dx. \quad (3.39)$$

并且

$$\|u\|_{W^{-m,p'}} = \sup_{0 \neq \varphi \in W_0^{m,p}(\Omega)} \frac{\langle u, \varphi \rangle}{\|\varphi\|_{W_0^{m,p}}}. \quad (3.40)$$

Remark 2.13: 式(3.40)在 $p = +\infty$ 时仍成立. 当 $p = 2$ 时, 由此得到 $H^{-m}(\Omega)$ 的 Hilbert 范数.

Definition 2.25: 对边界紧的 Lipschitz 区域和 $1 \leq p < +\infty$, 定义

$$W^{-1/p',p'}(\partial\Omega) = W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)'.$$

当 $p = 1$ 时约定 $W^{0,\infty}(\partial\Omega) = L^\infty(\partial\Omega)$.

Proposition 2.26: 对 $f \in W^{-1,p}(\Omega)$, $1 \leq p < +\infty$, 有

$$\|S_\varepsilon f - f\|_{W^{-1,p}} \rightarrow 0.$$

Proof: 写 $f = g_0 + \sum_j \partial_j g_j$, 其中 $g_j \in L^p$. Proposition 2.8 处理 g_0 ; 对导数项加入并减去 $\partial_j S_\varepsilon g_j$, 再用 Theorem 2.10 和 $S_\varepsilon g_j \rightarrow g_j$. ■

Remark 2.14: 因此 $C_c^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W^{-1,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 2.27:

设 $\alpha_j \in \mathbb{R}^k$ 为常向量, 并定义 $Df = \sum_j \partial_j (\alpha_j \cdot f)$. 对 $f \in W^{-1,p}(\Omega)^k$,

$$\|S_\varepsilon Df - DS_\varepsilon f\|_{W^{-1,p}} \rightarrow 0.$$

特别地, 若 $Df \in W^{-1,p}$, 则 $DS_\varepsilon f \rightarrow Df$ 于 $W^{-1,p}$.

Proof: 先对光滑 f 使用 Theorem 2.10 的计算, 再由 Proposition 2.26 稠密逼近. 以 $W_0^{1,p'}$ 的测试函数估计每个交换子项即可保持一致界. ■

3.2.7 平移估计

Definition 2.28: 对 $h \in \mathbb{R}^d$, 定义 $\tau_h f(x) = f(x+h)$ 和 $\delta_h f = \tau_h f - f$.

Theorem 2.29:

设 Ω 为任意开集, $1 \leq p \leq +\infty$. 对 $h \in \mathbb{R}^d$ 和 $f \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$\|\tau_h f - f\|_{L^p(\Omega_{2|h|})} \leq |h| \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)}.$$

Proof: 以截断函数把 f 延拓为 $g \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d)$, 在 $\Omega_{2|h|}$ 上 $g = f$. 对光滑逼近 g_ε 使用

$$g_\varepsilon(x+h) - g_\varepsilon(x) = \int_0^1 \nabla g_\varepsilon(x+th) \cdot h \, dt,$$

再用 Jensen 不等式积分并令 $\varepsilon \rightarrow 0$. ■

Lemma 2.30: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\int \tau_h(f)g = \int f\tau_{-h}(g), \quad \int \delta_h(f)g = \int f\delta_{-h}(g).$$

Proof: 作仿射变量替换即可. ■

Lemma 2.31: 设 $k \geq 0$, $f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d)$. 则

$$\|\delta_h f\|_{W^{k-1,p}} \leq |h| \|\nabla f\|_{W^{k-1,p}} \leq |h| \|f\|_{W^{k,p}}.$$

Proof: $k \geq 1$ 时应用 Theorem 2.29 于每个弱导数. $k = 0$ 时用 Lemma 2.30 和 $W^{1,p'}$ 对偶性. ■

对标准基 (e_i) 定义

$$|||f|||_{k+1,p} = \|f\|_{W^{k,p}} + \sum_{i=1}^d \sup_{0 < h < 1} \frac{1}{h} \|\delta_{he_i} f\|_{W^{k,p}}.$$

Proposition 2.32: 有

$$W^{k+1,p}(\mathbb{R}^d) = \{f \in W^{k,p}(\mathbb{R}^d) : |||f|||_{k+1,p} < +\infty\},$$

且 $\|\nabla f\|_{W^{k,p}} \leq |||f|||_{k+1,p}$.

Proof: 正向由 Lemma 2.31 得到. 反向中, 差商族 $\delta_{he_i} f/h$ 在 $W^{k,p}$ 中有界, 取弱收敛子列. Lemma 2.30 表明其分布极限为 $\partial_i f$, 因而 $\partial_i f \in W^{k,p}$; 再由范数的弱下半连续性得到估计. ■

3.2.8 Sobolev 嵌入

Definition 2.33: 对 $1 \leq p \leq +\infty$, 定义临界指数 p^* 为

$$\frac{1}{p^*} = \frac{1}{p} - \frac{1}{d} \quad (p < d), \quad 1 \leq p^* < +\infty \quad (p = d), \quad p^* = +\infty \quad (p > d).$$

Theorem 2.34:

[Sobolev embeddings] 设 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 中的有界 Lipschitz 区域.

1. 若 $1 \leq p < +\infty$ 且 $1 \leq q \leq p^*$, 则

$$W^{1,p}(\Omega) \subset L^q(\Omega), \quad (3.41)$$

当 $q < p^*$ 时嵌入紧. 若 $d < p \leq +\infty$ 且 $0 \leq \alpha \leq 1 - d/p$, 则

$$W^{1,p}(\Omega) \subset C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}), \quad (3.42)$$

当 $\alpha < 1 - d/p$ 时嵌入紧.

2. 对 $1 \leq q < d'$, 有 $L^1(\Omega) \subset W^{-1,q}(\Omega)$; 对 $1 < p < d$, 有 $L^p(\Omega) \subset W^{-1,p^*}(\Omega)$; 对 $p \geq d$, 有 $L^p(\Omega) \subset W^{-1,\infty}(\Omega)$.

Proof: 由延拓算子只需证明全空间结论. 当 $p = 1$ 时, 对 $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 逐坐标积分并用 Hölder 不等式, 得

$$\|u\|_{L^{d/(d-1)}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.43)$$

对一般 $1 < p < d$, 将式(3.43)应用于 $v = |u|^\gamma$, 取 $\gamma = p(d-1)/(d-p)$, 得

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^d)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.44)$$

其余 q 由插值得到. 紧性利用有限覆盖、平移估计 Theorem 2.29 和 Riesz–Fréchet–Kolmogorov 判据. 当 $p > d$ 时, 对 $q > d$ 先有

$$W_0^{1,q}(\Omega) \subset W^{1,q}(\Omega) \subset L^\infty(\Omega), \quad (3.45)$$

再由局部平均与梯度估计得到 Hölder 连续性. 第二部分对第一部分取对偶即得. ■

Remark 2.15: 局部嵌入对任意 Lipschitz 区域均成立. 对 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, 其局部正则性由截断 φu 与全空间嵌入得到.

Remark 2.16: 当 $p < d$ 时, 临界嵌入 $W^{1,p} \subset L^{p^*}$ 连续但一般不紧; 平移或缩放序列给出典型反例.

Proposition 2.35: 设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $p \leq q \leq p^*$. 存在 $C > 0$ 使

$$\|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{L^p}^{1+d/q-d/p} \|u\|_{W^{1,p}}^{d/p-d/q}, \quad u \in W^{1,p}(\Omega).$$

Proof: 延拓到全空间. 对 $v_\alpha(x) = u(\alpha x)$ 应用 Sobolev 嵌入,

$$\|v_\alpha\|_{L^q} \leq C (\|v_\alpha\|_{L^p} + \|\nabla v_\alpha\|_{L^p}). \quad (3.46)$$

代入各范数的缩放律并优化 α 即得断言. ■

Remark 2.17: 若全空间中 u 具有足够衰减, 可在估计右端只保留梯度半范数; 有界区域则必须保留低阶项.

Theorem 2.36:

设 $1 < p < d$. 对

$$p \leq r \leq \frac{p(d-1)}{d-p}$$

有 $W^{1-1/p,p}(\partial\Omega) \subset L^r(\partial\Omega)$, 且

$$\|\gamma_0 u\|_{L^r(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{L^p(\Omega)}^{1-d/p+(d-1)/r} \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}^{d/p-(d-1)/r}. \quad (3.47)$$

当 $p = d$ 时, 结论对每个 $p \leq r < +\infty$ 成立.

Proof: 在平坦半空间中沿法向对 $|\varphi|^r$ 使用微积分基本定理, 再依次应用 Hölder 与 Proposition 2.35. Lipschitz 半空间通过 T_a 变量替换处理, 一般区域再由有限覆盖和单位分解得到. ■

Remark 2.18: 这说明迹空间严格嵌入适当的边界 Lebesgue 空间. 端点指数对应临界迹嵌入.

Theorem 2.37:

[Product theorem] 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界 Lipschitz 区域.

1. 若 $1 \leq p \leq q \leq +\infty$ 且 $1/q^* + 1/p \leq 1$, 令 $1/t = 1/q^* + 1/p$, 则乘法从 $W^{1,p} \times W^{1,q}$ 连续映到 $W^{1,t}$.
2. 若 $1/p + 1/q \leq 1$, 令 $1/t_1 = 1/p^* + 1/q^*$, 则乘法从 $W^{1,p} \times W^{-1,q}$ 连续映到 $W^{-1,\sigma}$; 当 $1/p + 1/q = 1$ 且 $p \leq 3$ 时取任意 $\sigma < t_1$, 其余情形可取 $\sigma \leq t_1$.

Proof: 第一项由 Sobolev 嵌入、Hölder 不等式及分布恒等式

$$\frac{\partial(uv)}{\partial x_i} = u \frac{\partial v}{\partial x_i} + v \frac{\partial u}{\partial x_i} \quad (3.48)$$

得到. 对第二项写 $v = v_0 + \sum_{j=1}^3 \partial_j v_j$, 并定义

$$uv = uv_0 + \sum_j \partial_j(uv_j) - \sum_j v_j \partial_j u.$$

逐项使用第一项、Theorem 2.34 及负阶 Sobolev 嵌入即可得到所列指数; 临界 L^1 情形必须损失端点. ■

3.2.9 Poincaré 与 Hardy 不等式

Proposition 2.38: [Generalised Poincaré inequality] 设 Ω 为有界连通 Lipschitz 区域, $\Gamma_1 \subset \partial\Omega$ 的表面测度非零, 且

$$W_{0,\Gamma_1}^{1,p}(\Omega) = \{u \in W^{1,p}(\Omega) : \gamma_0 u|_{\Gamma_1} = 0\}.$$

则 $\|u\|_{L^p} \leq C\|\nabla u\|_{L^p}$ 对所有 $u \in W_{0,\Gamma_1}^{1,p}$ 成立.

Proof: 非零表面测度等价于

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{1}_{\Gamma_1} d\sigma > 0. \quad (3.49)$$

若结论不成立, 归一化可取 $\|u_n\|_{L^p} = 1$ 且 $\|\nabla u_n\|_{L^p} \rightarrow 0$. 紧 Sobolev 嵌入给出 $u_n \rightarrow u$ 于 L^p , 因而

$$\|u\|_{L^p} = 1. \quad (3.50)$$

但 $\nabla u = 0$, 连通性推出 u 为常数; 零迹与式(3.49)又推出该常数为零, 与式(3.50)矛盾. ■

Proposition 2.39: [Poincaré–Wirtinger inequality] 设 Ω 有界、连通且为 Lipschitz 区域. 则

$$\left\| u - \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u dx \right\|_{W^{1,p}} \leq C\|\nabla u\|_{L^p}.$$

等价地, $\|u\|_{L^p} \leq C(\|\nabla u\|_{L^p} + |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u)$.

Proof: 沿用 Proposition 2.38 的紧性反证法. 极限函数梯度为零而均值为零, 因而只能为零, 与归一化矛盾. ■

Proposition 2.40: [Hardy inequality in $W_0^{1,p}(\Omega)$] 设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 < p < +\infty$, $\delta(x) = d(x, \partial\Omega)$. 则

$$\left\| \frac{u}{\delta} \right\|_{L^p(\Omega)} \leq C\|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad u \in W_0^{1,p}(\Omega).$$

该结论在 $p = 1$ 时不成立.

Proof: 在 $\mathbb{R}_+^d$ 上对 $u(\bar{x}, x_d)/x_d$ 应用一维 Hardy 不等式. 对 H_a 使用 T_a 变量替换, 并由 Lipschitz 性证明 $|(T_a^{-1}x)_d| \leq C\delta(x)$. 一般区域取更细覆盖, 使

$$\delta(x) = d(x, \partial\Omega) = d(x, R_{\sigma_i}\partial H_{a_i}), \quad x \in U_i \cap \Omega. \quad (3.51)$$

对单位分解的每一项应用半空间结论; 内部项由 $\inf_{U_0} \delta > 0$ 控制. 求和后再用 Proposition 2.38 消去低阶项. ■

Corollary 2.41: 若 $f \in L^\infty(\Omega)$ 且 $\delta\nabla f \in L^\infty(\Omega)$, 则对 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 有 $fu \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 且

$$\|fu\|_{W_0^{1,p}} \leq C\|u\|_{W_0^{1,p}}.$$

Proof: 由稠密性只需考虑 $u \in \mathcal{D}(\Omega)$. 写 $\nabla(fu) = f\nabla u + (\delta\nabla f)(u/\delta)$, 再用 Proposition 2.40. ■

3.2.10 一阶微分算子的定义域

对式(3.24)中的 D , 定义

$$W_D^{p,r}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega)^k : Du \in L^r(\Omega)\}, \quad \|u\|_{W_D^{p,r}} = \|u\|_{L^p} + \|Du\|_{L^r}.$$

Theorem 2.42:

在 Theorem 2.10 的假设下, $W_D^{p,r}(\Omega)$ 是包含 $W^{1,p}(\Omega)^k$ 的 Banach 空间. 若 $p < +\infty$, 则 $C_c^\infty(\bar{\Omega})^k$ 在其中稠密.

Proof: 图范数 Cauchy 列分别在 L^p 与 L^r 中收敛; 分布闭性表明极限仍满足 $Du \in L^r$. 稠密性由 $S_\varepsilon u \rightarrow u$ 及 Theorem 2.10 得到. ■

Theorem 2.43:

设 $1 < p \leq +\infty$, $q \geq p'$, $(p, q) \neq (+\infty, +\infty)$, 并以

$$\frac{1}{\underline{t}} = \min \left(\frac{1}{p'}, \frac{1}{r'} + \frac{1}{d} \right)$$

定义 $\underline{t}$. 对每个 $t > \underline{t}$, 存在唯一连续线性算子 $\gamma_{\alpha,\nu} : W_D^{p,r}(\Omega) \rightarrow W^{-1/t',t'}(\partial\Omega)$, 使

$$\gamma_{\alpha,\nu}(u) = \gamma_0(u) \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu), \quad u \in W^{1,p}(\Omega)^k, \quad (3.52)$$

且对 $u \in W_D^{p,r}$, $\varphi \in W^{1,t}(\Omega)$ 有

$$\int_{\Omega} (Du)\varphi \, dx + \int_{\Omega} \sum_{j=1}^d (u \cdot \alpha_j) \partial_j \varphi \, dx = \langle \gamma_{\alpha,\nu} u, \gamma_0 \varphi \rangle. \quad (3.53)$$

除 $q = d$ 或 $q = p' > d$ 两种情形外, 还可取 $t = \underline{t}$.

Proof: 对光滑 u 由式(3.35)有

$$\int_{\Omega} (Du)\varphi + \int_{\Omega} \sum_j (u \cdot \alpha_j) \partial_j \varphi = \int_{\partial\Omega} \varphi u \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu) \, d\sigma. \quad (3.54)$$

令 $T_\varepsilon u = (S_\varepsilon u) \cdot (\gamma_0(\alpha)\nu)$. 对固定截断 $\theta = 1$ 于边界, 两个参数的差满足

$$\begin{aligned} |\langle T_{\varepsilon_1} u - T_{\varepsilon_2} u, \gamma_0 \varphi \rangle| &\leq \|DS_{\varepsilon_1} u - DS_{\varepsilon_2} u\|_{L^r} \|\theta \varphi\|_{L^{r'}} \\ &\quad + \sum_j \|(S_{\varepsilon_1} u - S_{\varepsilon_2} u) \alpha_j (|\theta| + |\nabla \theta|)\|_{L^{t'}} \|\varphi\|_{W^{1,t}}. \end{aligned} \quad (3.55)$$

Sobolev 嵌入与 Proposition 2.8 说明右端趋于零, 因而 $T_\varepsilon u$ 在目标负阶迹空间中收敛. 其极限定义 $\gamma_{\alpha,\nu} u$, 并由式(3.54)得到式(3.53). 两个例外恰对应所用的临界 L^∞ 嵌入失效. ■

Definition 2.44: 定义 $W_{D,0}^{p,r}(\Omega)$ 为 $\mathcal{D}(\Omega)^k$ 在 $W_D^{p,r}(\Omega)$ 中的闭包.

Theorem 2.45:

对 $u \in W_D^{p,r}(\Omega)$,

$$u \in W_{D,0}^{p,r}(\Omega) \iff u \in \ker \gamma_{\alpha,\nu} \iff \bar{u} \in W_D^{p,r}(\mathbb{R}^d).$$

Proof: 紧支光滑函数的广义法向迹为零, 连续性给出第一包含. 若迹为零, 式(3.53)表明

零延拓的分布导数等于 $\overline{Du} \in L^r$, 故零延拓属于全空间图空间. 反之, 对零延拓应用 Theorem 2.12, $\tilde{S}_\varepsilon \bar{u} \in \mathcal{D}(\Omega)^k$ 在图范数中趋于 u .

Theorem 2.46:

设 Ω 为边界紧的 Lipschitz 区域, $1 \leq p < +\infty$. 则

$$W^{1,p}(\Omega) = \bigcap_{i=1}^d W_{\partial_{x_i}}^{p,p}(\Omega), \quad (3.56)$$

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \bigcap_{i=1}^d W_{\partial_{x_i},0}^{p,p}(\Omega). \quad (3.57)$$

此外, 对 $u \in W^{1,p}(\Omega)$,

$$\gamma_0(u)\nu_i = \gamma_{\nu_i}(u), \quad i = 1, \dots, d, \quad (3.58)$$

且

$$\gamma_0(u) = \sum_{i=1}^d \gamma_{\nu_i}(u)\nu_i. \quad (3.59)$$

最后,

$$u \in W_0^{1,p}(\Omega) \iff u \in \ker \gamma_0 \iff \bar{u} \in W^{1,p}(\mathbb{R}^d).$$

Proof: 式(3.56)是定义. 对每个坐标导数应用 Theorem 2.45, 并使用同一个外移磨光算子, 得式(3.57). 在 Theorem 2.43 中取 $D = \partial_{x_i}$ 得式(3.58); 再由 $\sum_i \nu_i^2 = 1$ 得式(3.59). 最后的等价关系随即由式(3.57)与 Theorem 2.45得到.

3.3 区域边界附近的微积分

以下设 Ω 为边界 $\Gamma = \partial\Omega$ 紧的 $C^{k+1,1}$ 区域.

3.3.1 边界的局部坐标图描述

Proposition 3.1: [Definition and existence of local charts] 对每个 $\sigma \in \Gamma$, 存在包含 0 的凸开集 $U_\sigma \subset \mathbb{R}^{d-1}$ 、包含 σ 的开集 $V_\sigma \subset \mathbb{R}^d$ 和 $C^{k+1,1}$ 映射 $\varphi_\sigma : U_\sigma \rightarrow V_\sigma$, 使 $\varphi_\sigma(U_\sigma) = V_\sigma \cap \Gamma$, $\varphi_\sigma(0) = \sigma$, 且

$$|u_1 - u_2| \leq C|\varphi_\sigma(u_1) - \varphi_\sigma(u_2)|. \quad (3.60)$$

称 $(U_\sigma, \varphi_\sigma)$ 为 Γ 在 σ 附近的局部坐标图. 坐标图可相容选取, 即重叠区上的转移映射 $\varphi_{\sigma_1}^{-1} \circ \varphi_{\sigma_2}$ 为 $C^{k+1,1}$ 微分同胚. 常数 C 可由 Γ 的有限坐标图覆盖统一选取.

Proof: 把 Definition 1.2 的边界图旋转后写成 $u \mapsto R_\sigma(u, a_\sigma(u))$. Lipschitz 逆估计给出式(3.60); 坐标转移的正则性由逆函数定理得到.

Definition 3.2: 在坐标图 (U, φ) 中, 定义第一基本形式的矩阵

$$g(u) = (g_{ij}(u))_{1 \leq i,j \leq d-1}, \quad g_{ij}(u) = \langle \partial_{u_i} \varphi(u), \partial_{u_j} \varphi(u) \rangle.$$

Proposition 3.3: 若 $\sigma = \varphi(u)$ 且 $F = \sum_i f_i \partial_{u_i} \varphi(u) \in T_\sigma \Gamma$, 则

$$|F|^2 = {}^t f, g(u) f, \quad f = g(u)^{-1} (\langle F, \partial_{u_i} \varphi(u) \rangle)_i.$$

Corollary 3.4: $g(u)$ 正定, 因而可逆且 $\det g(u) > 0$.

3.3.2 到边界的距离与投影

定义 $\psi_0(\sigma, s) = \sigma - s\nu(\sigma)$.

Theorem 3.5:

存在 $\gamma, C > 0$, 使

$$|\sigma_1 - \sigma_2| + |s_1 - s_2| \leq C |\psi_0(\sigma_1, s_1) - \psi_0(\sigma_2, s_2)|, \quad (3.61)$$

对 $\sigma_i \in \Gamma, |s_i| < \gamma$ 成立. 此外 $\psi_0(\Gamma \times (0, \gamma)) = O_\gamma$, 且 $\psi_0(\Gamma \times (-\gamma, 0)) \subset \Omega^c$.

Proof: 有限坐标图上的 Taylor 展开与法向正交性给出

$$|\langle \sigma_2 - \sigma_1, \nu(\sigma_1) \rangle| \leq C |\sigma_1 - \sigma_2|^2. \quad (3.62)$$

若式(3.61)失败, 可取序列使

$$n^{-1}(|\sigma_1^n - \sigma_2^n| + |s_1^n - s_2^n|) > |\psi_0(\sigma_1^n, s_1^n) - \psi_0(\sigma_2^n, s_2^n)|. \quad (3.63)$$

紧性和式(3.62)推出

$$|s_1^n - s_2^n| \leq C (|\sigma_1^n - \sigma_2^n|^2 + |s_1^n| |\sigma_1^n - \sigma_2^n|), \quad (3.64)$$

这与式(3.63)矛盾. 双射性和像集描述由法向线段与符号距离的定义得到. ■

因此存在唯一投影 $P_0 : O_\gamma \rightarrow \Gamma$, 满足

$$x = \psi_0(P_0(x), \delta(x)) = P_0(x) - \delta(x)\nu(P_0(x)). \quad (3.65)$$

若 Ω 为 $C^{1,1}$, 则 $P_0 \in C^{1,1}$, $\delta \in C^{2,1}$, 并有

$$\nabla \delta(x) = -\nu(P_0(x)), \quad (3.66)$$

以及

$$\partial_{x_i} P_0(x) = [I - \delta(x) d\nu(P_0(x))]^{-1} (e_i + \partial_{x_i} \delta(x) \nu(P_0(x))). \quad (3.67)$$

3.3.3 正则化距离

取磨光核 η 并令

$$G(x, \tau) = \int_B \delta \left(x + \frac{\tau}{2} z \right) \eta(z) dz.$$

G 关于 τ 的 Lipschitz 常数不超过 1/2, 故 Banach 不动点定理给出唯一函数 ρ 满足

$$\rho(x) = G(x, \rho(x)). \quad (3.68)$$

Definition 3.6: 称式(3.68)定义的 ρ 为 Ω 的正则化距离函数.

Proposition 3.7: $\rho(x) = 0 \iff \delta(x) = 0 \iff x \in \partial\Omega$, 且存在 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1 \leq \frac{\delta(x)}{\rho(x)} \leq C_2, \quad x \notin \partial\Omega. \quad (3.69)$$

$\rho \in C^{k+1,1}(\mathbb{R}^d) \cap C^\infty(\mathbb{R}^d \setminus \partial\Omega)$, 且 $|\partial^\alpha \rho(x)| \leq C/|\rho(x)|$ 当 $|\alpha| = k+3$. 在边界上 $\nabla \rho = \nabla \delta = -\nu$, 并且在边界的某邻域中 $|\nabla \rho|$ 有正下界.

Proof: 由固定点方程和 $\text{Lip}(\delta) = 1$ 得 $|\rho - \delta| \leq |\rho|/2$, 从而得到式(3.69). 隐函数定理给出边界外的光滑性; 对固定点方程求导并利用核的矩消失性质, 得到全局 $C^{k+1,1}$ 正则性和最高阶导数界. 在 $\rho = 0$ 处利用 η 的对称性即得 $\nabla \rho = \nabla \delta$. ■

Remark 3.1: $k+3$ 阶导数一般确会在边界附近增长, 否则边界将具有额外一级正则性.

Remark 3.2: 即使通常距离 δ 在边界附近足够光滑, 它在区域内部也可能不光滑, 因而全局计算中仍宜使用 ρ .

Proof: [Theorem 2.23 的证明] 对 $g \in W^{1-1/p,p}(\partial\Omega)$ 取 $\alpha \leq C_1$ 且 $\alpha \text{Lip}(\rho) < 1$, 定义

$$R_\nu g(x) = -\rho(x) \int_B (R_0 g)(x + \alpha \rho(x) z) \eta(z) dz.$$

微分并对核分部积分得到

$$\begin{aligned} \partial_{x_i} R_\nu g(x) = & -\partial_{x_i} \rho(x) \int_B (R_0 g)(x + \alpha \rho(x) z) \psi(z) dz \\ & - \frac{1}{\alpha^d \rho(x)^{d-1}} \int_{\mathbb{R}^d} \partial_{x_i} (R_0 g)(y) \eta\left(\frac{y-x}{\alpha \rho(x)}\right) dy, \end{aligned} \quad (3.70)$$

其中 $\psi = \eta - \text{div}(\eta z)$. Jensen 不等式和变量替换 $x \mapsto x + \alpha \rho(x) z$ 给出 $\|R_\nu g\|_{W^{2,p}} \leq C \|g\|_{W^{1-1/p,p}}$. 边界上 $\rho = 0$, $\nabla \rho = -\nu$, 因而 $\gamma_0 R_\nu = 0$, $\gamma_\nu R_\nu = g$. ■

3.3.4 $\partial\Omega$ 邻域的参数化

令 $O_{s_0}^\rho = \{0 < \rho < s_0\}$, $\Gamma_s = \{\rho = s\}$, 并定义 $\nu = -\nabla \rho / |\nabla \rho|$, $w_N = \langle w, \nu \rangle$, $w_T = w - w_N \nu$, 以及 $\tilde{\nu} = \nu / |\nabla \rho|$. 令 ζ 为流

$$\frac{d}{ds} \zeta(s, x) = \tilde{\nu}(\zeta(s, x)), \quad \zeta(0, x) = x. \quad (3.71)$$

则

$$\rho(\zeta(s, x)) = \rho(x) - s. \quad (3.72)$$

Proposition 3.8: $\zeta \in C^{k,1}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d)$, 并在 $E = \{(s, x) : x \in O_{s_0}^\rho, s < \rho(x)\}$ 中光滑. 当 $|\alpha| = k+2$ 时,

$$|\partial^\alpha \zeta(s, x)| \leq C |\ln(\rho(x) - s)|, \quad (3.73)$$

$$|\partial_s \partial^\alpha \zeta(s, x)| \leq \frac{C}{\rho(x) - s}. \quad (3.74)$$

Proof: 常微分方程正则性给出第一项. 对流方程求两次空间导数得到

$$\frac{d}{ds} \partial_{ij}^2 \zeta = \nabla \tilde{\nu}(\zeta) \partial_{ij}^2 \zeta + D^2 \tilde{\nu}(\zeta) [\partial_i \zeta, \partial_j \zeta]. \quad (3.75)$$

再用式(3.72)和 Gronwall 引理积分即可. ■

Proposition 3.9: 映射

$$\psi : (\sigma, s) \in \Gamma_{s_0} \times [0, s_0] \mapsto \zeta(s_0 - s, \sigma) \in O_{s_0}^\rho$$

为双射, 其逆为 $x \mapsto (P(x), \rho(x))$, 其中 $P(x) = \zeta(\rho(x) - s_0, x)$. ψ 在闭条带上为 $C^{k,1}$, 在 $s > 0$ 时光滑.

Proof: 式(3.72)给出 $\rho(\psi(\sigma, s)) = s$, 从而给出单射及逆映射公式. 流的群性质给出满射, 正则性由 Proposition 3.8 得到. ■

Remark 3.3: 对光滑 v ,

$$(\nabla_N v) \circ \psi = -\frac{1}{|\tilde{\nu}|} \partial_s (v \circ \psi). \quad (3.76)$$

Proposition 3.10: 对每个 $s \in [0, s_0]$, 存在 $J_s : \Gamma_{s_0} \rightarrow \mathbb{R}$, 使

$$\int_{\Gamma_s} v \, d\sigma = \int_{\Gamma_{s_0}} v \circ \psi(\sigma, s) J_s(\sigma) \, d\sigma.$$

Definition 3.11: 定义 $J(x) = J_{\rho(x)}(P(x))$.

Proposition 3.12: 对可积函数 v ,

$$\int_{O_{s_0}^\rho} v(x) \, dx = \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_s} |\tilde{\nu}| v \, d\sigma \, ds = \int_0^{s_0} \int_{\Gamma_{s_0}} |\tilde{\nu}| J(v \circ \psi) \, d\sigma \, ds.$$

J 在开条带内光滑; 当 $|\alpha| \leq k$ 时 $\partial^\alpha J \in L^\infty$, 当 $|\alpha| = k+1$ 时 $\partial^\alpha J / |\ln \rho|$ 与 $\rho \nabla_N \partial^\alpha J$ 有界.

Proof: 在每个坐标图中, J_s 是第一基本形式行列式之比的平方根. 对 $(u, s) \mapsto \psi(\varphi(u), s)$ 使用变量替换, 并利用式(3.71)计算 Jacobian. 正则性来自 Proposition 3.8. ■

Remark 3.4: 只需较低正则性时, 上述余面积公式仍可直接用于 Lipschitz 层面集.

Proposition 3.13: 设 Ω 为边界紧的 $C^{1,1}$ 区域, $1 < p < +\infty$. 则

$$\left\| \frac{u - (\gamma_0 u) \circ \psi(P(\cdot), 0)}{\rho} \right\|_{L^p(O_{s_0}^\rho)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}.$$

Proof: 沿 $s \mapsto \psi(P(x), s)$ 使用式(3.76), 对一维积分应用 Hardy 不等式, 再用 Proposition 3.12. ■

3.3.5 切向 Sobolev 空间

Theorem 3.14:

设 $0 \leq l \leq k+1$, $1 \leq p < +\infty$, 且 $f \in W^{l,p}(\Omega) \cap W_{\text{loc}}^{l+1,p}(\Omega)$. 则

$$f \in W^{l+1,p}(\Omega) \iff \nabla_T f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)^d, \nabla_N f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho).$$

Proof: 利用 $\nabla_N f = \langle \nabla f, \nu \rangle$ 和 $\nabla_T f = \nabla f - (\nabla_N f)\nu$, 结合 $\nu \in C^{k,1}$ 及 Leibniz 公式双向估计. ■

Definition 3.15: 若 $\nabla_T f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)^d$ 且 $\rho \nabla_N f \in W^{l,p}(O_{s_0}^\rho)$, 则称 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$.

Proposition 3.16: 若 $f \in W_{\text{tang}}^{l+1,p}(\Omega)$, 则对 $|\alpha| = l$, 有 $\partial^\alpha f \in W_{\text{tang}}^{1,p}(\Omega)$.

Proof: 对 $\partial^\alpha(\nabla_T f)$ 和 $\partial^\alpha(\rho \nabla_N f)$ 使用 Leibniz 公式, 并用 Proposition 3.7 控制 ρ 与法向场的高阶导数. ■

取满足

$$\theta \in C_c^{k+1,1}(\mathbb{R}^d)^d, \quad \theta \cdot \nu = 0 \text{ 于 } \partial\Omega, \quad |\partial^\alpha \theta(x)| \leq C/\rho(x) \text{ 当 } |\alpha| = k+2 \quad (3.77)$$

的向量场, 并定义其流 τ^θ 为

$$\partial_h \tau^\theta(h, x) = \theta(\tau^\theta(h, x)), \quad \tau^\theta(0, x) = x. \quad (3.78)$$

Lemma 3.17: 有

$$\langle \theta, \nu \rangle \in C^{k,1}(\overline{\Omega}), \quad (3.79)$$

以及

$$\frac{\langle \theta, \nu \rangle}{\rho} \in \begin{cases} L^\infty(\Omega), & k = 0, \\ C^{k-1,1}(\overline{\Omega}), & k \geq 1. \end{cases} \quad (3.80)$$

Proof: 第一式由乘积正则性得到. 因该内积在边界为零, 沿法向流积分并除以 ρ 即得第二式. ■

Proposition 3.18: 对 $|h| \leq 1$,

$$\|\nabla \tau^\theta(h) - I\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|, \quad (3.81)$$

$$\|\text{Jac } \tau^\theta(h) - 1\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|, \quad (3.82)$$

$$\|\rho \nabla \text{Jac } \tau^\theta(h)\|_{W^{k,\infty}} \leq C(\theta)|h|. \quad (3.83)$$

并且 $\tau^\theta(h, \Omega) = \Omega$.

Proof: 对流方程关于 x 微分并应用 Gronwall 引理. 另外

$$\partial_h \rho(\tau^\theta(h, x)) = \langle \nabla \rho, \theta \rangle(\tau^\theta(h, x)), \quad (3.84)$$

Lemma 3.17 给出 $\rho(\tau^\theta(h, x)) \asymp \rho(x)$, 即

$$\rho(\tau^\theta(h, x)) \geq C' \rho(x), \quad 0 < h < 1. \quad (3.85)$$

由此控制最高阶导数并证明流不穿越边界. ■

定义 $\tau_h^\theta f = f \circ \tau^\theta(h, \cdot)$, 并令

$$\{f, g\}_h = (\tau_h^\theta f)g - f \tau_{-h}^\theta g \operatorname{Jac}(\tau_{-h}^\theta), \quad (3.86)$$

以及 $|||f|||_{\theta, l+1, p} = \|f\|_{W^{l, p}} + \sup_{0 < h < 1} h^{-1} \|\tau_h^\theta f - f\|_{W^{l, p}}$.

Proposition 3.19: 对 $-1 \leq l \leq k+1$:

$$\sup_{0 < h < 1} \|\tau_h^\theta f\|_{W^{l, p}} \leq C(\theta) \|f\|_{W^{l, p}}, \quad (3.87)$$

$$\tau_h^\theta f \longrightarrow f \quad \text{于 } W^{l, p}(\Omega), \quad (3.88)$$

且

$$\left| \int_{\Omega} \{f, g\}_h \, dx \right| \leq C(\theta) |h| \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{p'}}, \quad (3.89)$$

边界积分也满足相同估计:

$$\left| \int_{\partial\Omega} \{f, g\}_h \, d\sigma \right| \leq C(\theta) |h| \|f\|_{L^p(\partial\Omega)} \|g\|_{L^{p'}(\partial\Omega)}. \quad (3.90)$$

若 $f \in W^{l+1, p}$, 则

$$\|\tau_h^\theta f - f\|_{W^{l, p}} \leq C(\theta) |h| \|f\|_{W^{l+1, p}}, \quad (3.91)$$

因而

$$|||f|||_{\theta, l+1, p} \leq C(\theta) \|f\|_{W^{l+1, p}}. \quad (3.92)$$

Proof: 正阶范数由链式法则和 Proposition 3.18 控制, 负一阶范数由变量替换和对偶性控制. 对光滑函数收敛显然, 一般情形用稠密性. 体积及边界交换子估计来自流的 Jacobian 估计. 最后利用

$$f(\tau^\theta(h, x)) - f(x) = h \int_0^1 \langle \nabla f(\tau^\theta(hu, x)), \theta(\tau^\theta(hu, x)) \rangle \, du \quad (3.93)$$

并对 l 归纳得到最后两式. ■

Theorem 3.20:

设 $1 < p < +\infty$, $0 \leq l \leq k+1$. 则

$$W_{\text{tang}}^{l+1, p}(\Omega) = \{f \in W^{l, p}(\Omega) : |||f|||_{\theta, l+1, p} < +\infty \text{ 对每个满足式(3.77)的 } \theta\}.$$

Proof: 在内部紧集上选取等于坐标向量的 θ , 则

$$\tau^\theta(h, x) = x + h e_i \quad (3.94)$$

并对截断 φ 有

$$(f\varphi)(\tau^\theta(h, x)) = (f\varphi)(x + h e_i). \quad (3.95)$$

由 Proposition 2.32 得局部 $W^{l+1, p}$ 正则性. 在边界条带中, 对所有切向场的差商弱极限给出切向导数, 而 Lemma 3.17 控制加权法向部分. 反向由式(3.93)及 Definition 3.15 得到. ■

3.3.6 切向/法向坐标中的微分算子

在层面集 Γ_s 的局部坐标图中, 切向散度定义为

$$(\operatorname{div}_{\Gamma_s} w) \circ \varphi_s = \frac{1}{\sqrt{\det g_s}} \sum_{i,j=1}^{d-1} \partial_{u_i} \left(\sqrt{\det g_s} g_s^{ij} \langle w \circ \varphi_s, \partial_{u_j} \varphi_s \rangle \right). \quad (3.96)$$

Definition 3.21: 定义 $\operatorname{div}_T w(x) = \operatorname{div}_{\Gamma_{\rho(x)}} w(x)$.

Proposition 3.22: 存在向量场 G 使

$$\operatorname{div}_T w = \operatorname{Tr}(\nabla_T w) + \langle w, G \rangle, \quad (3.97)$$

以及

$$\operatorname{div}_T w = \operatorname{Tr}(\nabla_T w_T) + \langle w_T, G \rangle. \quad (3.98)$$

G 在开条带中光滑, 并具有与 J 相应的加权导数界.

Proof: 在局部坐标中写 $w = \sum_i \alpha_i \partial_{u_i} \varphi_s + w_N \nu$, 展开式(3.96). 第一基本形式恒等式把 w 的一阶项化为 $\operatorname{Tr}(\nabla_T w)$, 其余几何系数组成 G . 局部表达式中的关键 Jacobian 项为

$$\frac{1}{\sqrt{\det g_s}} \partial_{u_i} (\sqrt{\det g_s} \alpha_i). \quad (3.99)$$

单位分解给出全局结论. ■

Proposition 3.23: 对光滑向量场 w ,

$$\operatorname{div} w = \operatorname{div} w_T + \nabla_N w_N + \frac{\nabla_N J}{J} w_N = \operatorname{Tr}(\nabla_T w) + \nabla_N w_N + \langle w, \tilde{G} \rangle,$$

其中 $\tilde{G} = G + \nabla_T |\tilde{\nu}|/|\tilde{\nu}| + (\nabla_N J/J) \nu$.

Proof: 对测试函数分解 $\nabla v = \nabla_T v + (\nabla_N v) \nu$, 分别对切向部分用层面集分部积分, 对法向部分用 Proposition 3.12 沿 s 分部积分, 再识别分布散度. ■

Proposition 3.24: 对充分光滑的标量函数 v ,

$$\Delta v = \operatorname{div}(\nabla_T v) + \nabla_N(\nabla_N v) + \frac{\nabla_N J}{J} \nabla_N v,$$

并且

$$\Delta v = \operatorname{Tr}(\nabla_T \nabla v) + \nabla_N \nabla_N v + \langle \nabla v, \tilde{G} \rangle.$$

Proof: 在 Proposition 3.23 中取 $w = \nabla v$ 即得. ■

3.4 Laplace 问题

本节先研究 Dirichlet 边界条件, 再研究 Neumann 边界条件. 存在唯一性由 Lax–Milgram 定理和迹提升得到; 正则性则用前面建立的 Nirenberg 平移方法自足地证明.

3.4.1 Dirichlet 边界条件

Theorem 4.1:

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为有界连通 Lipschitz 区域, $f \in H^{-1}(\Omega)$, $u_b \in H^{1/2}(\partial\Omega)$. 则问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{于 } \Omega, \\ u = u_b, & \text{于 } \partial\Omega \end{cases} \quad (3.100)$$

存在唯一解 $u \in H^1(\Omega)$, 且

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{H^{-1}} + \|u_b\|_{H^{1/2}}).$$

Proof: 取 Theorem 2.22 的提升 $R_0 u_b$. 则 $\tilde{u} = u - R_0 u_b \in H_0^1(\Omega)$ 满足齐次边界问题, 右端为 $\tilde{f} = f + \Delta(R_0 u_b) \in H^{-1}$. 在 $H_0^1(\Omega)$ 上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出连续性, Proposition 2.38 给出强制性. Lax–Milgram 定理产生唯一 $\tilde{u}$, 并给出所需估计. 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 测试即恢复分布方程, 而 Theorem 2.46 给出边界条件. ■

Theorem 4.2:

沿用 Theorem 4.1 的记号. 若 $k \geq 0$, Ω 为 $C^{k+1,1}$ 区域, $f \in H^k(\Omega)$, $u_b \in H^{k+3/2}(\partial\Omega)$, 则式(3.100)的解属于 $H^{k+2}(\Omega)$, 且

$$\|u\|_{H^{k+2}} \leq C(\|f\|_{H^k} + \|u_b\|_{H^{k+3/2}}).$$

Proof: 只详细处理 $k = 0$; 高阶情形逐次微分重复同一论证. Theorem 2.22 的高阶性质把非齐次边界数据化为齐次情形.

先证内部正则性. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 令 $v = u\varphi$ 并在全空间计算

$$-\Delta v = f\varphi - 2\nabla u \cdot \nabla \varphi - u\Delta\varphi =: F \in L^2(\mathbb{R}^d).$$

于是 $-\Delta(\delta_h v) = \delta_h F$. 以 $\delta_h v$ 测试并应用 Lemma 2.31 与 Young 不等式, 得 $\|\nabla \delta_h v\|_{L^2} \leq C|h|$. Proposition 2.32 推出 $v \in H^2(\mathbb{R}^d)$, 故 $u \in H_{\text{loc}}^2(\Omega)$.

再证切向正则性. 齐次问题的变分式为

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx, \quad v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.101)$$

对满足式(3.77)的 θ , 取弯曲差商测试函数 $\delta_{-h}^\theta \delta_h^\theta u$. Proposition 3.19 和强制性给出

$$\|\delta_h^\theta u\|_{H_0^1} \leq C|h|(\|f\|_{L^2} + \|\nabla u\|_{L^2}).$$

Theorem 3.20 推出 $u \in H_{\text{mathrm{tang}}}^2(\Omega)$.

最后在边界条带上使用 Proposition 3.24:

$$\text{Tr}(\nabla_T \nabla u) + \nabla_N \nabla_N u + \nabla u \cdot \tilde{G} = f. \quad (3.102)$$

几何系数满足

$$\frac{\tilde{G}}{|\ln \rho|} \in L^\infty(O_{s_0}^\rho)^d, \quad (3.103)$$

故先有

$$\nabla u \cdot \tilde{G} \in L^q(O_{s_0}^\rho), \quad \forall q < 2. \quad (3.104)$$

式(3.102)于是给出 $u \in W^{2,q}$ 对每个 $q < 2$. Sobolev 嵌入再提高 ∇u 的可积指数至某个 $r > 2$, 从而式(3.104)可取 $q = 2$. 回代即得 $u \in H^2(\Omega)$ 及估计. ■

3.4.2 Neumann 边界条件

Theorem 4.3:

设 Ω 为有界连通 Lipschitz 区域, $f \in L^2(\Omega)$, $f_b \in H^{-1/2}(\partial\Omega)$, 且满足相容条件

$$\int_{\Omega} f(x) dx + \langle f_b, 1 \rangle_{H^{-1/2}, H^{1/2}} = 0. \quad (3.105)$$

则存在唯一的 $u \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 满足

$$-\Delta u = f \quad \text{于} \Omega, \quad \partial_\nu u = f_b \quad \text{于} \partial\Omega,$$

并且

$$\|u\|_{H^1} \leq C(\|f\|_{L^2} + \|f_b\|_{H^{-1/2}}). \quad (3.106)$$

若进一步 Ω 为 $C^{k+1,1}$, $f \in H^k$, $f_b \in H^{k+1/2}$, 则 $u \in H^{k+2}$ 且

$$\|u\|_{H^{k+2}} \leq C(\|f\|_{H^k} + \|f_b\|_{H^{k+1/2}}).$$

Remark 4.1: 若 $u \in H^1$ 且 $-\Delta u = f$ 于分布意义成立, 则 ∇u 属于后文研究的 H_{div} 空间, 因而法向导数在 $H^{-1/2}(\partial\Omega)$ 中有弱意义. 广义 Stokes 公式表明式(3.105)是可解性的必要条件; 零均值则保证唯一性.

Proof: 令

$$H_m^1(\Omega) = \left\{ v \in H^1(\Omega) : \int_{\Omega} v dx = 0 \right\},$$

并在其上定义

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx, \quad L(v) = \int_{\Omega} f v dx + \langle f_b, \gamma_0 v \rangle.$$

Proposition 2.39使 a 强制, 故 Lax–Milgram 定理给出唯一零均值解和式(3.106). 式(3.105)说明 $L(1) = 0$, 因而变分式对所有 H^1 测试函数成立, 这同时给出方程与弱 Neumann 条件.

正则性方面, 先用 Theorem 2.23提升 f_b , 化为齐次 Neumann 条件. 内部 H^2 正则性与 Dirichlet 情形完全相同. 切向差商不再具有零迹, 但 Proposition 3.19和 $\int_{\Omega} u = 0$ 给出

$$\left| \int_{\Omega} \delta_h^\theta u dx \right| \leq C|h| \|u\|_{L^2}.$$

用 Poincaré–Wirtinger 不等式替代齐次 Poincaré 不等式, 可重复切向正则性论证. 最后通过式(3.102)恢复完整正则性, 与边界条件类型无关.

