

Fourier 分析

Javier Duoandikoetxea

目录

1	Fourier 级数与 Fourier 积分	3
1.1	Fourier 系数与级数	3
1.2	逐点收敛判别法	4
1.3	连续函数的 Fourier 级数	7
1.4	范数收敛	8
1.5	可和方法	9
1.6	L^1 函数的 Fourier 变换	11
1.7	Schwartz 类与缓增分布	11
1.8	L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$	14
1.9	Fourier 积分的收敛与可和性	15
1.10	注记与进一步结果	17
1.10.1	参考资料	17
1.10.2	多重 Fourier 级数	18
1.10.3	Poisson 求和公式	18
1.10.4	Gibbs 现象	18
1.10.5	Hausdorff–Young 不等式	19
1.10.6	$L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数	19
1.10.7	解析算子族的插值	20
1.10.8	有限测度的 Fourier 变换	20
2	Hardy–Littlewood 极大函数	20
2.1	恒等逼近	21
2.2	弱型不等式与几乎处处收敛	22
2.3	Marcinkiewicz 插值定理	23
2.4	Hardy–Littlewood 极大函数	24
2.5	二进极大函数	26
2.6	极大函数的弱 $(1,1)$ 不等式	28
2.7	加权范数不等式	29
2.8	注记与进一步结果	30

2.8.1	参考资料	30
2.8.2	Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排	31
2.8.3	Lorentz 空间 $L^{p,q}$	32
2.8.4	$L \log L$	33
2.8.5	常数的大小	33
2.8.6	覆盖引理	34
2.8.7	非切向 Poisson 极大函数	35
2.8.8	强极大函数	35
2.8.9	Kakeya 极大函数	36
3	Hilbert 变换	38
3.1	共轭 Poisson 核	38
3.2	$1/x$ 的主值	38
3.3	M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理	40
3.4	截断积分与逐点收敛	42
3.5	乘子	44
3.6	注记与进一步结果	46
3.6.1	参考资料	47
3.6.2	共轭函数与 Fourier 级数	47
3.6.3	M. Riesz 定理的其他证明	48
3.6.4	常数的大小	49
3.6.5	L^1 上的 Hilbert 变换	50
3.6.6	$L \log L$ 估计	51
3.6.7	平移不变算子与乘子	51
3.6.8	Fourier 级数的乘子	52
3.6.9	特征函数的 Hilbert 变换	52

1 Fourier 级数与 Fourier 积分

1.1 Fourier 系数与级数

在 (一个区间上的) $\mathbb{R}$ 上定义的函数 f 用形如

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \quad (1.1)$$

的三角级数表示这一问题, 在用分离变量法求解偏微分方程时自然出现. J. Fourier 正是由此接触到这个问题, 并将其著作 *Théorie Analytique de la Chaleur* 的大部分篇幅用于研究它 (该书出版于 1822 年, 其结果于 1807 年首次提交给 Institute de France). 更早以前, 在 18 世纪中叶, Daniel Bernoulli 试图求解弦振动问题时已经提出了这一问题, 而系数公式则出现于 L. Euler 1777 年的一篇论文中.

(1.1) 右端是周期为 2π 的周期函数, 因而 f 也必须具有这一性质. 所以只需在一个长度为 2π 的区间上考虑 f . 利用 Euler 恒等式 $e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx)$, 可将 (1.1) 中的函数 $\sin(kx)$ 和 $\cos(kx)$ 换成 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$; 从现在起我们都这样做. 此外, 我们将考虑周期为 1 而不是 2π 的函数, 因而把函数系改为 $\{e^{2\pi i k x} : k \in \mathbb{Z}\}$. 这样, 我们的问题就转化为研究 f 的表示

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k x}. \quad (1.2)$$

例如, 若假设该级数一致收敛, 则乘以 $e^{-2\pi i m x}$ 并在 $(0, 1)$ 上逐项积分, 得到

$$c_m = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i m x} dx,$$

这是因为正交关系

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} e^{-2\pi i m x} dx = \begin{cases} 0, & k \neq m, \\ 1, & k = m. \end{cases} \quad (1.3)$$

以 $\mathbb{T}$ 表示实数模 1 的加法群 (即 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$), 也就是一维环面. 它也可与单位圆 S^1 等同. 说一个函数定义在 $\mathbb{T}$ 上, 等价于说它定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1. 对每个函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 赋予其 Fourier 系数序列 $\{\hat{f}(k)\}$, 定义为

$$\hat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx. \quad (1.4)$$

以这些数为系数的三角级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} \quad (1.5)$$

称为 f 的 Fourier 级数.

现在的问题是确定级数 (1.5) 在何时以及按何种意义表示函数 f .

1.2 逐点收敛判别法

以 $S_N f(x)$ 表示级数 (1.5) 的第 N 个对称部分和, 即

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

注意, 当级数写成 (1.1) 的形式时, 这也是它的第 N 个部分和.

研究用 Fourier 级数表示 f 的第一种途径, 是确定对每个 x , 极限 $\lim S_N f(x)$ 是否存在, 以及在存在时它是否等于 $f(x)$. 第一个肯定结果由 P. G. L. Dirichlet 于 1829 年给出. 他证明了下述收敛判别法: 若 f 有界、分段连续并且只有有限个极大值和极小值, 则 $\lim S_N f(x)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)]$. 我们将在下面证明的 Jordan 判别法包含这一结果作为特殊情况.

为了研究 $S_N f(x)$, 需要一个更便于处理的表达式. Dirichlet 将部分和写成

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^N \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt e^{2\pi i k x} \\ &= \int_0^1 f(t) D_N(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt, \end{aligned}$$

其中 D_N 是 Dirichlet 核,

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t}.$$

对这个几何级数求和, 得

$$D_N(t) = \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}. \quad (1.6)$$

它满足

$$\int_0^1 D_N(t) dt = 1, \quad |D_N(t)| \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}, \quad \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2}.$$

下面证明两个逐点收敛判别法.

定理 1.1 (Dini 判别法): 若对某个 x , 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty,$$

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x).$$

定理 1.2 (Jordan 判别法): 若 f 在 x 的一个邻域内是有界变差函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

乍看之下, 这些结果是局部的这一点可能令人惊讶, 因为稍微修改函数就会改变 f 的 Fourier 系数. 然而, Fourier 级数的收敛性实际上是一种局部性质; 若修改发生在 x 的某个邻域之外, 则级数在 x 处的行为不变. 下述结果精确表述了这一点.

定理 1.3 (Riemann 局部化原理): 若 f 在 x 的一个邻域内为零, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0.$$

这一结果的一个等价表述是: 若两个函数在 x 的一个邻域内相同, 则它们的 Fourier 级数在 x 处具有相同的行为.

由 Fourier 系数的定义 (1.4), 立即有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \|f\|_1,$$

但还有一个更精细的估计成立, 我们将用它证明前面的结果.

引理 1.4 (Riemann–Lebesgue): 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0.$$

证明: 因为 $e^{2\pi i x}$ 的周期为 1,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= - \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k(x+1/2k)} dx \\ &= - \int_0^1 f(x - 1/2k) e^{-2\pi i k x} dx. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x) - f(x - 1/2k)] e^{-2\pi i k x} dx.$$

若 f 连续, 则立即得到 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0$. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取连续函数 g , 使 $\|f - g\|_1 < \varepsilon/2$, 再取充分大的 k , 使 $|\widehat{g}(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|\widehat{f}(k)| \leq |\widehat{(f - g)}(k)| + |\widehat{g}(k)| \leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(k)| < \varepsilon.$$

■

证明: 这里证明定理 1.3. 设 $f(t) = 0$ 于 $(x - \delta, x + \delta)$. 则

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \int_{\delta \leq |t| < 1/2} f(x - t) \frac{\sin(\pi(2N + 1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \widehat{(ge^{\pi i \cdot})}(N) + \widehat{(ge^{-\pi i \cdot})}(-N), \end{aligned}$$

其中

$$g(t) = \frac{f(x - t)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\delta \leq |t| < 1/2\}}(t)$$

可积. 由 Riemann–Lebesgue 引理可得 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0$.

证明: 这里证明定理 1.1. 因为 D_N 的积分为 1,

$$S_N f(x) - f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} [f(x-t) - f(x)] \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt = \int_{|t|<\delta} + \int_{\delta \leq |t| < 1/2}.$$

由 Riemann–Lebesgue 引理, 这两个积分都趋于 0. 第二个积分按前一证明论证; 对第一个积分, 由假设函数

$$\frac{f(x-t) - f(x)}{\sin(\pi t)} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t)$$

可积即可得到结论. 这里用到了当 $|t| < \delta$ 时, $\sin(\pi t)$ 与 πt 等价.

证明: 这里证明定理 1.2. 每个有界变差函数都是两个单调函数之差, 因而可设 f 在 x 的一个邻域内单调. 由于

$$S_N f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t) D_N(t) dt = \int_0^{1/2} [f(x-t) + f(x+t)] D_N(t) dt,$$

只需证明对单调函数 g 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \frac{1}{2} g(0+).$$

进一步, 可设 $g(0+) = 0$, 且 g 在 0 的右侧递增. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $0 < t < \delta$ 时 $g(t) < \varepsilon$. 于是

$$\int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \int_0^\delta + \int_\delta^{1/2}.$$

仍由 Riemann–Lebesgue 引理, 第二个积分趋于 0. 对第一个积分应用积分第二中值定理¹. 则对某个 ν , $0 < \nu < \delta$, 有

$$\int_0^\delta g(t) D_N(t) dt = g(\delta-) \int_\nu^\delta D_N(t) dt.$$

此外,

$$\begin{aligned} \left| \int_\nu^\delta D_N(t) dt \right| &\leq \left| \int_\nu^\delta \sin(\pi(2N+1)t) \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) dt \right| \\ &\quad + \left| \int_\nu^\delta \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_\nu^\delta \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + 2 \sup_{M>0} \left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{t} dt \right| \\ &\leq C. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_0^\delta g(t) D_N(t) dt \right| \leq C\varepsilon.$$

¹若 ϕ 在 $[a, b]$ 上连续且 h 单调, 则存在 c , $a < c < b$, 使得 $\int_a^b h\phi = h(b-) \int_c^b \phi + h(a+) \int_a^c \phi$.

1.3 连续函数的 Fourier 级数

若 f 在 x 的一个邻域内满足 Lipschitz 型条件, 即对某个 $\alpha > 0$, 当 $|t| < \delta$ 时有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$, 则 Dini 判别法适用于 f . 然而, 连续函数不一定满足这一条件, 也不一定满足我们已经见过的任何其他收敛判别法. P. du Bois-Reymond 于 1873 年给出的下述结果表明, 情形必然如此.

定理 1.5: 存在一个连续函数, 其 Fourier 级数在某一点发散.

Du Bois-Reymond 构造了一个具有这一性质的函数, 但这里将应用一致有界原理来证明这种函数存在; 该原理也称为 Banach-Steinhaus 定理.

引理 1.6 (一致有界原理): 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范向量空间, $\{T_a\}_{a \in A}$ 是从 X 到 Y 的一族有界线性算子. 则或者

$$\sup_a \|T_a\| < \infty,$$

或者存在 $x \in X$, 使得

$$\sup_a \|T_a x\|_Y = \infty.$$

回忆 T_a 的算子范数为 $\|T_a\| = \sup\{\|T_a x\|_Y : \|x\|_X \leq 1\}$. 这一结果的证明例如可见 Rudin [14, Chapter 5].

现在取 $X = C(\mathbb{T})$, 赋予范数 $\|\cdot\|_\infty$, 并取 $Y = \mathbb{C}$. 定义 $T_N : X \rightarrow Y$ 为

$$T_N f = S_N f(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) D_N(t) dt.$$

定义 Lebesgue 数

$$L_N = \int_{-1/2}^{1/2} |D_N(t)| dt;$$

立即有 $|T_N f| \leq L_N \|f\|_\infty$. $D_N(t)$ 只有有限个零点, 因而 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 只有有限个跳跃间断点. 在每个间断点的一个小邻域内修改它, 可以构造连续函数 f , 使得 $\|f\|_\infty = 1$ 且 $|T_N f| \geq L_N - \varepsilon$. 因此 $\|T_N\| = L_N$. 于是, 如果能证明当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_N \rightarrow \infty$, 则由一致有界原理, 存在连续函数 f 满足

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |S_N f(0)| = \infty;$$

也就是说, f 的 Fourier 级数在 0 处发散.

引理 1.7: 有

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

证明:

$$\begin{aligned}
L_N &= 2 \int_0^{1/2} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \int_0^{N+1/2} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t+k} dt + O(1).
\end{aligned}$$

继续可得

$$\begin{aligned}
L_N &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + O(1) \\
&= \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).
\end{aligned}$$

■

1.4 范数收敛

测度论和 L^p 空间的发展为收敛问题带来了新的研究途径. 现在可以提出:

- (1) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_p = 0$?
- (2) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$ 几乎处处成立?

第一个问题可用下述引理重新表述.

引理 1.8: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, $S_N f$ 在 L^p 范数下收敛到 f , 当且仅当存在与 N 无关的 C_p , 使得

$$\|S_N f\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (1.7)$$

证明: (1.7) 的必要性由一致有界原理得到.

为证明其充分性, 先注意, 若 g 是三角多项式, 则当 $N \geq \deg g$ 时 $S_N g = g$. 因此, 由三角多项式在 L^p 中稠密 (见推论 1.11), 对 $f \in L^p$, 可以找到三角多项式 g , 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$. 所以, 当 N 充分大时,

$$\|S_N f - f\|_p \leq \|S_N(f - g)\|_p + \|S_N g - g\|_p + \|f - g\|_p \leq (C_p + 1)\varepsilon.$$

■

若 $1 < p < \infty$, 则不等式 (1.7) 成立, 我们将在第 3 章证明这一点. 当 $p = 1$ 时, S_N 的 L^1 算子范数仍为 L_N , 所以由引理 1.7, 第一个问题的答案是否定的.

当 $p = 2$ 时, 由 (1.3), 函数系 $\{e^{2\pi i k x}\}$ 是正交归一系; 又由三角多项式在 L^2 中稠密, 它是完备的 (即为正交归一基). 因而可应用 Hilbert 空间理论得到下述结果.

定理 1.9: 映射 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}$ 是从 L^2 到 ℓ^2 的等距映射, 即

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2.$$

L^2 中的范数收敛立即由此得到.

第二个问题困难得多. A. Kolmogorov 于 1926 年给出了一个可积函数, 其 Fourier 级数在每一点都发散, 所以当 $p = 1$ 时答案是否定的. 若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 则 f 的 Fourier 级数几乎处处收敛. 这一点由 L. Carleson 于 1965 年对 $p = 2$ 证明, 由 R. Hunt 于 1967 年对 $p > 1$ 证明. 在 Carleson 的结果出现之前, 即使对连续函数 f , 这一问题的答案也是未知的.

1.5 可和方法

为了从 Fourier 系数恢复函数 f , 最好能找到不同于取 Fourier 级数部分和极限的方法, 因为正如已经看到的, 后一种方法并不总是有效.

一种这样的办法是 Cesàro 可和法, 即取部分和的算术平均的极限. 众所周知, 若 $\lim a_k$ 存在, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}$$

也存在且取相同的值. 定义

$$\begin{aligned} \sigma_N f(x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x) \\ &= \int_0^1 f(t) \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(t) F_N(x-t) dt, \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核,

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\pi(N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right)^2.$$

F_N 具有下列性质:

$$F_N(t) \geq 0,$$

$$\|F_N\|_1 = \int_0^1 F_N(t) dt = 1, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0. \quad (1.8)$$

因为 F_N 为正, 它的 L^1 范数等于其积分, 即为 1. Dirichlet 核并非如此: 它的积分等于 1 是因为正部与负部相消, 而它的 L^1 范数随 N 趋于无穷.

定理 1.10: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_p = 0.$$

证明: 因为 $\int F_N = 1$, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned}\|\sigma_N f - f\|_p &= \int_{-1/2}^{1/2} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| < \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt + 2\|f\|_p \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt.\end{aligned}$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p = 0;$$

当 $p = \infty$ 且 f 连续时, 同一极限也成立. 因而选择适当的 δ , 可以使第一项任意小. 固定 δ 后, 由 (1.8), 第二项趋于 0. ■

推论 1.11:

- (1) 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 三角多项式在 L^p 中稠密;
- (2) 若 f 可积且对每个 k 都有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 f 恒等于零.

第二种可和方法是把 Fourier 级数看成单位圆 (复平面中) 上形式极限

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|}, \quad z = re^{2\pi i \theta}. \quad (1.9)$$

由于 $\{\hat{f}(k)\}$ 是有界序列, 此函数在 $|z| < 1$ 上有定义. 它可改写为

$$u(re^{2\pi i \theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{2\pi i k \theta} = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) P_r(\theta - t) dt,$$

其中

$$P_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{2\pi i k t} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}$$

是 Poisson 核. Poisson 核具有与 Fejér 核类似的性质:

$$\begin{aligned}P_r(t) &\geq 0, \\ \int_0^1 P_r(t) dt &= 1, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < |t| < 1/2} P_r(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0.\end{aligned} \quad (1.10)$$

因此可以证明一个与定理 1.10 类似的结果.

定理 1.12: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_p = 0.$$

由于函数 u 在 $|z| < 1$ 上调和, 它是 Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{if } |z| < 1, \quad u = f \quad \text{if } |z| = 1$$

的解, 其中边界条件按定理 1.12 的意义理解.

在第 2 章, 我们将研究 $\sigma_N f(x)$ 和 $P_r * f(x)$ 的几乎处处收敛性.

1.6 L^1 函数的 Fourier 变换

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \quad (1.11)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$. 下面列出 Fourier 变换的若干性质:

$$\widehat{(\alpha f + \beta g)} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g} \quad (\text{线性性}); \quad (1.12)$$

$$\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1 \quad \text{且 } \widehat{f} \text{ 连续}; \quad (1.13)$$

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0 \quad (\text{Riemann-Lebesgue}); \quad (1.14)$$

$$\widehat{(f * g)} = \widehat{f} \widehat{g}; \quad (1.15)$$

$$\widehat{(\tau_h f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i h \cdot \xi}, \quad \text{其中 } \tau_h f(x) = f(x + h); \quad \widehat{(f e^{2\pi i h \cdot x})}(\xi) = \widehat{f}(\xi - h); \quad (1.16)$$

$$\text{若 } \rho \in O_n (\text{正交变换}), \text{ 则 } \widehat{f(\rho \cdot)}(\xi) = \widehat{f}(\rho \xi); \quad (1.17)$$

$$\text{若 } g(x) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1} x), \text{ 则 } \widehat{g}(\xi) = \widehat{f}(\lambda \xi); \quad (1.18)$$

$$\widehat{\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi); \quad (1.19)$$

$$\widehat{(-2\pi i x_j f)}(\xi) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi). \quad (1.20)$$

$\widehat{f}$ 的连续性由控制收敛定理得到; (1.14) 可仿照引理 1.4 证明; 其余性质分别由变量代换、Fubini 定理和分部积分得到. 在 (1.19) 中假设 $\partial f / \partial x_j \in L^1$, 在 (1.20) 中假设 $x_j f \in L^1$.

与环面上的情形不同, $L^1(\mathbb{R}^n)$ 不包含 $L^p(\mathbb{R}^n) (p > 1)$, 因此 (1.11) 不能定义这些空间中函数的 Fourier 变换. 出于同一原因, 本应由 $\widehat{f}$ 恢复 f 的公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

可能没有意义, 因为关于 $\widehat{f}$ 我们只有 (1.13) 和 (1.14), 而它们并不蕴含 $\widehat{f}$ 可积 (事实上, $\widehat{f}$ 一般不可积).

1.7 Schwartz 类与缓增分布

若函数 f 无限次可微, 且它的所有导数在无穷远处都迅速衰减, 则称 f 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 也就是说, 对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\sup_x |x^\alpha D^\beta f(x)| = p_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

C_c^∞ 中的函数属于 $\mathcal{S}$, 像 $e^{-|x|^2}$ 这样不具有紧支集的函数也属于 $\mathcal{S}$. 集合 $\{p_{\alpha, \beta}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的可数半范数族, 可用它在 $\mathcal{S}$ 上定义一个拓扑: 序列 $\{\phi_k\}$ 收敛到 0, 当且仅当对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_{\alpha, \beta}(\phi_k) = 0.$$

在此拓扑下, $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间 (完备且可度量), 并且当 $1 \leq p < \infty$ 时在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 特别地, $\mathcal{S} \subset L^1$, 因而 (1.11) 定义了 $\mathcal{S}$ 中函数的 Fourier 变换.

$\mathcal{S}$ 上的有界线性泛函空间 $\mathcal{S}'$ 称为缓增分布空间. 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射 T 属于 $\mathcal{S}'$, 当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T(\phi_k) = 0 \quad \text{只要} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = 0 \text{ 于 } \mathcal{S}.$$

定理 1.13: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的连续映射, 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g, \quad (1.21)$$

以及

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (1.22)$$

等式 (1.22) 称为反演公式.

为证明定理 1.13, 需要计算一个特殊函数的 Fourier 变换.

引理 1.14: 若 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.

证明: 可以在 $\mathbb{C}$ 中积分来直接证明这一结果, 但这里给出另一种证明. 只需证明一维情形, 因为在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\widehat{f}$ 是 n 个相同积分的乘积.

函数 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 是微分方程

$$u' + 2\pi x u = 0, \quad u(0) = 1$$

的解. 由 (1.19) 和 (1.20), $\widehat{u}$ 满足同一微分方程, 且初值为

$$\widehat{u}(0) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1.$$

因此由唯一性, $\widehat{f} = f$. ■

证明: 这里证明定理 1.13. 由 (1.19) 和 (1.20),

$$\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi) = C(\widehat{D^\alpha x^\beta f})(\xi),$$

所以

$$|\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi)| \leq C \|D^\alpha x^\beta f\|_1.$$

右端的 L^1 范数可由 f 的有限个半范数的线性组合控制, 这说明 Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到自身的连续映射.

等式 (1.21) 是 Fubini 定理的直接推论, 因为 $f(x)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可积.

由 (1.18) 和 (1.21), 得

$$\int f(x) \widehat{g}(\lambda x) dx = \int \widehat{f}(x) \lambda^{-n} g(\lambda^{-1} x) dx.$$

在第一个积分中作变量代换 $\lambda x = y$, 得

$$\int f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x) dx = \int \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x) dx;$$

再令 $\lambda \rightarrow \infty$, 得

$$f(0) \int \widehat{g}(x) dx = g(0) \int \widehat{f}(x) dx.$$

令 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 由引理 1.14,

$$f(0) = \int \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

这就是 $x = 0$ 时的 (1.22). 将 f 换成 $\tau_x f$, 再由 (1.16),

$$f(x) = (\tau_x f)(0) = \int \widehat{(\tau_x f)}(\xi) d\xi = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

■

令 $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, 得到下述推论.

推论 1.15: 对 $f \in \mathcal{S}$, 有 $\widehat{\widehat{f}} = \widetilde{f}$; 因而 Fourier 变换的周期为 4 (即连续应用四次得到恒等算子).

定义 1.16: $T \in \mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换是由

$$\widehat{T}(f) = T(\widehat{f}), \quad f \in \mathcal{S}$$

给出的缓增分布 $\widehat{T}$.

由定理 1.13, $\widehat{T}$ 是缓增分布. 特别地, 若 T 是可积函数, 则 $\widehat{T}$ 与等式 (1.11) 定义的 Fourier 变换一致. 同样, 若 μ 是有限 Borel 测度 (即 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函, 这里 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是在无穷远处消失的连续函数空间), 则 $\widehat{\mu}$ 是由

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu(x)$$

给出的有界连续函数. 对原点处的 Dirac 测度 δ , 这给出 $\widehat{\delta} = 1$.

定理 1.17: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}'$ 到 $\mathcal{S}'$ 的有界线性双射, 其逆映射也有界.

证明: 若 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{S}'$, 则对任意 $f \in \mathcal{S}$,

$$\widehat{T}_n(f) = T_n(\widehat{f}) \longrightarrow T(\widehat{f}) = \widehat{T}(f).$$

此外, Fourier 变换的周期为 4, 所以其逆映射等价于连续应用 Fourier 变换三次; 因此其逆映射也连续.

■

若定义 $\widetilde{T}$ 为 $\widetilde{T}(f) = T(\widetilde{f})$, 则由推论 1.15 有 $\widetilde{(\widetilde{T})} = T$. 若 $\widehat{T} \in L^1$, 则由反演公式,

$$T(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{T}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi;$$

特别地, T 是有界连续函数.

1.8 L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$

若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$, 则可将 f 等同于缓增分布: 对 $\phi \in \mathcal{S}$, 定义

$$T_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^n} f\phi.$$

显然这个积分有限. 为说明 T_f 连续, 设当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\phi_k \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}$. 由 Hölder 不等式,

$$|T_f(\phi_k)| \leq \|f\|_p \|\phi_k\|_{p'}.$$

$\|\phi_k\|_{p'}$ 可由形如 $x^\alpha \phi_k$ 的函数的 L^∞ 范数控制, 从而可由 ϕ_k 的有限个半范数的线性组合控制; 因而左端在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

此外, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, $\widehat{f}$ 是一个函数.

定理 1.18: Fourier 变换是 L^2 上的等距映射; 即 $\widehat{f} \in L^2$ 且 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. 此外,

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

并且

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中极限均在 L^2 中取.

恒等式 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 称为 Plancherel 定理.

证明: 给定 $f, h \in \mathcal{S}$, 令 $g = \widetilde{\overline{h}}$, 从而 $\widehat{g} = \widetilde{\widehat{h}}$. 由 (1.21),

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \overline{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} \widetilde{\widehat{h}}. \quad (1.23)$$

令 $h = f$, 得到对 $f \in \mathcal{S}$ 有 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$. 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, Fourier 变换以范数相等的方式延拓到所有 $f \in L^2$.

最后, Fourier 变换的连续性蕴含所述的 f 和 $\widehat{f}$ 的极限公式, 因为 $f\chi_{B(0,R)}$ 和 $\widehat{f}\chi_{B(0,R)}$ 分别在 L^2 中收敛到 f 和 $\widehat{f}$. ■

若 $f \in L^p$, $1 < p < 2$, 则可分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1$, $f_2 \in L^2$. 例如可取 $f_1 = f\chi_{\{|x| > 1\}}$, $f_2 = f - f_1$. 因此 $\widehat{f} = \widehat{f}_1 + \widehat{f}_2 \in L^\infty + L^2$. 然而, 应用插值定理可以得到更精确的结果.

定理 1.19 (Riesz–Thorin 插值): 设 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, 并且对 $0 < \theta < 1$, 由

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

定义 p 和 q . 若 T 是从 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子, 且

$$\|Tf\|_{q_0} \leq M_0 \|f\|_{p_0} \quad \text{for } f \in L^{p_0},$$

以及

$$\|Tf\|_{q_1} \leq M_1 \|f\|_{p_1} \quad \text{for } f \in L^{p_1},$$

则

$$\|Tf\|_q \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_p \quad \text{for } f \in L^p.$$

这一结果的证明使用解析函数的所谓“三线定理”；例如可见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5], 或 Katznelson [10, Chapter 4].

推论 1.20 (Hausdorff–Young 不等式): 若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p'}$ 且

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p.$$

证明: 在定理 1.19 中使用不等式 (1.13), 即 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, 以及 Plancherel 定理 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. ■

暂且离开 Fourier 变换, 给出 Riesz–Thorin 插值的另一个推论; 它将在后面的章节中使用.

推论 1.21 (Young 不等式): 若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$, 则 $f * g \in L^r$, 其中 $1/r + 1 = 1/p + 1/q$, 并且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明: 固定 $f \in L^p$, 立即得到不等式

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

以及

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

所需结果由 Riesz–Thorin 插值得到. ■

1.9 Fourier 积分的收敛与可和性

从 Fourier 变换恢复函数的问题, 与 Fourier 级数中的同一问题相似. 需要确定在何时以及是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = f(x),$$

其中 $B_R = \{Rx : x \in B\}$, B 是原点的一个开凸邻域, 而极限或者按 L^p 意义理解, 或按几乎处处逐点意义理解. 若定义部分和算子 S_R 为

$$\widehat{(S_R f)} = \chi_{B_R} \widehat{f},$$

则这个问题等价于确定是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f = f.$$

与引理 1.8 类似, 范数收敛的充要条件是

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

其中 C_p 与 R 无关. 当 $n=1$ 时这一点成立; 我们将在第 3 章证明. 当 $n>1$ 时, 还将证明几个部分结果, 但一般而言, 当 $p \neq 2$ 时不存在范数收敛. 这一点将在第 8 章讨论.

当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$S_R f(x) = D_R * f(x),$$

其中 D_R 是 Dirichlet 核,

$$D_R(x) = \int_{-R}^R e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x}.$$

它显然不可积, 但对任意 $q>1$ 都属于 $L^q(\mathbb{R})$, 所以当 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$ 时, $D_R * f$ 有定义.

几乎处处收敛取决于估计

$$\left\| \sup_R |S_R f| \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

当 $1 < p < \infty$ 时此式成立 (Carleson–Hunt 定理), 但这里无法证明.

对 Fourier 变换, Cesàro 可和法是取部分和算子的积分平均

$$\sigma_R f(x) = \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt,$$

并确定是否有 $\lim \sigma_R f(x) = f(x)$. 当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$\sigma_R f(x) = F_R * f(x),$$

其中 F_R 是 Fejér 核,

$$F_R(x) = \frac{1}{R} \int_0^R D_t(x) dt = \frac{\sin^2(\pi R x)}{R(\pi x)^2}. \quad (1.24)$$

与 Dirichlet 核不同, Fejér 核可积. 由于它具有与 (1.8) 类似的性质, 可以证明在 L^p , $1 \leq p < \infty$ 中,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_R f = f.$$

证明与定理 1.10 的证明类似. 在第 2 章, 我们将证明两个一般结果, 并由此推出这种可和法以及下面的可和法在 L^p 中和几乎处处逐点意义下的收敛性.

Abel–Poisson 可和法是在反演公式中引入因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$. 对每个 $t>0$, 该积分收敛, 然后令 t 趋于 0. 若改为引入因子 $e^{-\pi t^2|\xi|^2}$, 就得到 Gauss–Weierstrass 可和法. 更准确地, 定义

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.25)$$

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi t^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.26)$$

并试图确定是否有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x), \quad (1.27)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} w(x, t) = f(x), \quad (1.28)$$

其中极限在 L^p 中取, 或几乎处处逐点取.

可以证明 $u(x, t)$ 在半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中调和. 当 $n = 1$ 时, 有一个与 (1.9) 类似的等价公式:

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it, \quad (1.29)$$

它立即蕴含 u 调和. 极限 (1.27) 可解释为 Dirichlet 问题的边界条件

$$\Delta u = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由 (1.25),

$$u(x, t) = P_t * f(x),$$

其中 $\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$. 当 $n = 1$ 时可通过简单计算证明, 当 $n > 1$ 时可通过更困难的计算证明 (见 Stein 与 Weiss [18, p. 6]),

$$P_t(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\pi^{(n+1)/2}} \frac{t}{(t^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}. \quad (1.30)$$

这称为 Poisson 核.

在 Gauss–Weierstrass 可和法的情形, 可以证明函数 $\tilde{w}(x, t) = w(x, \sqrt{4\pi t})$ 是热方程

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} - \Delta \tilde{w} = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad \tilde{w}(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

的解, 而 (1.28) 可解释为该问题的初值条件. 还有公式

$$w(x, t) = W_t * f(x),$$

其中 W_t 是 Gauss–Weierstrass 核,

$$W_t(x) = t^{-n} e^{-\pi|x|^2/t^2}. \quad (1.31)$$

此公式可由引理 1.14 和 (1.18) 证明.

1.10 注记与进一步结果

1.10.1 参考资料

三角级数方面的经典参考书是 Zygmund 的著作 [21], 它也是随后几章中各项结果的重要参考书. 不过, 这部著作有时不易查阅. Bary 的著作 [1] 是关于三角级数的另一部综合性参考书.

Katznelson [10] 以及 Dym 与 McKean [4] 对 Fourier 级数与积分有出色的论述. R. E. Edwards 的著作 [5] 从较现代的观点对 Fourier 级数进行了详尽研究. 还推荐 Weiss 的论文 [20] 和 Körner 的著作 [12]. J. P. Kahane 关于 Fourier 级数及其对数学概念发展之影响的优秀历史论述, 见 [9] 的前半部. E. González-Velasco 的著作 *Fourier Analysis and Boundary Value Problems* (Academic Press, New York, 1995) 包含许多将 Fourier 分离变量法应用于偏微分方程的例子, 也包含历史资料. 另见同一作者的 *Connections in mathematical analysis: the case of Fourier series*, Amer. Math. Monthly 99 (1992), 427–441. O. G. Jørsboe 与 L. Melbro 的著作 *The Carleson–Hunt Theorem on Fourier Series*, Lecture Notes in Math. 911,

Springer-Verlag, Berlin, 1982, 专门讨论该定理的证明. 其原始文献是 L. Carleson 的论文 *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966), 135–157, 以及 R. Hunt 的论文 *On the convergence of Fourier series*, Orthogonal Expansions and their Continuous Analogues (Proc. Conf., Edwardsville, Ill., 1967), pp. 235–255, Southern Illinois Univ. Press, Carbondale, 1968. Kolmogorov 关于一个 Fourier 级数处处发散的 L^1 函数的例子, 出现在 *Une série de Fourier-Lebesgue divergente partout* (C. R. Acad. Sci. Paris 183 (1926), 1327–1328) 中.

1.10.2 多重 Fourier 级数

令 $\mathbb{T}^n$ 为 n 维环面 (可将它与商群 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 等同). 定义在 $\mathbb{T}^n$ 上的函数等价于定义在 $\mathbb{R}^n$ 上并且关于每个变量都以 1 为周期的函数. 若 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$, 则可定义其 Fourier 系数为

$$\hat{f}(\nu) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \nu} dx, \quad \nu \in \mathbb{Z}^n,$$

并用这些系数构造 f 的 Fourier 级数

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

可以证明若干与单变量 Fourier 级数类似的结果, 但随着 n 增大, 所需的正则性条件越来越严格. 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 7].

1.10.3 Poisson 求和公式

设函数 f 满足: 对某个 $\delta > 0$,

$$|f(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\delta}, \quad |\hat{f}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-n-\delta}.$$

特别地, f 和 $\hat{f}$ 都连续. 则

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} f(x + \nu) = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

这个等式 (更准确地说, $x = 0$ 的情形) 称为 Poisson 求和公式, 它不过是反演公式. 左端定义了 $\mathbb{T}^n$ 上的函数, 其 Fourier 系数恰为 $\hat{f}(\nu)$.

1.10.4 Gibbs 现象

在 $(-1/2, 1/2)$ 上令 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. 例如由 Dirichlet 判别法可知, 对所有 x , $S_N f(x)$ 收敛到 $f(x)$. 在 0 的右侧, 部分和在 1 附近振荡; 但与可能的预期相反, 当 N 增大时, 它们超过 1 的量并不趋于 0. 可以证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_x S_N f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin y}{y} dy \approx 1.17898 \dots$$

只要函数存在跳跃间断点, 就会出现这种现象. 它以 J. Gibbs 命名; Gibbs 于 1899 年在 Nature 59 上宣布了这一现象, 但 H. Wilbraham 早在 1848 年已经发现它. 见 Dym 与 McKean [4,

Chapter 1], 以及 E. Hewitt 与 R. E. Hewitt 的论文 *The Gibbs–Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci. 21 (1979/80), 129–160.

以 Cesàro 可和性代替逐点收敛可以消除 Gibbs 现象. 若 $m \leq f(x) \leq M$, 则由 (1.8) 中 Fejér 核的前两个性质, $m \leq \sigma_N f(x) \leq M$. 事实上, 可以证明, 若在区间 (a, b) 上 $m \leq f(x) \leq M$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 当 N 充分大时, 在 $(a + \varepsilon, b - \varepsilon)$ 上有

$$m - \varepsilon \leq \sigma_N f(x) \leq M + \varepsilon.$$

1.10.5 Hausdorff–Young 不等式

推论 1.20 是 Riesz–Thorin 插值的直接应用. 但实际上有更强的不等式: 若 $1 \leq p \leq 2$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \left(\frac{p^{1/p}}{(p')^{1/p'}} \right)^{n/2} \|f\|_p.$$

这个不等式是锐的, 因为对 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 等号成立. 这一结果由 W. Beckner 证明 (*Inequalities in Fourier analysis*, Ann. of Math. 102 (1975), 159–182); p 为偶数的特殊情形更早由 K. I. Babenko 证明 (*An inequality in the theory of Fourier integrals (Russian)*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 25 (1961), 531–542).

在同一篇论文中, Beckner 还证明了 Young 不等式 (推论 1.21) 的锐化形式.

1.10.6 $L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数

由于 Fourier 变换的周期为 4, 若 f 满足 $\widehat{f} = \lambda f$, 则必有 $\lambda^4 = 1$. 因此, $\lambda = \pm 1, \pm i$ 是 Fourier 变换仅有的可能特征值. 引理 1.14 表明 $\exp(-\pi x^2)$ 是属于特征值 1 的特征函数. Hermite 函数给出其余特征函数: 对 $n \geq 0$,

$$h_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} \exp(\pi x^2) \frac{d^n}{dx^n} \exp(-\pi x^2)$$

满足 $\widehat{h}_n = (-i)^n h_n$. 将这些函数归一化,

$$e_n = \frac{h_n}{\|h_n\|_2} = \left[(4\pi)^{-n} \sqrt{2n!} \right]^{1/2} h_n,$$

便得到 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交归一基, 并且

$$\widehat{f} = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n \langle f, e_n \rangle e_n.$$

于是 $L^2(\mathbb{R})$ 分解为直和 $H_0 \oplus H_1 \oplus H_2 \oplus H_3$, 其中 Fourier 变换在子空间 H_j , $0 \leq j \leq 3$, 上的作用是将函数乘以 i^j .

这种定义 $L^2(\mathbb{R})$ 上 Fourier 变换的方法归功于 N. Wiener, 可见其著作 *The Fourier Integral and Certain of its Applications*, original edition, 1933; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988. 另见 Dym 与 McKean [4, Chapter 2].

在高维情形, Fourier 变换的特征函数是 Hermite 函数的乘积, 每个坐标变量对应一个因子. 另见第 4 章第 7.2 节.

1.10.7 解析算子族的插值

Riesz–Thorin 插值定理有一个由 E. M. Stein 给出的有力推广 (见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5]). 令

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\},$$

并令 $\{T_z\}_{z \in S}$ 为一族算子. 若给定两个函数 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 映射

$$z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx$$

在 S 的内部解析, 在边界上连续, 并且存在常数 $a < \pi$, 使

$$e^{-a|\operatorname{Im} z|} \log \left| \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx \right|$$

对所有 $z \in S$ 一致有界, 则称这个算子族是可容许的.

定理 1.22: 设 $\{T_z\}$ 为可容许算子族, 并假设对 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ 和 $y \in \mathbb{R}$,

$$\|T_{iy}f\|_{q_0} \leq M_0(y)\|f\|_{p_0}, \quad \|T_{1+iy}f\|_{q_1} \leq M_1(y)\|f\|_{p_1},$$

其中对某个 $b < \pi$,

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} e^{-b|y|} \log M_j(y) < \infty, \quad j = 1, 2.$$

则当 $0 < \theta < 1$, $\operatorname{Re} z = \theta$, 且 p, q 如定理 1.19 中定义时, 存在常数 M_θ , 使得

$$\|T_z f\|_q \leq M_\theta \|f\|_p.$$

1.10.8 有限测度的 Fourier 变换

如上所述, 若 μ 是有限 Borel 测度, 则 $\hat{\mu}$ 是有界连续函数. 由这种方式得到的所有函数组成的集合可由下述结果刻画.

定理 1.23: 若 h 是有界连续函数, 则下列条件等价:

- (1) 对某个正的有限 Borel 测度 μ , 有 $h = \hat{\mu}$;
- (2) h 是正定的: 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} h(x-y) f(x) \overline{f(y)} \, dx \, dy \geq 0.$$

这一定理归功于 S. Bochner (*Lectures on Fourier Integrals*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1959; translated from *Vorlesungen über Fouriersche Integrale*, Akad. Verlag, Leipzig, 1932). 另见 Katznelson [10, Chapter 6].

2 Hardy–Littlewood 极大函数

2.1 恒等逼近

设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 满足 $\int \varphi = 1$; 对 $t > 0$, 定义 $\varphi_t(x) = t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$. 当 $t \rightarrow 0$ 时, φ_t 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到原点处的 Dirac 测度 δ : 若 $g \in \mathcal{S}$, 则

$$\varphi_t(g) = \int_{\mathbb{R}^n} t^{-n}\varphi(t^{-1}x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)g(tx) dx,$$

因而由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t(g) = g(0) = \delta(g).$$

由于 $\delta * g = g$, 对 $g \in \mathcal{S}$ 有逐点极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * g(x) = g(x).$$

正因如此, 我们称 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 为一个恒等逼近.

上一章的可和方法可以看作恒等逼近. 对 Cesàro 可和法, $\varphi = F_1$ 且 $F_R = \varphi_{1/R}$ (见 (1.24)); 对 Abel–Poisson 可和法, $\varphi = P_1$ (见 (1.30)); 对 Gauss–Weierstrass 可和法, $\varphi = W_1$ (见 (1.31)). 由下述结果可见, 这些可和方法在 L^p 范数下收敛.

定理 2.1: 设 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 是恒等逼近. 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\varphi_t * f - f\|_p = 0;$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则上述收敛是一致收敛 (即取 $p = \infty$).

证明: 因为 φ 的积分为 1,

$$\varphi_t * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y)[f(x - ty) - f(x)] dy.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_1}.$$

(注意 δ 依赖于 f .) 固定 δ 后, 当 t 足够小时,

$$\int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \frac{\varepsilon}{4\|f\|_p}.$$

因此, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned} \|\varphi_t * f - f\|_p &\leq \int_{|y| < \delta/t} |\varphi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_p dy \\ &\quad + 2\|f\|_p \int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \varepsilon. \end{aligned}$$

由该定理可知, 存在一个依赖于 f 的序列 $\{t_k\}$, 使 $t_k \rightarrow 0$ 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{t_k} * f(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

所以, 如果 $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x)$ 存在, 它几乎处处必等于 $f(x)$. 第 2.4 节将研究这个极限的存在性.

2.2 弱型不等式与几乎处处收敛

设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 Y 上复值可测函数空间的算子. 若 $q < \infty$ 且

$$\nu(\{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q,$$

则称 T 为弱 (p, q) 型; 若 T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^\infty(Y, \nu)$ 的有界算子, 则称其为弱 (p, ∞) 型. 若 T 从 $L^p(X, \mu)$ 有界地映入 $L^q(Y, \nu)$, 则称其为强 (p, q) 型.

若 T 为强 (p, q) 型, 则它为弱 (p, q) 型. 事实上, 令 $E_\lambda = \{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}$, 则

$$\nu(E_\lambda) = \int_{E_\lambda} d\nu \leq \int_{E_\lambda} \frac{|Tf(y)|^q}{\lambda^q} d\nu \leq \frac{\|Tf\|_q^q}{\lambda^q} \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q.$$

当 $(X, \mu) = (Y, \nu)$ 且 T 为恒等算子时, 弱 (p, p) 不等式就是经典的 Chebyshev 不等式.

弱 (p, q) 不等式与几乎处处收敛之间的关系由下述结果给出; 其中假设 $(X, \mu) = (Y, \nu)$.

定理 2.2: 设 $\{T_t\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, 并定义

$$T^*f(x) = \sup_t |T_tf(x)|.$$

若 T^* 为弱 (p, q) 型, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.

T^* 称为与算子族 $\{T_t\}$ 相伴的极大算子.

证明: 设 $\{f_n\}$ 在 $L^p(X, \mu)$ 范数下收敛到 f , 且 $T_tf_n(x)$ 几乎处处收敛到 $f_n(x)$. 则

$$\begin{aligned} & \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \lambda\} \\ & \leq \mu\{x : T^*(f - f_n)(x) > \lambda/2\} + \mu\{x : |f(x) - f_n(x)| > \lambda/2\} \\ & \leq \left(\frac{2C\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^q + \left(\frac{2\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^p, \end{aligned}$$

末项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因此

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 0\} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 1/k\} = 0.$$

用同样方法还可证明集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) \text{ 存在 a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭. 只需证明

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) > \lambda\} = 0.$$

这可如上推出, 因为

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \leq 2T^* f(x).$$

(若 $T_t f(x)$ 为复数, 分别对其实部和虚部应用该论证.)

由于恒等逼近对 $f \in \mathcal{S}$ 逐点收敛到 f , 若能证明极大算子 $\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)|$ 具有弱型有界性, 便可应用该定理, 对 $f \in L^p(1 \leq p < \infty)$ 或 $f \in C_0$ 得到几乎处处逐点收敛.

2.3 Marcinkiewicz 插值定理

设 (X, μ) 为测度空间, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为可测函数. 称函数 $a_f: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$,

$$a_f(\lambda) = \mu\{x \in X : |f(x)| > \lambda\},$$

为 f (相对于 μ) 的分布函数.

命题 2.3: 设 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可微且递增, 并满足 $\phi(0) = 0$. 则

$$\int_X \phi(|f(x)|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) a_f(\lambda) d\lambda.$$

为证明此式, 只需注意左端等于

$$\int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu,$$

然后交换积分次序. 特别地, 若 $\phi(\lambda) = \lambda^p$, 则

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} a_f(\lambda) d\lambda. \quad (2.1)$$

由于弱型不等式度量分布函数的大小, 这个 L^p 范数表示最适合用来证明下面的插值定理. 该定理使我们能从弱型不等式推出 L^p 有界性, 而且适用于比线性算子更大的类 (注意极大算子不是线性的): 若从可测函数向量空间到可测函数空间的算子 T 满足

$$|T(f_0 + f_1)(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|, \quad |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf| \quad (\lambda \in \mathbb{C}),$$

则称 T 为次线性算子.

定理 2.4 (Marcinkiewicz 插值): 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, T 是从 $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性算子, 并且 T 为弱 (p_0, p_0) 型和弱 (p_1, p_1) 型. 则对 $p_0 < p < p_1$, T 为强 (p, p) 型.

证明: 给定 $f \in L^p$, 对每个 $\lambda > 0$ 将 f 分解为 $f_0 + f_1$, 其中

$$f_0 = f \chi_{\{x: |f(x)| > c\lambda\}}, \quad f_1 = f \chi_{\{x: |f(x)| \leq c\lambda\}};$$

常数 c 稍后确定. 于是 $f_0 \in L^{p_0}(\mu)$, $f_1 \in L^{p_1}(\mu)$. 又有

$$|Tf(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|,$$

故 $a_{Tf}(\lambda) \leq a_{Tf_0}(\lambda/2) + a_{Tf_1}(\lambda/2)$. 分两种情形.

情形 1: $p_1 = \infty$. 取 $c = 1/(2A_1)$, 其中 $\|Tg\|_\infty \leq A_1\|g\|_\infty$, 则 $a_{Tf_1}(\lambda/2) = 0$. 由弱 (p_0, p_0) 不等式,

$$a_{Tf_0}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_0\|f_0\|_{p_0}}{\lambda} \right)^{p_0}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_{\{|f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

情形 2: $p_1 < \infty$. 现在对 $i = 0, 1$ 有

$$a_{Tf_i}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_i\|f_i\|_{p_i}}{\lambda} \right)^{p_i}.$$

照上面的论证可得

$$\|Tf\|_p^p \leq \left(\frac{p2^{p_0}A_0^{p_0}}{p-p_0} c^{p_0-p} + \frac{p2^{p_1}A_1^{p_1}}{p_1-p} c^{p_1-p} \right) \|f\|_p^p.$$

■

该定理中的强 (p, p) 范数不等式可以更精确地写为

$$\|Tf\|_p \leq 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_p, \quad (2.2)$$

其中

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0}, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $p_1 = \infty$ 时, 这就是证明中出现的常数; 当 $p_1 < \infty$ 时, 只需选择 c 使 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$, 再化简即可.

2.4 Hardy–Littlewood 极大函数

令 $B_r = B(0, r)$ 为以原点为中心、半径为 r 的 Euclidean 球. 局部可积函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Hardy–Littlewood 极大函数定义为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.3)$$

(其值可以为 $+\infty$.) 若令 $\varphi = |B_1|^{-1}\chi_{B_1}$, 则对非负 f , (2.3) 与定理 2.2 中恒等逼近 $\{\varphi_t\}$ 的相伴极大算子一致.

有时用立方体代替球定义极大函数. 若 $Q_r = [-r, r]^n$, 定义

$$M'f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.4)$$

当 $n = 1$ 时, M 与 M' 相同; 若 $n > 1$, 则存在只依赖于 n 的常数 C_n, c_n , 使

$$c_n M'f(x) \leq Mf(x) \leq C_n M'f(x). \quad (2.5)$$

因此 M 与 M' 本质上可以互换, 我们将依情形使用更合适者. 还可定义更一般的极大函数

$$M''f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy, \quad (2.6)$$

其中上确界遍历所有包含 x 的立方体. M'' 仍与 M 逐点等价. 通常称 M' 为中心极大算子, 称 M'' 为非中心极大算子; 也可用球而非立方体定义非中心极大函数.

定理 2.5: 算子 M 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

由 (2.5), 同一结论对 M' (以及 M'') 也成立. 由定义立即有

$$\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty. \quad (2.7)$$

因此, 由 Marcinkiewicz 插值定理, 为证明定理 2.5, 只需证明 M 为弱 $(1, 1)$ 型. 这里先证明 $n = 1$ 的情形; 一般情形在第 2.6 节证明. 一维情形需要下列覆盖引理, 其简单证明留给读者.

引理 2.6: 设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一族区间, 紧集 K 包含于这些区间的并中. 则存在有限子族 $\{I_j\}$, 使

$$K \subset \bigcup_j I_j, \quad \sum_j \chi_{I_j}(x) \leq 2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明: 这里证明定理 2.5 的 $n = 1$ 情形. 令 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$. 若 $x \in E_\lambda$, 则存在以 x 为中心的区间 I_x , 使

$$\frac{1}{|I_x|} \int_{I_x} |f| > \lambda. \quad (2.8)$$

取紧集 $K \subset E_\lambda$. 由引理 2.6, 存在有限区间族 $\{I_j\}$, 使 $K \subset \bigcup_j I_j$ 且 $\sum_j \chi_{I_j} < 2$. 于是

$$|K| \leq \sum_j |I_j| < \frac{1}{\lambda} \sum_j \int_{I_j} |f| \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1.$$

此式对每个紧集 $K \subset E_\lambda$ 都成立, 故 M 的弱 $(1, 1)$ 不等式立即成立. ■

引理 2.6 在高于一维时不成立. 虽可用类似结果替代, 但这里不采用该途径 (这种证明见第 2.8.6 节). 极大函数在研究恒等逼近时的重要性来自下述结果.

命题 2.7: 设 φ 为正的、径向的、递减的 (视为 $(0, \infty)$ 上的函数) 且可积的函数. 则

$$\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)| \leq \|\varphi\|_1 Mf(x).$$

证明: 先在已有假设之外假定 φ 是简单函数, 即

$$\varphi(x) = \sum_j a_j \chi_{B_{r_j}}(x), \quad a_j > 0.$$

则

$$\varphi * f(x) = \sum_j a_j |B_{r_j}|^{-1} \chi_{B_{r_j}} * f(x) \leq \|\varphi\|_1 Mf(x),$$

因为 $\|\varphi\|_1 = \sum_j a_j |B_{r_j}|$.

满足这些假设的任意 φ 都可由单调递增到它的简单函数序列逼近. 每个伸缩 φ_t 仍是正的、径向的、递减的函数, 且积分相同, 故满足同一不等式. 所需结论随即成立. ■

推论 2.8: 若 $|\varphi(x)| \leq \psi(x)$ 几乎处处成立, 其中 ψ 为正的、径向的、递减且可积的函数, 则极大函数 $\sup_t |\varphi_t * f(x)|$ 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

这是命题 2.7 与定理 2.5 的直接推论. 将其与定理 2.2 合并可得:

推论 2.9: 在上一推论的假设下, 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 或 $f \in C_0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x) = \varphi(\mathbb{R}^n) f(x) \quad \text{a.e.}$$

特别地, 第 1.9 节讨论的 Cesàro、Abel–Poisson 与 Gauss–Weierstrass 可和法, 对上述任一空间中的 f 都几乎处处收敛到 $f(x)$.

证明: 因为对 $f \in \mathcal{S}$ 已有收敛, 由定理 2.2, 对 $f \in L^p$ (若 $p = \infty$, 则对 $f \in C_0$) 也有收敛. Poisson 核 (1.30) 与 Gauss–Weierstrass 核 (1.31) 递减; Fejér 核 (1.24) 不递减, 但 $F_1(x) \leq \min(1, (\pi x)^{-2})$. ■

2.5 二进极大函数

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 把右端开立方体 $[0, 1)^n$ 称为单位立方体; 令 $\mathcal{Q}_0$ 为与 $[0, 1)^n$ 全等且顶点位于格点 $\mathbb{Z}^n$ 上的立方体族. 将此立方体族按因子 2^{-k} 伸缩, 得到 $\mathcal{Q}_k (k \in \mathbb{Z})$.

$\mathcal{Q}_k$ 是顶点为格点 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 的相邻点且右端开的立方体族. $\bigcup_k \mathcal{Q}_k$ 中的立方体称为二进立方体. 由构造立即得到:

- (1) 给定 $x \in \mathbb{R}^n$, 每个 $\mathcal{Q}_k$ 中恰有一个包含 x 的立方体;
- (2) 任意两个二进立方体或不相交, 或其中一个完全包含于另一个;
- (3) $\mathcal{Q}_k$ 中的二进立方体包含于每个 $\mathcal{Q}_j (j < k)$ 中的唯一立方体, 并包含 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的 2^n 个二进立方体.

给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f \right) \chi_Q(x).$$

$E_k f$ 是 f 关于由 $\mathcal{Q}_k$ 生成的 σ -代数的条件期望. 若 Ω 是 $\mathcal{Q}_k$ 中若干立方体的并, 则它满足基本恒等式

$$\int_{\Omega} E_k f = \int_{\Omega} f.$$

$E_k f$ 是恒等逼近的离散类比. 先定义二进极大函数

$$M_d f(x) = \sup_k |E_k f(x)|. \quad (2.9)$$

定理 2.10:

- (1) 二进极大函数为弱 $(1, 1)$ 型;
- (2) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x)$ 几乎处处成立.

证明: (1) 固定 $f \in L^1$. 可设 f 非负: 实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部. 令

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda, \text{ 且若 } j < k \text{ 则 } E_j f(x) \leq \lambda\}.$$

也就是说, $x \in \Omega_k$ 恰当且仅当 $E_k f(x)$ 是第一个超过 λ 的条件期望. (因为 $f \in L^1$, 当 $k \rightarrow -\infty$ 时 $E_k f(x) \rightarrow 0$, 故这样的 k 存在.)

集合 Ω_k 显然两两不交, 且每个都可写成 $\mathcal{Q}_k$ 中立方体的并. 因此

$$\lambda |\{M_d f > \lambda\}| = \lambda \sum_k |\Omega_k| < \sum_k \int_{\Omega_k} E_k f = \sum_k \int_{\Omega_k} f \leq \|f\|_1.$$

(2) 对连续函数, 该极限显然成立, 所以由定理 2.2, 对 $f \in L^1$ 成立. 最后, 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则对任意 $Q \in \mathcal{Q}_0, f \chi_Q \in L^1$. 故 (2) 对几乎每个 $x \in Q$ 成立, 从而对 $\mathbb{R}^n$ 中几乎每个 x 成立. ■

这个证明使用了一个非常有用的 $\mathbb{R}^n$ 分解, 称为 Calderón–Zygmund 分解. 准确陈述如下.

定理 2.11: 给定可积非负函数 f 和正数 λ , 存在一系列两两不交的二进立方体 $\{Q_j\}$, 使得

$$(1) \text{ 对几乎每个 } x \notin \bigcup_j Q_j, \text{ 有 } f(x) \leq \lambda;$$

$$(2) \left| \bigcup_j Q_j \right| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1;$$

$$(3) \text{ 对每个 } j, \lambda < |Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda.$$

证明: 如定理 2.10 的证明那样构造集合 Ω_k , 并把每个集合分解为 $\mathcal{Q}_k$ 中两两不交的二进立方体; 所有这些立方体合成族 $\{Q_j\}$. 定理的 (2) 正是定理 2.10 的弱 $(1, 1)$ 不等式.

若 $x \notin \bigcup_j Q_j$, 则对每个 k 都有 $E_k f(x) \leq \lambda$, 因而由定理 2.10 的 (2), 几乎每个这样的点都满足 $f(x) \leq \lambda$.

最后, 由 Ω_k 的定义, f 在 Q_j 上的平均值大于 λ , 这给出 (3) 中第一个不等式. 若 $\tilde{Q}_j$ 是包含 Q_j 、边长为其两倍的二进立方体, 则 f 在 $\tilde{Q}_j$ 上的平均值至多为 λ .

因此

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq \frac{|\tilde{Q}_j|}{|Q_j|} \frac{1}{|\tilde{Q}_j|} \int_{\tilde{Q}_j} f \leq 2^n \lambda.$$

2.6 极大函数的弱 (1, 1) 不等式

现在用定理 2.10 证明定理 2.5. 它事实上是下列引理与 (2.5) 的直接推论 (回忆 M' 是 (2.4) 定义的立方体极大算子).

引理 2.12: 若 f 非负, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

由该引理及定理 2.10 所证 M_d 的弱 (1, 1) 不等式,

$$|\{M'f > \lambda\}| \leq 2^n |\{M_d f > 4^{-n} \lambda\}| \leq \frac{8^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

(因为 $M'f = M'(|f|)$, 可设 f 非负.)

证明: 这里证明引理 2.12. 如前构造分解

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_j Q_j.$$

令 $2Q_j$ 为与 Q_j 同中心、边长为其两倍的立方体. 只需证明

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

固定 $x \notin \bigcup_j 2Q_j$, 令 Q 为任一以 x 为中心的立方体. 记其边长为 $\ell(Q)$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $2^{k-1} < \ell(Q) \leq 2^k$. 则 Q 与 $\mathcal{Q}_k$ 中至多 2^n 个二进立方体 $R_1, \dots, R_m$ 相交. 这些立方体都不包含于任何 Q_j , 否则 $x \in \bigcup_j 2Q_j$. 故 f 在每个 R_i 上的平均值至多为 λ , 从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f \leq 4^n \lambda.$$

由弱 (1, 1) 不等式和定理 2.2, 得到定理 2.10 后半部分的连续类比.

推论 2.13 (Lebesgue 微分定理): 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

由此可见 $|f(x)| \leq Mf(x)$ 几乎处处成立. 将 M 换成 M' 或 M'' 也成立. 还可加强推论 2.13 的结论:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \quad \text{a.e.} \quad (2.10)$$

这是下式的直接推论:

$$\sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \leq Mf(x) + |f(x)|.$$

使极限 (2.10) 等于 0 的点称为 f 的 Lebesgue 点. 若 x 是 Lebesgue 点, 且 $\{B_j\}$ 是球列, 满足 $B_1 \supset B_2 \supset \cdots$ 且 $\bigcap_j B_j = \{x\}$ (这些球不必以 x 为中心), 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} f = f(x).$$

这是包含关系 $B_j \subset B(x, 2r_j)$ 的直接推论, 其中 r_j 是 B_j 的半径. 类似论证表明, 用立方体代替球并不改变 f 的 Lebesgue 点集合.

M 的弱 $(1, 1)$ 不等式替代了并不成立的强 $(1, 1)$ 不等式. 事实上, 后者从不成立:

命题 2.14: 若 $f \in L^1$ 且不恒为 0, 则 $Mf \notin L^1$.

证明很简单. 因 f 不恒为 0, 存在 $R > 0$, 使 $\varepsilon = \int_{B_R} |f| > 0$. 若 $|x| > R$, 则 $B_R \subset B(x, 2|x|)$, 故

$$Mf(x) \geq \frac{1}{(2|x|)^n} \int_{B_R} |f| = \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n}.$$

不过仍有下述结论.

定理 2.15: 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集, 则

$$\int_B Mf(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx,$$

其中 $\log^+ t = \max(\log t, 0)$.

证明:

$$\int_B Mf < 2 \int_0^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda \leq 2|B| + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda.$$

把 f 分解为 $f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$, $f_2 = f - f_1$. 则

$$\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in B : Mf_1(x) > \lambda\}.$$

因此, 由弱 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda &\leq C \int_1^\infty \frac{1}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx d\lambda \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx. \end{aligned}$$

■

2.7 加权范数不等式

定理 2.16: 若 w 为非负可测函数且 $1 < p < \infty$, 则存在常数 C_p , 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Mf(x)|^p w(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p Mw(x) dx.$$

此外,

$$\int_{\{x: Mf(x) > \lambda\}} w(x) dx \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| Mw(x) dx. \quad (2.11)$$

证明: 只需证明 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$ 以及弱 $(1,1)$ 不等式; 强 (p,p) 不等式随后由 Marcinkiewicz 插值定理得到. 若对某个 x 有 $Mw(x) = 0$, 则 $w(x) = 0$ 几乎处处, 没有什么需要证明. 因此可设每个 x 都有 $Mw(x) > 0$.

若 $a > \|f\|_{L^\infty(Mw)}$, 则

$$\int_{\{x: |f(x)| > a\}} Mw(x) dx = 0,$$

故 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > a\}| = 0$, 即 $|f(x)| \leq a$ 几乎处处. 于是 $Mf(x) \leq a$ 几乎处处, 进而 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq a$. 所以 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$.

为证明弱 $(1,1)$ 不等式, 可设 f 非负且 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. (若 $f \in L^1(Mw)$, 则 $f_j = f\chi_{B(0,j)}$ 是逐点递增到 f 的可积函数序列.) 设 $\{Q_j\}$ 是高度 $\lambda > 0$ 处 f 的 Calderón-Zygmund 分解. 由引理 2.12 的证明,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\{M'f > 4^n \lambda\}} w(x) dx &\leq \sum_j \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) \left(\frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \right) dy \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) M''w(y) dy. \end{aligned}$$

由于 $M''w(y) \leq C_n Mw(y)$, 得到所需不等式. ■

若 w 满足 $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处成立, 则这些不等式两端可使用同一权函数 w . 满足此条件的函数称为 A_1 权; 第 7 章将进一步研究它们.

2.8 注记与进一步结果

2.8.1 参考资料

一维极大函数由 G. H. Hardy 与 J. E. Littlewood 引入 (*A maximal theorem with function-theoretic applications*, Acta Math. 54 (1930), 81–116), 高维情形由 N. Wiener 引入 (*The ergodic theorem*, Duke Math. J. 5 (1939), 1–18). Hardy 与 Littlewood 在文中首先考虑离散情形, 并说: “用板球或任何其他一名运动员积累一系列成绩并记录其平均数的运动来表述时, 这个问题最容易把握.”

他们使用递减重排的证明 (见下文 2.8.2) 可见 Zygmund [21]. 我们的证明遵循 Calderón 与 Zygmund 的思路 (*On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139); 以他们命名的分解也首次出现在该文中. 第 4 章讨论的旋转法使我们能从一维结果推出 $n > 1$ 时的强 (p,p) 不等式.

关于定理 2.2 的相关问题, 尤其是该定理中条件的必要性, 见 de Guzmán [7]. Marcinkiewicz 插值定理由 J. Marcinkiewicz 宣布 (*Sur l'interpolation d'opérations*, C. R. Acad. Sci. Paris 208 (1939), 1272–1273). 然而, 他在第二次世界大战中去世, 完整证明最终由 A. Zygmund 给出 (*On a theorem of Marcinkiewicz concerning interpolation of operations*, J. Math. Pures Appl. 34 (1956), 223–248). Marcinkiewicz 插值与第 1 章的 Riesz–Thorin 插值都已得到相当大的推广, 例如见 C. Bennett 与 R. Sharpley 的著作 (*Interpolation of Operators*, Academic Press, New York, 1988). 极大算子的加权范数不等式源于 C. Fefferman 与 E. M. Stein (*Some maximal inequalities*, Amer. J. Math. 93 (1971), 107–115).

2.8.2 Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排

给定 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ 上的函数 g , 作用于 g 的 Hardy 算子定义为

$$Tg(t) = \frac{1}{t} \int_0^t g(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

若 $g \in L^1(\mathbb{R}^+)$ 非负, 则因 Tg 连续, 可以证明

$$|E(\lambda)| = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} g(t) dt, \quad (2.12)$$

其中 $E(\lambda) = \{t \in \mathbb{R}^+ : Tg(t) > \lambda\}$. 由此与 (2.1) 得 $\|Tg\|_p \leq p' \|g\|_p, 1 < p < \infty$. 该结果的其他证明以及该算子的推广, 可见 G. H. Hardy、J. E. Littlewood 与 G. Pólya 的经典著作 (*Inequalities*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987; 初版 1932), 或上引 Bennett 与 Sharpley 一书第 2 章. 对实直线上的函数 f , 定义单侧 Hardy–Littlewood 极大函数

$$M^+ f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} |f(s)| ds, \quad M^- f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_{t-h}^t |f(s)| ds.$$

Hardy 与 Littlewood 所定义的极大函数, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数对应于 M^- (定义中 $0 < h < t$). 当 $|f|$ 递减时, 这一极大函数与作用于 $|f|$ 的 Hardy 算子一致.

若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 可在 $(0, \infty)$ 上定义一个递减函数 f^* , 称为 f 的递减重排, 它与 f 有相同的分布函数:

$$f^*(t) = \inf\{\lambda : a_f(\lambda) \leq t\}.$$

由于 f 与 f^* 有相同的分布函数, 由 (2.1), 它们的 L^p 范数相等; 任何只依赖分布函数的量也相等 (比较下文第 2.8.3 节). Hardy 算子作用于 f^* 的结果通常记作 f^{**} .

Hardy 与 Littlewood 证明, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数,

$$|\{x : M^- f(x) > \lambda\}| \leq |\{x : f^{**}(x) > \lambda\}|. \quad (2.13)$$

因此 M^- 的弱 $(1, 1)$ 与强 (p, p) 不等式可由 T 的相应不等式推出.

F. Riesz 利用他的“上升太阳引理”给出了 M^+ 弱 $(1, 1)$ 不等式的一个优美证明 (*Sur un théorème du maximum de MM. Hardy et Littlewood*, J. London Math. Soc. 7 (1932), 10–13). 给定 $\mathbb{R}$ 上的函数 F , 若存在 $y > x$ 使 $F(y) > F(x)$, 则称 x 为 F 的阴影点. F 的阴影点集记作 $S(F)$.

引理 2.17: 设 F 为连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

则 $S(F)$ 为开集, 并可写成有限开区间的两两不交并 $\bigcup_j (a_j, b_j)$, 且 $F(a_j) = F(b_j)$.

给定 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 与 $\lambda > 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt - \lambda x$. 则 $E(\lambda) = \{x : M^+ f(x) > \lambda\} = S(F)$. 利用引理 2.17 可推出

$$E(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} |f(x)| dx,$$

这与 Hardy 算子的 (2.12) 类似. 强 (p, p) 不等式可像以前一样推出, 常数为 p' (且为最佳常数). 证明细节及引理 2.17 的证明留给读者.

对 $\mathbb{R}^n$ 上的极大算子, 有与 (2.13) 类似的不等式. 事实上, 存在正常数 c_n, C_n , 使

$$c_n(Mf)^*(t) \leq f^{**}(t) \leq C_n(Mf)^*(t), \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

左侧不等式归功于 F. Riesz; 右侧不等式在 $n = 1$ 时归功于 C. Herz, 在 $n > 1$ 时归功于 C. Bennett 与 R. Sharpley. 关于证明和更多参考资料, 见后二位作者上述著作的第 3 章.

2.8.3 Lorentz 空间 $L^{p,q}$

设 (X, μ) 为测度空间. $L^{p,q}(X)$ 表示满足下列条件的可测函数 f 所成的空间:

$$\|f\|_{p,q} = \left(\frac{q}{p} \int_0^\infty [t^{1/p} f^*(t)]^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q} < \infty, \quad 1 \leq p < \infty, \quad 1 \leq q < \infty,$$

以及

$$\|f\|_{p,\infty} = \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t) < \infty, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

当 $p = q$ 时,

$$\|f\|_{p,p} = \|f^*\|_p = \|f\|_p,$$

从而恢复 L^p . 一般而言, $\|\cdot\|_{p,q}$ 并非范数, 因为三角不等式仅在 $1 \leq q \leq p < \infty$ 或 $p = q = \infty$ 时成立. 但当 $1 < p \leq \infty$ 且 $1 \leq q \leq \infty$ 时, 若在定义中以 f^{**} 代替 f^* , 所得量与 $\|f\|_{p,q}$ 等价并定义一个范数.

若 $q_1 \leq q_2$, 则 $\|f\|_{p,q_2} \leq \|f\|_{p,q_1}$, 因而 $L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$. 算子 T 为弱 (p, p) 型, 当且仅当

$$\|Tf\|_{p,\infty} \leq C\|f\|_p.$$

Marcinkiewicz 插值定理可推广到这些空间. 例如, 它给出比推论 1.20 更强的 Hausdorff–Young 不等式: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p',p}$, 且存在常数 $\bar{B}_p$, 使

$$\|\widehat{f}\|_{p',p} \leq \bar{B}_p \|f\|_p.$$

关于递减重排和 $L^{p,q}$ 空间的更多资料, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5] 及 Bennett 与 Sharpley 的上述著作. 关于插值定理, 特别是非常适用于 Lorentz 空间的所谓实插值法, 也可见后一部著作.

这些空间由 G. G. Lorentz 在两篇论文中引入: *Some new functional spaces*, Ann. of Math. 51 (1950), 37–55, 以及 *On the theory of spaces Λ* , Pacific J. Math. 1 (1951), 411–429.

2.8.4 $L \log L$

在命题 2.14 的证明中, Mf 的可积性在无穷远处失效, 但这并未排除局部可积性. 然而, 例子 $f(x) = x^{-1}(\log x)^{-2}\chi_{(0,1/2]}$ 表明局部可积性也可能失效. 定理 2.15 有一个部分逆命题, 它刻画了 Mf 何时局部可积.

定理 2.18: 若 f 是支集包含于紧集 B 的可积函数, 则 $Mf \in L^1(B)$ 当且仅当 $f \log^+ f \in L^1(B)$.

这一结果归功于 E. M. Stein (*Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310); 证明也可见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, p. 146]. 其证明的核心是极大函数弱 (1, 1) 不等式的加强形式及“反向”弱 (1, 1) 不等式:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}} |f(x)| dx, \quad (2.14)$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \geq \frac{c}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx. \quad (2.15)$$

不等式 (2.14) 由弱 (1, 1) 不等式应用于 $f_1 = f\chi_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}}$ 得到; 将 M 换成 M'' 后, 不等式 (2.15) 由 Calderón–Zygmund 分解得到.

在此类问题中, 希望把满足 $f \log^+ f \in L^1$ 的函数视为某个 Banach 空间的元素. 但 $\int f \log^+ f$ 不定义范数. 一种处理方法是引入 Luxemburg 范数: 给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|f\|_{L \log L(\Omega)} = \inf \left\{ \lambda > 0 : \int_{\Omega} \frac{|f(x)|}{\lambda} \log^+ \left(\frac{|f(x)|}{\lambda} \right) dx \leq 1 \right\}. \quad (2.16)$$

利用这一范数可将定理 2.18 加强为 $\|Mf\|_{L^1(B)} \leq C\|f\|_{L \log L(B)}$ (见 Zygmund [21, Chapter 4]). 以任意凸递增函数 Φ 代替 (2.16) 中的 $t \log^+ t$, 得到推广 L^p 空间的一类 Banach 函数空间 $L^\Phi(\Omega)$, 称为 Orlicz 空间. 这类空间具有丰富的理论; 更多资料可见 M. A. Krasnosel'skiĭ 与 Ya. B. Rutickiĭ 的著作 *Convex Functions and Orlicz Spaces*, P. Noordhoff, Groningen, 1961, 以及 M. M. Rao 与 Z. D. Ren 的著作 *Theory of Orlicz Spaces*, Marcel Dekker, New York, 1991.

2.8.5 常数的大小

本章证明中, M 与 M' 的弱 (1, 1) 和强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 中的常数关于维数 n 呈指数增长. 对强 (p, p) 不等式, 旋转法 (见 推论 4.7) 给出形如 $C_p n$ 的较好常数. 进一步可证明, 存在与 n 无关的常数 C_p , 使

$$\|Mf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

这一结果归功于 E. M. Stein, 证明发表于 E. M. Stein 与 J.-O. Strömberg 的论文 *Behavior of maximal functions in $\mathbb{R}^n$ for large n* , *Ark. Mat.* 21 (1983), 259–269; 另见 E. M. Stein, *Three variations on the theme of maximal functions*, 载于 *Recent Progress in Fourier Analysis*, I. Peral 与 J. L. Rubio de Francia 编, pp. 229–244, North-Holland, Amsterdam, 1985. 该结果可以部分推广. 若 B 是关于原点对称的凸集, 定义

$$M_B f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|rB|} \int_{rB} |f(x-y)| dy.$$

则当 $p > 3/2$ 时, 存在与 B, n 无关的常数 C_p , 使

$$\|M_B f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

对弱 $(1, 1)$ 不等式, M 目前已知的最佳常数为 n 阶 (见上述 Stein 与 Strömberg 的论文). 对 (2.6) 定义的非中心极大函数 (将立方体换成球), 强 (p, p) 不等式中的最佳常数必随 n 指数增长; 见 L. Grafakos 与 S. Montgomery-Smith, *Best constants for uncentered maximal functions*, Bull. London Math. Soc. 29 (1997), 60–64.

当 $n = 1$ 时, 单侧极大算子和非中心极大算子 M'' 的最佳常数已知, 但 M 的最佳常数未知. 对 M'' 的弱 $(1, 1)$ 不等式, 引理 2.6 给出 $C = 2$, 而函数 $f(t) = \chi_{[0,1]}$ 表明这是最佳常数. 关于 M'' 的强 (p, p) 不等式, 见上述 Grafakos 与 Montgomery-Smith 的论文. 关于 M 的弱 $(1, 1)$ 常数的上下界, 见 J. M. Aldaz, *Remarks on the Hardy–Littlewood maximal function*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 128 (1998), 1–9.

2.8.6 覆盖引理

证明 $\mathbb{R}^n$ 上的极大函数为弱 $(1, 1)$ 型的一种标准方法是使用覆盖引理. 这里给出两个. 第一个是 N. Wiener 给出的 Vitali 型引理. 若 $B = B(x, r)$ 且 $t > 0$, 记 $tB = B(x, tr)$.

定理 2.19: 设 $\{B_j\}_{j \in \mathcal{J}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族球. 则存在至多可数的两两不交子族 $\{B_k\}$, 使

$$\bigcup_{j \in \mathcal{J}} B_j \subset \bigcup_k 5B_k.$$

第二个引理由 A. Besicovitch 与 A. P. Morse 独立得到; 证明及更多参考资料可见 M. de Guzmán, *Differentiation of Integrals in $\mathbb{R}^n$* , Lecture Notes in Math. 481, Springer-Verlag, Berlin, 1985.

定理 2.20: 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 且 $\{B_x\}_{x \in A}$ 是一族球, 其中 $B_x = B(x, r_x)$, $r_x > 0$. 则存在至多可数的子族 $\{B_j\}$ 及只依赖维数的常数 C_n , 使

$$A \subset \bigcup_j B_j, \quad \sum_j \chi_{B_j}(x) \leq C_n.$$

将球换成立方体时同一结论仍成立; 更一般地, 点 x 不必是球或立方体的中心, 但必须一致地靠近中心. 利用 Besicovitch–Morse 引理, 可把极大函数的结果推广到相对于其他测度的 L^p 空间. 给定非负 Borel 测度 μ , 定义

$$M_\mu f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{\mu(B_r)} \int_{B_r} |f(x-y)| d\mu(y).$$

若 $\mu(B_r) = 0$, 则把 f 在 B_r 上的 μ -平均定义为 0. 可以证明 M_μ 相对于 μ 为弱 $(1, 1)$ 型, 因而由插值知它在 $L^p(\mu)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

若以立方体定义 M'_μ , 则除非 μ 满足附加倍增条件, M_μ 与 M'_μ 不必逐点等价: 存在 C , 使对任意球 B 有 $\mu(2B) \leq C\mu(B)$. 对非中心极大算子 M''_μ , 当 $n > 1$ 时, 除非 μ 满足倍增条件, 它甚至不必为弱 $(1, 1)$ 型. 在这种情形, 弱 $(1, 1)$ 不等式由 Wiener 引理推出; 当 $n = 1$ 时,

即便对非倍增测度也可应用引理 2.6. 使 M_μ'' 非弱 $(1, 1)$ 型的测度例子归功于 P. Sjögren, *A remark on the maximal function for measures on $\mathbb{R}^n$* , Amer. J. Math. 105 (1983), 1231–1233. 对某些测度, 比倍增更弱的条件也蕴含 M_μ'' 为弱 $(1, 1)$ 型; 例如见 A. Vargas, *On the maximal function for rotation invariant measures in $\mathbb{R}^n$* , Studia Math. 110 (1994), 9–17.

2.8.7 非切向 Poisson 极大函数

给定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $u(x, t) = P_t * f(x)$ 定义 f 到上半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 的调和延拓. 固定 $a > 0$, 令

$$\Gamma_a(x) = \{(y, t) : |y - x| < at\}.$$

这是顶点为 x 、孔径为 a 的锥. 我们要问是否有

$$\lim_{\substack{(y,t) \rightarrow (x,0) \\ (y,t) \in \Gamma_a(x)}} u(y, t) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

若 f 连续且具有紧支集, 则此极限对每个 x 都成立. 因此, 为应用定理 2.2, 只需考虑极大函数

$$u_a^*(x) = \sup_{(y,t) \in \Gamma_a(x)} |u(y, t)|.$$

存在只依赖 a 的常数 C_a , 使

$$u_a^*(x) \leq C_a Mf(x).$$

因此 u_a^* 为弱 $(1, 1)$ 型和强 (p, p) 型, $1 < p \leq \infty$, 并可结合定理 2.2 得到几乎处处非切向收敛. 这些结果还能推广到“切向”逼近区域, 条件是相伴极大函数具有弱有界性. 例如见 A. Nagel 与 E. M. Stein, *On certain maximal functions and approach regions*, Adv. in Math. 54 (1984), 83–106, 以及 D. Cruz-Uribe、C. J. Neugebauer 与 V. Olesen, *Norm inequalities for the minimal and maximal operator, and differentiation of the integral*, Publ. Mat. 41 (1997), 577–604.

2.8.8 强极大函数

令 $R(h_1, \dots, h_n) = [-h_1, h_1] \times \cdots \times [-h_n, h_n]$. 对 $f \in L_{\text{loc}}^1$, 定义

$$M_s f(x) = \sup_{h_1, \dots, h_n > 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} |f(x - y)| dy.$$

M_s 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p > 1$, 上有界, 这是单变量结果的推论. 但 M_s 不是弱 $(1, 1)$ 型; 最佳不等式为

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_s f(x) > \lambda\}| \leq C \int \frac{|f(x)|}{\lambda} \left(1 + \log^+ \frac{|f(x)|}{\lambda}\right)^{n-1} dx.$$

这一结果归功于 B. Jessen、J. Marcinkiewicz 与 A. Zygmund (*Note on the differentiability of multiple integrals*, Fund. Math. 25 (1935), 217–234). A. Córdoba 与 R. Fefferman 给出了几何证明 (*A geometric proof of the strong maximal theorem*, Ann. of Math. 102 (1975), 95–100); 另见 R. J. Bagby, *Maximal functions and rearrangements: some new proofs*, Indiana Univ. Math. J. 32 (1983), 879–891. 相应的 Lebesgue 微分定理

$$\lim_{\max(h_i) \rightarrow 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} f(x - y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

对某些 $f \in L^1$ 不成立, 但当 $f(1 + \log^+ |f|)^{n-1}$ 局部可积时成立, 特别地对某个 $p > 1$ 的 $f \in L^p_{\text{loc}}$ 成立.

若在 M_s 的定义中允许任意方向的长方体 (即平行多面体), 而不仅是边平行于坐标轴的长方体, 则所得算子在任何 $L^p, p < \infty$, 上都无界, 相伴微分定理甚至对有界 f 也不成立. 关于这些及其他积分微分问题, 见 de Guzmán [7], 上述同一作者的著作, 以及 A. M. Bruckner 的专著 *Differentiation of Integrals*, Amer. Math. Monthly 78 (1971), Slaughter Memorial Papers, 12.

2.8.9 Kakeya 极大函数

给定 $N > 1$, 令 $\mathcal{R}_N$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中所有这样的长方体所成的集合: $n-1$ 条边长为 h , 另一条边长为 $Nh, h > 0$. 定义 Kakeya 极大函数

$$\mathcal{K}_N f(x) = \sup_{R \in \mathcal{R}_N} \frac{1}{|R|} \int_R |f|.$$

由于 $\mathcal{R}_N$ 中每个长方体都包含于半径为 $c_n Nh$ 的球中. 因而 Kakeya 极大函数受 Hardy–Littlewood 极大函数逐点控制:

$$\mathcal{K}_N f(x) \leq C_n N^{n-1} Mf(x). \quad (2.17)$$

因此 $\mathcal{K}_N$ 在 $L^p, 1 < p \leq \infty$, 上有界.

由 (2.17) 及 L^∞ 范数为 1, 插值得

$$\|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{(n-1)/p} \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

当 $p = n$ 时, 猜想该常数可改进为 $\log N$ 的幂. 由插值, 这将给出

$$\begin{aligned} p \geq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p, \\ 1 < p \leq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{n/p-1} (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p. \end{aligned}$$

这一猜想与另外两个问题密切相关: Kakeya 集的 Hausdorff 维数, 即包含每个方向上一条线段的 Lebesgue 测度为零的集合 (见 Stein [17, p. 434]), 以及 Bochner–Riesz 乘子的有界性 (见第 8 章第 5 节和第 8.3 节).

该猜想仅在 $n = 2$ 时得到完全证明; 见 A. Córdoba, *The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers*, Amer. J. Math. 99 (1977), 1–22. 该文还讨论了它与 Bochner–Riesz 乘子的联系. Córdoba 后来证明了所有维数下 $1 < p < 2$ 的结果; 见 *A note on Bochner–Riesz operators*, Duke Math. J. 46 (1979), 505–511. M. Christ、J. Duoandikoetxea 与 J. L. Rubio de Francia 在 *Maximal operators related to the Radon transform and the Calderón–Zygmund method of rotations*, Duke Math. J. 53 (1986), 189–209 中把范围推广到 $1 < p \leq (n+1)/2$.

J. Bourgain 的工作极大地推动了这一问题 (*Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis*, Geom. Funct. Anal. 1 (1991), 147–187). 他证明了猜想对 $1 < p \leq (n+1)/2 + \varepsilon_n$ 成立, 其中 ε_n 由递推公式给出 (例如 $\varepsilon_3 = 1/3$). T. Wolff 在 *An improved bound for Kakeya type maximal functions*, Rev. Mat. Iberoamericana 11 (1995), 651–674 中把范围改进为 $1 < p \leq (n+2)/2$. 随后 J. Bourgain 在 *On the dimension of Kakeya*

sets and related maximal inequalities, Geom. Funct. Anal. 9 (1999), 256–282 中证明, 存在 $c > 1/2$, 使当 n 充分大时猜想对 $p \leq cn$ 成立.

关于该问题近期结果及其与 Kakeya 集的联系, 可见 T. Wolff 的综述 *Recent work connected with the Kakeya problem*, 载于 *Prospects in Mathematics*, H. Rossi 编, pp. 129–162, Amer. Math. Soc., Providence, 1999.

3 Hilbert 变换

3.1 共轭 Poisson 核

给定函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 它到上半平面的调和延拓为 $u(x, t) = P_t * f(x)$, 其中 P_t 是 Poisson 核. 由(1.29), 也可写成

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it.$$

现在定义

$$iv(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi - \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi.$$

则 v 也在 $\mathbb{R}_+^2$ 上调和, 而且当 f 为实值函数时, u 和 v 都是实值函数. 此外, $u + iv$ 是解析函数, 因而 v 是 u 的调和共轭.

显然, v 还可写成

$$v(z) = \int_{\mathbb{R}} -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

这等价于

$$v(x, t) = Q_t * f(x), \quad (3.1)$$

其中

$$\widehat{Q}_t(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|}. \quad (3.2)$$

对 Fourier 变换作反演, 得

$$Q_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{t^2 + x^2}. \quad (3.3)$$

这就是共轭 Poisson 核. 立即可以验证 $Q(x, t) = Q_t(x)$ 是上半平面内的调和函数, 并且是 Poisson 核 $P_t(x)$ 的调和共轭. 更准确地说,

$$P_t(x) + iQ_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{t + ix}{t^2 + x^2} = \frac{i}{\pi z},$$

它在 $\operatorname{Im} z > 0$ 时解析.

在第 2 章中, 我们利用 $\{P_t\}$ 是恒等逼近这一事实研究了 $t \rightarrow 0$ 时 $u(x, t)$ 的极限. 我们也希望对 $v(x, t)$ 作同样处理, 但立即遇到一个障碍: $\{Q_t\}$ 不是恒等逼近, 事实上对任意 $t > 0$, Q_t 都不可积. 形式上,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t(x) = \frac{1}{\pi x};$$

它甚至不是局部可积函数, 因而不能定义它与光滑函数的卷积.

3.2 $1/x$ 的主值

我们定义一个称为 $1/x$ 的主值的缓增分布, 记作 p. v. $1/x$:

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

为了看出这个表达式定义了一个缓增分布, 将它改写为

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \int_{|x|<1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_{|x|>1} \frac{\varphi(x)}{x} dx;$$

这是因为 $1/x$ 在 $\varepsilon < |x| < 1$ 上的积分为零. 于是立即得到

$$\left| \text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) \right| \leq C(\|\varphi'\|_\infty + \|x\varphi\|_\infty).$$

命题 3.1: 在 $\mathcal{S}'$ 中,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

证明: 对每个 $\varepsilon > 0$, 函数 $\psi_\varepsilon(x) = x^{-1} \chi_{\{|x|>\varepsilon\}}$ 有界并定义缓增分布. 由定义立即知道, 在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \psi_\varepsilon = \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

因此只需证明在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(Q_t - \frac{1}{\pi} \psi_t \right) = 0.$$

固定 $\varphi \in \mathcal{S}$. 则

$$\begin{aligned} (\pi Q_t - \psi_t)(\varphi) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx - \int_{|x|>t} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\ &= \int_{|x|<t} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx + \int_{|x|>t} \left(\frac{x}{t^2 + x^2} - \frac{1}{x} \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_{|x|<1} \frac{x\varphi(tx)}{1 + x^2} dx - \int_{|x|>1} \frac{\varphi(tx)}{x(1 + x^2)} dx. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0$ 并应用控制收敛定理, 得到两个在对称区域上对奇函数的积分. 因而极限为零. ■

由命题 3.1 可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy,$$

再由 Fourier 变换在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性及(3.2), 得

$$\left(\frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} \right)^\wedge(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi).$$

给定 $f \in \mathcal{S}$, 用下列任一等价表达式定义它的 Hilbert 变换:

$$Hf = \lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f, \quad Hf = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} * f, \quad \widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

第三个表达式还允许我们定义 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数的 Hilbert 变换; 它满足

$$\|Hf\|_2 = \|f\|_2, \tag{3.4}$$

$$H(Hf) = -f, \tag{3.5}$$

以及

$$\int Hf \cdot g = - \int f \cdot Hg. \tag{3.6}$$

3.3 M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理

下一个定理说明, 目前定义在 $\mathcal{S}$ 或 L^2 上的 Hilbert 变换可以延拓到 L^p 中的函数, $1 \leq p < \infty$.

定理 3.2: 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 下列断言成立:

1. (Kolmogorov) H 为弱 $(1,1)$ 型:

$$|\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

2. (M. Riesz) H 为强 (p,p) 型, $1 < p < \infty$:

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

证明: (1) 固定 $\lambda > 0$ 并设 f 非负. 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解 (见定理 2.11), 得到一系列互不相交的区间 $\{I_j\}$, 使得

$$f(x) \leq \lambda \quad \text{a.e. } x \in \Omega^c, \quad \Omega = \bigcup_j I_j,$$

$$|\Omega| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1, \quad \lambda < \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \leq 2\lambda.$$

由这个 $\mathbb{R}$ 的分解, 将 f 写成两个函数 g 与 b 之和, 其中

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \Omega, \\ \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f, & x \in I_j, \end{cases} \quad b(x) = \sum_j b_j(x),$$

并且

$$b_j(x) = \left(f(x) - \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \right) \chi_{I_j}(x).$$

于是 $g(x) \leq 2\lambda$ 几乎处处成立, 而 b_j 支撑于 I_j 且积分为零. 因为 $Hf = Hg + Hb$,

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}|. \end{aligned}$$

利用(3.4) 估计第一项:

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| &\leq \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} |Hg(x)|^2 dx \\ &= \frac{4}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} g(x)^2 dx \leq \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx. \end{aligned}$$

令 $2I_j$ 表示与 I_j 同心而长度为其两倍的区间, 并令 $\Omega^* = \bigcup_j 2I_j$. 则 $|\Omega^*| \leq 2|\Omega|$, 而且

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}| &\leq |\Omega^*| + |\{x \notin \Omega^* : |Hb(x)| > \lambda/2\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1 + \frac{2}{\lambda} \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |Hb(x)| dx. \end{aligned}$$

几乎处处有 $|Hb(x)| \leq \sum_j |Hb_j(x)|$: 当求和有限时这是显然的; 否则, 它来自 $\sum b_j$ 与 $\sum Hb_j$ 分别在 L^2 中收敛到 b 与 Hb . 因而要完成弱 $(1, 1)$ 不等式的证明, 只需证明

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq C \|f\|_1.$$

尽管 $b_j \notin \mathcal{S}$, 当 $x \notin 2I_j$ 时公式

$$Hb_j(x) = \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy$$

仍成立. 记 I_j 的中心为 c_j . 因为 b_j 的积分为零,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx &= \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \left| \int_{I_j} b_j(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right) dy \right| dx \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|y-c_j|}{|x-y||x-c_j|} dx \right) dy \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(|I_j| \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{dx}{|x-c_j|^2} \right) dy. \end{aligned}$$

最后一个不等式利用了 $|y-c_j| \leq |I_j|/2$ 以及 $|x-y| \geq |x-c_j|/2$. 括号内的积分等于 2, 因此

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq 2 \sum_j \int_{I_j} |b_j(y)| dy \leq 4 \|f\|_1.$$

上面的弱 $(1, 1)$ 证明针对非负函数 f , 但这已经足够, 因为任意实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部.

(2) 因为 H 为弱 $(1, 1)$ 型和强 $(2, 2)$ 型, Marcinkiewicz 插值定理给出 $1 < p < 2$ 时的强 (p, p) 不等式. 当 $p > 2$ 时, 应用(3.6) 及 $p' < 2$ 时的结果:

$$\begin{aligned} \|Hf\|_p &= \sup \left\{ \left| \int Hf \cdot g \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \left| \int f \cdot Hg \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &\leq \|f\|_p \sup \{ \|Hg\|_{p'} : \|g\|_{p'} \leq 1 \} \leq C_{p'} \|f\|_p. \end{aligned}$$

■

定理 3.2 第一部分证明中的函数 g 与 b 传统上分别称为 f 的好部与坏部.

从这些证明还可看出, 强 (p, p) 与 (p', p') 不等式中的常数相同, 并且当 p 趋于 1 或无穷时趋于无穷. 更准确地说,

$$C_p = O(p) \quad (p \rightarrow \infty), \quad C_p = O((p-1)^{-1}) \quad (p \rightarrow 1).$$

利用定理 3.2 中的不等式, 可将 Hilbert 变换延拓到 L^p , $1 \leq p < \infty$. 若 $f \in L^1$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^1 范数收敛到 f 的函数列, 则由弱 $(1, 1)$ 不等式, $\{Hf_n\}$ 在测度意义下为 Cauchy 列: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |(Hf_n - Hf_m)(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

因此它在测度意义下收敛到一个可测函数, 我们将此函数定义为 f 的 Hilbert 变换.

若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^p 范数收敛到 f 的函数列, 则由强 (p, p) 不等式, $\{Hf_n\}$ 是 L^p 中的 Cauchy 列, 因而收敛到 L^p 中的一个函数, 我们称之为 f 的 Hilbert 变换.

在两种情形下, $\{Hf_n\}$ 都有一个依赖于 f 的子列几乎处处逐点收敛到上述定义的 Hf .

当 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时, 强 (p, p) 不等式不成立. 取 $f = \chi_{[0,1]}$ 即可看出这一点. 此时

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x}{x-1} \right|,$$

而 Hf 既不可积也无界.

在 Schwartz 类中, 容易刻画 Hilbert 变换可积的函数: 对 $\varphi \in \mathcal{S}$, $H\varphi \in L^1$ 当且仅当 $\int \varphi = 0$. 其证明留作练习. 关于 Hilbert 变换在 L^1 上性质的更多资料, 见第 3.6.5 节.

在第 6 章中, 我们将考察 Hilbert 变换仍然可积的可积函数空间, 以及能够为有界函数 f 定义 Hf 的一个比 L^∞ 更大的空间 (另见第 3.6.6 节).

3.4 截断积分与逐点收敛

对 $\varepsilon > 0$, 函数 $y^{-1}\chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 属于 $L^q(\mathbb{R})$, $1 < q \leq \infty$, 因而当 $f \in L^p$, $p \geq 1$ 时,

$$H_\varepsilon f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy$$

有良好定义. 此外, H_ε 满足与定理 3.2 相同的弱 $(1, 1)$ 和强 (p, p) 估计, 且常数对所有 ε 一致有界. 为此先注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{y} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}} \right)^\wedge(\xi) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{e^{-2\pi i y \xi}}{y} dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{-i \sin(2\pi y \xi)}{y} dy \\ &= -2i \operatorname{sgn}(\xi) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{2\pi \varepsilon |\xi|}^{2\pi N |\xi|} \frac{\sin t}{t} dt. \end{aligned}$$

它一致有界, 所以强 $(2, 2)$ 不等式成立, 且常数与 ε 无关. 现在可以完全仿照定理 3.2 证明弱 $(1, 1)$ 不等式, 再由插值和对偶性得到强 (p, p) 不等式.

若固定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则当 $p > 1$ 时, $\{H_\varepsilon f\}$ 依 L^p 范数收敛到上述定义的 Hf ; 当 $p = 1$ 时, 它在测度意义下收敛到 Hf . 为看出这一点, 固定 $\mathcal{S}$ 中收敛到 f 的函数列 $\{f_n\}$. 则

$$Hf = \lim_{n \rightarrow \infty} Hf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f;$$

第二个与第三个等号由相应的 (一致) (p, p) 不等式得到.

下面要证明同一等式几乎处处逐点成立.

定理 3.3: 给定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$Hf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}. \quad (3.7)$$

因为已知(3.7) 对某个子列 $\{H_{\varepsilon_k} f\}$ 成立, 只需证明 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x)$ 对几乎所有 x 存在. 由定理 2.2 及其后的说明, 只需证明极大算子

$$H^* f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |H_\varepsilon f(x)|$$

为弱 (p, p) 型. 这由下一个结果推出.

定理 3.4: H^* 为强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 并且为弱 $(1, 1)$ 型.

为证明这个定理, 需要一个称为 Cotlar 不等式的引理.

引理 3.5: 若 $f \in \mathcal{S}$, 则

$$H^* f(x) \leq M(Hf)(x) + CMf(x).$$

证明: 只需对每个 H_ε 证明该不等式, 并使常数与 ε 无关.

固定非负、偶、在 $(0, \infty)$ 上递减、支撑于 $\{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1/2\}$ 且积分为 1 的函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

令 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1} \varphi(x/\varepsilon)$. 则

$$\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} = \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) + \left[\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} - \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right].$$

右端第一项与 f 的卷积受 $M(Hf)(x)$ 控制 (参见命题 2.7). 只需在 $\varepsilon = 1$ 时求出第二项的逐点估计, 其他 ε 由伸缩得到.

若 $|y| > 1$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{y} - \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)}{y-x} dx \right| &= \left| \int_{|x| < 1/2} \varphi(x) \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-x} \right) dx \right| \\ &\leq \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)|x|}{|y| |y-x|} dx \leq \frac{C}{y^2}; \end{aligned}$$

若 $|y| < 1$, 则

$$\left| -\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} \frac{\varphi(y-x)}{x} dx \right| \leq \left| \int_{|x| < 2} \frac{\varphi(y-x) - \varphi(y)}{x} dx \right| \leq C.$$

因此

$$\left| \frac{1}{y} \chi_{\{|y| > 1\}} - \left(\varphi * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right| \leq \frac{C}{1+y^2},$$

而由命题 2.7, 右端与 f 的卷积受 $Mf(x)$ 控制. ■

证明: 定理 3.4 的证明. 因为极大函数和 Hilbert 变换都是强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 由引理 3.5 立即知道 H^* 为强 (p, p) 型.

为证明 H^* 为弱 $(1, 1)$ 型, 先仿照定理 3.2 的证明. 可设 $f \geq 0$. 固定 $\lambda > 0$, 在高度 λ 对 f 作 Calderón-Zygmund 分解, 写成

$$f = g + b = g + \sum_j b_j.$$

涉及 g 的论证与定理 3.2 相同, 其中使用 H^* 为强 $(2, 2)$ 型这一事实. 因而问题归结为证明

$$|\{x \notin \Omega^* : H^* b(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|b\|_1.$$

固定 $x \notin \Omega^*$ 、 $\varepsilon > 0$ 以及支撑于 I_j 的 b_j . 则下列情形之一成立:

1. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = I_j$;
2. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = \emptyset$;
3. $x - \varepsilon \in I_j$ 或 $x + \varepsilon \in I_j$.

第一种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = 0$. 第二种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = Hb_j(x)$; 因此若以 c_j 表示 I_j 的中心, 由 b_j 的平均值为零,

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \left| \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right| |b_j(y)| dy \leq \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1.$$

第三种情形下, 因为 $x \notin \Omega^*$, 有 $I_j \subset (x - 3\varepsilon, x + 3\varepsilon)$, 而且对所有 $y \in I_j$, $|x - y| > \varepsilon/3$. 因而

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \frac{|b_j(y)|}{|x-y|} dy \leq \frac{3}{\varepsilon} \int_{x-3\varepsilon}^{x+3\varepsilon} |b_j(y)| dy.$$

对所有 j 求和, 得

$$|H_\varepsilon b(x)| \leq \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 + CMb(x).$$

由此推出

$$\begin{aligned} |\{x \notin \Omega^* : H^*b(x) > \lambda\}| &\leq \left| \left\{ x \notin \Omega^* : \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 > \lambda/2 \right\} \right| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : Mb(x) > \lambda/(2C)\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \sum_j \|b_j\|_1 \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} dx + \frac{C'}{\lambda} \|b\|_1 \\ &\leq \frac{C''}{\lambda} \|b\|_1. \end{aligned}$$

■

3.5 乘子

给定函数 $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上定义有界算子 T_m :

$$\widehat{T_m f}(\xi) = m(\xi) \hat{f}(\xi). \quad (3.8)$$

由 Plancherel 定理, 当 $f \in L^2$ 时 $T_m f$ 有良好定义, 并且

$$\|T_m f\|_2 \leq \|m\|_\infty \|f\|_2.$$

容易看出 T_m 的算子范数就是 $\|m\|_\infty$: 固定 $\varepsilon > 0$, 在集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : |m(x)| > \|m\|_\infty - \varepsilon\}$ 中取一个测度有限且为正的 measurable 子集 A , 并令 f 是满足 $\hat{f} = \chi_A$ 的 L^2 函数. 则

$$\|T_m f\|_2 > (\|m\|_\infty - \varepsilon) \|f\|_2.$$

我们称 m 为算子 T_m 的乘子, 尽管有时也把算子本身称为乘子. 当 T_m 可以延拓为 L^p 上的有界算子时, 称 m 为 L^p 乘子.

例如, Hilbert 变换的乘子 $m(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi)$ 是 L^p 乘子. 更一般地, 给定 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 定义 $m_{a,b}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi)$. 令 $S_{a,b}$ 为与此乘子相伴的算子:

$$\widehat{S_{a,b}f}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

它还有等价表达式

$$S_{a,b} = \frac{i}{2} (M_a H M_{-a} - M_b H M_{-b}), \quad (3.9)$$

其中 M_a 是逐点乘以 $e^{2\pi i a x}$ 的算子,

$$M_a f(x) = e^{2\pi i a x} f(x).$$

为验证这一点, 注意由(1.16), $i M_a H M_{-a}$ 的乘子为 $\operatorname{sgn}(\xi - a)$. 显然 M_a 在 L^p , $1 \leq p \leq \infty$ 上有界且范数为 1. 因而由(3.9) 和 H 的强 (p, p) 不等式, $S_{a,b}$ 在 L^p 上有界.

对上述论证作显然的修改, 可知当 $a = -\infty$ 或 $b = \infty$ 时结论仍成立. 因而得到下述结果.

命题 3.6: 存在常数 C_p , $1 < p < \infty$, 使得对所有 $-\infty \leq a < b \leq \infty$,

$$\|S_{a,b}f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

作为这一结果的一个应用, 取 $a = -R$, $b = R$. 此时 $S_{a,b}$ 就是第 1 章中引入的部分和算子 S_R : $S_R f = D_R * f$, 其中 D_R 是 Dirichlet 核. 因而

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

且常数与 R 无关. 由此得到下述推论.

推论 3.7: 若 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|S_R f - f\|_p = 0.$$

当 $p = 1$ 时没有范数收敛, 只有测度意义下的收敛:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |S_R f(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

由这个结果和推论 3.7 可知, 存在一个序列 $\{S_{R_k} f(x)\}$, 它对几乎所有 x 收敛到 $f(x)$, 但这个序列依赖于 f .

给定 L^p 上一族一致有界的算子, 它们的任意凸组合仍然有界. 因而由命题 3.6 还可得到另一个推论.

推论 3.8: 若 m 是 $\mathbb{R}$ 上的有界变差函数, 则 m 是 L^p 乘子, $1 < p < \infty$.

证明: 因为 m 有界变差, 所以 $\lim_{t \rightarrow -\infty} m(t)$ 存在. 必要时给 m 加上一个常数, 可设该极限为零. 还可将 m 规范化为在每个 $x \in \mathbb{R}$ 处右连续. 令 dm 为与 m 相伴的 Lebesgue-Stieltjes 测度. 则

$$m(\xi) = \int_{-\infty}^{\xi} dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(-\infty, \xi)}(t) dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) dm(t).$$

因此

$$\widehat{T_m f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) \widehat{f}(t) dm(t),$$

从而

$$T_m f(x) = \int_{\mathbb{R}} S_{t,\infty} f(x) dm(t).$$

由 Minkowski 不等式,

$$\|T_m f\|_p \leq \int_{\mathbb{R}} \|S_{t,\infty} f\|_p |dm|(t) \leq C_p \|f\|_p \int_{\mathbb{R}} |dm|(t).$$

$|dm|$ 的积分就是 m 的全变差, 按假设它是有限的. ■

给定一个乘子, 可以通过平移、伸缩和旋转构造其他乘子.

命题 3.9: 若 m 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, 则由

$$m(\xi + a), \quad a \in \mathbb{R}^n; \quad m(\lambda \xi), \quad \lambda > 0; \quad m(\rho \xi), \quad \rho \in O(n)$$

定义的函数都是 L^p 上有界算子的乘子, 且算子范数均与 T_m 相同.

这一结论由 Fourier 变换的性质(1.16)、(1.17) 与(1.18) 立即得到.

若 m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, 则 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\tilde{m}(\xi) = m(\xi_1)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 事实上, 若 T_m 是与 m 相伴的一维算子, 则对定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 f ,

$$T_{\tilde{m}} f(x) = T_m f(\cdot, x_2, \dots, x_n)(x_1).$$

由 Fubini 定理和 T_m 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界性,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_{\tilde{m}} f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |T_m f(\cdot, x_2, \dots, x_n)(x_1)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x_1, \dots, x_n)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

取 $m = \chi_{(0,\infty)}$. 由命题 3.6, m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, $1 < p < \infty$. 因而由前面的论证, 半空间 $\{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_1 > 0\}$ 的特征函数是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 再由命题 3.9, 任意半空间的特征函数也具有同样性质, 因为任意半空间都可由上述半空间经旋转和平移得到. 一个有 N 个面的凸多面体的特征函数可写成 N 个半空间特征函数的乘积, 所以它也是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, $1 < p < \infty$. 由此得到下述推论.

推论 3.10: 若 $P \subset \mathbb{R}^n$ 是包含原点的凸多面体, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|S_{\lambda P} f - f\|_p = 0, \quad 1 < p < \infty,$$

其中 $S_{\lambda P}$ 是以 $\lambda P = \{\lambda x : x \in P\}$ 的特征函数为乘子的算子.

根据上述观察, 下述事实可能颇令人惊讶: 当 $n > 1$ 时, 以原点为中心的球的特征函数在 $p \neq 2$ 时不是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的有界乘子. 我们将在第 8 章中考察这一事实以及 $\mathbb{R}^n$ 上乘子的相关结果 (另见下文第 3.6.8 节).

3.6 注记与进一步结果

3.6.1 参考资料

M. Riesz 定理的证明最早发表于论文 *Sur les fonctions conjuguées* (Math. Zeit. 27 (1927), 218–244), 但更早已在 *Les fonctions conjuguées et les séries de Fourier* (C. R. Acad. Sci. Paris 178 (1924), 1464–1467) 中宣布. 正文中的证明只有在 Marcinkiewicz 插值定理于 1939 年出现后才成为可能. Riesz 的原始证明以及 M. Cotlar 的另一证明, 见下文第 3.6.3 节; 后一证明见 *A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems*, Rev. Mat. Cuyana 1 (1955), 105–167. Zygmund [22] 还收录了 A. P. Calderón 的 *On the theorems of M. Riesz and Zygmund*, Proc. Amer. Math. Soc. 1 (1950), 533–535, 以及 P. Stein 的 *On a theorem of M. Riesz*, J. London Math. Soc. 8 (1933), 242–247 中的证明.

Kolmogorov 的定理见 *Sur les fonctions harmoniques conjuguées et les séries de Fourier*, Fund. Math. 7 (1925), 23–28. L. H. Loomis 在 *A note on Hilbert's transform*, Bull. Amer. Math. Soc. 52 (1946), 1082–1086 中给出的另一证明可见 Zygmund [22], 而 L. Carleson 的一个优美证明由 Katznelson [10] 给出. 我们的证明使用 Calderón–Zygmund 分解, 其使用方式与第 5 章中处理更一般奇异积分时相同. 它源于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 的证明 *On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139. 引理 3.5 见上引 M. Cotlar 的论文.

3.6.2 共轭函数与 Fourier 级数

本章结果也可对定义在单位圆上的函数建立. 从历史上看, 它们的发展与第 1 章讨论的 Fourier 级数理论密切相关.

给定 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 等价地说, 给定 $L^1([0, 1])$ 中的函数, 它到单位圆盘的调和延拓由与 Poisson 核

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到.

$P_r * f(t)$ 的调和共轭由与共轭 Poisson 核

$$Q_r(t) = \frac{2r \sin(2\pi t)}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到. Hilbert 变换的对应物是共轭算子, 定义为

$$\tilde{f}(x) = \lim_{r \rightarrow 1^-} Q_r * f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < t < 1/2} \frac{f(x-t) - f(x+t)}{\tan(\pi t)} dt. \quad (3.10)$$

可以证明这两个极限对几乎所有 x 都存在.

M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理对共轭算子也成立. 因而通过与第 3.5 节相似的论证, 可以证明 Fourier 级数的部分和算子 $S_N f$ 在 L^p 上一致有界, 从而 $S_N f$ 在 L^p 中收敛到 f (参见第 1 章第 1.4 节).

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 它的共轭 Fourier 级数是三角级数

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} -i \operatorname{sgn}(k) \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

若 f 的 Fourier 级数写成(1.1) 的形式, 则将正弦项与余弦项的系数互换, 并取其差而非其和, 即得共轭级数:

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \sin(2\pi kx) - b_k \cos(2\pi kx)).$$

当 $\tilde{f} \in L^1$ 时, $\tilde{S}[f]$ 与 $\tilde{f}$ 的 Fourier 级数一致.

即使对连续函数, (3.10) 中的第二个极限之所以存在, 也是因为微妙的抵消, 而不是因为 t 接近零时分子变小. 利用 Baire 纲定理可以证明, 存在连续函数 f , 使得对每个 $x \in [0, 1]$,

$$\int_0^{1/2} \frac{|f(x-t) - f(x+t)|}{\tan(\pi t)} dt = \infty.$$

Hilbert 变换也出现同一现象.

关于这些以及更多结果, 见 Bary [1]、Katznelson [10]、Koosis [11] 和 Zygmund [21] 的著作.

3.6.3 M. Riesz 定理的其他证明

M. Riesz 关于共轭函数 L^p 有界性的原始证明以解析函数的幂的解析性为基础. 最容易的情形是 $p = 2k$, 其中 k 为整数. 给定单位圆上的函数 f , 令 $u = P_r * f$ 、 $v = Q_r * f$; 则 $F(z) = u + iv$ 在单位圆盘内解析, 因而 $F(z)^{2k}$ 也解析. 由 Cauchy 定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{F(z)^{2k}}{z} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(re^{it})^{2k} dt = F(0)^{2k}.$$

若 $F(0) = 0$, 对 $F(re^{it})^{2k}$ 取实部, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq \sum_{j=1}^k \binom{2k}{2j} \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2j} |v(re^{it})|^{2k-2j} dt.$$

对右端每一项应用具有适当指数的 Hölder 不等式, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq C_k \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2k} dt,$$

其中 C_k 与圆的半径无关. 令半径趋于 1, u 趋于 f , 而 v 趋于 $\tilde{f}$. 当 $F(0) = \hat{f}(0) \neq 0$ 时, 用 $f - \hat{f}(0)$ 代替 f .

从 $p = 2k$ 时的不等式出发, 可以用插值与对偶性得到整个定理. 但 1923 年尚无插值理论可用, 因而 Riesz 随后考虑 $p > 1$ 且 p 不是整数的情形. 为使 $(u + iv)^p$ 解析, 他假设 $u > 0$ (当 f 非负且不恒为零时确实如此), 然后使用了一个巧妙的估计. 由于技术原因, 该论证对奇整数 p 不适用, 这些 p 值的不等式则由对偶性得到. 在一封写于 1923 年 11 月的信中, Riesz 向 Hardy 解释了自己如何得到这一证明, 并向他展示了关键细节; 该信转载于 M. L. Cartwright, *Manuscripts of Hardy, Littlewood, M. Riesz and Titchmarsh*, Bull. London Math. Soc. 14 (1982), 472–532.

由 $(u + iv)^2 = u^2 - v^2 + 2iuv$ 解析这一事实, 得

$$H(f^2 - (Hf)^2) = 2f \cdot Hf,$$

从而得到 Cotlar 的公式

$$(Hf)^2 = f^2 + 2H(f \cdot Hf). \quad (3.11)$$

Cotlar 在其论文中提出了另一种证明方式, 即直接证明

$$\widehat{Hf} * \widehat{Hf} = \widehat{f} * \widehat{f} - 2i \operatorname{sgn}(\xi) (\widehat{f} * \widehat{Hf}).$$

由(3.11) 可知, 如果 $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 则

$$\|Hf\|_{2p} \leq \left(C_p + \sqrt{C_p^2 + 1} \right) \|f\|_{2p}.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \|Hf\|_{2p}^2 &= \|(Hf)^2\|_p \\ &\leq \|f^2\|_p + 2\|H(f \cdot Hf)\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f \cdot Hf\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f\|_{2p} \|Hf\|_{2p}, \end{aligned}$$

解这个二次不等式即得所需结论.

从(3.4) 出发反复应用这一不等式, 例如可得对整数 $k \geq 1$,

$$\|Hf\|_{2^k} \leq (2^k - 1) \|f\|_{2^k}.$$

再由 Riesz–Thorin 插值定理 (定理 1.19), 得

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad p \geq 2.$$

像定理 3.2 的证明那样使用对偶性, 可得到 $p < 2$ 时的 Riesz 定理.

$p = 2$ 时还有下面这个不使用 Fourier 变换的初等实变量证明:

$$\|H_\varepsilon f\|_2^2 = \langle f, -H_\varepsilon H_\varepsilon f \rangle \leq \|f\|_2 \|H_\varepsilon H_\varepsilon f\|_2.$$

$H_\varepsilon H_\varepsilon$ 的核是 $y^{-1} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 与自身的卷积, 它可以显式算出并证明属于 L^1 . 通过伸缩论证, 只需考虑 $\varepsilon = 1$ 的情形. E. M. Dyn'kin 在 *Methods of the theory of singular integrals: Hilbert transform and Calderón–Zygmund theory, Commutative Harmonic Analysis*, I, V. Havin and N. Nikolskii 编, pp. 167–259, Springer-Verlag, Berlin, 1991 中将这个证明归于 N. Lusin (1951). Schur 更早曾对算子的离散版本使用类似论证.

另一个在 $p = 2$ 时使用 Cotlar 引理的实变量证明见第 9 章第 1 节.

3.6.4 常数的大小

Kolmogorov 与 M. Riesz 定理中的最佳常数是已知的. 对强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 最佳常数为

$$C_p = \tan \frac{\pi}{2p}, \quad 1 < p \leq 2; \quad C_p = \cot \frac{\pi}{2p}, \quad 2 \leq p < \infty.$$

S. K. Pichorides 在 *On the best values of the constants in the theorems of M. Riesz, Zygmund and Kolmogorov*, *Studia Math.* 44 (1972), 165–179 中首先证明这一结果; L. Grafakos 后来在

Best bounds for the Hilbert transform on $L^p(\mathbb{R}^1)$, Math. Res. Let. 4 (1997), 469–471 中给出了简单得多的证明.

在上面 Cotlar 给出的 M. Riesz 定理证明中, 得到估计

$$C_{2p} \leq C_p + \sqrt{C_p^2 + 1}.$$

若从 $C_2 = 1$ 出发, 所得到的 C_{2^k} 上界是锐的. I. Gohberg 与 N. Krupnik 在 *Norm of the Hilbert transformation in the space L^p* , Funct. Anal. Appl. 2 (1968), 180–181 中首先注意到这一事实.

弱 (1, 1) 不等式中的最佳常数具有更复杂的表达式:

$$C_1 = \frac{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots}{1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \cdots}.$$

B. Davis 使用 Brownian 运动首先证明了这一结果, 见 *On the weak type (1, 1) inequality for conjugate functions*, Proc. Amer. Math. Soc. 44 (1974), 307–311. A. Baernstein 后来在 *Some sharp inequalities for conjugate functions*, Indiana Univ. Math. J. 27 (1978), 833–852 中给出了一个非概率证明.

3.6.5 L^1 上的 Hilbert 变换

正如第 3.3 节指出的, 若 $f \in L^1$, 则 Hf 未必属于 L^1 . 但是, 与极大函数的情形不同, 存在 $f \in L^1$ 使得 $Hf \in L^1$. 例如, 若 $f = \chi_{(0,1)} - \chi_{(-1,0)}$, 则

$$Hf(x) = \log \frac{|x^2 - 1|}{x^2}$$

是可积的.

当 $f \in L^1$ 时, Hf 可积的一个简单必要条件是 $\widehat{f}(0) = \int f = 0$. 若 f 满足恒等式 $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$, 只需注意可积函数的 Fourier 变换连续, 而 $\widehat{f}(\xi)$ 与 $-i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$ 只有在 $\widehat{f}(0) = 0$ 时才能同时连续. 当 $f \in L^1 \cap L^2$ 时, Fourier 变换恒等式成立, 因而这个论证显然适用. 但可以证明, 当 $f, Hf \in L^1$ 时该恒等式也成立. 为此, 若能对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$ 证明

$$\varphi * (Hf) = H(\varphi * f),$$

则对两边取 Fourier 变换并化简即可. A. P. Calderón 与 O. Capri 在 *On the convergence in L^1 of singular integrals*, Studia Math. 78 (1984), 321–327 中按照处理更一般奇异积分的方法证明了这一等式.

同样, 当 $f, Hf \in L^1$ 时, 有恒等式 $H(Hf) = -f$. 我们在(3.5) 中首先对 L^2 函数给出这个恒等式, 利用本章结果可将它延拓到 L^p , $1 < p < \infty$. 当 f 与 Hf 可积时, E. Hille 与 J. D. Tamarkin 在 *On the absolute integrability of the Fourier transform*, Fund. Math. 25 (1935), 329–352 中给出了使用复分析的证明. J. F. Toland 的论文 *A few remarks about the Hilbert transform*, J. Funct. Anal. 145 (1997), 151–174 考察了这一问题, 并给出了更多历史资料.

一般而言 $Hf \notin L^1$, 因而甚至不能定义 Hf 的 Hilbert 变换. 不过, 如果用一种更一般的积分取代 Lebesgue 积分, 就可以定义 $H(Hf)$ 并得到上述恒等式 (见 Zygmund [21, Chapter 7]). 上引 Toland 的论文使用了这种推广的积分概念.

3.6.6 $L \log L$ 估计

下述结果刻画 Hilbert 变换的局部可积性; 它与极大函数的定理 2.18 类似.

定理 3.11: 设 B 与 C 是满足 $\overline{B} \subset C$ 的两个开球.

1. 若 $f \log^+ |f| \in L^1(C)$, 则 $Hf \in L^1(B)$.
2. 反之, 若 $f \geq 0$ 且 $Hf \in L^1(C)$, 则 $f \log^+ |f| \in L^1(B)$.

定理第一部分归功于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund(见上引论文). 利用 Orlicz 空间可以加强这一结论 (参见第 2.8.4 节以及 Zygmund [21, Chapter 4]). 第二部分归功于 E. M. Stein 的 *Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310. 假设 $f \geq 0$ 可以替换为一个更弱的条件, 它在某种意义下度量 $P_t * f$ 与一个正调和函数的差异程度. 见 J. Brossard 与 L. Chevalier 的论文 *Classe $L \log L$ et densité de l'intégrale d'aire dans $\mathbb{R}_+^{n+1}$* , *Ann. of Math.* 128 (1988), 603–618.

3.6.7 平移不变算子与乘子

令 τ_h 为平移算子: $\tau_h f(x) = f(x - h)$. 如果算子 T 与 τ_h 交换, 即

$$\tau_h \circ T = T \circ \tau_h, \quad h \in \mathbb{R}^n,$$

就称 T 平移不变. 例如 Hilbert 变换是平移不变的. 这类算子由下述结果完全刻画.

定理 3.12: 设线性算子 T 平移不变, 并且对某对 (p, q) , $1 \leq p, q \leq \infty$, 从 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 有界映入 $L^q(\mathbb{R}^n)$. 则存在唯一的缓增分布 K , 使得

$$Tf = K * f, \quad f \in \mathcal{S}.$$

若这样的 T 从 L^p 有界映入 L^q 且不为零, 则 p 不能大于 q . L. Hörmander 在 *Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces*, *Acta Math.* 104 (1960), 93–139 中给出了这一事实的一个优美而极其简单的证明. 首先注意到

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} \|f + \tau_h f\|_p = 2^{1/p} \|f\|_p.$$

以 $\|T\|_{p,q}$ 表示 T 从 L^p 到 L^q 的算子范数. 因为 T 与平移交换,

$$\|Tf + \tau_h Tf\|_q \leq \|T\|_{p,q} \|f + \tau_h f\|_p.$$

令 h 趋于无穷, 得

$$\|Tf\|_q \leq 2^{1/p-1/q} \|T\|_{p,q} \|f\|_p,$$

而这只有在 $p \leq q$ 时才可能成立.

显然, 若 $Tf = K * f$, 则 T 线性且平移不变. 由 Fourier 变换的性质,

$$\widehat{Tf} = \widehat{K} \widehat{f},$$

这说明至少当 $\widehat{K} \in L^\infty$ 时, $\widehat{K}$ 是第 3.5 节定义意义下 T 的乘子.

但是, 若 T 在 L^p 上有界, 则由对偶性, 它的伴随算子是与核 $\widetilde{K}(x) = \overline{K(-x)}$ 的卷积, 因而在 $L^{p'}$ 上有界. 所以由插值可知 T 在 L^2 上有界, 条件 $\widehat{K} \in L^\infty$ 是必要的, 从而我们关于乘子 $m \in L^\infty$ 的假设是合理的.

刻画定义有界算子的分布 K (等价地说, 刻画 L^p 乘子) 是一个有趣的问题, 但完整答案只在两种情形下已知.

命题 3.13: 下列结论成立:

1. T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 $\widehat{K} \in L^\infty$; T 在 L^2 上的算子范数等于 $\widehat{K}$ 的 L^∞ 范数.
2. T 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 K 是有限 Borel 测度; T 的算子范数等于该测度的全变差.

注意, 因为 p.v. $1/x$ 不是测度, 命题 3.13 给出了 Hilbert 变换在 L^1 上不有界的另一个证明.

关于上述所有结果, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 1].

3.6.8 Fourier 级数的乘子

三角级数的乘子恰好是有界序列 $\{\lambda(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 相伴算子定义为

$$T_\lambda f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lambda(k) \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

对多重 Fourier 级数, 除了取 $k \in \mathbb{Z}^n$ 外, 定义相同. T_λ 可写成 f 与一个 Fourier 系数为 $\{\lambda(k)\}$ 的分布的卷积, 并且有与命题 3.13 类似的结果.

如果知道 $L^p(\mathbb{R})$ 上一个乘子的有界性, 就可以把乘子限制到整数上, 从而推导级数乘子的结果.

定理 3.14: 设 $1 \leq p \leq \infty$, 算子 $Tf = K * f$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界. 若 $\widehat{K}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的每一点连续, 且 $\lambda(k) = \widehat{K}(k)$, 则与这个序列相伴的算子 T_λ 在 $L^p(\mathbb{T})$ 上有界, 并且

$$\|T_\lambda\| \leq \|T\|.$$

还有一个类似的 n 维结果. 证明见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 6].

从定理 3.14 出发, 可以由第 3.5 节中 S_R 的相应结果推导 Fourier 级数部分和算子 S_N 的结果,

特别是可得到 Fourier 级数部分和依 L^p 范数收敛 (参见第 1 章第 1.4 节).

3.6.9 特征函数的 Hilbert 变换

若 A 是 $\mathbb{R}$ 中的有限测度子集, 则可以证明

$$|\{x \in \mathbb{R} : |H(\chi_A)(x)| > \lambda\}| = \frac{2|A|}{\sinh(\pi\lambda)}.$$

E. M. Stein 与 G. Weiss 在 *An extension of a theorem of Marcinkiewicz and some of its applications*, J. Math. Mech. 8 (1959), 263–284 中首先证明这一结果. Zygmund [22, p. 15] 给出了一个简单证明.