

0 基本概念

有限元方法为生成离散的 (有限的) 算法提供了一套形式体系, 这些算法用于逼近微分方程的解. 可以把它看作一个黑箱: 输入微分方程 (边值问题), 输出逼近相应解的算法. 这样的任务原则上可以由计算机自动完成, 但它需要相当多的数学技巧, 目前仍须有人参与. 本书的目的在于帮助读者熟练掌握这个黑箱的运作方法. 本书不着重讨论如何把所得算法转化为计算机代码, 不过已有若干团队在研究这一课题. 特别地, FEniCS 项目 (网站为 fenics.org) 利用有限元方法的数学结构自动生成有限元代码.

本章把本书很大一部分内容浓缩到一维问题中加以介绍. 我们暂时留下许多尚未解决的问题, 其中大部分将在下一章给出的 Sobolev 空间理论中得到处理. 这些问题应当为学习这些空间提供动机和指引.

0.1 边值问题的弱形式

考虑两点边值问题

$$\begin{aligned} -\frac{d^2 u}{dx^2} &= f && \text{in } (0, 1), \\ u(0) &= 0, \quad u'(1) = 0. \end{aligned} \tag{0.1.1}$$

若 u 是其解, 而 v 是任意满足 $v(0) = 0$ 的 (充分正则的) 函数, 则分部积分给出

$$\begin{aligned} (f, v) &:= \int_0^1 f(x)v(x) dx = \int_0^1 -u''(x)v(x) dx \\ &= \int_0^1 u'(x)v'(x) dx =: a(u, v). \end{aligned} \tag{0.1.2}$$

暂且形式地定义 (因为所用导数的概念尚未精确说明)

$$V = \{v \in L^2(0, 1) : a(v, v) < \infty \text{ and } v(0) = 0\}.$$

于是可以说, (0.1.1) 的解 u 由下式刻画:

$$u \in V \quad \text{such that} \quad a(u, v) = (f, v) \quad \forall v \in V. \tag{0.1.3}$$

这称为 (0.1.1) 的变分形式或弱形式.

关系 (0.1.3) 称为“变分的”, 因为允许函数 v 任意变化. 初看起来这或许有些不同寻常; 后面将看到, 它在 Hilbert 空间框架中有自然的解释. (Hilbert 空间是其拓扑由内积定义的向量空间.) Hilbert 空间的一个例子是带内积 $(\cdot, \cdot)$ 的 $L^2(0, 1)$. 尽管这一点绝非显然, 我们还将看到, 空间 V 可以视为以 (0.1.2) 定义的 $a(\cdot, \cdot)$ 为内积的 Hilbert 空间.

尚未处理的一个关键问题是: 在双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 的定义中应使用哪一种导数? 应当使用经典导数

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}?$$

还是应当使用对有界变差 (BV) 函数有效的“几乎处处”定义? 我们暂时搁置这一点, 并希望这类问题能促使读者学习下一章的 Sobolev 空间. 当然, 核心问题是 (0.1.3) 是否仍然体现原问题 (0.1.1). 在一些简化假设下, 以下定理对此作出验证.

定理 0.1.4: 设 $f \in C^0([0, 1])$ 且 $u \in C^2([0, 1])$ 满足 (0.1.3). 则 u 解 (0.1.1).

证明: 令 $v \in V \cap C^1([0, 1])$. 分部积分给出

$$(f, v) = a(u, v) = \int_0^1 (-u'')v \, dx + u'(1)v(1). \quad (0.1.5)$$

因此, 对所有满足 $v(1) = 0$ 的 $v \in V \cap C^1([0, 1])$, 有 $(f - (-u''), v) = 0$. 令 $w = f + u'' \in C^0([0, 1])$. 若 $w \neq 0$, 则由连续性, 在某个满足 $x_0 < x_1$ 的区间 $[x_0, x_1] \subset [0, 1]$ 上, $w(x)$ 同号. 在 $[x_0, x_1]$ 上取 $v(x) = (x - x_0)^2(x - x_1)^2$, 并在区间外令 $v \equiv 0$. 但此时 $(w, v) \neq 0$, 矛盾. 因而 $-u'' = f$. 再在 (0.1.5) 中取 $v(x) = x$, 得 $u'(1) = 0$. 当然, $u \in V$ 蕴含 $u(0) = 0$, 所以 u 解 (0.1.1). ■

注 0.1.6: 边界条件 $u(0) = 0$ 称为本质边界条件, 因为它显式出现在变分形式中, 即出现在 V 的定义中. 这类边界条件也常以专名 Dirichlet 边界条件相称. 边界条件 $u'(1) = 0$ 称为自然边界条件, 因为它被隐式地纳入. 这类边界条件常称为 Neumann 边界条件. 表 0.1 汇总了目前遇到的两类边界条件及其不同名称.

表 0.1: 两类边界条件的命名约定

边界条件	变分名称	专名
$u(x) = 0$	本质	Dirichlet
$u'(x) = 0$	自然	Neumann

定理 0.1.4 中的假设 $f \in C^0([0, 1])$ 和 $u \in C^2([0, 1])$ 使 (0.1.1) 可以按通常意义解释. 不过, 后面还会看到解释 (0.1.1) 的其他方式; 事实上, 该定理说明 (0.1.3) 是一种在对 f 远为宽松的假设下仍然有效的解释. 因此, (0.1.3) 也称为 (0.1.1) 的弱形式.

0.2 Ritz-Galerkin 逼近

设 $S \subset V$ 是任意 (有限维) 子空间. 用 S 替换 (0.1.3) 中的 V , 即考虑

$$u_S \in S \quad \text{such that} \quad a(u_S, v) = (f, v) \quad \forall v \in S. \quad (0.2.1)$$

如此容易地定义一个逼近 (0.1.1) 的离散格式, 是一件引人注目的事. 这只是 Ritz-Galerkin 方法的一个有力方面. 不过, 首先必须说明 (0.2.1) 确实定义了一个对象. 在此过程中, 还将说明 (0.2.1) 如何表示关于 u_S 的一个 (方形的, 有限的) 方程组. 以下定理及其证明完成这两项工作.

定理 0.2.2: 给定 $f \in L^2(0, 1)$, (0.2.1) 有唯一解.

证明: 用 S 的一组基 $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$ 表示 (0.2.1). 令

$$u_S = \sum_{j=1}^n U_j \phi_j, \quad K_{ij} = a(\phi_j, \phi_i), \quad F_i = (f, \phi_i), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

记 $\mathbf{U} = (U_j)$, $\mathbf{K} = (K_{ij})$, $\mathbf{F} = (F_i)$. 则 (0.2.1) 等价于求解 (方形的) 矩阵方程

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F}. \quad (0.2.3)$$

对于 (0.2.3) 这样的方形方程组, 由于它是有限维方程组, 唯一性等价于存在性. 若解不唯一, 则存在非零向量 $\mathbf{V}$ 使 $\mathbf{KV} = 0$. 写成 $v = \sum_j V_j \phi_j$. (0.2.1) 与 (0.2.3) 的等价性意味着对所有 j 都有 $a(v, \phi_j) = 0$. 将其乘以 V_j 并对 j 求和, 得

$$0 = a(v, v) = \int_0^1 (v')^2(x) dx,$$

由此断定 $v' \equiv 0$. 因而 v 为常数. 又因 $v \in S \subset V$ 蕴含 $v(0) = 0$, 必有 $v \equiv 0$. 由于 $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$ 是 S 的一组基, 这说明 $\mathbf{V} = 0$. 所以 (0.2.3) 的解必定唯一 (因而存在). 因此, (0.2.1) 的解 u_S 也存在且唯一. ■

注 0.2.4: 定理 0.2.2 的“证明”中隐藏着两个微妙之处. 为什么可以说“因而 v 为常数”? 此外, 为什么 $v \in V$ 确实蕴含 $v(0) = 0$ (尽管这写在定义中, 换言之, 为什么该定义有意义)? 第一个问题会令熟悉 Cantor 函数的读者警觉: 该函数的导数几乎处处为零, 但它当然不是常数 (在典型构造中, 它在区间左端也为零). 因此, 我们对 V 的定义中必须有某种性质把这类函数排除在外. V 是 Sobolev 空间的一个例子, 后面将看到这类问题不会在这些空间中出现. 显然, 应当以一种系统的方式把 Cantor 函数之类的函数排除在微分方程候选解之外, 因为它会成为具有初始条件 $u(0) = 0$ 的常微分方程 $u' = 0$ 的一个非平凡解.

注 0.2.5: 矩阵 $\mathbf{K}$ 常称为刚度矩阵, 这个名称来自结构问题中的相应矩阵. 由于能量内积 $a(\cdot, \cdot)$ 对称, 它显然是对称矩阵. 它也是正定矩阵, 因为

$$\sum_{i,j=1}^n K_{ij} v_i v_j = a(v, v), \quad v = \sum_{j=1}^n v_j \phi_j.$$

显然, 对所有 (v_j) 都有 $a(v, v) \geq 0$. 原文在此称, $a(v, v) = 0$ 蕴含 $v \equiv 0$ 已在原文所称的“定理 0.2.3”的证明中“得到说明”; 但该编号在本章对应矩阵方程 (0.2.3), 因而此处目标保留为待核查项.

0.3 误差估计

先考察 u 与 u_S 之间的基本正交关系. 从 (0.1.3) 中减去 (0.2.1), 得

$$a(u - u_S, w) = 0 \quad \forall w \in S. \quad (0.3.1)$$

方程 (0.3.1) 及其后续变形是所有 Ritz-Galerkin/有限元方法取得成功的关键. 现在对所有 $v \in V$ 定义能量范数

$$\|v\|_E = \sqrt{a(v, v)}.$$

能量范数与内积之间的一个关键关系是 Schwarz 不等式:

$$|a(v, w)| \leq \|v\|_E \|w\|_E \quad \forall v, w \in V. \quad (0.3.2)$$

这个不等式是 Hilbert 空间理论的基石, 将在 后文相应小节详细讨论. 对任意 $v \in S$, 有

$$\begin{aligned}
\|u - u_S\|_E^2 &= a(u - u_S, u - u_S) \\
&= a(u - u_S, u - v) + a(u - u_S, v - u_S) \\
&= a(u - u_S, u - v) && \text{by (0.3.1), with } w = v - u_S \\
&\leq \|u - u_S\|_E \|u - v\|_E && \text{by (0.3.2).}
\end{aligned}$$

若 $\|u - u_S\|_E \neq 0$, 则可除以该量, 对任意 $v \in S$ 得 $\|u - u_S\|_E \leq \|u - v\|_E$. 若 $\|u - u_S\|_E = 0$, 该不等式显然成立. 对 $v \in S$ 取下确界, 得

$$\|u - u_S\|_E \leq \inf\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

由于 $u_S \in S$, 又有

$$\inf\{\|u - v\|_E : v \in S\} \leq \|u - u_S\|_E.$$

因此

$$\|u - u_S\|_E = \inf\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

此外, 该下确界在某个元素 (即 u_S) 处达到, 因此用 “最小值” 替换 “下确界”. 由此证明了以下结论.

定理 0.3.3: 有

$$\|u - u_S\|_E = \min\{\|u - v\|_E : v \in S\}.$$

这是 Ritz-Galerkin 方法的基本误差估计, 它说明误差在能量范数下是最优的. 后面将针对 S 的特定选择, 通过在 S 中构造 u 的逼近来导出更具体的误差估计. 现在考虑另一种范数下的误差.

定义

$$\|v\| = (v, v)^{1/2} = \left(\int_0^1 v(x)^2 dx \right)^{1/2},$$

即 $L^2(0, 1)$ 范数. 我们要考察 $u - u_S$ 在这一范数下的大小. 可以猜想, $L^2(0, 1)$ 范数弱于能量范数, 因为后者是导数的 $L^2(0, 1)$ 范数 (在 V 上的确如此, 尽管这并非完全显然, 并且用到了纳入 V 的本质边界条件). 因而, 用 $L^2(0, 1)$ 范数度量的误差至少可以同用能量范数度量的误差相比较. 事实上, 我们将发现它小得多.

为估计 $\|u - u_S\|$, 使用所谓 “对偶” 论证. 令 w 为下列问题的解:

$$-w'' = u - u_S \quad \text{on } [0, 1], \quad w(0) = w'(1) = 0.$$

分部积分给出, 对所有 $v \in S$,

$$\begin{aligned}
\|u - u_S\|^2 &= (u - u_S, u - u_S) \\
&= (u - u_S, -w'') \\
&= a(u - u_S, w) && \text{since } (u - u_S)(0) = w'(1) = 0 \\
&= a(u - u_S, w - v) && \text{by (0.3.1).}
\end{aligned}$$

因此, Schwarz 不等式 (0.3.2) 蕴含

$$\begin{aligned}\|u - u_S\| &\leq \frac{\|u - u_S\|_E \|w - v\|_E}{\|u - u_S\|} \\ &= \frac{\|u - u_S\|_E \|w - v\|_E}{\|w''\|}.\end{aligned}$$

对 $v \in S$ 取下确界, 得

$$\|u - u_S\| \leq \|u - u_S\|_E \inf_{v \in S} \frac{\|w - v\|_E}{\|w''\|}.$$

由此可见, 只要 w 能被 S 中某个函数很好地逼近, 误差的 L^2 范数就可以比能量范数小得多. 假定可以在 S 中选取接近 w 的 v 是合理的, 我们把它形式化为以下逼近假设:

$$\inf_{v \in S} \|w - v\|_E \leq \epsilon \|w''\|. \quad (0.3.4)$$

当然, 我们设想这里的 ϵ 是一个小数. 应用 (0.3.4), 得

$$\|u - u_S\| \leq \epsilon \|u - u_S\|_E.$$

在 (0.3.4) 中再以 u 替换 w , 并使用定理 0.3.3, 得

$$\|u - u_S\|_E \leq \epsilon \|u''\|.$$

结合这些估计并回顾 (0.1.1), 得到以下结论.

定理 0.3.5: 假设 (0.3.4) 蕴含

$$\|u - u_S\| \leq \epsilon \|u - u_S\|_E \leq \epsilon^2 \|u''\| = \epsilon^2 \|f\|.$$

关键在于 $\|u - u_S\|_E$ 是 ϵ 阶的, 而 $\|u - u_S\|$ 是 ϵ^2 阶的. 下面考虑一族可以使 ϵ 任意小的空间 S .

0.4 分片多项式空间—有限元方法

设 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$ 是 $[0, 1]$ 的一个剖分, 并令 S 为满足下列条件的函数 v 所成的线性空间:

- i) $v \in C^0([0, 1])$;
- ii) $v|_{[x_{i-1}, x_i]}$ 是线性多项式, $i = 1, \dots, n$;
- iii) $v(0) = 0$.

后面将看到 $S \subset V$. 对每个 $i = 1, \dots, n$, 以条件 $\phi_i(x_j) = \delta_{ij}$ 定义 ϕ_i , 其中 δ_{ij} 是 Kronecker delta, 如图 0.1 所示.




图 0.1: 分片线性基函数 ϕ_i

引理 0.4.1: $\{\phi_i : 1 \leq i \leq n\}$ 是 S 的一组基.

注 0.4.2: $\{\phi_i\}$ 称为 S 的节点基, $\{v(x_i)\}$ 称为函数 v 的节点值. (点 $\{x_i\}$ 称为节点.)

证明: 集合 $\{\phi_i\}$ 线性无关, 因为 $\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x_j) = 0$ 蕴含 $c_j = 0$. 为说明它张成 S , 考虑以下定义.

定义 0.4.3: 给定 $v \in C^0([0, 1])$, v 的插值函数 $v_I \in S$ 定义为

$$v_I := \sum_{i=1}^n v(x_i) \phi_i.$$

若以下结论成立, 则集合 $\{\phi_i\}$ 显然张成 S .

引理 0.4.4: $v \in S \Rightarrow v = v_I$.

证明: $v - v_I$ 在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上为线性函数, 且在端点为零, 因而必恒等于零. ■

下面证明关于插值函数的逼近定理.

定理 0.4.5: 令 $h = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$. 则对所有 $u \in V$,

$$\|u - u_I\|_E \leq Ch \|u''\|,$$

其中 C 与 h 和 u 无关.

证明: 回顾两个范数的定义, 只需逐段证明估计

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} (u - u_I)'(x)^2 dx \leq c(x_j - x_{j-1})^2 \int_{x_{j-1}}^{x_j} u''(x)^2 dx,$$

因为对 j 求和即得所述结论, 其中 $C = \sqrt{c}$. 令 $e = u - u_I$ 表示误差. 由于 u_I 在区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上是线性多项式, 上式等价于

$$\int_{x_{j-1}}^{x_j} e'(x)^2 dx \leq c(x_j - x_{j-1})^2 \int_{x_{j-1}}^{x_j} e''(x)^2 dx.$$

用仿射映射把区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 变换到 $[0, 1]$, 可见这等价于证明

$$\int_0^1 \tilde{e}'(\tilde{x})^2 d\tilde{x} \leq c \int_0^1 \tilde{e}''(\tilde{x})^2 d\tilde{x},$$

其中

$$x = x_{j-1} + \tilde{x}(x_j - x_{j-1}), \quad \tilde{e}(\tilde{x}) = e(x_{j-1} + \tilde{x}(x_j - x_{j-1})).$$

这样得到的等价估计完全不含网格尺度. 以这种方式把依赖网格长度的估计化为不依赖网格的估计, 称为齐次性论证 (或尺度变换论证), 从后文相应章节起将频繁使用.

最后一个估计可由简单的微积分论证验证. 为简化记号, 令 $w = \tilde{e}$, 并以 x 表示 $\tilde{x}$. 注意 w 在区间两端为零 (插值误差在所有节点处为零). 由 Rolle 定理, 存在满足 $0 < \xi < 1$ 的 ξ 使 $w'(\xi) = 0$. 因此

$$w'(y) = \int_{\xi}^y w''(x) dx.$$

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}
|w'(y)| &= \left| \int_{\xi}^y w''(x) dx \right| = \left| \int_{\xi}^y 1 \cdot w''(x) dx \right| \\
&\leq \left| \int_{\xi}^y 1 dx \right|^{1/2} \left| \int_{\xi}^y w''(x)^2 dx \right|^{1/2} \\
&= |y - \xi|^{1/2} \left| \int_{\xi}^y w''(x)^2 dx \right|^{1/2} \\
&\leq |y - \xi|^{1/2} \left(\int_0^1 w''(x)^2 dx \right)^{1/2}.
\end{aligned} \tag{0.4.6}$$

两边平方并对 y 积分即可完成验证, 因为

$$c = \sup_{0 < \xi < 1} \int_0^1 |y - \xi| dy = \frac{1}{2}.$$

■

推论 0.4.7: 有

$$\|u - u_S\| + Ch\|u - u_S\|_E \leq 2(Ch)^2\|u''\|.$$

证明: 定理 0.4.5 蕴含逼近假设 (0.3.4) 在 $\epsilon = Ch$ 时成立.

■

注 0.4.8: 插值函数定义了线性算子 $I : C^0([0, 1]) \rightarrow S$, 其中 $Iv = v_I$. 引理 0.4.4 说明 I 是投影, 即 $I^2 = I$. 定理 0.4.5 的证明中关于 w' 的估计 (0.4.6) 是 Sobolev 不等式的一个例子; 在这种不等式中, 函数的逐点值可以用涉及其导数的积分量估计. 下一章将详细考察这类估计.

0.5 与差分方法的关系

使用上面所述的基 $\{\phi_i\}$, 可以把 (0.2.3) 中定义的刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 解释为差分算子. 令 $h_i = x_i - x_{i-1}$. 容易计算矩阵元素 $K_{ij} = a(\phi_i, \phi_j)$:

$$K_{ii} = h_i^{-1} + h_{i+1}^{-1}, \quad K_{i,i+1} = K_{i+1,i} = -h_{i+1}^{-1}, \quad i = 1, \dots, n-1, \tag{0.5.1}$$

且 $K_{nn} = h_n^{-1}$, $\mathbf{K}$ 的其余元素为零. 类似地, 若 f 充分光滑, 则可逼近 $\mathbf{F}$ 的元素:

$$(f, \phi_i) = \frac{1}{2}(h_i + h_{i+1})(f(x_i) + O(h)), \tag{0.5.2}$$

其中 $h = \max h_i$. (由 Taylor 定理及 ϕ_i 的积分为 $(h_i + h_{i+1})/2$ 容易得到这一点. 注意, 除非 $1 - (h_i/h_{i+1}) = O(h)$, 否则误差并非 $O(h^2)$.) 因此, $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$ 的第 i 个方程 ($1 \leq i \leq n-1$) 可以写成

$$-\frac{2}{h_i + h_{i+1}} \left[\frac{U_{i+1} - U_i}{h_{i+1}} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h_i} \right] = \frac{2(f, \phi_i)}{h_i + h_{i+1}} = f(x_i) + O(h). \tag{0.5.3}$$

该方程左端的差分算子也可以看作微分算子 $-d^2/dx^2$ 的 $O(h)$ 精度逼近 (在通常意义下并非 $O(h^2)$ 精度, 除非 $1 - h_i/h_{i+1} = O(h)$). 对均匀网格, 方程化为熟知的差分方程

$$-\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} = f(x_i) + O(h^2), \tag{0.5.4}$$

其二阶精度是众所周知的。不过, 对一般网格 (例如, 偶数 i 时 $h_i = h$, 奇数 i 时 $h_i = h/2$), 推论 0.4.7 表明所得答案仍然具有二阶精度 (至少在 $L^2(0, 1)$ 中如此, 第 0.7 节还将证明其在最大范数下也如此), 尽管这些差分方程在形式上仅有一阶相容性. Spijker 对这一现象作了详细研究 (Spijker 1971), (Kreiss, et.al. 1986) 近期也完成了相关工作. 更多细节见习题 0.x.11–0.x.15.

这里借机讨论有限元形式体系在生成微分方程解的离散逼近格式方面的一些有力特征. 由于以边值问题的变分形式为基础, 它十分系统, 能方便地处理不同的边界条件; 只需以有限维子空间替换无限维空间. 如 (0.5.3) 所示, 所得结果与有限差分方程相同, 这也符合一个说法: 不同数值方法之间的相似之处通常多于差异之处. 然而, 我们能够非常迅速地导出有限元方法的收敛性质. 最后, 离散格式在有限元形式下的记号相当紧凑. 如果有合适的计算机语言和编译器, 可以利用这一点显著提高算法编码效率. 有限元方法的这一特征尚未得到广泛利用, 但 fec 系统已经作过初步尝试 (Bagheri, Scott & Zhang 1992). (也可以认为, 有限元实践者通过开发自己的大型软件库, 已经构造出自己的“语言”并利用了这一点; 不过, 这同样适用于有限差分实践者.)

0.6 有限元方法的计算机实现

在工程实践中发展起来的有限元方法之所以成功, 一个关键在于能够以系统方式实现计算机代码. 这一过程中的一个重要步骤是组装内积 $a(u, v)$: 分别计算每个子区间或单元上的组成部分, 再把它们求和. 一种称为全局到局部指标的编号方式使这一过程更加便利. 该指标 $i(e, j)$ 把特定单元 e 上的局部节点号 j 与其在全局数据结构中的位置联系起来. 在分片线性函数的一维例子中, 该指标特别简单: “单元”基于区间

$$I_e := [x_{e-1}, x_e], \quad e = 1, \dots, n,$$

并且

$$i(e, j) := e + j - 1, \quad e = 1, \dots, n, \quad j = 0, 1.$$

也就是说, 每个单元有两个相关的节点参数, 一个对应区间左端 ($j = 0$), 另一个对应右端 ($j = 1$). 映射 $i(e, j)$ 表示它们之间的关系.

对所有分片线性函数组成的空间 (不施加边界条件), 连续函数的插值函数可写为

$$f_I := \sum_e \sum_{j=0}^1 f(x_{i(e,j)}) \phi_j^e, \quad (0.6.1)$$

其中 $\{\phi_j^e : j = 0, 1\}$ 是单个区间 $I_e = [x_{e-1}, x_e]$ 上线性函数的基函数集合:

$$\phi_j^e(x) = \phi_j \left(\frac{x - x_{e-1}}{x_e - x_{e-1}} \right),$$

而

$$\phi_0(x) := \begin{cases} 1 - x, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \phi_1(x) := \begin{cases} x, & x \in [0, 1], \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

注意, 通过从 $[0, 1]$ 到 $[x_{e-1}, x_e]$ 的仿射映射, 我们把所有“局部”基函数 ϕ_j^e 都关联到“参考”单元 $[0, 1]$ 上的一组固定基函数. (依定义, 局部基函数 ϕ_j^e 在区间 I_e 外延拓为零.)

插值函数的表达式 (0.6.1) 表明 (比较引理 0.4.4), 任意分片线性函数 f (不施加边界条件) 都可以写成

$$f := \sum_e \sum_{j=0}^1 f_{i(e,j)} \phi_j^e, \quad (0.6.2)$$

其中对所有 i 都有 $f_i = f(x_i)$. 特别地, 指标映射 $i(e, j)$ 的像的基数就是分片线性函数空间的维数. 注意, 表达式 (0.6.2) 在节点处对 f 作了不正确的重复表示, 但这不影响对涉及 f 的积分型多线性型进行求值.

用这种表示也很容易求值 (组装) (0.1.2) 中定义的双线性型. 例如

$$a(v, w) = \sum_e a_e(v, w),$$

其中 “局部” 双线性型定义并计算为

$$\begin{aligned} a_e(v, w) &:= \int_{I_e} v' w' dx \\ &= (x_e - x_{e-1})^{-1} \int_0^1 \left(\sum_j v_{i(e,j)} \phi_j \right)' \left(\sum_j w_{i(e,j)} \phi_j \right)' dx \\ &= (x_e - x_{e-1})^{-1} \begin{pmatrix} v_{i(e,0)} \\ v_{i(e,1)} \end{pmatrix}^t \mathbf{K} \begin{pmatrix} w_{i(e,0)} \\ w_{i(e,1)} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这里局部刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 为

$$K_{ij} := \int_0^1 \phi'_{i-1} \phi'_{j-1} dx, \quad i, j = 1, 2.$$

注意, 我们把分片线性函数空间中的 v 与它在节点处的值向量 (v_i) 等同起来. 第 0.4 节定义的, 在 $x = 0$ 处为零的分片线性函数子空间 S , 可与子空间 $\{(v_i) : v_0 = 0\}$ 等同. 把值为零的 v_0 纳入数据结构, 使得存在边界条件时双线性型的组装仍然同样方便.

0.7 局部估计

我们希望逐点地导出误差 $u - u_S$ 的估计. 与 L^2 范数的情形相同, 先把待估计的误差写成能量双线性型作用于 $u - u_S$ 和另一个函数的形式. 此处的另一个函数是问题 (0.1.1) 的所谓 Green 函数, 在本例中就是

$$g_x(t) := \begin{cases} t, & t < x, \\ x, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中 x 是 $[0, 1]$ 中任意一点. 分部积分表明

$$v(x) = a(v, g_x) \quad \forall v \in V,$$

因为在 x 的两侧, g_x'' 都恒等于零. 因此

$$\begin{aligned} (u - u_S)(x) &= a(u - u_S, g_x) \\ &= a(u - u_S, g_x - v) \quad \forall v \in S. \end{aligned}$$

由此得到一个结论: 若 S 是第 0.4 节所述剖分 $\{x_i : i = 1, \dots, n\}$ 上定义的分片线性函数空间, 则

$$(u - u_S)(x_i) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

因为此时 $g_{x_i} \in S$. 因而 $u_S = u_I$, 定理 0.4.5 的一个变式给出

$$\|u - u_I\|_{\max} \leq Ch^2 \|u''\|_{\max}. \quad (0.7.1)$$

(回顾 $\|f\|_{\max} = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$.) 结合以上估计, 我们证明了以下结论.

定理 0.7.2: 设 u_S 由 (0.2.1) 确定, 其中使用第 0.4 节定义的分片线性函数空间. 则

$$\|u - u_S\|_{\max} \leq Ch^2 \|u''\|_{\max}.$$

高维问题的局部估计要困难得多, 但使用 Green 函数的方法是类似的. 不过, 一维 Green 函数奇点的局部性质会消失, 而高维 Green 函数的分布性质要求使用下一节所展示的技术.

0.8 自适应逼近

在许多情形下, 微分方程的解只在有限区域内快速变化. 对于这类问题, 使网格适应解的变化是合理的. 为一般问题选取的网格与为特定问题自适应选取的网格, 在逼近能力上可能有显著差异. 这里给出一个特别简单的逼近问题来说明这一效应. 更复杂的结果见 DeVore, Howard & Micchelli (1989).

考虑逼近导数可积的一元函数. 这个条件甚至弱于第 0.3 节所用的条件, 而我们希望在更强的范数, 即最大范数下考察逼近. 考虑用剖分上的分片常值函数空间 S_Δ 作逼近, 其中

$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n : 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1\}. \quad (0.8.1)$$

在此情形下, 记 $\text{size}(\Delta) = n$. 不难看出, 若要求下列形式的最佳结果对所有 u (网格固定) 都成立,

$$\inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} \leq Cn^{-p} \int_0^1 |u'(x)| dx, \quad (0.8.2)$$

则只能取 $p = 0$. 事实上, 无论网格如何, 都可令 u 从 x_0 处的零增至 x_1 处的一, 并在区间其余部分保持为一. 这个特定的 u 满足

$$\int_0^1 |u'(x)| dx = 1, \quad \inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} = \frac{1}{2}.$$

当然, 把 u 写成 u' 的积分 (比较 (0.4.6)), 只需取 $v \equiv 0$, 就能以 $C = 1, p = 0$ 证明 (0.8.2).

另一方面, 假设固定一个特定的 u , 并要求对某个形如 (0.8.1) 的剖分 Δ , (0.8.2) 成立. 换言之, 如果允许依据 u 的性质选取 Δ , 情形如何? 更精确地说, 我们区分两个陈述: 一个是对每个 u 都存在 Δ 使 (0.8.2) 成立; 另一个是前面所述的, 给定 Δ 后, (0.8.2) 对所有 u 成立.

为说明自适应选取网格时可以得到更好的估计, 设 u 满足 $\int_0^1 |u'(x)| dx = 1$. 函数

$$\phi(x) = \int_0^x |u'(t)| dt \quad (0.8.3)$$

在 $x = 0$ 处为零, 且单调不减. 又有 $\phi(1) = 1$, 所以必存在点 x_i , 使 $\phi(x_i) = i/n$ 且对所有 i 有 $x_i < x_{i+1}$. 若这个过程中恰有 $x_n < 1$, 则令 $x_n = 1$. 这一剖分的一个性质是, 对所有 $i = 1, \dots, n$,

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |u'(t)| dt = \phi(x_i) - \phi(x_{i-1}) = \frac{1}{n}. \quad (0.8.4)$$

在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上用常数 $c_i = u(x_{i-1})$ 逼近 u . 则对 $x \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$|u(x) - c_i| = \left| \int_{x_{i-1}}^x u'(t) dt \right| \leq \int_{x_{i-1}}^{x_i} |u'(t)| dt = \frac{1}{n}. \quad (0.8.3)$$

这证明了当 $\int_0^1 |u'(x)| dx = 1$ 时, 对所有 n , (0.8.2) 都以 $p = 1, C = 1$ 成立. 在一般情形下, 只需把 (0.8.2) 中的各项除以 $\int_0^1 |u'(x)| dx$.

为再次明确量词, 对满足 $0 < \int_0^1 |u'(x)| dx < \infty$ 的给定 u 以及给定剖分 Δ , 定义逼近商

$$Q(u, \Delta) = \inf_{v \in S_\Delta} \|u - v\|_{\max} / \int_0^1 |u'(x)| dx. \quad (0.8.5)$$

于是第一个结果是

$$\forall \Delta \exists u \text{ such that } Q(u, \Delta) \geq \frac{1}{2}, \quad (0.8.6)$$

而在第二个结果中, 我们构造了一个 Δ 来证明

$$\forall u \exists \Delta \text{ with size}(\Delta) = n \text{ such that } Q(u, \Delta) \leq \frac{1}{n}. \quad (0.8.7)$$

这些结果表明, 使用固定网格与使用适应特定函数的网格, 在逼近能力上可能有极其显著的差异.

0.9 加权范数估计

设 $h(x)$ 是度量点 x 附近局部网格尺度的函数. 具体地, 假设 h 是满足

$$h(x_j) = h_j + h_{j+1}$$

的分片线性函数, 其中 $h_j = x_j - x_{j-1}$, 并令 $h_{n+1} = h_n, h_0 = h_1$. 注意, 对所有 $j = 1, \dots, n$,

$$h(x) \geq h_j \quad \forall x \in [x_{j-1}, x_j], \quad (0.9.1)$$

因为该不等式在区间的两个端点成立, 而 h 在端点之间为线性函数.

先导出一个与定理 0.4.5 类似的基本估计. 由其证明及 (0.9.1), 有

$$\begin{aligned} \|u - u_I\|_E^2 &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (u - u_I)'(x)^2 dx \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n h_i^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} u''(x)^2 dx \\ &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} h(x)^2 u''(x)^2 dx = \frac{1}{2} \|hu''\|^2. \end{aligned}$$

因此

$$\|u - u_S\|_E \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|hu''\|. \quad (0.9.2)$$

下面导出与定理 0.3.5 中第一个不等式类似的 L^2 估计. 像该定理的证明那样选取 w , 得

$$\|u - u_S\|^2 = a(u - u_S, w),$$

其中 w 解以 $u - u_S$ 为右端项的边值问题 (0.1.1). 为简化记号, 令 $e := u - u_S$. 使用正交关系 (0.3.1) 和 Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned} a(e, w) &= a(e, w - w_I) \\ &= \int_0^1 h(u - u_S)'(w - w_I)'/h \, dx \\ &\leq \left(\int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx \right)^{1/2} \left(\int_0^1 ((w - w_I)'/h)^2 \, dx \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

由第 0.4 节的结果,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{(w - w_I)'(x)}{h(x)} \right)^2 \, dx &= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\frac{(w - w_I)'(x)}{h(x)} \right)^2 \, dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n h_i^{-2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w - w_I)'(x)^2 \, dx \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} w''(x)^2 \, dx. \end{aligned}$$

结合以上不等式, 得

$$a(e, w) \leq \|he'\| \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \int_{x_{i-1}}^{x_i} w''(x)^2 \, dx \right)^{1/2}. \quad (0.9.3)$$

回顾 $-w'' = e$, 得

$$\begin{aligned} \|e\|^2 = a(e, w) &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \left(\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} e(x)^2 \, dx \right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \|e\|. \end{aligned}$$

除以 $\|e\|$ 并回顾 $e = u - u_S$, 得到

$$\|u - u_S\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx \right)^{1/2}. \quad (0.9.4)$$

这说明 L^2 误差总能由导数误差平方的加权积分估计, 其中权由网格函数 (0.9.1) 给出. 下面估计 (0.9.4) 右端的“加权能量”范数.

仍记 $e := u - u_S$. 首先注意

$$\int_0^1 (h(u - u_S)')^2 \, dx = \|he'\|^2 = a(e, h^2e) - \int_0^1 2hh'ee' \, dx,$$

这只需展开 $a(e, h^2e)$ 即得. 下面假设 h' 很小, 即网格变化不快 (对于均匀网格, $h' \equiv 0$). 这样便可忽略项

$$\int_0^1 2hh'ee' \, dx$$

而不影响前一方程中的其他项. 为此将频繁使用算术-几何平均不等式. 对任意实数 a, b , 它不过是如下简单事实:

$$ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2),$$

(只需注意 $0 \leq (a - b)^2 = -2ab + a^2 + b^2$). 把 ab 写成

$$ab = (\epsilon a)(b/\epsilon) \leq \frac{1}{2}((\epsilon a)^2 + (b/\epsilon)^2),$$

便得到稍复杂的形式. 以 δ 代替 ϵ^2 , 得

$$ab \leq \frac{\delta}{2}a^2 + \frac{1}{2\delta}b^2 \quad (0.9.5)$$

对任意 $\delta > 0$ 成立.

令 $M := \|h'\|_{\max}$. Schwarz 不等式和算术-几何平均不等式蕴含

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 2hh'e'e' dx \right| &\leq 2M \int_0^1 |hee'| dx \\ &\leq 2M \|he'\| \|e\| \\ &\leq M(\|he'\|^2 + \|e\|^2). \end{aligned}$$

因此

$$\|he'\|^2 \leq a(e, h^2e) + M(\|he'\|^2 + \|e\|^2),$$

从而

$$(1 - M)\|he'\|^2 \leq a(e, h^2e) + M\|e\|^2.$$

现在估计 $a(e, h^2e)$. 令 $w := h^2e$. 由 (0.9.3) 和算术-几何平均不等式,

$$\begin{aligned} a(e, h^2e) = a(e, w) &\leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|he'\| \left(\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1-M}{2} \|he'\|^2 + \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx. \end{aligned}$$

与前一估计结合, 得

$$\frac{1-M}{2} \|he'\|^2 \leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} (w'')^2 dx + M\|e\|^2.$$

在每个区间 (x_{i-1}, x_i) 上展开, 有

$$w'' = h^2e'' + 4hh'e' + 2(h')^2e,$$

因为 $h'' \equiv 0$. 再展开并使用算术-几何平均不等式, 得

$$\begin{aligned} (w'')^2 &\leq h^4(e'')^2 + 16M^2(he')^2 + 4M^4e^2 \\ &\quad + 8Mh^3|e''||e'| + 4M^2h^2|e''||e| + 16M^3h|e'| |e| \\ &\leq 7h^4(e'')^2 + 28M^2(he')^2 + 14M^4e^2. \end{aligned}$$

积分后得到

$$\begin{aligned} \frac{1-M}{2} \|he'\|^2 &\leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} 7h^4(e'')^2 dx \\ &\quad + \frac{7M^2}{1-M} \|he'\|^2 + \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \left(\frac{1-M}{2} - \frac{7M^2}{1-M}\right) \|he'\|^2 &\leq \frac{1}{4(1-M)} \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} 7h^4(e'')^2 dx \\ &\quad + \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2. \end{aligned}$$

令

$$c_1 = \left(\frac{1-M}{2} - \frac{7M^2}{1-M}\right)^{-1},$$

并回顾 $e'' = u''$, 当

$$M < \frac{1}{1 + \sqrt{14}}$$

时有

$$\|he'\|^2 \leq \frac{7c_1}{4(1-M)} \|h^2u''\|^2 + c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) \|e\|^2.$$

与估计 (0.9.4) 结合, 得

$$\left(2 - c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right)\right) \|u - u_S\|^2 \leq \frac{7c_1}{4(1-M)} \|h^2u''\|^2.$$

最后, 假设 M 充分小, 使

$$2 - c_1 \left(M + \frac{7M^4}{2(1-M)}\right) > 0.$$

(注意当 $M \rightarrow 0$ 时 $c_1 \rightarrow 2$.) 于是得到

$$\|u - u_S\|^2 \leq C(M) \|h^2u''\|^2, \quad (0.9.6)$$

其中当 $M \rightarrow 0$ 时 $C(M) \rightarrow 7/4$. 以下定理汇总上述结果.

定理 0.9.7: 在不对网格施加任何限制的情况下,

$$\|u - u_S\|_E \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|hu''\|$$

且

$$\|u - u_S\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \|h(u - u_S)'\|.$$

若网格尺度的变化 $M := \|h'\|_{\max}$ 充分小, 则存在一个依赖于 M , 但除此之外与网格无关的常数 C , 使

$$\|u - u_S\| \leq C \|h^2u''\|.$$

h 的导数很小这一条件很容易解释. 由定义,

$$h'|_{(x_{i-1}, x_i)} = \frac{h_{i+1} - h_{i-1}}{h_i} = r_{i+1} - \frac{1}{r_i},$$

其中 r_i 是相邻网格区间长度之比, $r_i = h_i/h_{i-1}$. 因而, 当这些比值充分接近一时, $|h'|$ 很小. 不过, 这并不排除强网格分级, 例如当 δ 充分小时的几何分级网格 $x_i = e^{\delta(i-n)}$.

习题

习题 0.x.1: 验证分片线性函数刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 的表达式 (0.5.1). 若 f 是分片线性函数, 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i \phi_i(x),$$

求矩阵 $\mathbf{M}$ (称为质量矩阵), 使 $\mathbf{KU} = \mathbf{MF}$.

习题 0.x.2: 给出两点边值问题 (0.1.1) 的下列修改形式的弱形式:

- a) 以常微分方程 $-u'' + u = f$ 代替 $-u'' = f$;
- b) 边界条件为 $u(0) = u(1) = 0$.

两项修改也可以同时采用.

习题 0.x.3: 说明问题

$$-u'' = f, \quad u'(0) = u'(1) = 0$$

在变分框架和经典框架中分别有什么问题. 换言之, 说明该问题在这两种框架下为何都不是适定的.

习题 0.x.4: 证明分片二次函数有一组节点基, 由节点 x_i 处的值以及中点 $\frac{1}{2}(x_i + x_{i+1})$ 处的值组成. 计算这些单元的刚度矩阵.

习题 0.x.5: 验证 (0.5.2).

习题 0.x.6: 在与定理 0.4.5 相同的假设下, 证明

$$\|u - u_I\| \leq Ch^2 \|u''\|.$$

(提示: 使用定理 0.4.5 证明中的齐次性论证. 采用该证明中的记号, 并利用 $w(0) = 0$ 进一步证明)

$$\int_0^1 w(x)^2 dx \leq \tilde{c} \int_0^1 w'(x)^2 dx.$$

若同时使用 $w(0) = 0$ 和 $w(1) = 0$, 能把 $\tilde{c}$ 取得多小?)

习题 0.x.7: 仅使用定理 0.3.5 和定理 0.4.5, 证明

$$\inf_{v \in S} \|u - v\| \leq Ch^2 \|u''\|.$$

习题 0.x.6 也可以独立推出这一结果. 比较不同方法所得的不同常数 C .

习题 0.x.8: 证明, 若 $f \in C^0([0, 1])$, 则 (0.1.1) 有解 $u \in C^2([0, 1])$. (提示: 写成

$$u(x) = \int_0^x \left(\int_s^1 f(t) dt \right) ds,$$

并验证各方程.)

习题 0.x.9: 令 V 表示第 0.1 节定义的空间, $a(\cdot, \cdot)$ 表示该节定义的双线性型. 证明强制性结果

$$\|v\|^2 + \|v'\|^2 \leq Ca(v, v) \quad \forall v \in V.$$

给出 C 的一个值. (提示: 见习题 0.x.6 的提示. 为简单起见, 把结论限制在 $v \in V \cap C^1(0, 1)$.)

习题 0.x.10: 令 V 和双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 如第 0.1 节所定义. 证明下列 Sobolev 不等式:

$$\|v\|_{\max}^2 \leq Ca(v, v) \quad \forall v \in V.$$

给出 C 的一个值. (提示: 见习题 0.x.6 的提示. 为简单起见, 把结论限制在 $v \in V \cap C^1(0, 1)$.)

习题 0.x.11: 考虑由 (0.5.3) 表示的差分方法, 即

$$-\frac{2}{h_i + h_{i+1}} \left(\frac{U_{i+1} - U_i}{h_{i+1}} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h_i} \right) = f(x_i).$$

证明 $\tilde{u}_S := \sum_i U_i \phi_i$ 满足 (0.2.1) 的下列修改形式:

$$a(\tilde{u}_S, v) = Q(fv) \quad \forall v \in S,$$

其中 $a(\cdot, \cdot)$ 是第 0.1 节定义的双线性型, S 由第 0.4 节定义的分片线性函数组成, 而 Q 表示基于梯形法则的求积逼近

$$Q(w) := \sum_{i=0}^n \frac{h_i + h_{i+1}}{2} w(x_i).$$

这里 ϕ_i, x_i, h_i 如第 0.4 节所定义; 为简化记号, 再定义 $h_0 = h_{n+1} = 0$.

习题 0.x.12: 设 Q 如习题 0.x.11 所定义. 证明

$$\left| Q(w) - \int_0^1 w(x) dx \right| \leq Ch^2 \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |w''(x)| dx.$$

(提示: 注意梯形法则对分片线性函数是精确的, 并参考习题 0.x.6 的提示.)

习题 0.x.13: 设 u_S 解 (0.2.1), 其中 S 由第 0.4 节定义的分片线性函数组成; 设 $\tilde{u}_S$ 如习题 0.x.11 所定义. 证明

$$|a(u_S - \tilde{u}_S, v)| \leq Ch^2(\|f'\| + \|f''\|)(\|v\| + \|v'\|) \quad \forall v \in S.$$

(提示: 应用习题 0.x.12 和 Schwarz 不等式.)

习题 0.x.14: 设 u_S 和 $\tilde{u}_S$ 如习题 0.x.13 所定义. 证明

$$\|u_S - \tilde{u}_S\|_E \leq Ch^2(\|f'\| + \|f''\|).$$

(提示: 应用习题 0.x.13, 取 $v = u_S - \tilde{u}_S$, 并应用习题 0.x.9.)

习题 0.x.15: 设 $\tilde{u}_S$ 如习题 0.x.11 所定义, 且 u 解 (0.1.1). 证明

$$\|u - \tilde{u}_S\|_{\max} \leq Ch^2(\|f\|_{\max} + \|f'\| + \|f''\|).$$

(提示: 应用习题 0.x.14 和定理 0.7.2.)

习题 0.x.16: 给出两点边值问题 (0.1.1) 的修改形式的弱形式, 其中边界条件为 $u(0) = 0$ 和 $u'(1) = \lambda$. (提示: 证明 $a(u, v) = F(v)$, 其中 F 是线性泛函 $F(v) = \lambda v(1)$.)

1 Sobolev 空间

本章致力于建立微分方程变分形式所使用的函数空间. 我们首先回顾 Lebesgue 积分理论, “变分” 导数或 “弱” 导数的概念正是建立在这一理论之上. 具有这种 “广义” 导数的函数构成通常所说的 Sobolev 空间. 我们只发展这些空间的已知理论中的一小部分, 其范围恰好足以有限元方法奠定基础.

1.1 Lebesgue 积分理论回顾

现在回顾 Lebesgue 积分理论的基本概念, 参见 (Halmos 1991), (Royden 1988) 或 (Rudin 1987). 所谓 “区域”, 是指 $\mathbb{R}^n$ 中内部非空的 Lebesgue 可测子集 (通常为开集或闭集). 为简单起见, 我们只考虑给定区域 Ω 上的实值 Lebesgue 可测函数 f . 记

$$\int_{\Omega} f(x) dx$$

为 f 的 Lebesgue 积分, 其中 dx 表示 Lebesgue 测度. 对 $1 \leq p < \infty$, 令

$$\|f\|_{L^p(\Omega)} := \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p},$$

而当 $p = \infty$ 时令

$$\|f\|_{L^\infty(\Omega)} := \operatorname{ess\,sup}\{|f(x)| : x \in \Omega\}.$$

在两种情形下, 都定义 Lebesgue 空间

$$L^p(\Omega) := \{f : \|f\|_{L^p(\Omega)} < \infty\}. \quad (1.1.1)$$

为避免函数之间无关紧要的差异, 我们把满足 $\|f - g\|_{L^p(\Omega)} = 0$ 的两个函数 f 和 g 等同起来. 例如, 取 $n = 1$, $\Omega = [-1, 1]$ 以及

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad (1.1.2)$$

f 和 g 只在一个零测集上不同 (此处该集合只有一个点), 因而我们把它们看成同一个函数的代表. 于是, 尽管记号略有含混, 我们仍把 $L^p(\Omega)$ 看成关于这种等同关系的函数等价类的集合. 上面定义的泛函满足一些著名且有用的不等式.

1.1.3 Minkowski 不等式: 若 $1 \leq p \leq \infty$ 且 $f, g \in L^p(\Omega)$, 则

$$\|f + g\|_{L^p(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} + \|g\|_{L^p(\Omega)}.$$

1.1.4 Hölder 不等式: 设 $1 \leq p, q \leq \infty$ 且 $1 = 1/p + 1/q$. 若 $f \in L^p(\Omega)$ 且 $g \in L^q(\Omega)$, 则 $fg \in L^1(\Omega)$, 并且

$$\|fg\|_{L^1(\Omega)} \leq \|f\|_{L^p(\Omega)} \|g\|_{L^q(\Omega)}.$$

1.1.5 Schwarz 不等式: 这就是 $p = q = 2$ 时的 Hölder 不等式. 也就是说, 若 $f, g \in L^2(\Omega)$, 则 $fg \in L^1(\Omega)$, 且

$$\int_{\Omega} |f(x)g(x)| dx \leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|g\|_{L^2(\Omega)}.$$

由 Minkowski 不等式和 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 的定义可知, $L^p(\Omega)$ 对线性组合封闭, 即它是一个线性空间 (或向量空间). 此外, 泛函 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 具有使其成为范数的性质.

定义 1.1.6: 给定线性 (向量) 空间 V , 范数 $\|\cdot\|$ 是从 V 到非负实数的函数, 满足:

- i) $\|v\| \geq 0 \quad \forall v \in V,$
 $\|v\| = 0 \iff v = 0,$
- ii) $\|c \cdot v\| = |c| \cdot \|v\| \quad \forall c \in \mathbb{R}, v \in V,$
- iii) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\| \quad \forall v, w \in V.$

最后一个条件称为三角不等式.

范数 $\|\cdot\|$ 可以用来定义 V 中点 v, w 之间的距离或度量 $d(v, w) = \|v - w\|$. 赋予该度量所诱导拓扑的向量空间称为赋范线性空间. 回顾度量空间 V 的完备性定义: V 的每个元素 Cauchy 序列 $\{v_j\}$ 都在 V 中有极限 v . 对赋范线性空间, Cauchy 序列满足 $\|v_j - v_k\| \rightarrow 0$, $j, k \rightarrow \infty$, 而完备性意味着存在 $v \in V$ 使 $\|v_j - v\| \rightarrow 0$, $j \rightarrow \infty$. 以下定义概括了理论发展所需的无限维线性空间的若干关键特征.

定义 1.1.7: 若赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 关于由范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量完备, 则称它为 Banach 空间.

定理 1.1.8: 对 $1 \leq p \leq \infty$, $L^p(\Omega)$ 是 Banach 空间.

这个定理的证明可在本节开头列出的文献中找到, 它是 Lebesgue 积分理论的基石. 注意, 它同时包含 Minkowski 不等式和 Lebesgue 积分的一个极限定理. 也就是说, 若 $f_j \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$, 则 (参见习题 1.x.3)

$$\int_{\Omega} |f_j(x)|^p dx \longrightarrow \int_{\Omega} |f(x)|^p dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty. \quad (1.1.9)$$

不过, Hölder 不等式和更精细的极限定理并未反映在 Lebesgue 空间的这一刻画中.

Lebesgue 积分优于 Riemann 积分的一个关键原因, 是它享有这种“完备性”: 可积函数的适当极限仍然可积, 而 Riemann 积分没有这一性质. 例如, 通过计算广义积分很容易确定函数 $\log x$ 在任一形如 $[0, a]$ 的有限区间上具有有限积分. 相应地, 若 $\{r_n : n = 1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 中稠密, 则函数

$$f_j(x) := \sum_{n=1}^j 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.10)$$

都有广义积分, 并且容易看出

$$\left| \int_0^1 f_j(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.11)$$

因此, “极限” 函数

$$f(x) := \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \log |x - r_n| \quad (1.1.12)$$

应当在 $[0, 1]$ 上有有限的“积分”，并同样满足

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq 2 \int_0^1 |\log x| dx. \quad (1.1.13)$$

然而, f 在 $[0, 1]$ 的每个开子区间中都在某点取无穷大, 所以它在 $[0, 1]$ 的任何子区间上都不是 Riemann 可积的. 因而即使使用“广义”Riemann 积分, 也无法判定 f 是否具有有限积分. 另一方面, 可以证明 (见习题 1.x.6) 它是 Lebesgue 可积的, 且 (1.1.13) 成立.

1.2 广义 (弱) 导数

在不同情形下, 有若干有用的导数定义. “微积分”定义

$$u'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

是一种“局部”定义, 只涉及点 x 附近的函数信息. 第 0 章建立的变分形式采取了更为整体的观点, 因为不需要导数的逐点值, 只出现能够解释为 Lebesgue 空间 $L^2(\Omega)$ 中函数的导数. 在上一节中已经看到, Lebesgue 空间中函数的逐点值并不重要 (参见 (1.1.2)); 这些空间中的函数仅由其整体行为决定. 因此, 很自然要建立一种更适合 Lebesgue 空间的整体导数概念. 我们使用一种“对偶”技巧来完成这件事: 通过把一类不太光滑的函数 (见定义 1.2.3) 与非常非常光滑的函数 (见定义 1.2.1) 比较来定义导数.

首先引入微积分偏导数的一种简写, 即多重指标记号. 多重指标 α 是由非负整数组成的 n 元组 α_i . α 的长度为

$$|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

对 $\phi \in C^\infty$, 用

$$D^\alpha \phi, \quad D_x^\alpha \phi, \quad \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha \phi, \quad \phi^{(\alpha)}, \quad \text{以及} \quad \partial_x^\alpha \phi$$

表示通常的逐点偏导数

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n} \phi.$$

给定向量 $(x_1, \dots, x_n)$, 定义 $x^\alpha := x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$. 若形式地用符号 $\partial/\partial x := (\partial/\partial x_1, \dots, \partial/\partial x_n)$ 替换 x , 则 x^α 的定义与上述 $(\partial/\partial x)^\alpha$ 的定义一致. 注意, 该导数的阶数为 $|\alpha|$.

接着引入 $\mathbb{R}^n$ 中某区域上函数的支集概念. 对连续函数 u , 支集是开集 $\{x : u(x) \neq 0\}$ 的闭包. 若该闭包为紧集 (即有界) 并包含在集合 Ω 的内部, 则称 u 关于 Ω 具有“紧支集”. 在函数支集之外, 自然地把它定义为零, 从而将其延拓到整个 $\mathbb{R}^n$. 当 Ω 有界时, 这等价于说 u 在 $\partial\Omega$ 的某个邻域中为零.

定义 1.2.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的区域. 用 $\mathcal{D}(\Omega)$ 或 $C_0^\infty(\Omega)$ 表示 Ω 上具有紧支集的 $C^\infty(\Omega)$ 函数的集合.

在继续之前, 应当先确认刚才引入的定义并非空洞定义, 下面就来验证这一点.

例 1.2.2: 定义

$$\phi(x) := \begin{cases} e^{1/(|x|^2-1)}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

我们断言, 对任意多重指标 α , 都存在某个多项式 P_α 使

$$\phi^{(\alpha)}(x) = \frac{P_\alpha(x)\phi(x)}{(1 - |x|^2)^{|\alpha|}}.$$

下面说明这一点. 当 $|x| < 1$ 时, 对 α 归纳求导可得 $\phi^{(\alpha)}(x) = P_\alpha(x)e^{-t|x|^2}$, 其中 P_α 为某个多项式且 $t = 1/(1 - |x|^2)$. 此外, 当 $|x| > 1$ 时 $\phi^{(\alpha)}(x) = 0$. 因而, 对 $|x| \neq 1$, 上述 $\phi^{(\alpha)}$ 公式得到验证. 由于指数函数的增长快于任意有限次幂, 对任意整数 k 都有

$$\frac{\phi^{(\alpha)}(x)}{(1 - |x|^2)^k} = \frac{P_\alpha(x)t^{|\alpha|+k}}{e^t} \rightarrow 0 \quad \text{as } |x| \rightarrow 1 \ (t \rightarrow \infty).$$

取 $k = 0$ 并归纳应用这些事实, 可知 $\phi^{(\alpha)}$ 在 $|x| = 1$ 处连续; 取 $k = 1$ 又可知它在那里可微, 且导数为零. 因此, 所断言的公式对所有 x 都成立. 这个论证还表明, 对所有 α , $\phi^{(\alpha)}$ 都有界且连续. 所以, 对任意包含闭单位球的开集 Ω , 都有 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 适当地缩放变量可知, 对任意内部非空的 Ω , $\mathcal{D}(\Omega) \neq \emptyset$.

现在使用空间 $\mathcal{D}$ 把逐点导数的概念推广到比 C^∞ 更大的函数类. 为简单起见, 我们把导数概念限制在以下函数空间中 (更一般的定义见 (Schwartz 1957)).

定义 1.2.3: 给定区域 Ω , 局部可积函数的集合记为

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) := \{f : f \in L^1(K) \ \forall \text{ compact } K \subset \text{interior } \Omega\}.$$

$L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 中的函数在边界附近可以表现得任意恶劣. 例如, $e^{e^{1/\text{dist}(x, \partial\Omega)}} \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 尽管这一点与我们使用该空间的方式关系不大. 记号上的一个便利之处是, $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 包含 $C^0(\Omega)$ 中的所有函数, 而无须施加增长限制. 最后给出新的导数定义.

定义 1.2.4: 给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. 若存在 $g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} g(x)\phi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} f(x)\phi^{(\alpha)}(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则称 f 有弱导数 $D_w^\alpha f$. 若这样的 g 存在, 定义 $D_w^\alpha f = g$.

例 1.2.5: 取 $n = 1$, $\Omega = [-1, 1]$, $f(x) = 1 - |x|$. 我们断言 $D_w^1 f$ 存在, 且

$$g(x) := \begin{cases} 1, & x < 0, \\ -1, & x > 0. \end{cases}$$

为说明这一点, 把区间 $[-1, 1]$ 分成 f 光滑的两部分并分部积分. 对 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x)\phi'(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x)\phi'(x) dx + \int_0^1 f(x)\phi'(x) dx \\ &= - \int_{-1}^0 (+1)\phi(x) dx + [f\phi]_{-1}^0 - \int_0^1 (-1)\phi(x) dx + [f\phi]_0^1 \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx + (f\phi)(0^-) - (f\phi)(0^+) \\ &= - \int_{-1}^1 g(x)\phi(x) dx, \end{aligned}$$

最后一步使用了 f 在 0 处的连续性. 可以验证 (参见习题 1.x.10), 当 $j > 1$ 时 $D_w^j f$ 不存在.

粗略地说, 只要被求导的函数足够正则, 新导数定义就与旧定义相同. 特别地, 在上例中, f 的连续性足以保证一阶弱导数存在, 但不足以保证二阶弱导数存在. 这一现象还依赖于维数 n , 因而微积分导数与弱导数之间的关系无法作简单刻画, 如下例所示.

例 1.2.6: 设 ρ 是定义在 $0 < r \leq 1$ 上的光滑函数, 满足

$$\int_0^1 |\rho'(r)| r^{n-1} dr < \infty.$$

在 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ 上定义 $f(x) = \rho(|x|)$. 则对所有 $|\alpha| = 1$, $D_w^\alpha f$ 都存在, 且

$$g(x) = \rho'(|x|)x^\alpha/|x|.$$

其验证留给习题 1.x.12.

这个例子表明, 微积分导数与弱导数之间的关系依赖于维数. 也就是说, $|x|^r$ 这样的函数是否具有弱导数, 不仅依赖于 r , 还依赖于 n (参见习题 1.x.13). 不过, 以下事实的证明留作习题, 它表明后者确实推广了前者.

命题 1.2.7: 设 α 任意且 $\psi \in C^{|\alpha|}(\Omega)$. 则弱导数 $D_w^\alpha \psi$ 存在, 且等于 $D^\alpha \psi$.

由此以后, 我们忽略 D 与 D_w 在定义上的差别. 也就是说, 一般地, 微分符号均指弱导数; 同时在适当场合仍使用光滑函数导数的经典性质.

1.3 Sobolev 范数及相关空间

利用弱导数概念, 可以把 Lebesgue 范数和空间推广为包含导数的范数和空间.

定义 1.3.1: 设 k 为非负整数, $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$, 并假设对所有 $|\alpha| \leq k$, 弱导数 $D_w^\alpha f$ 都存在. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 定义 Sobolev 范数

$$\|f\|_{W_p^k(\Omega)} := \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时定义

$$\|f\|_{W_\infty^k(\Omega)} := \max_{|\alpha| \leq k} \|D_w^\alpha f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

在两种情形下, Sobolev 空间都定义为

$$W_p^k(\Omega) := \{f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega) : \|f\|_{W_p^k(\Omega)} < \infty\}.$$

在特殊情形下, Sobolev 空间可以与其他空间联系起来. 例如, 回顾 Lipschitz 范数

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)} + \sup \left\{ \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} : x, y \in \Omega, x \neq y \right\},$$

以及相应的 Lipschitz 函数空间

$$\text{Lip}(\Omega) = \{f \in L^\infty(\Omega) : \|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} < \infty\}.$$

在一定的区域条件下, 对所有维数 n 都有 $\text{Lip}(\Omega) = W_\infty^1(\Omega)$, 且两者范数等价 (参见习题 1.x.15 和习题 1.x.14). 所谓线性空间 V 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价, 是指存在正常数 $C < \infty$, 使

$$\|v\|_1/C \leq \|v\|_2 \leq C\|v\|_1 \quad \forall v \in V.$$

此外, 当 $k > 1$ 时,

$$W_{\infty}^k(\Omega) = \{f \in C^{k-1}(\Omega) : f^{(\alpha)} \in \text{Lip}(\Omega) \ \forall |\alpha| \leq k-1\}.$$

在一维情形 ($n = 1$) 中, 空间 $W_1^1(\Omega)$ 可以刻画为区间 Ω 上绝对连续函数的集合 (参见 (Hartman & Mikusinski 1961) 以及习题 1.x.17 和习题 1.x.22).

容易看出, $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 是范数. 因而根据定义, $W_p^k(\Omega)$ 是赋范线性空间. 以下定理说明它是完备的.

定理 1.3.2: Sobolev 空间 $W_p^k(\Omega)$ 是 Banach 空间.

证明: 设 $\{v_j\}$ 关于范数 $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 为 Cauchy 序列. 由于该范数只是各弱导数的 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 范数的组合, 对每个 $|\alpha| \leq k$, $\{D_w^{\alpha} v_j\}$ 都关于 $\|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$ 为 Cauchy 序列. 因此, 定理 1.1.8 蕴含存在 $v^{\alpha} \in L^p(\Omega)$, 使

$$\|D_w^{\alpha} v_j - v^{\alpha}\|_{L^p(\Omega)} \longrightarrow 0 \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

特别地, $v_j \rightarrow v^{(0,\dots,0)} =: v$ 于 $L^p(\Omega)$. 剩下要验证的是 $D_w^{\alpha} v$ 存在且等于 v^{α} .

首先注意, 若 $w_j \rightarrow w$ 于 $L^p(\Omega)$, 则对所有 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} w_j(x) \phi(x) dx \longrightarrow \int_{\Omega} w(x) \phi(x) dx. \quad (1.3.3)$$

这由 (1.1.9) 和 Hölder 不等式得到:

$$\|w_j \phi - w \phi\|_{L^p(\Omega)} \leq \|w_j - w\|_{L^p(\Omega)} \|\phi\|_{L^{\infty}(\Omega)} \longrightarrow 0.$$

为了证明 $D_w^{\alpha} v = v^{\alpha}$, 必须证明

$$\int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

这由 $D_w^{\alpha} v_j$ 的定义和两次应用 (1.3.3) 得出:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} v^{\alpha} \phi dx &= \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\Omega} (D_w^{\alpha} v_j) \phi dx \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v_j \phi^{(\alpha)} dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \phi^{(\alpha)} dx. \end{aligned}$$

■

还可以给出另一个可能的 Sobolev 空间定义. 令 $H_p^k(\Omega)$ 表示 $C^k(\Omega)$ 关于 Sobolev 范数 $\|\cdot\|_{W_p^k(\Omega)}$ 的闭包. 当 $p = \infty$ 时, $H_{\infty}^k = C^k$, 它并不等于 $W_{\infty}^k(\Omega)$. 事实上, 已经指出后者与某些 Lipschitz 空间有关. 不过, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 有 $H_p^k(\Omega) = W_p^k(\Omega)$. 以下结果由 (Meyers & Serrin 1964) 的一篇论文证明, 该论文既以结果的重要性著称, 也以标题的简短著称.

定理 1.3.4: 设 Ω 为任意开集. 当 $p < \infty$ 时, $C^{\infty}(\Omega) \cap W_p^k(\Omega)$ 在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密.

注 1.3.5: 这一结果应与另一类稠密性结果相区别, 即 $C^{\infty}(\overline{\Omega})$ 在 Sobolev 空间中的稠密性. 只要区域的一部分位于其一部分边界的两侧, 后一种稠密性就不可能成立. 裂缝扩展问题中常用的狭缝区域就是这种情形 (参见习题 1.x.26). 要使这种更强的稠密性成立, 还必须满足某种

正则性条件. 例如, 已知当 Ω 满足线段条件时它成立 (参见 (Adams 1975)). 线段条件是指: 对所有 $x \in \partial\Omega$, 存在包含 x 的开球 B_x 和非零向量 n_x , 使对所有 $z \in \Omega \cap B_x$ 都有

$$\{z + tn_x : 0 < t < 1\} \subset \Omega.$$

向量 n_x 起到 $\partial\Omega$ 在 x 处指向内部的法向量的作用. 本书考虑的许多区域都满足这一条件 (参见习题 1.x.25).

注 1.3.6: 当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时, 可以如下看出定理 1.3.4 的有效性. 更一般的情形见习题 1.x.19. 由例 1.2.2 可知, 存在非负的 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. 适当归一化后, 可进一步假设

$$\int_{\Omega} \phi(x) dx = 1.$$

对任意 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 和 $\epsilon > 0$, 定义

$$f_{\epsilon}(x) = \epsilon^{-n} \int_{\Omega} f(y) \phi((x-y)/\epsilon) dy.$$

也就是说, $f_{\epsilon} = f * \phi_{\epsilon}$, 其中 $\phi_{\epsilon}(y) := \epsilon^{-n} \phi(y/\epsilon)$ 对所有 $y \in \Omega$ 成立, “*” 表示卷积. 由控制收敛定理容易看出, $f_{\epsilon} \in C^{\infty}$, 且 $f \in L^p(\Omega)$ 蕴含 $f_{\epsilon} \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 此外, 若 $f \in W_p^k(\Omega)$, 则通过在积分号下求导并使用弱导数定义, 对 f 与 f_{ϵ} 的各阶导数也可作同样论断, 从而证明该结果. 函数 f_{ϵ} 称为 f 的“光滑化”.

出于技术原因, 引入以下 Sobolev 半范数记号很有用.

定义 1.3.7: 设 k 为非负整数且 $f \in W_p^k(\Omega)$. 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 令

$$|f|_{W_p^k(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

当 $p = \infty$ 时, 令

$$|f|_{W_{\infty}^k(\Omega)} = \max_{|\alpha|=k} \|D_w^{\alpha} f\|_{L^{\infty}(\Omega)}.$$

1.4 包含关系与 Sobolev 不等式

定义 Sobolev 空间时使用了多个指标, 因而自然希望这些空间之间存在包含关系, 从而可以给出某种次序. 利用定义 1.3.1 和习题 1.x.1, 很容易导出以下命题.

命题 1.4.1: 设 Ω 为任意区域, k, m 为满足 $k \leq m$ 的非负整数, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 则

$$W_p^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

命题 1.4.2: 设 Ω 为有界区域, k 为非负整数, p, q 为满足 $1 \leq p \leq q \leq \infty$ 的实数. 则

$$W_q^k(\Omega) \subset W_p^k(\Omega).$$

不过, Sobolev 空间之间还有更精细的关系. 例如, 在某些情形下, 即使 $k < m$ 且 $p > q$, 仍有 $W_q^m(\Omega) \subset W_p^k(\Omega)$. Sobolev 导数的存在性会蕴含函数具有更强的可积性条件. 为寻找这种结果中 k, m, p, q 之间可能的关系, 先考察一个例子.

例 1.4.3: 设 $n \geq 2$, $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1/2\}$, 并考虑函数

$$f(x) = \log|\log|x||.$$

由例 1.2.6(以及习题 1.x.12) 可知, f 有一阶弱导数

$$D^\alpha f(x) = \frac{x^\alpha}{|x|^2 \log|x|} \quad (|\alpha| = 1).$$

由习题 1.x.5 可知, 当 $p \leq n$ 时 $D^\alpha f \in L^p(\Omega)$. 例如,

$$|D^\alpha f(x)|^n \leq \rho(|x|) := \frac{1}{|x|^n |\log|x||^n},$$

而 ρ 满足习题 1.x.5 的条件, 因为 $\rho(r)r^{n-1} = 1/(r|\log r|^n)$ 对所有 $n \geq 2$ 在 $[0, 1/2]$ 上可积. 实际上, 作变量代换 $r = e^{-t}$ 得

$$\int_0^{1/2} \frac{dr}{r|\log r|^n} = \int_{\log 2}^\infty \frac{dt}{t^n} < \infty \quad (n \geq 2).$$

同样容易看出, 对 $p < \infty$, $f \in L^p(\Omega)$. 因此, 当 $p \leq n$ 时, $f \in W_p^1(\Omega)$. 但要注意, 对任何 p , 都有 $f \notin L^\infty(\Omega)$.

这个例子表明, 存在这样的函数: 它在一些点本质上为无穷大 (这些点也可以像 (1.1.12) 中那样选得处处稠密), 但它仍具有 p 次幂可积的弱导数. 而且, 随维数 n 增大, 可积性幂次 p 也随之增大. 另一方面, 下面将在第 4 章证明的结果表明, 当 n 固定时, 若函数的弱导数以充分大的幂次 p 可积, 则该函数必有界 (实际上可视为连续函数). 在陈述该结果之前, 必须先对区域边界引入一个正则性条件.

定义 1.4.4: 若存在开集族 O_i , 正参数 ϵ , 整数 N 和有限常数 M , 使得对每个 $x \in \partial\Omega$, 以 x 为中心、半径为 ϵ 的球都包含在某个 O_i 中, 任意点至多属于 N 个 O_i , 且每个区域 $O_i \cap \Omega = O_i \cap \Omega_i$, 其中 Ω_i 的边界是 Lipschitz 函数 ϕ_i 的图像, 即

$$\Omega_i = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n : x \in \mathbb{R}^{n-1}, y < \phi_i(x)\}, \quad \|\phi_i\|_{\text{Lip}(\mathbb{R}^{n-1})} \leq M,$$

则称 Ω 具有 Lipschitz 边界 $\partial\Omega$.

该定义的一个推论是, 现在可以把给定区域上的 Sobolev 空间与整个 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 空间联系起来.

定理 1.4.5: 设 Ω 具有 Lipschitz 边界. 则对所有非负整数 k 和 $1 \leq p \leq \infty$, 存在延拓映射

$$E : W_p^k(\Omega) \longrightarrow W_p^k(\mathbb{R}^n),$$

使得对所有 $v \in W_p^k(\Omega)$ 都有 $(Ev)|_\Omega = v$, 且

$$\|Ev\|_{W_p^k(\mathbb{R}^n)} \leq C\|v\|_{W_p^k(\Omega)},$$

其中 C 与 v 无关.

该结果的证明以及本节其他材料的更多细节见 (Stein 1970). 当然, 对任意区域, 相反方向的结果都成立: 自然限制映射使我们可以把 $W_p^k(\mathbb{R}^n)$ 中的函数视为 $W_p^k(\Omega)$ 中定义良好的函数. 现在回到不同指标 Sobolev 空间之间的关系问题.

定理 1.4.6 (Sobolev 不等式): 设 Ω 为具有 Lipschitz 边界的 n 维区域, k 为正整数, p 为满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数, 且

$$\begin{cases} k \geq n, & p = 1, \\ k > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数 C , 使对所有 $u \in W_p^k(\Omega)$ 都有

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外, u 的 $L^\infty(\Omega)$ 等价类中存在一个连续函数.

这个结果说明, 任何具有适当正则弱导数的函数都可以视为连续有界函数. 注意, 例 1.4.3 表明该结果是尖锐的. 也就是说, 至少当 $n \geq 2$ 时, 条件 $k > n/p$ 不能放宽 (除非 $p = 1$). 当 $n = 1$ 时, Sobolev 不等式说明一阶导数以任意幂次 $p \geq 1$ 可积就足以保证连续性. 该结果将在第 4 章作为多项式逼近理论的一个推论得到证明. 把它应用于 Sobolev 空间中函数的导数, 得到如下结果.

推论 1.4.7: 设 Ω 为具有 Lipschitz 边界的 n 维区域, k, m 为满足 $m < k$ 的正整数, p 为满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数, 且

$$\begin{cases} k - m \geq n, & p = 1, \\ k - m > n/p, & p > 1. \end{cases}$$

则存在常数 C , 使对所有 $u \in W_p^k(\Omega)$ 都有

$$\|u\|_{W_\infty^m(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_p^k(\Omega)}.$$

此外, u 的 $L^p(\Omega)$ 等价类中存在一个 C^m 函数.

注 1.4.8: 若 $\partial\Omega$ 不 Lipschitz 连续, 则定理 1.4.5 和定理 1.4.6 都可能不成立. 例如, 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, |y| < x^r\},$$

其中 $r > 1$, 并令 $u(x, y) = x^{-\epsilon/p}$, 其中 $0 < \epsilon < r$. 则

$$\sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |D^\alpha u|^p dx dy = c_{\epsilon, p} \int_0^1 x^{-\epsilon-p+r} dx < \infty,$$

只要 $p < 1 + r - \epsilon$. 此时 $u \in W_p^1(\Omega)$, 但当 $\epsilon > 0$ 时, u 在 Ω 上不是本质有界的. 选取 ϵ 使 $p > 2$ 仍有可能, 就会发现 Sobolev 不等式成立必须要求 Lipschitz 边界. 由于 Sobolev 不等式在 $\mathbb{R}^n$ 上成立, 不可能把 u 延拓为 $W_2^1(\mathbb{R}^2)$ 的元素. 因此, 若 $\partial\Omega$ 不 Lipschitz 连续, Sobolev 函数的延拓定理可能不成立.

1.5 第 0 章回顾

现在可以处理上一章遗留的许多问题. 那里引入的空间 V 现在可以严格定义为

$$V = \{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\},$$

其中 $\Omega = [0, 1]$. 这个定义有意义, 因为 Sobolev 不等式保证 $W_2^1(\Omega)$ 中函数的逐点值定义良好. 实际上, 可以把 $W_2^1(\Omega)$ 看作 $C_b(\Omega)$ 的子空间, 后者是有界连续函数的 Banach 空间.

现在可以严格地推导 (0.1.1) 的解所满足的变分形式 (0.1.3) (参见习题 1.x.24). 我们已在第 1.3 节说明 (见相关习题), $W_1^1(\Omega)$ 中的函数, 从而更强地说 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数, 都绝对连续, 所以 Cantor 函数不在其中. 另一方面, 在例 1.2.5 中已经看到, 分片线性函数的弱导数是分片常数. 因而, 第 0.4 节构造的空间 S 满足 $S \subset W_\infty^1(\Omega)$, 从而 $S \subset V$.

由于 Sobolev 不等式蕴含 $V \subset C_b(\Omega)$, 习题 0.x.8 说明, 导出定理 0.3.5 的对偶论证中的 w 定义良好 (另见习题 1.x.23).

在 $u - u_S$ 的误差估计中, 我们使用了函数二阶导数的 $L^2(\Omega)$ 范数 $\|\cdot\|_2$. 现在可以在 $W_2^2(\Omega)$ 中严格解释这些表达式. 特别地, 可以把逼近假设 (0.3.4) 改述为

$$\exists \epsilon < \infty \quad \text{such that} \quad \inf_{v \in S} \|w - v\|_E \leq \epsilon \|w''\|_2 \quad \forall w \in W_2^2(\Omega). \quad (0.3.4\text{bis})$$

而定理 0.4.5 成立所需的唯一条件是 $f \in L^2(\Omega)$ (参见习题 1.x.23).

最后, 在第 0 章的证明中, 我们论证了 $a(v, v) = 0$ 蕴含 $v \equiv 0$. 它当然蕴含 v 的弱导数作为 $L^2(\Omega)$ 中的函数为零, 但要断定 v 必为常数, 还需要一种强制性概念, 后面将详细发展这一概念. 目前先考虑以下简单情形. 由习题 1.x.16 可知, 对所有 $v \in V$,

$$v(x) = \int_0^x D_w^1 v(s) ds.$$

利用 Schwarz 不等式 (参见定理 0.4.5 的证明) 估计得

$$|v(x)|^2 \leq x \int_0^x D_w^1 v(s)^2 ds.$$

再对 x 积分, 得

$$\|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq \frac{1}{2} a(v, v).$$

特别地, 这说明若 $v \in V$ 满足 $a(v, v) = 0$, 则 v 作为 $L^2(\Omega)$ 的元素为零. 再回顾 $W_2^1(\Omega)$ 范数的定义, 可见

$$\|v\|_{W_2^1(\Omega)}^2 \leq \frac{3}{2} a(v, v) \quad \forall v \in V. \quad (1.5.1)$$

因而可以断定, 对 $v \in V$, $a(v, v)$ 为零蕴含 v 是 V (或 $W_2^1(\Omega)$) 中的零元素. 不等式 (1.5.1) 是双线性型 $a(\cdot, \cdot)$ 在空间 V 上的强制性不等式. 注意, 该不等式只在 $W_2^1(\Omega)$ 的子空间 V 上有效, 而非在整个 $W_2^1(\Omega)$ 上有效, 因为若取 v 为非零常数函数, 无论用什么常数替换 $3/2$, 它都不成立.

1.6 迹定理

上一节中, 借助 Sobolev 不等式, 可以解释空间 V 定义中的“边界条件” $v(0) = 0$. 对以后关心的高维情形而言, 这一点多少有些误导, 因为第 1.4 节给出的 Sobolev 不等式不足以解释高维问题的边界条件. 例如, 已在例 1.4.3 中看到, 当 $n \geq 2$ 时, 空间 V 的对应物 $W_2^1(\Omega)$ 包含无界函数. 因此, 不能逐点解释边界条件; 当 $n \geq 2$ 时, 必须实质性地加强 Sobolev 不等式. 另一方面, 例 1.4.3 中的函数可以解释为 $\mathbb{R}^2$ 中任意直线上的 L^p 函数, 因为函数 $\log |\log |\cdot||$ 在一维中 p 次幂可积.

正确的解释如下. n 维区域 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 可以解释为 $n-1$ 维对象, 即流形. 当 $n=1$ 时, 它由互异的点组成, 这是零维流形的情形. Sobolev 不等式给出 Sobolev 空间中函数逐点值定义良好的条件, 从而也给出二维情形边界值定义良好的条件. 对高维问题, 必须寻求把 Sobolev 类函数限制到 $n-1$ 维流形上的解释. 特别地, 对 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数, 这种限制应当有良好意义, 例如属于某个 Lebesgue 类.

先用一个简单例子说明这一思想. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘:

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} = \{(r, \theta) : 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}.$$

设 $u \in C^1(\bar{\Omega})$, 如下考察它在 $\partial\Omega$ 上的限制:

$$\begin{aligned} u(1, \theta)^2 &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u(r, \theta)^2) dr \\ &= \int_0^1 (2r^2 u u_r + 2r u^2)(r, \theta) dr \\ &= \int_0^1 \left(2r^2 u \nabla u \cdot \frac{(x, y)}{r} + 2r u^2 \right) (r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 (2r^2 |u| |\nabla u| + 2r u^2)(r, \theta) dr \\ &\leq \int_0^1 2(|u| |\nabla u| + u^2)(r, \theta) r dr. \end{aligned}$$

最后一步使用了 $r \leq 1$. 对 θ 积分并使用极坐标 (参见习题 1.x.4), 得

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta \leq 2 \int_{\Omega} (|u| |\nabla u| + u^2) dx dy,$$

其中按显然的方式定义边界积分及相应范数:

$$\int_{\partial\Omega} u^2 d\theta := \int_0^{2\pi} u(1, \theta)^2 d\theta =: \|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2. \quad (1.6.1)$$

利用 Schwarz 不等式,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}^2 \leq 2\|u\|_{L^2(\Omega)} \left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + 2 \int_{\Omega} u^2 dx dy.$$

算术-几何平均不等式 (参见习题 1.x.32) 蕴含

$$\left(\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} u^2 dx dy \right)^{1/2} \leq 2 \left(\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + u^2) dx dy \right)^{1/2}.$$

因此,

$$\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}. \quad (1.6.2)$$

这是一个类似于 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6) 的不等式, 只是左端的 $L^\infty(\Omega)$ 范数被 $\|u\|_{L^2(\partial\Omega)}$ 取代. 虽然目前只对光滑 u 证明了该不等式, 但将看到它对所有 $u \in W_2^1(\Omega)$ 都有意义, 而且对这种 u , 限制 $u|_{\partial\Omega}$ 作为 $L^2(\partial\Omega)$ 中的函数也有意义. 首先应说明后一个空间的含义. 利用定义 (1.6.1), 可以通过坐标映射 $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ 简单地把它与 $L^2([0, 2\pi])$ 等同起来. 更一般的边界稍后讨论. 现在可以用 (1.6.2) 证明以下结果.

命题 1.6.3: 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆盘. 对所有 $u \in W_2^1(\Omega)$, 限制 $u|_{\partial\Omega}$ 都可以解释为 $L^2(\partial\Omega)$ 中的函数, 并满足 (1.6.2).

证明: 证明中将三次使用 (1.6.2), 而目前只对光滑函数导出了该不等式. 不过, 由注 1.3.5, 这类函数在 $W_2^1(\Omega)$ 中稠密. 因而可以选取序列 $u_j \in C^1(\bar{\Omega})$, 使对所有 j 都有 $\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} \leq 1/j$. 由 (1.6.2) 和三角不等式,

$$\begin{aligned}\|u_k - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &\leq \sqrt[4]{8} \|u_k - u_j\|_{W_2^1(\Omega)} \leq \sqrt[4]{8} \left(\frac{1}{j} + \frac{1}{k} \right).\end{aligned}$$

所以 $\{u_j\}$ 是 $L^2(\partial\Omega)$ 中的 Cauchy 序列. 该空间完备, 故存在极限 $v \in L^2(\partial\Omega)$, 使 $\|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \rightarrow 0$. 定义

$$u|_{\partial\Omega} := v.$$

首先必须验证该定义不依赖于所选序列. 假设 v_j 是另一个满足 $\|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \rightarrow 0$ 的 $C^1(\bar{\Omega})$ 函数序列. 多次使用三角不等式并再次使用 (1.6.2), 得

$$\begin{aligned}\|v - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \|u_j - v_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} \|u_j - v_j\|_{W_2^1(\Omega)} \\ &\leq \|v - u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} + \sqrt[4]{8} (\|u_j - u\|_{W_2^1(\Omega)} + \|u - v_j\|_{W_2^1(\Omega)}) \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因而 $u|_{\partial\Omega}$ 在 $L^2(\partial\Omega)$ 中定义良好. 最后还须验证 (1.6.2) 对 u 成立. 再次利用该不等式对光滑函数的有效性,

$$\begin{aligned}\|u\|_{L^2(\partial\Omega)} &= \|v\|_{L^2(\partial\Omega)} = \lim_{j \rightarrow \infty} \|u_j\|_{L^2(\partial\Omega)} \\ &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[4]{8} \|u_j\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u_j\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2} \\ &= \sqrt[4]{8} \|u\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|u\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.\end{aligned}$$

■

这就完成了命题的证明. 注意, 为把 (1.6.2) 从稠密子空间推广到整个 $W_2^1(\Omega)$, 证明中反复使用了该不等式. 这是稠密性论证的典型例子.

注 1.6.4: 命题 1.6.3 并未断言 u 在 $\partial\Omega$ 上的逐点值有意义, 它只断言 $u|_{\partial\Omega}$ 在 $\partial\Omega$ 上平方可积. 因此仍有可能 (参见习题 1.x.28), u 在 $\partial\Omega$ 上的一个稠密点集处为无穷大. 对光滑函数, 这里定义的迹与通常的逐点边界限制相同.

注 1.6.5: 初看起来, 命题 1.6.3 说明 $W_2^1(\Omega)$ 中的函数具有 $L^2(\partial\Omega)$ 中的边界值, 这当然正确. 但仅此本身并非尖锐结果, 因为并非 $L^2(\partial\Omega)$ 的每个元素都是 $W_2^1(\Omega)$ 某个元素的迹. 仔细考察可知, 该命题给出了一个尖锐结论: 函数的 $L^2(\partial\Omega)$ 范数可以只由 $W_2^1(\Omega)$ 范数的一部分 (其平方根) 和 $L^2(\Omega)$ 范数控制. 从量纲上看, 这一结果并不奇怪. 假设函数的单位为 U , 长度单位为 L . 则 $W_2^1(\Omega)$ 范数的单位 (忽略低阶项) 为 U , $L^2(\Omega)$ 范数的单位为 $U \cdot L$. 它们都不等于 (1.6.2) 左端的单位 $U\sqrt{L}$, 但二者乘积的平方根正好等于它. 这种量纲论证不能证明 (1.6.2) 这样的不等式, 但可以用来否定某个不等式, 或简化其证明 (参见习题 1.x.31).

下面把命题 1.6.3 推广到更复杂的区域. 一种自然方法是在 Lipschitz 区域类中讨论. 若 $\partial\Omega$ 是函数 ϕ 的图像 (参见定义 1.4.4), 可以定义

$$\int_{\partial\Omega} f dS := \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x, \phi(x)) \sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2} dx.$$

若 ϕ 为 Lipschitz 函数, 则权函数 $\sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2}$ 是 L^∞ 函数 (参见习题 1.x.14). 这样就能在任意 Lipschitz 边界上定义积分以及相应的 Lebesgue 空间 (参见 (Grisvard 1985)). 此外, 以下结果成立.

定理 1.6.6: 设 Ω 具有 Lipschitz 边界, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 则存在常数 C , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

用记号 $\dot{W}_p^1(\Omega)$ 表示 $W_p^1(\Omega)$ 中在 $\partial\Omega$ 上迹为零的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^1(\Omega) = \{v \in W_p^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega)\}. \quad (1.6.7)$$

类似地, 用 $\dot{W}_p^k(\Omega)$ 表示 $W_p^k(\Omega)$ 中所有 $k-1$ 阶导数都属于 $\dot{W}_p^1(\Omega)$ 的函数所组成的子集, 即

$$\dot{W}_p^k(\Omega) = \{v \in W_p^k(\Omega) : v^{(\alpha)}|_{\partial\Omega} = 0 \text{ in } L^2(\partial\Omega) \ \forall |\alpha| < k\}. \quad (1.6.8)$$

1.7 负范数与对偶性

本节介绍若干思想, 它们导出负整数 k 时 Sobolev 空间 W_p^k 的定义. 该定义以 Banach 空间中的对偶性概念为基础. Banach 空间 B 的对偶空间 B' 是 B 上的一组线性泛函. 线性空间 B 上的线性泛函, 就是从 B 到实数域 $\mathbb{R}$ 的线性函数, 即满足

$$L(u + av) = L(u) + aL(v) \quad \forall u, v \in B, a \in \mathbb{R}$$

的函数 $L : B \rightarrow \mathbb{R}$. 更准确地说, 要区分 B 上所有线性泛函组成的线性空间 B^* (参见习题 1.x.33) 和连续线性泛函组成的子空间 $B' \subset B^*$. 以下观察简化了这类泛函的刻画.

命题 1.7.1: Banach 空间 B 上的线性泛函 L 连续, 当且仅当它有界. 也就是说, 存在有限常数 C , 使

$$|L(v)| \leq C \|v\|_B \quad \forall v \in B.$$

证明: 有界线性函数实际上 Lipschitz 连续, 因为

$$|L(u) - L(v)| = |L(u - v)| \leq C \|u - v\|_B \quad \forall u, v \in B.$$

反之, 设 L 连续. 若它无界, 则必存在 B 中的序列 $\{v_n\}$, 使 $|L(v_n)|/\|v_n\|_B \geq n$. 令 $w_n = v_n/(n\|v_n\|_B)$ 作归一化, 则 $|L(w_n)| \geq 1$, 但 $\|w_n\|_B \leq 1/n$, 因而 $w_n \rightarrow 0$. 可是由 L 的连续性应有 $L(w_n) \rightarrow 0$, 这给出所需的矛盾. ■

对 Banach 空间 B 上的连续线性泛函 L , 命题 1.7.1 说明下式总为有限值:

$$\|L\|_{B'} := \sup_{0 \neq v \in B} \frac{L(v)}{\|v\|_B}. \quad (1.7.2)$$

习题 1.x.34 说明它在 B' 上构成范数, 称为对偶范数. 可以证明 (参见 (Trèves 1967)), B' 关于该范数完备, 即 B' 也是 Banach 空间.

例 1.7.3: Banach 空间的共轭空间不一定是神秘对象. Lebesgue 积分理论的关键结果之一是, 当 $1 \leq p < \infty$ 时, L^p 的共轭空间可以容易地识别. 由 Hölder 不等式, 任意函数 $f \in L^q(\Omega)$, 其中 $1/q + 1/p = 1$ 定义了 p 的共轭指标 q , 都可以通过

$$L^p(\Omega) \ni v \mapsto \int_{\Omega} v(x)f(x) dx$$

视为连续线性泛函. Riesz 表示定理的一个版本断言, $L^p(\Omega)$ 上所有连续线性泛函都以这种方式产生. 也就是说, $(L^p(\Omega))'$ 与 $L^q(\Omega)$ 同构.

例 1.7.4: Banach 空间的共轭空间也可以包含全新的对象. 例如, Sobolev 不等式说明, 只要 k, p 满足定理 1.4.6 中的适当关系, Dirac δ 函数就是 W_p^k 上的连续线性泛函. 具体地说, Dirac δ 函数是线性泛函

$$W_p^k(\Omega) \ni v \mapsto v(y) =: \delta_y(v),$$

其中 y 是区域 Ω 中的给定点. 可以看出, 它不能通过任何局部可积函数的积分过程产生 (参见习题 1.x.36), 即不能视为前面引入的任何空间的成员.

定义 1.7.5: 设 $1 \leq p \leq \infty$, k 为负整数. 设 q 为 p 的共轭指标, 即 $1/q + 1/p = 1$. Sobolev 空间 $W_p^k(\Omega)$ 定义为对偶空间

$$W_p^k(\Omega) := (W_q^{-k}(\Omega))',$$

其范数为对偶范数 (参见 (1.7.2)).

注 1.7.6: 注意, 我们对负指标 Sobolev 空间的定义具有如下性质: 若对 $k = 0$ 也使用同样定义, 则由例 1.7.3, 当 $1 < p < \infty$ 时, 该定义与定义 1.3.1 一致. 还要注意, 可以用不同的对偶空间定义负指标 Sobolev 空间. 特别地, 常常需要使用 $W_q^{-k}(\Omega)$ 的某个子空间的共轭; 由习题 1.x.35, 这会得到一个略大的空间. 无论采用哪种情形, 负 Sobolev 空间都足够大, 可以包含 Dirac δ 函数这样的有趣新对象. 例 1.7.4 表明, 当 $k < -n + n/p$ (或 $p = \infty$ 时 $k \leq -n$) 时, $\delta \in W_p^k(\Omega)$.

习题

习题 1.x.1: 设 Ω 有界且 $1 \leq p \leq q \leq \infty$. 证明 $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$. (提示: 使用 Hölder 不等式.) 举例说明当 $p < q$ 时该包含为真包含, 而当 Ω 无界时该包含不成立.

习题 1.x.2: 证明区域 Ω 上的有界连续函数集合在范数 $\|\cdot\|_{L^\infty(\Omega)}$ 下构成 Banach 空间.

习题 1.x.3: 设 Ω 有界且 $f_j \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$. 使用 Hölder 不等式证明

$$\int_{\Omega} f_j(x) dx \rightarrow \int_{\Omega} f(x) dx \quad \text{as } j \rightarrow \infty.$$

习题 1.x.4: 这里补充 n 维极坐标的知识. 归纳地定义从 $\Omega_k \subset \mathbb{R}^k$ 的子集到 $\mathbb{R}^{k+1}$ 单位球面的映射 x^k :

$$(x_1^k, \dots, x_{k+1}^k)(\omega, \phi) := ((\sin \phi)x^{k-1}(\omega), \cos \phi),$$

其中

$$\Omega_k := \{(\omega, \phi) : \omega \in \Omega_{k-1}, 0 \leq \phi < \pi\},$$

$x^1(\omega) = (\cos \omega, \sin \omega)$ 且 $\Omega_1 = \{\omega : 0 \leq \omega < 2\pi\}$. 对 $r \geq 0$ 和 $\omega \in \Omega_{n-1}$, 定义极坐标映射 $X(\omega, r) := rx^{n-1}(\omega)$. 证明

$$\left| \det \frac{\partial X(\omega, r)}{\partial(\omega, r)} \right| = r^{n-1} \prod_{j=2}^{n-1} (\sin \omega_j)^{j-1}$$

对 $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \in \Omega_{n-1}$ 和 $r \geq 0$ 成立. (提示: 先对 $n = 2$ 计算, 再对 k 归纳证明以下恒等式.)

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^{k+1}}{\partial(\omega, \phi)} \\ x^{k+1}(\omega, \phi) \end{pmatrix} = (\sin \phi)^k \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x^k}{\partial \omega} \\ x^k(\omega) \end{pmatrix}.$$

习题 1.x.5: 设 n 为正整数, ρ 为定义在 $0 < r \leq 1$ 上的非负光滑函数, 且满足

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \rho(r) r^{n-1} dr < \infty.$$

在 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ 上定义 $f(x) = \rho(|x|)$. 证明 $f \in L^1(\Omega)$. (提示: 使用单调收敛定理、极坐标 (参见习题 1.x.4) 和 Fubini 定理.)

习题 1.x.6: 设 $\Omega = [0, 1]$ 且 $1 \leq p < \infty$. 证明 (1.1.12) 定义的函数 f 属于 $L^p(\Omega)$, 并且 $\|f - f_j\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, j \rightarrow \infty$. (提示: 先证明 $\log x \in L^p(\Omega)$, 再使用 $L^p(\Omega)$ 为 Banach 空间这一事实.)

习题 1.x.7: 选取你喜欢的稠密序列 $\{r_n\}$. 对不同的 j 画出 (1.1.10) 定义的函数 f_j 的图像.

习题 1.x.8: 证明对所有 $x \neq 0$ 和 $|\alpha| = 1$,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha |x| = \frac{x^\alpha}{|x|}.$$

习题 1.x.9: 证明命题 1.2.7. (提示: 使用分部积分和 $C^0(\Omega) \subset L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 这一事实.)

习题 1.x.10: 证明例 1.2.5 中函数 f 的二阶及更高阶弱导数不存在.

习题 1.x.11: 证明例 1.2.6 中的条件蕴含

$$\lim_{r \rightarrow 0} r^{n-1} |\rho(r)| = 0.$$

(提示: 先证明 $r^{n-1} |\rho(r)| \leq \int_r^1 t^{n-1} |\rho'(t)| dt + C \leq \tilde{C}$. 若极限不为零, 则存在趋于零的点 r_j , 使对适当的 $\gamma > 0$,

$$\begin{aligned} \left| r_j^{n-1} \int_{r_j}^{r_j + \gamma r_j} \rho'(t) dt \right| &= \left| r_j^{n-1} (\rho(r_j + \gamma r_j) - \rho(r_j)) \right| \\ &\geq \left| r_j^{n-1} (C(r_j + \gamma r_j)^{1-n} - cr_j^{1-n}) \right| = \delta > 0. \end{aligned}$$

说明这与条件矛盾. 或者应用 Hardy 不等式 (Stein 1970).)

习题 1.x.12: 验证例 1.2.6 中所断言的弱导数存在性. (提示: 使用习题 1.x.11, 习题 1.x.8, 习题 1.x.5, 散度定理以及 Lebesgue 积分的一个极限定理.)

习题 1.x.13: 对给定实数 r , 令 $f(x) = |x|^r$. 证明当 $r > 1 - n$ 时, f 在单位球上有一阶弱导数.

习题 1.x.14: 证明 $\text{Lip}(\Omega) \subset W_\infty^1(\Omega)$. (提示: $f \in \text{Lip}(\Omega)$ 对每个变量分别而言当然也是 Lipschitz 连续的, 因而几乎处处有偏导数. 使用 Fubini 定理和反证法说明这些偏导数在 Ω 上必本质有界. 利用 Lipschitz 函数绝对连续且绝对连续函数可以分部积分, 说明这些导数实际上是弱导数.) 对这一包含关系, Lipschitz 范数与 Sobolev $W_\infty^1(\Omega)$ 范数之间等价关系的常数是 多少?

习题 1.x.15: 设 Ω 为凸集. 证明 $W_\infty^1(\Omega) \subset \text{Lip}(\Omega)$. (提示: 给定 $f \in W_\infty^1(\Omega)$, $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 和 $y, z \in \Omega$, 写成

$$f(y) - f(z) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\Omega f(x) D\phi^\epsilon(x) dx,$$

其中 D 表示沿 $n_{y,z} = (y - z)/|y - z|$ 方向的方向导数, 且

$$\phi^\epsilon(x) = \epsilon^{-n} \int_0^\infty \phi\left(\frac{x - y - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) \phi\left(\frac{x - z - tn_{y,z}}{\epsilon}\right) dt.$$

注意: 必须证明上述恒等式, 参见注 1.3.6 中的光滑化论证和习题 1.x.18. 通过验证并使用恒等式

$$\phi^\epsilon(x) = -\epsilon^{-n}|y - z| \int_{-1}^0 \phi\left(\frac{x - y - \tau(y - z)}{\epsilon}\right) d\tau,$$

证明 $\phi^\epsilon \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且 $\|\phi^\epsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = |y - z|$. 应用弱导数的定义和 Hölder 不等式.)

习题 1.x.16: 设 $n = 1$, $\Omega = [a, b]$, $f \in W_1^1(\Omega)$. 在假设 f 在 a, b 处连续的条件下, 证明

$$\int_a^b D_w^1 f(x) dx = f(b) - f(a).$$

(提示: 使用定义弱导数的“分部积分”公式, 并选取适当序列 $\phi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使 $\phi_j \rightarrow 1$ 于 Ω , 参见习题 1.x.15.)

习题 1.x.17: 证明区间 $[a, b]$ 上的绝对连续函数属于 $W_1^1([a, b])$. (提示: 使用绝对连续函数可以分部积分这一事实.)

习题 1.x.18: 验证注 1.3.6 中的论断. (提示: 对所有 α 证明 $D^\alpha f_\epsilon = \epsilon^{-|\alpha|} f * (D^\alpha \phi)_\epsilon$; 证明 $f_\epsilon \rightarrow f$ 于 $L^p(\Omega)$; 并在适当条件下证明 $D^\alpha f_\epsilon = (D_w^\alpha f) * \phi_\epsilon = (D_w^\alpha f)_\epsilon$.)

习题 1.x.19: 若对某个点 x , 每个 $y \in \Omega$ 与 x 的连线段都位于 Ω 内, 则称区域 Ω 关于 x 为星形. 这里指闭线段, 因而必有 $x \in \Omega$. 在 Ω 为星形的假设下, 证明当 $1 \leq p < \infty$ 时 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密. (提示: 见 (Dupont and Scott 1979). 假设 $x = 0$, 证明当 $\rho < 1$ 时定义的“伸缩” $u_\rho(y) = u(\rho y)$ 满足 $u_\rho \rightarrow u$ 于 $W_p^k(\Omega)$, $\rho \rightarrow 1$. 像注 1.3.6 中那样光滑化 u_ρ , 得光滑函数 $u_{\rho,\epsilon} \rightarrow u$, $\rho \rightarrow 1$, $\epsilon \rightarrow 0$.)

习题 1.x.20: 证明 $n = 1$ 时的 Sobolev 不等式. 也就是说, 设 $\Omega = [a, b]$, 证明

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \|u\|_{W_1^1(\Omega)}.$$

(提示: 使用微积分基本定理和定理 1.3.4. 技术细节可参考迹不等式 (1.6.2) 的证明.) 常数 C 如何依赖于 a, b ?

习题 1.x.21: 设 $\Omega = [a, b]$ (这里 $n = 1$). 证明 $W_1^1(\Omega)$ 中所有函数都连续 (即具有连续代表). (提示: 使用习题 1.x.20 和定理 1.3.4.)

习题 1.x.22: 证明 $W_1^1([a, b])$ 中的函数在 $[a, b]$ 上绝对连续. (提示: 使用习题 1.x.16、习题 1.x.21 以及 Lebesgue 积分的“连续性”.)

习题 1.x.23: 使用习题 0.x.8 中的提示, 证明给定 $f \in L^2(\Omega)$, 存在满足 (0.1.1) 的解 $u \in W_2^2(\Omega)$. 验证所有边界条件都有意义且得到满足, 并说明应在何种意义下解释该微分方程.

习题 1.x.24: 设 u 是由习题 0.x.8 或习题 1.x.23 给出的 (0.1.1) 的解. 严格证明 (0.1.3) 成立.

习题 1.x.25: 证明任意 Lipschitz 区域都满足注 1.3.5 中的线段条件.

习题 1.x.26: 令

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, |y| < 1, y \neq 0 \text{ for } x \geq 0\}.$$

证明 $W_p^1(\Omega)$ 中存在不能由 $C^0(\overline{\Omega})$ 中函数的极限得到的函数.

习题 1.x.27: “尖点”区域 $\Omega = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < x^r\}$, $r > 1$, 是否满足线段条件? 它的补集是否满足?

习题 1.x.28: 设 Ω 为平面上的单位圆盘. 证明存在 $u \in W_2^1(\Omega)$, 它在 $\partial\Omega$ 的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

习题 1.x.29: 设 Ω 为平面上的区域. 证明存在 $u \in W_2^1(\Omega)$, 它在 Ω 的一个稠密点集处为无穷大. (提示: 参见 (1.1.12) 和例 1.4.3.)

习题 1.x.30: 设 Ω 如命题 1.6.3, p 为满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数. 证明存在常数 C , 使

$$\|v\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^p(\Omega)}^{1-1/p} \|v\|_{W_p^1(\Omega)}^{1/p} \quad \forall v \in W_p^1(\Omega).$$

说明当 $p = \infty$ 时该式的含义.

习题 1.x.31: 设 Ω 为上半平面. 证明不存在形如

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^\lambda \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^\mu$$

的不等式, 除非 $\lambda \leq 1/2$ 且 $\lambda + \mu = 1$. (提示: 假设该不等式成立, 考虑函数 $u(x) = Uv(Lx)$, 其中 U, L 任意, 从而得到矛盾.) 证明要在 $\lambda = \mu = 1/2$ 时建立该不等式, 只须假设 $\|v\|_{L^2(\Omega)} = \|v\|_{W_2^1(\Omega)} = 1$. 也就是说, 从这个特殊情形推出一般情形. (提示: 使用相同的缩放.) 用同样的思想证明

$$\|v\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)}^{1/2} \|v\|_{W_2^1(\Omega)}^{1/2}.$$

习题 1.x.32: 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 证明对任意 $\epsilon > 0$,

$$ab \leq \frac{\epsilon}{2} a^2 + \frac{1}{2\epsilon} b^2.$$

(提示: 展开 $(\sqrt{\epsilon}a - b/\sqrt{\epsilon})^2 \geq 0$.) 应用该式证明

$$a + b \leq ((1 + \epsilon)a^2 + (1 + 1/\epsilon)b^2)^{1/2}.$$

习题 1.x.33: 证明线性空间上的线性泛函集合本身是线性空间, 其中加法定义为 $(L_1 + L_2)(v) := L_1(v) + L_2(v)$, 数乘定义为 $(aL)(v) := aL(v)$.

习题 1.x.34: 证明 (1.7.2) 中的表达式在 Banach 空间的对偶空间上定义范数, 即验证定义 1.1.6 中的各条件.

习题 1.x.35: 设 B, C 为两个 Banach 空间, $B \subset C$, 且该包含映射连续. 证明 $C' \subset B'$, 且该包含映射连续.

习题 1.x.36: 设 Ω 为开集且 $y \in \Omega$. 证明不存在 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 使

$$\phi(y) = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

习题 1.x.37: 设 $\Omega = [0, 1]$. 证明

$$\{v \in C^1([0, 1]) : v(0) = 0\}$$

在 $\{v \in W_2^1(\Omega) : v(0) = 0\}$ 中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果和 Sobolev 不等式.)

习题 1.x.38: 设 $\Omega = [0, 1]$. 证明 $\{v \in C^1([0, 1]) : v'(1) = 0\}$ 在 $W_2^1(\Omega)$ 中稠密. (提示: 使用注 1.3.5 中的稠密性结果, 取 $C^1([0, 1])$ 中收敛到 v 于 $W_2^1(\Omega)$ 的序列 v_n , 再在 1 附近修改每个 v_n 使其导数为零.)

习题 1.x.39: 设 Ω 为开集. 假设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且

$$\int_{\Omega} f\phi dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

证明 $f = 0$ 几乎处处成立. (提示: 用反证法. 否则, 说明存在 $\epsilon > 0$, 使 $A = \{x \in \Omega : \pm f(x) > \epsilon\}$ 具有正测度. 用有限个球的并 A_N 在测度意义下逼近 A , 并令 $\tilde{A}_N$ 表示稍小的同心球的并, 它也在测度意义下逼近 A . 选取 $\phi_N \in \mathcal{D}(A_N)$, 使处处有 $0 \leq \phi_N \leq 1$, 并在 $\tilde{A}_N$ 上有 $\phi_N \geq 1/2$, 再对 $f\phi_N$ 在 Ω 上积分以得到矛盾. 如下构造 ϕ_N : 写成 $A_N = \bigcup_j B_j$, $\tilde{A}_N = \bigcup_j \tilde{B}_j$, 并选取 $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$, 使处处有 $0 \leq \psi_j \leq 1$, 且在 $\tilde{B}_j$ 上 $\psi_j = 1$. 定义

$$\phi_N(x) = \sum_j \psi_j(x) \left(1 + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

这可以看作一个近似单位分解论证.)

习题 1.x.40: 证明弱导数是唯一的. (提示: 使用习题 1.x.39.)

习题 1.x.41: 与习题 1.x.39 一样, 设 $\tilde{B}_j \subset B_j$ 为同心球, $\psi_j \in \mathcal{D}(B_j)$, 处处有 $0 \leq \psi_j \leq 1$, 且在 $\tilde{B}_j$ 上 $\psi_j = 1$. 设 $\epsilon > 0$, 定义

$$\phi^\epsilon(x) = \sum_j \psi_j(x) \left(\frac{\epsilon}{1-\epsilon} + \sum_j \psi_j(x) \right)^{-1}.$$

证明处处有 $0 \leq \phi^\epsilon \leq 1$, 且在 $\bigcup_j \tilde{B}_j$ 上 $\phi^\epsilon \geq 1 - \epsilon$. 能否构造 $\phi \in \mathcal{D}(\bigcup_j B_j)$, 使处处有 $0 \leq \phi \leq 1$, 且在 $\bigcup_j \tilde{B}_j$ 上 $\phi = 1$? 若有限并改为无限并, 可以得到什么结论?

习题 1.x.42: 令

$$v_\beta(r, \theta) = r^\beta \sin(\beta\theta), \quad \Omega_\beta = \{(r, \theta) : r < 1, 0 < \theta < \pi/\beta\},$$

其中 $1/2 \leq \beta < \infty$. 作为 β 的函数, 确定使 $v_\beta \in W_p^k(\Omega_\beta)$ 的最优 k, p 值. $\beta = 1/2$ 的情形称为狭缝区域, $\beta = 2/3$ 的情形称为凹角. $\beta = 1$ 对应什么情形?

习题 1.x.43: 冰淇淋所用的有限圆锥 C 可以表示为集合 $t\xi + B_{\alpha t}$ 在 $0 < t < h$ 时的并, 其中 ξ 是圆锥轴, α 度量夹角, h 是高度, B_t 是半径为 t 的球. Lipschitz 区域 Ω 满足圆锥性质: 存在有限个有限圆锥 C_i , 使对所有 $x \in \Omega$, 都存在某个 i 使 $x + C_i \subset \Omega$. 对这样的区域, 证明光滑函数在 $W_p^k(\Omega)$ 中稠密. (提示: 定义 x 处的光滑化值时, 使用光滑化核在集合 $x + t\xi + B_{\alpha t}$ 上取平均, 即

$$v_t(x) := \int_{B_{\alpha t}} v(x + y + t\xi) \rho_t(y) dy.$$

证明 v_t 趋于 v 于 $W_p^k(\Omega)$.)

习题 1.x.44: Cantor 函数可以由连续分片线性函数的极限序列定义. 设 $0 < \epsilon < 1$, 从 $f_0(x) = x$ 开始. 接着令 $f_1(x)$ 在以 $x = 1/2$ 为中心、宽度为 ϵ 的区间内等于 $1/2$, 并在区间 $[0, 1]$ 的两端等于 f_0 . 已给定 f_i , 归纳定义 f_{i+1} . 在 f_i 不为常数的每个区间中, 像处理原区间一样划分: 令 f_{i+1} 在中心长度为 $2^{-i}\epsilon$ 的子区间上为常数, 其余部分用线性函数连接. 该常数取为中间值. 证明序列 f_i 在函数空间 Lip^α 中有界, 该空间中的函数对某个 $1 > \alpha > 0$ 满足一致估计

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha.$$

证明当 ϵ 趋于零时, 最优的 α 可以趋于 1.

2 椭圆边值问题的变分表述

本章讨论建立微分方程变分形式所需的泛函分析工具. 首先介绍 Hilbert 空间, 只包括后续发展所必需的材料. 本章的目标是提供一个框架, 以便建立变分问题解的存在性与唯一性.

2.1 内积空间

定义 2.1.1: 线性空间 V 上的双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 是映射 $b: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得映射 $v \mapsto b(v, w)$ 和 $w \mapsto b(v, w)$ 分别都是 V 上的线性形式. 若对所有 $v, w \in V$ 都有 $b(v, w) = b(w, v)$, 则称它是对称的. (实) 内积记作 $(\cdot, \cdot)$, 它是线性空间 V 上满足下列条件的对称双线性形式:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & (v, v) \geq 0 \quad \forall v \in V, \\ \text{(b)} \quad & (v, v) = 0 \iff v = 0. \end{aligned}$$

定义 2.1.2: 配备了内积的线性空间 V 称为内积空间, 记作 $(V, (\cdot, \cdot))$.

例 2.1.3: 以下是内积空间的例子:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & V = \mathbb{R}^n, \quad (x, y) := \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \text{(ii)} \quad & V = L^2(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} u(x)v(x) dx, \\ \text{(iii)} \quad & V = W_2^k(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_k := \sum_{|\alpha| \leq k} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

记号: 内积空间 (iii) 常记作 $H^k(\Omega)$. 因此, $H^k(\Omega) = W_2^k(\Omega)$.

定理 2.1.4 (Schwarz 不等式): 若 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 则

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{1/2} (v, v)^{1/2}. \quad (2.1.5)$$

等号成立当且仅当 u 与 v 线性相关.

证明: 对 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq (u - tv, u - tv) = (u, u) - 2t(u, v) + t^2(v, v). \quad (2.1.6)$$

若 $(v, v) = 0$, 则对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $(u, u) - 2t(u, v) \geq 0$, 这迫使 $(u, v) = 0$, 因而不等式平凡成立. 于是设 $(v, v) \neq 0$. 在该不等式中代入 $t = (u, v)/(v, v)$, 得

$$0 \leq (u, u) - \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)}, \quad (2.1.7)$$

这等价于 (2.1.5). 注意, 证明 (2.1.5) 时没有使用定义 2.1.1 的条件 (b).

若 u 与 v 线性相关, 容易看出 (2.1.5) 中等号成立.

反之, 设等号成立. 若 $v = 0$, 则 u 与 v 线性相关. 若 $v \neq 0$, 取 $\lambda = (u, v)/(v, v)$. 于是 $(u - \lambda v, u - \lambda v) = 0$, 由定义 2.1.1 的条件 (b) 得 $u - \lambda v = 0$, 即 u 与 v 线性相关.

注 2.1.8: Schwarz 不等式 (2.1.5) 的证明没有使用内积的条件 (b). 这可能有用的一个例子是 $H^1(\Omega)$ 上的

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

因此, 我们已经证明, 对所有 $u, v \in H^1(\Omega)$,

$$a(u, v)^2 \leq a(u, u)a(v, v),$$

尽管 $a(\cdot, \cdot)$ 不是 $H^1(\Omega)$ 上的内积.

命题 2.1.9: $\|v\| := \sqrt{(v, v)}$ 定义了内积空间 $(V, (\cdot, \cdot))$ 上的范数.

证明: 容易证明 $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$, $\|v\| \geq 0$, 且 $\|v\| = 0 \iff v = 0$. 只需证明三角不等式:

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= (u + v, u + v) \\ &= (u, u) + 2(u, v) + (v, v) \\ &= \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

因此, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

2.2 Hilbert 空间

命题 2.1.9 表明, 给定内积空间 $(V, (\cdot, \cdot))$, 在 V 上存在相应的范数 $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$. 因而内积空间可以成为赋范线性空间.

定义 2.2.1: 设 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间. 若相应的赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 完备, 则称 $(V, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间.

例 2.2.2: 例 2.1.3 的 (i)–(iii) 都是 Hilbert 空间. 特别地, $W_2^k(\Omega)$ 上与内积 $(\cdot, \cdot)_k$ 相应的范数, 与第 1 章中定义的范数 $\|\cdot\|_{W_2^k(\Omega)}$ 相同, 在那里已经证明了 $W_2^k(\Omega)$ 的完备性.

定义 2.2.3: 设 H 是 Hilbert 空间, $S \subset H$ 是 H 中闭的线性子集. (回顾, S 是线性的, 是指 $u, v \in S, \alpha \in \mathbb{R} \implies u + \alpha v \in S$.) 则称 S 为 H 的子空间.

命题 2.2.4: 若 S 是 H 的子空间, 则 $(S, (\cdot, \cdot))$ 也是 Hilbert 空间.

证明: 因为 S 在范数 $\|\cdot\|$ 下是 H 中的闭集, 所以 $(S, \|\cdot\|)$ 完备.

例 2.2.5: Hilbert 空间子空间的例子如下:

(i) H 和 $\{0\}$ 是显然的两个极端情形. 下面是更有意义的例子.

(ii) 设 $T: H \longrightarrow K$ 是从 H 到另一个线性空间的连续线性映射. 则 $\ker T$ 是子空间 (见习题 2.x.1).

(iii) 设 $x \in H$, 定义 $x^\perp := \{v \in H : (v, x) = 0\}$. 则 $x^\perp$ 是 H 的子空间. 为说明这一点, 注意 $x^\perp = \ker L_x$, 其中 L_x 是线性泛函

$$L_x : v \mapsto (v, x). \quad (2.2.6)$$

由 Schwarz 不等式 (2.1.5),

$$|L_x(v)| \leq \|x\| \|v\|,$$

这表明 L_x 有界, 因而连续. 结合前一个例子可知 $x^\perp$ 是 H 的子空间.

注: 下一节的总体目标是证明, 当 H 是 Hilbert 空间时, 所有 $L \in H'$ 都具有 L_x 的形式, 其中 $x \in H$.

(iv) 设 $M \subset H$ 是一个子集, 定义

$$M^\perp := \{v \in H : (x, v) = 0 \ \forall x \in M\}.$$

注意

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp,$$

并且每个 $x^\perp$ 都是 H 的 (闭) 子空间. 因此, $M^\perp$ 是 H 的子空间.

命题 2.2.7: 设 H 是 Hilbert 空间.

- (1) 对任意子集 $M, N \subset H$, $M \subset N \implies N^\perp \subset M^\perp$.
- (2) 对任意包含零元的 H 的子集 M , $M \cap M^\perp = \{0\}$.
- (3) $\{0\}^\perp = H$.
- (4) $H^\perp = \{0\}$.

证明: 证明 (2): 设 $x \in M \cap M^\perp$. 则

$$x \in M \implies M^\perp \subset x^\perp, \quad x \in M^\perp \implies x \in x^\perp \iff (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

证明 (4): 因为 $H^\perp \subset H$, 由 (2) 得

$$H^\perp = H \cap H^\perp = \{0\}.$$

(1) 和 (3) 留给读者在习题 2.x.3 中证明. ■

定理 2.2.8 (平行四边形法则): 设 $\|\cdot\|$ 是与 H 上的内积 $(\cdot, \cdot)$ 相应的范数. 则

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2). \quad (2.2.9)$$

证明: 直接计算即可, 见习题 2.x.4. ■

2.3 到子空间上的投影

下面的结果建立了 Hilbert 空间的一个基本几何事实.

命题 2.3.1: 设 M 是 Hilbert 空间 H 的子空间. 设 $v \in H \setminus M$, 并定义 $\delta := \inf\{\|v - w\| : w \in M\}$. (注意, 因为 M 在 H 中闭, 所以 $\delta > 0$.) 则存在 $w_0 \in M$ 使得:

- (i) $\|v - w_0\| = \delta$, 即 M 中存在离 v 最近的点 w_0 ;
- (ii) $v - w_0 \in M^\perp$.

证明: (i) 设 $\{w_n\}$ 是极小化序列:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v - w_n\| = \delta.$$

现在证明 $\{w_n\}$ 是 Cauchy 序列. 由平行四边形法则,

$$\|(w_n - v) + (w_m - v)\|^2 + \|(w_n - v) - (w_m - v)\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2),$$

即

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\|^2.$$

因为 $\frac{1}{2}(w_n + w_m) \in M$, 由 δ 的定义,

$$\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\| \geq \delta.$$

因此,

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 \leq 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2.$$

令 m, n 趋于无穷, 得

$$2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2 \longrightarrow 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

所以 $\|w_n - w_m\|^2 \rightarrow 0$, 从而 $\{w_n\}$ 是 Cauchy 序列. 因此存在 $w_0 \in \overline{M} = M$ 使 $w_n \rightarrow w_0$. 范数的连续性给出 $\|v - w_0\| = \delta$.

(ii) 令 $z = v - w_0$, 则 $\|z\| = \delta$. 证明 $z \perp M$. 设 $w \in M, t \in \mathbb{R}$. 因为 $w_0 + tw \in M$, 函数 $\|z - tw\|^2 = \|v - (w_0 + tw)\|^2$ 在 $t = 0$ 处取得绝对最小值. 因而

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \|z - tw\|^2 \right|_{t=0} = -2(z, w).$$

于是对所有 $w \in M$,

$$(v - w_0, w) = (z, w) = 0.$$

由于 $w \in M$ 任意, 可知 $v - w_0 \in M^\perp$. ■

命题 2.3.1 表明, 给定 H 的子空间 M 和 $v \in H$, 可写成 $v = w_0 + w_1$, 其中 $w_0 \in M$, $w_1 (= v - w_0) \in M^\perp$. 下面说明 $v \in H$ 的这种分解唯一. 事实上, 由

$$w_0 + w_1 = v = z_0 + z_1, \quad w_0, z_0 \in M, \quad w_1, z_1 \in M^\perp,$$

可得

$$M \ni w_0 - z_0 = -(w_1 - z_1) \in M^\perp.$$

因为 $M \cap M^\perp = \{0\}$, 所以 $w_0 = z_0, w_1 = z_1$. 这说明分解唯一. 因而可定义算子

$$P_M : H \longrightarrow M, \quad P_M^\perp : H \longrightarrow M^\perp, \quad (2.3.2)$$

其定义分别如下.

$$P_M v = \begin{cases} v, & v \in M, \\ w_0, & v \in H \setminus M, \end{cases} \quad (2.3.3)$$

$$P_M^\perp v = \begin{cases} 0, & v \in M, \\ v - w_0, & v \in H \setminus M. \end{cases} \quad (2.3.4)$$

分解的唯一性说明 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$ (见习题 2.x.5), 所以不必再仔细区分把 “ $\perp$ ” 放在何处. 对上述观察总结如下.

命题 2.3.5: 给定 H 的子空间 M 和 $v \in H$, 存在唯一分解

$$v = P_M v + P_{M^\perp} v, \quad (2.3.6)$$

其中 $P_M : H \longrightarrow M, P_{M^\perp} : H \longrightarrow M^\perp$. 换言之,

$$H = M \oplus M^\perp. \quad (2.3.7)$$

注 2.3.8: 上述定义的算子 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 是线性算子. 由命题 2.3.5,

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2),$$

其中

$$v_1 = P_M v_1 + P_{M^\perp} v_1, \quad v_2 = P_M v_2 + P_{M^\perp} v_2.$$

也就是说,

$$\begin{aligned} & P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \\ &= (\alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2) + (\alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2). \end{aligned}$$

由 $\alpha v_1 + \beta v_2$ 的分解唯一性以及 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 的定义,

$$P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2,$$

且

$$P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2.$$

即 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 是线性的.

定义 2.3.9: 线性空间 V 上的算子 P 若满足 $P^2 = P$, 即对 P 的像中的所有 z 都有 $Pz = z$, 则称 P 为投影.

注 2.3.10: 由定义可知 P_M 是投影. 由 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$ 也可知 $P_M^\perp$ 是投影.

2.4 Riesz 表示定理

给定 $u \in H$, 回顾可在 H 上定义连续线性泛函 L_u :

$$L_u(v) = (u, v). \quad (2.4.1)$$

下面的定理证明其逆命题也成立.

定理 2.4.2 (Riesz 表示定理): Hilbert 空间 H 上的任意连续线性泛函 L 都可唯一表示为

$$L(v) = (u, v) \quad (2.4.3)$$

的形式, 其中 $u \in H$. 此外,

$$\|L\|_{H'} = \|u\|_H. \quad (2.4.4)$$

证明: 唯一性来自内积的非退化性. 若 u_1, u_2 都是这样的解, 则

$$\begin{aligned} 0 &= L(u_1 - u_2) - L(u_1 - u_2) \\ &= (u_1, u_1 - u_2) - (u_2, u_1 - u_2) \\ &= (u_1 - u_2, u_1 - u_2), \end{aligned}$$

故 $u_1 = u_2$. 下面证明存在性.

定义 $M := \{v \in H : L(v) = 0\}$. 由例 2.2.5 的 (ii), M 是 H 的子空间. 因而由命题 2.3.5, $H = M \oplus M^\perp$.

情形 (1): $M^\perp = \{0\}$. 此时 $M = H$, 从而 $L \equiv 0$. 取 $u = 0$.

情形 (2): $M^\perp \neq \{0\}$. 取 $z \in M^\perp, z \neq 0$. 则 $L(z) \neq 0$ (否则 $z \in M$, 于是 $z \in M^\perp \cap M = \{0\}$). 对 $v \in H$, 令 $\beta = L(v)/L(z)$, 则

$$L(v - \beta z) = L(v) - \beta L(z) = 0, \quad \text{即} \quad v - \beta z \in M.$$

因此, $v - \beta z = P_M v$, $\beta z = P_{M^\perp} v$. 特别地, 若 $v \in M^\perp$, 则 $v = \beta z$ (即 $v - \beta z = 0$), 这证明 $M^\perp$ 是一维的. 现在取

$$u := \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} z. \quad (2.4.5)$$

注意 $u \in M^\perp$. 有

$$\begin{aligned} (u, v) &= (u, (v - \beta z) + \beta z) \\ &= (u, v - \beta z) + (u, \beta z) \\ &= (u, \beta z) & (u \in M^\perp, v - \beta z \in M) \\ &= \beta \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} (z, z) & (\text{由 } u \text{ 的定义}) \\ &= \beta L(z) \\ &= L(v) & (\text{由 } \beta \text{ 的定义}). \end{aligned}$$

因此, $u := L(z)z/\|z\|_H^2$ 是所需的 H 中元素.

还需证明 $\|L\|_{H'} = \|u\|_H$. 先由 (2.4.5) 注意到

$$\|u\|_H = \frac{|L(z)|}{\|z\|_H}.$$

根据对偶范数的定义 (1.7.2),

$$\begin{aligned} \|L\|_{H'} &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|L(v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (1.7.2)}) \\ &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|(u, v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (2.4.3)}) \\ &\leq \|u\|_H \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= \frac{|L(z)|}{\|z\|_H} \quad (\text{由 (2.4.5)}) \\ &\leq \|L\|_{H'} \quad (\text{由 (1.7.2)}). \end{aligned}$$

因此, $\|u\|_H = \|L\|_{H'}$. ■

注 2.4.6: 由 Riesz 表示定理, H 与 H' 之间存在自然等距同构 ($u \in H \longleftrightarrow L_u \in H'$). 因此, H 与 H' 常被等同. 例如, 可以写作 $W_2^m(\Omega) \cong W_2^{-m}(\Omega)$ (尽管它们是完全不同的 Hilbert 空间). 我们用 τ 表示从 H' 到 H 的等距同构.

2.5 对称变分问题的表述

本章其余部分旨在应用前几节建立的抽象 Hilbert 空间理论, 得到边值问题变分形式的存在性与唯一性结果.

例 2.5.1: 回顾例 2.1.3 的 (iii) 和例 2.2.2, $H^1(0, 1) = W_2^1(0, 1)$ 在内积

$$(u, v)_{H^1} = \int_0^1 uv \, dx + \int_0^1 u'v' \, dx$$

下是 Hilbert 空间. 在第 0 章中, 我们定义了 $V = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = 0\}$. 为说明 V 是 $H^1(0, 1)$ 的子空间, 定义 $\delta_0 : H^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_0(v) = v(0)$. 由 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6), δ_0 是 H^1 上有界的线性泛函, 所以它连续. 因而 $V = \delta_0^{-1}\{0\}$ 在 H^1 中闭. 我们还定义了 $a(v, w) = \int_0^1 v'w' \, dx$. 注意, $a(\cdot, \cdot)$ 是 $H^1(0, 1)$ 上的对称双线性形式, 但不是 H^1 上的内积, 因为 $a(1, 1) = 0$. 不过, 它在 V 上确实满足强制性 (1.5.1). 根据下面的结果, 第 0 章中的变分问题自然地表示在 Hilbert 空间框架中.

定义 2.5.2: 赋范线性空间 H 上的双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 若存在 $C < \infty$ 使

$$|a(v, w)| \leq C\|v\|_H\|w\|_H \quad \forall v, w \in H,$$

则称它是有界的 (或连续的). 若存在 $\alpha > 0$ 使

$$a(v, v) \geq \alpha\|v\|_H^2 \quad \forall v \in V,$$

则称它在 $V \subset H$ 上是强制的.

命题 2.5.3: 设 H 是 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是在 H 上连续并在 H 的子空间 V 上强制的对称双线性形式. 则 $(V, a(\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间.

证明: 由 $a(\cdot, \cdot)$ 的强制性立即可知, 若 $v \in V$ 且 $a(v, v) = 0$, 则 $v \equiv 0$. 因而 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积.

令 $\|v\|_E = \sqrt{a(v, v)}$, 并设 $\{v_n\}$ 是 $(V, \|\cdot\|_E)$ 中的 Cauchy 序列. 由强制性, $\{v_n\}$ 也是 $(H, \|\cdot\|_H)$ 中的 Cauchy 序列. 因为 H 完备, 存在 $v \in H$ 使 $v_n \rightarrow v$ 于 $\|\cdot\|_H$ 范数. 由于 V 在 H 中闭, $v \in V$. 又因 $a(\cdot, \cdot)$ 有界, $\|v - v_n\|_E \leq \sqrt{c_1} \|v - v_n\|_H$. 因而 $v_n \rightarrow v$ 于 $\|\cdot\|_E$ 范数, 所以 $(V, \|\cdot\|_E)$ 完备. ■

一般地, 对称变分问题如下提出. 假设下列三个条件成立:

$$\begin{cases} (1) & (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) & V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) & a(\cdot, \cdot) \text{ 是有界的对称双线性形式, 且在 } V \text{ 上强制.} \end{cases} \quad (2.5.4)$$

于是对称变分问题如下.

给定 $F \in V'$, 求 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.5.5)$$

定理 2.5.6: 假设 (2.5.4) 的条件 (1)–(3) 成立. 则存在唯一的 $u \in V$ 解 (2.5.5).

证明: 命题 2.5.3 表明 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 且 $(V, a(\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间. 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

(Ritz–Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间 $V_h \subset V$ 和 $F \in V'$, 求 $u_h \in V_h$ 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.5.7)$$

定理 2.5.8: 在条件 (2.5.4) 下, 存在唯一的 u_h 解 (2.5.7).

证明: $(V_h, a(\cdot, \cdot))$ 本身是 Hilbert 空间, 且 $F|_{V_h} \in V_h'$. 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

$u - u_h$ 的误差估计来自下述关系.

命题 2.5.9 (Galerkin 基本正交性): 设 u 和 u_h 分别为 (2.5.5) 和 (2.5.7) 的解. 则

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h.$$

证明: 将两个方程

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h$$

相减即可.

推论 2.5.10:

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

证明: 与定理 0.3.3 的证明相同.

注 2.5.11 (Ritz 方法): 在对称情形, u_h 在所有 $v \in V_h$ 上极小化二次泛函

$$Q(v) = a(v, v) - 2F(v)$$

(见习题 2.x.6). 注意, 推论 2.5.10 和本注只在对称情形成立.

2.6 非对称变分问题的表述

非对称变分问题如下提出. 假设下列五个条件成立:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \quad (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) \quad V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 是 } V \text{ 上的双线性形式, 不一定对称;} \\ (4) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上连续 (有界);} \\ (5) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上强制.} \end{array} \right. \quad (2.6.1)$$

于是非对称变分问题如下:

$$\text{给定 } F \in V', \text{ 求 } u \in V \text{ 使 } a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.6.2)$$

(Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间 $V_h \subset V$ 和 $F \in V'$, 求 $u_h \in V_h$ 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.6.3)$$

随之产生以下问题:

1. 是否存在唯一解 u, u_h ?
2. $u - u_h$ 的误差估计是什么?
3. 是否有有意义的例子?

一个有意义的例子. 考虑边值问题

$$-u'' + u' + u = f \quad \text{于 } [0, 1], \quad u'(0) = u'(1) = 0. \quad (2.6.4)$$

它的一种变分表述为: 取

$$V = H^1(0, 1),$$

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad (2.6.5)$$

$$F(v) = (f, v),$$

并求解变分方程 (2.6.2). 注意, 由于 $u'v$ 项的存在, $a(\cdot, \cdot)$ 不对称.

为证明 $a(\cdot, \cdot)$ 连续, 注意

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq |(u, v)_{H^1}| + \left| \int_0^1 u'v dx \right| \\ &\leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} + \|u'\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &\leq 2\|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}. \end{aligned}$$

因此, $a(\cdot, \cdot)$ 连续 (在定义中取 $c_1 = 2$).

为证明 $a(\cdot, \cdot)$ 强制, 注意

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_0^1 ((v')^2 + v'v + v^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (v' + v)^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx \\ &\geq \frac{1}{2} \|v\|_{H^1}^2. \end{aligned}$$

因此, $a(\cdot, \cdot)$ 强制 (在定义中取 $c_2 = 1/2$).

若把上述微分方程改为

$$-u'' + ku' + u = f, \quad (2.6.6)$$

则相应的 $a(\cdot, \cdot)$ 对较大的 k 未必强制.

注 2.6.7: 若 $(H, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间, V 是 H 的子空间, 且 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 则当 $a(\cdot, \cdot)$ 不强制时, $(V, a(\cdot, \cdot))$ 未必完备. 例如, 令 $H = H^1(0, 1)$, $V = H$, $a(v, w) = \int_0^1 vw dx = (v, w)_{L^2(0, 1)}$. 则 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 但 L^2 范数中的收敛不蕴含 H^1 范数中的收敛, 因为 $H^1(0, 1)$ 在 $L^2(0, 1)$ 中稠密.

2.7 Lax–Milgram 定理

我们要证明 (非对称) 变分问题解的存在性与唯一性: 求 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad (2.7.1)$$

其中 V 是 Hilbert 空间, $F \in V'$, $a(\cdot, \cdot)$ 是不一定对称的连续强制双线性形式. Lax–Milgram 定理保证 (2.7.1) 的解存在且唯一. 首先证明以下引理.

引理 2.7.2 (压缩映射原理): 给定 Banach 空间 V 和映射 $T: V \rightarrow V$, 若对所有 $v_1, v_2 \in V$ 及某个固定的 $M, 0 \leq M < 1$, 有

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|, \quad (2.7.3)$$

则存在唯一的 $u \in V$ 使

$$u = Tu, \quad (2.7.4)$$

即压缩映射 T 有唯一不动点 u .

注 2.7.5: 在引理 2.7.2 中, 实际只需 V 是完备度量空间.

证明: 先证明唯一性. 设 $Tv_1 = v_1, Tv_2 = v_2$. 因为 T 是压缩映射, 对某个 $0 \leq M < 1$,

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

但 $\|Tv_1 - Tv_2\| = \|v_1 - v_2\|$. 因而

$$\|v_1 - v_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

这说明 $\|v_1 - v_2\| = 0$ (否则将有 $1 \leq M$). 所以 $v_1 = v_2$, 即不动点唯一.

下面证明存在性. 取 $v_0 \in V$ 并定义

$$v_1 = Tv_0, \quad v_2 = Tv_1, \quad \dots, \quad v_{k+1} = Tv_k, \quad \dots$$

注意 $\|v_{k+1} - v_k\| = \|Tv_k - Tv_{k-1}\| \leq M\|v_k - v_{k-1}\|$. 归纳可得

$$\|v_k - v_{k-1}\| \leq M^{k-1}\|v_1 - v_0\|.$$

因此, 对任意 $N > n$,

$$\begin{aligned} \|v_N - v_n\| &= \left\| \sum_{k=n+1}^N (v_k - v_{k-1}) \right\| \\ &\leq \|v_1 - v_0\| \sum_{k=n+1}^N M^{k-1} \\ &\leq \frac{M^n}{1-M} \|v_1 - v_0\| \\ &= \frac{M^n}{1-M} \|Tv_0 - v_0\|, \end{aligned} \tag{2.7.6}$$

这说明 $\{v_n\}$ 是 Cauchy 序列. 因为 V 完备, $\{v_n\}$ 收敛. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n =: v$, 则

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n = T \left(\lim_{n \rightarrow \infty} v_n \right) = Tv,$$

其中使用了 T 的连续性. 换言之, 不动点存在. ■

定理 2.7.7 (Lax–Milgram): 给定 Hilbert 空间 $(V, (\cdot, \cdot))$, 连续强制双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和连续线性泛函 $F \in V'$, 存在唯一的 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \tag{2.7.8}$$

证明: 对任意 $u \in V$, 定义泛函 Au : 对所有 $v \in V$, $Au(v) = a(u, v)$. Au 是线性的, 因为

$$\begin{aligned} Au(\alpha v_1 + \beta v_2) &= a(u, \alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha a(u, v_1) + \beta a(u, v_2) \\ &= \alpha Au(v_1) + \beta Au(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Au 也是连续的, 因为对所有 $v \in V$,

$$|Au(v)| = |a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|,$$

其中 C 是 $a(\cdot, \cdot)$ 连续性定义中的常数. 因此,

$$\|Au\|_{V'} = \sup_{v \neq 0} \frac{|Au(v)|}{\|v\|} \leq C\|u\| < \infty.$$

所以 $Au \in V'$. 类似地 (见习题 2.x.8), 可以证明映射 $u \mapsto Au$ 是从 V 到 V' 的线性映射. 这里还证明了线性映射 $A: V \rightarrow V'$ 连续, 且 $\|A\|_{\mathcal{L}(V, V')} \leq C$.

由 Riesz 表示定理 2.4.2, 对任意 $\phi \in V'$, 存在唯一的 $\tau\phi \in V$, 使得对任意 $v \in V$ 都有 $\phi(v) = (\tau\phi, v)$ (见注 2.4.6). 我们必须求唯一的 u 使

$$Au(v) = F(v) \quad \forall v \in V.$$

换言之, 要求唯一的 u 使

$$Au = F \quad \text{于 } V',$$

或

$$\tau Au = \tau F \quad \text{于 } V,$$

因为 $\tau: V' \rightarrow V$ 是一一映射. 我们利用引理 2.7.2 求解最后一个方程. 要找 $\rho \neq 0$ 使映射 $T: V \rightarrow V$ 是压缩映射, 其中

$$Tv := v - \rho(\tau Av - \tau F) \quad \forall v \in V. \quad (2.7.9)$$

若 T 是压缩映射, 则由引理 2.7.2, 存在唯一的 $u \in V$ 使

$$Tu = u - \rho(\tau Au - \tau F) = u, \quad (2.7.10)$$

即 $\rho(\tau Au - \tau F) = 0$, 或 $\tau Au = \tau F$.

还需证明这样的 $\rho \neq 0$ 存在. 对任意 $v_1, v_2 \in V$, 令 $v = v_1 - v_2$. 则

$$\begin{aligned} \|Tv_1 - Tv_2\|^2 &= \|(v_1 - v_2) - \rho(\tau Av_1 - \tau Av_2)\|^2 \\ &= \|v - \rho(\tau Av)\|^2 \quad (\tau, A \text{ 线性}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho(\tau Av, v) + \rho^2\|\tau Av\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\rho Av(v) + \rho^2 Av(\tau Av) \quad (\text{由 } \tau \text{ 的定义}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho a(v, v) + \rho^2 a(v, \tau Av) \quad (\text{由 } A \text{ 的定义}) \\ &\leq \|v\|^2 - 2\rho\alpha\|v\|^2 + \rho^2 C\|v\|\|\tau Av\| \quad (a \text{ 的强制性与连续性}) \\ &\leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v\|^2 \quad (A \text{ 有界且 } \tau \text{ 等距}) \\ &= (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v_1 - v_2\|^2 \\ &= M^2\|v_1 - v_2\|^2. \end{aligned}$$

这里 α 是 $a(\cdot, \cdot)$ 强制性定义中的常数. 最后一个不等式还使用了 $\|\tau Av\| = \|Av\| \leq C\|v\|$. 因而需要某个 ρ 满足

$$1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2 < 1, \quad \text{即} \quad \rho(\rho C^2 - 2\alpha) < 0.$$

若取 $\rho \in (0, 2\alpha/C^2)$, 则 $M < 1$, 证明完成. ■

注 2.7.11: 注意 $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|F\|_{V'}$, 其中 α 是强制性常数 (见习题 2.x.9).

推论 2.7.12: 在条件 (2.6.1) 下, 变分问题 (2.6.2) 有唯一解.

证明: (2.6.1) 的条件 (1) 和 (2) 表明 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间. 应用 Lax–Milgram 定理 2.7.7. ■

推论 2.7.13: 在条件 (2.6.1) 下, 逼近问题 (2.6.3) 有唯一解.

证明: 因为 V_h 是 V 的 (闭) 子空间, 所以把 V 换成 V_h 后 (2.6.1) 仍成立. 应用推论 2.7.12. ■

注 2.7.14: 要使 (2.6.3) 适定, V_h 不必是有限维的.

2.8 一般有限元逼近的估计

设 u 是变分问题 (2.6.2) 的解, u_h 是逼近问题 (2.6.3) 的解. 现在估计误差 $\|u - u_h\|_V$. 这由下面的定理完成.

定理 2.8.1 (Céa): 设条件 (2.6.1) 成立, 且 u 解 (2.6.2). 对有限元变分问题 (2.6.3), 有

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \quad (2.8.2)$$

其中 C 是连续性常数, α 是 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上的强制性常数.

证明: 因为对所有 $v \in V$ 有 $a(u, v) = F(v)$, 对所有 $v \in V_h$ 有 $a(u_h, v) = F(v)$, 相减得

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.3)$$

对任意 $v \in V_h$,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) && \text{(由强制性)} \\ &= a(u - u_h, u - v) + a(u - u_h, v - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v) && \text{(因为 } v - u_h \in V_h) \\ &\leq C \|u - u_h\|_V \|u - v\|_V && \text{(由连续性).} \end{aligned}$$

因此,

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \|u - v\|_V \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.4)$$

从而

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &= \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \quad \text{(因为 } V_h \text{ 闭).} \end{aligned}$$
■

注 2.8.5:

1. Céa 定理表明 u_h 是拟最优的, 即误差 $\|u - u_h\|_V$ 与使用子空间 V_h 所能达到的最佳误差成比例.
2. 在对称情形, 我们已证明

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

因此,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \|u - u_h\|_E \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E \\ &\leq \sqrt{\frac{C}{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &\leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \end{aligned}$$

即 Céa 定理的结果. 这实际上说明了两种表述之间的关系: 一种可以由另一种推出.

2.9 高维例子

下面说明前几节建立的理论如何应用于若干多维问题. 考虑变分形式

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (A(x) \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) + (B(x) \cdot \nabla u(x))v(x) + C(x)u(x)v(x)) dx,$$

其中 A, B, C 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上有界可测的函数. 当然, B 是向量值函数. 形式上, 该变分形式对应微分算子

$$-\nabla \cdot (A(x) \nabla u(x)) + B(x) \cdot \nabla u(x) + C(x)u(x),$$

但即使该微分算子在传统意义下没有意义, 变分形式仍有良好定义. Hölder 不等式表明 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $H^1(\Omega)$ 上连续, 定义 2.5.2 中的常数 c_1 仅依赖于系数的 $L^\infty(\Omega)$ 范数. 然而, 验证强制性较为复杂.

先考虑对称情形 $B \equiv 0$. 再假设存在常数 $\gamma > 0$ 使

$$A(x) \geq \gamma \quad \& \quad C(x) \geq \gamma \quad \text{对几乎处处的 } x \in \Omega. \quad (2.9.1)$$

则 $a(\cdot, \cdot)$ 在整个 $H^1(\Omega)$ 上强制, 定义 2.5.2 中的常数 c_2 等于 γ . 因而有下述结果.

定理 2.9.2: 若 $B \equiv 0$ 且 (2.9.1) 成立, 则取上述 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $V = H^1(\Omega)$ 时, (2.5.5) 有唯一解 u . 此外, 对任意 $V_h \subset H^1(\Omega)$, (2.5.7) 有唯一解 u_h , 且推论 2.5.10 的估计对 $u - u_h$ 成立.

注意, 我们甚至没有假设系数 A 和 C 连续. 事实上, 不连续系数出现在许多重要的物理模型中. 在某种程度上, 条件 (2.9.1) 中 C 的正性是必要的, 因为若 $C \equiv 0$, 则对任意常值函数 v 都有 $a(v, v) = 0$.

现在考虑 B 非零的一般情形. 由 Hölder 不等式和算术-几何平均不等式 (0.9.5),

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} (B(x) \cdot \nabla u(x))u(x) dx \right| &\leq \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{2} \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

若 (2.9.1) 成立, 并且还有

$$\|B\|_{L^\infty(\Omega)} < 2\gamma, \quad (2.9.3)$$

则 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $H^1(\Omega)$ 上强制, 并有下列结论.

定理 2.9.4: 若 (2.9.1) 和 (2.9.3) 成立, 则取上述 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $V = H^1(\Omega)$ 时, (2.6.2) 有唯一解 u . 此外, 对任意 $V_h \subset H^1(\Omega)$, (2.6.3) 有唯一解 u_h , 且估计 (2.8.2) 对 $u - u_h$ 成立.

这里给出的强制性条件略显严格, 但在 Neumann 边界条件的情形是合适的. 第 5 章将讨论更复杂的变分问题. 特别地, 将证明在 Dirichlet 边界条件下, 为保证强制性只需要更弱的条件.

习题

习题 2.x.1: 证明例 2.2.5 的 (ii).

习题 2.x.2: 若 M 是子空间, 证明 $(M^\perp)^\perp = M$.

习题 2.x.3: 证明命题 2.2.7 的 (1) 和 (3).

习题 2.x.4: 证明平行四边形法则, 即定理 2.2.8.

习题 2.x.5: 设 $P_M^\perp$ 是 (2.3.4) 中定义的算子. 证明 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$.

习题 2.x.6: 证明注 2.5.11 中的断言.

习题 2.x.7: 证明压缩映射总是连续的 (参见引理 2.7.2).

习题 2.x.8: 证明 Lax–Milgram 定理 2.7.7 的证明中的映射 $u \mapsto Au$ 是线性映射 $V \rightarrow V'$.

习题 2.x.9: 证明 Lax–Milgram 定理保证的解 u 满足

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V'}$$

(参见注 2.7.11).

习题 2.x.10: 对微分方程 $-u'' + ku' + u = f$, 求一个 k 值, 使某个 $v \in H^1(0, 1)$ 满足 $a(v, v) = 0$ 但 $v \neq 0$ (参见 (2.6.6)).

习题 2.x.11: 设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 Hilbert 空间 V 的内积. 对 $F \in V'$ 和 V 的任意 (闭) 子空间 U , 证明下述两个命题等价:

(a) $u \in U$ 满足 $a(u, v) = F(v)$, $\forall v \in U$;

(b) u 在 $v \in U$ 上极小化 $\frac{1}{2}a(v, v) - F(v)$.

即证明一个命题中的存在性蕴含另一个命题中的存在性. (提示: 展开 $a(u + \epsilon v, u + \epsilon v) = \dots$)

习题 2.x.12: 设

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad V = \{v \in W_2^1(0, 1) : v(0) = v(1) = 0\}.$$

证明对所有 $v \in V$,

$$a(v, v) = \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx.$$

(提示: 写成 $vv' = \frac{1}{2}(v^2)'$.)

习题 2.x.13: 设 $a(\cdot, \cdot)$, V , U 如习题 2.x.11. 对 $g \in V$, 定义 $U_g = \{v + g : v \in U\}$ (注意 $U_0 = U$). 对任意 $g \in V$, 证明下述命题等价:

(a) $u \in U_g$ 满足 $a(u, v) = 0, \forall v \in U_0$;

(b) u 在所有 $v \in U_g$ 上极小化 $a(v, v)$.

习题 2.x.14: 证明 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密. (提示: 使用习题 1.x.39 证明 $\mathcal{D}(\Omega)^\perp = \{0\}$.)

习题 2.x.15: 设 H 是 Hilbert 空间, $v \in H$ 任意. 证明

$$\|v\|_H = \sup_{0 \neq w \in H} \frac{(v, w)_H}{\|w\|_H}.$$

(提示: 应用 Schwarz 不等式 (2.1.5), 并考虑 $w = v$.)

3 有限元空间的构造

为了逼近第 0 章建立的变分问题

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V$$

的解, 需要以系统且实用的方式构造有限维子空间 $S \subset V$.

考察第 0.4 节定义的空间 S . 为了充分理解空间 S 中的函数, 需要回答以下问题:

1. 函数在给定子区间上是什么形状?
2. 如何确定函数在给定子区间上的值?
3. 函数在两个相邻区间上的限制如何在公共边界处衔接?

本章将定义与 S 类似、但定义在更一般区域上的分片函数空间, 并发展有助于回答这些问题的概念.

3.1 有限元

我们采用 Ciarlet 对有限元的定义 (Ciarlet 1978).

定义 3.1.1: 设:

- (i) $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是内部非空且具有分片光滑边界的有界闭集 (单元区域);
- (ii) $\mathcal{P}$ 是 K 上函数的有限维空间 (形函数空间);
- (iii) $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, \dots, N_k\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基 (节点变量集合).

则称 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元.

这里隐含假设节点变量 N_i 属于某个更大函数空间的对偶空间, 例如某个 Sobolev 空间的对偶空间.

定义 3.1.2: 设 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元. 与 $\mathcal{N}$ 对偶的 $\mathcal{P}$ 的基 $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_k\}$ (即 $N_i(\phi_j) = \delta_{ij}$) 称为 $\mathcal{P}$ 的节点基.

例 3.1.3 (一维 Lagrange 单元): 令 $K = [0, 1]$, $\mathcal{P}$ 为线性多项式集合, $\mathcal{N} = \{N_1, N_2\}$, 其中对所有 $v \in \mathcal{P}$, $N_1(v) = v(0)$, $N_2(v) = v(1)$. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 其节点基由 $\phi_1(x) = 1 - x$ 和 $\phi_2(x) = x$ 构成.

更一般地, 可令 $K = [a, b]$, $\mathcal{P}_k$ 为所有次数不超过 k 的多项式的集合, 并令

$$\mathcal{N}_k = \{N_0, N_1, N_2, \dots, N_k\}.$$

其中对 $v \in \mathcal{P}_k$ 和 $i = 0, 1, \dots, k$,

$$N_i(v) = v \left(a + \frac{(b-a)i}{k} \right).$$

则 $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$ 是有限元. 这一点可由引理 3.1.4 验证.

通常, 定义 3.1.1 的条件 (iii) 是唯一需要较多工作的条件, 下面的结果可简化其验证.

引理 3.1.4: 设 $\mathcal{P}$ 是 d 维向量空间, $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$ 是对偶空间 $\mathcal{P}'$ 的子集. 则下列两个命题等价:

- (a) $\{N_1, N_2, \dots, N_d\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基;
- (b) 若 $v \in \mathcal{P}$ 且 $N_i(v) = 0, i = 1, 2, \dots, d$, 则 $v \equiv 0$.

证明: 设 $\{\phi_1, \dots, \phi_d\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的某组基. $\{N_1, \dots, N_d\}$ 是 $\mathcal{P}'$ 的一组基, 当且仅当对 $\mathcal{P}'$ 中任意给定的 L 都有

$$L = \alpha_1 N_1 + \dots + \alpha_d N_d \quad (3.1.5)$$

(因为 $d = \dim \mathcal{P} = \dim \mathcal{P}'$). 方程 (3.1.5) 等价于

$$y_i := L(\phi_i) = \alpha_1 N_1(\phi_i) + \dots + \alpha_d N_d(\phi_i), \quad i = 1, \dots, d.$$

令 $B = (N_j(\phi_i)), i, j = 1, \dots, d$. 因而 (a) 等价于 $B\alpha = y$ 总可解, 即 B 可逆.

对任意 $v \in \mathcal{P}$, 可写成 $v = \beta_1 \phi_1 + \dots + \beta_d \phi_d$. $N_i(v) = 0$ 意味着 $\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0$. 因而 (b) 等价于

$$\beta_1 N_i(\phi_1) + \dots + \beta_d N_i(\phi_d) = 0, \quad i = 1, \dots, d \quad \Big\} \implies \beta_1 = \dots = \beta_d = 0. \quad (3.1.6)$$

令 $C = (N_i(\phi_j)), i, j = 1, \dots, d$. 则 (b) 等价于 $Cx = 0$ 只有平凡解, 即 C 可逆. 但 $C = B^T$. 因此 (a) 与 (b) 等价. ■

注 3.1.7: 定义 3.1.1 的条件 (iii) 就是引理 3.1.4 的 (a), 可通过检验该引理的 (b) 来验证. 例如, 在例 3.1.3 中, $v \in \mathcal{P}$ 意味着 $v = a + bx$; $N_1(v) = N_2(v) = 0$ 意味着 $a = 0$ 且 $a + b = 0$. 因而 $a = b = 0$, 即 $v \equiv 0$. 更一般地, 若 $v \in \mathcal{P}_k$ 且对 $i = 0, 1, \dots, k$ 有

$$0 = N_i(v) = v \left(a + \frac{(b-a)i}{k} \right),$$

则由代数基本定理, v 恒为零. 因而 $(K, \mathcal{P}_k, \mathcal{N}_k)$ 是有限元.

下面的术语将在后续各节中使用.

定义 3.1.8: 若 $\psi \in \mathcal{P}$ 且对所有 $N \in \mathcal{N}$ 都有 $N(\psi) = 0$ 蕴含 $\psi = 0$, 则称 $\mathcal{N}$ 确定 $\mathcal{P}$.

注 3.1.9: 若 L 是非退化线性函数, 我们常把超平面 $\{x : L(x) = 0\}$ 简称为 L .

引理 3.1.10: 设次数 $d \geq 1$ 的多项式 P 在超平面 L 上为零. 则可写成 $P = LQ$, 其中 Q 是次数为 $d-1$ 的多项式.

证明: 作仿射坐标变换, 使 $L(\hat{x}, x_n) = x_n$, 且超平面 $L(\hat{x}, x_n) = 0$ 为 $\hat{x}$ 轴. 因而 $P(\hat{x}, 0) \equiv 0$. 由于 $\deg P = d$,

$$P(\hat{x}, x_n) = \sum_{j=0}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{ij} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j,$$

其中 $\hat{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}), \hat{i} = (i_1, \dots, i_{n-1})$. 令 $x_n = 0$, 得

$$0 \equiv P(\hat{x}, 0) = \sum_{|\hat{i}| \leq d} c_{i0} \hat{x}^{\hat{i}},$$

从而对 $|\hat{i}| \leq d$ 有 $c_{\hat{i}0} = 0$. 因此,

$$\begin{aligned} P(\hat{x}, x_n) &= \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^j \\ &= x_n \sum_{j=1}^d \sum_{|\hat{i}| \leq d-j} c_{\hat{i}j} \hat{x}^{\hat{i}} x_n^{j-1} \\ &= x_n Q = LQ, \end{aligned}$$

其中 $\deg Q = d - 1$. ■

3.2 三角形有限元

设 K 是任意三角形. 记 $\mathcal{P}_k$ 为二元次数不超过 k 的所有多项式的集合. 表 3.2 给出 $\mathcal{P}_k$ 的维数.

表 3.2: 二维情形 $\mathcal{P}_k$ 的维数

k	$\dim \mathcal{P}_k$
1	3
2	6
3	10
$\vdots$	$\vdots$
k	$\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$

Lagrange 单元

例 3.2.1 ($k = 1$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N}_1 = \{N_1, N_2, N_3\}$, 其中 $N_i(v) = v(z_i)$, z_1, z_2, z_3 是 K 的顶点. 该单元见图 3.2. 图中的实心点表示在该点取值的节点变量. 令 L_1, L_2, L_3 是定义三角形三




图 3.2: 线性 Lagrange 三角形

条边所在直线的非平凡线性函数. 若 $P \in \mathcal{P}_1$ 在 z_1, z_2, z_3 处为零, 则 $P|_{L_1}$ 是有两个零点的一元线性函数, 因而 $P = 0$ 于 L_1 . 由引理 3.1.10, $P = cL_1$. 但

$$0 = P(z_1) = cL_1(z_1) \implies c = 0,$$

因为 $L_1(z_1) \neq 0$. 故 $P \equiv 0$, 从而 $\mathcal{N}_1$ 确定 $\mathcal{P}_1$.

注 3.2.2: 上述 $\mathcal{N}$ 的选择并不唯一. 例如, 可令 $N_i(v)$ 为 v 在第 i 条边中点的值. 所得 Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形见图 3.3. 连接三个中点后得到一个三角形, $P \in \mathcal{P}_1$ 在其顶点处为零; 与例 3.2.1 相同的论证表明 $P \equiv 0$.




图 3.3: Crouzeix–Raviart 非协调线性三角形

例 3.2.3 ($k = 2$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$, $\mathcal{N}_2 = \{N_1, \dots, N_6\}$, 其中

$$N_i(v) = \begin{cases} v(\text{第 } i \text{ 个顶点}), & i = 1, 2, 3, \\ v(\text{第 } i - 3 \text{ 条边的中点或该边上任一点}), & i = 4, 5, 6. \end{cases}$$

该单元见图 3.4. 设 $P \in \mathcal{P}_2$ 在 $z_1, \dots, z_6$ 处为零. 因为 $P|_{L_1}$ 是在三个点为零的一元二次多项




图 3.4: 二次 Lagrange 三角形

式, 故 $P = 0$ 于 L_1 , 从而 $P = L_1 Q_1$, $\deg Q_1 = 1$. 又因 $P = 0$ 于 L_2 , 且 L_1 在非退化三角形的 L_2 上至多一个点为零, 连续性给出 $Q_1 = 0$ 于 L_2 . 再用引理 3.1.10, 可写 $Q_1 = L_2 Q_2$, 其中 $Q_2 = c$ 为常数. 因此 $P = c L_1 L_2$. 由内部节点 z_6 ,

$$0 = P(z_6) = c L_1(z_6) L_2(z_6) \implies c = 0.$$

故 $P \equiv 0$.

例 3.2.4 ($k = 3$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$, $\mathcal{N}_3 = \{N_i : i = 1, \dots, 10\}$, 其中 $N_i(v) = v(z_i)$, $i = 1, \dots, 9$, 这些点按图 3.5 分布在边上; $N_{10}(v)$ 为 v 在任一内部点的值. 若 $P \in \mathcal{P}_3$ 在全部十个节点处为




图 3.5: 三次 Lagrange 三角形

零, 则对三个边依次使用引理 3.1.10, 得 $P = cL_1L_2L_3$. 于是

$$0 = P(z_{10}) = cL_1(z_{10})L_2(z_{10})L_3(z_{10}) \implies c = 0,$$

因为 $L_i(z_{10}) \neq 0, i = 1, 2, 3$. 故 $P \equiv 0$.

一般地, 对 $k \geq 1$ 取 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_k$. 对于 $\mathcal{N}_k = \{N_i : i = 1, 2, \dots, \frac{1}{2}(k+1)(k+2)\}$, 选取求值点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 3(k-1) \text{ 个互异的边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点.} \end{cases} \quad (3.2.5)$$

内部点通过归纳选取, 使其确定 $\mathcal{P}_{k-3}$. 节点总数为

$$3 + 3(k-1) + \frac{1}{2}(k-2)(k-1) = \frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k.$$

$k = 4$ 与 $k = 5$ 的求值点见图 3.6. 若 $P \in \mathcal{P}_k$ 在所有节点处为零, 则边节点与顶点节点给出 $P = QL_1L_2L_3$, $\deg Q \leq k-3$. 因三个 L_i 在内部点均不为零, Q 在全部内部点为零. 这些点正是为确定 $Q \equiv 0$ 而选取的.




图 3.6: 四次与五次 Lagrange 三角形

Hermite 单元

例 3.2.6 ($k = 3$, 三次 Hermite): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.7 中实心点表示在该点求值, 圆圈表示在圆心处对梯度求值. 后者对应两个不同的节点变量, 但梯度的具体表示并不唯一. 图中的




图 3.7: 三次 Hermite 三角形

$\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{10}\}$ 确定 $\mathcal{P}_3$. 设 $P \in \mathcal{P}_3$ 且 $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 10$. 在 L_1 上, z_2, z_3 是 P 的二重根, 因为函数值及沿直线 L_1 的导数均为零. 一元三次多项式若有四个计重根, 必为零, 故 $P = 0$ 于 L_1 . 对 L_2, L_3 同理, 从而 $P = cL_1L_2L_3$. 内部点 z_4 给出

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4)L_3(z_4) \implies c = 0.$$

注 3.2.7: 使用方向导数时, 可用多种不同方式以 $\mathcal{P}_3$ 定义有限元, 图 3.8 给出其中两种. 箭头表示在该点沿所示方向取方向导数. 左侧的“全局”单元便于在整个三角剖分区域内计算 x 或 y 方向导数; 右侧的“局部”单元则使每个三角形的节点参数相对于该三角形保持不变.




图 3.8: 三次 Hermite 单元的两组不同节点值

一般 Hermite 情形的节点为

$$\begin{cases} 3 \text{ 个顶点节点,} \\ 6 \text{ 个方向导数节点 (每个顶点的梯度给出两个),} \\ 3(k-3) \text{ 个边节点,} \\ \frac{1}{2}(k-2)(k-1) \text{ 个内部节点, 与 Lagrange 情形相同.} \end{cases} \quad (3.2.9)$$

它们的总数仍为 $\frac{1}{2}(k+1)(k+2) = \dim \mathcal{P}_k$.

例 3.2.8 ($k = 4$): 有 $\dim \mathcal{P}_4 = 15$. 图 3.9 所示 $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{15}\}$ 确定 $\mathcal{P}_4$.




图 3.9: 四次 Hermite 三角形

Argyris 单元

例 3.2.10 ($k = 5$): 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_5$. 考虑图 3.10 中的 $21 = \dim \mathcal{P}_5$ 个自由度. 实心点表示函数值, 内圈表示梯度的两个分量, 外圈表示三个二阶导数, 箭头表示在三个边中点取法向导数. 这些节点变量 $\mathcal{N} = \{N_1, \dots, N_{21}\}$ 确定 $\mathcal{P}_5$. 设 $P \in \mathcal{P}_5$ 且 $N_i(P) = 0, i = 1, \dots, 21$. $P|_{L_1}$




图 3.10: 五次 Argyris 三角形

是在 z_2, z_3 处有三重根的一元五次多项式, 因而恒为零. 对 L_2, L_3 同理, 故 $P = QL_1L_2L_3$, $\deg Q = 2$. 记 ∂_{L_i} 为沿 L_i 的方向导数. 由 $(\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = 0$ 得

$$0 = (\partial_{L_1}\partial_{L_2}P)(z_3) = Q(z_3)L_3(z_3)\partial_{L_2}L_1\partial_{L_1}L_2,$$

从而 $Q(z_3) = 0$. 同理 $Q(z_1) = Q(z_2) = 0$. 又因 $L_1(m_1) = 0$,

$$0 = \frac{\partial P}{\partial n_1}(m_1) \implies Q(m_1) = 0,$$

并同理有 $Q(m_2) = Q(m_3) = 0$. 由例 3.2.3, $Q \equiv 0$.

例 3.2.11 ($k = 7$): $\dim \mathcal{P}_7 = 36$. 图 3.11 所示节点变量确定 $\mathcal{P}_7$; 验证留作练习 3.x.12.

3.3 插值算子

考察若干有限元之后, 现在把它们拼接成 Sobolev 空间的子空间. 首先定义局部插值算子.




图 3.11: 七次 Argyris 三角形

定义 3.3.1: 给定有限元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$, 令 $\{\phi_i : 1 \leq i \leq k\} \subseteq \mathcal{P}$ 为 $\mathcal{N}$ 的对偶基. 若函数 v 使所有 $N_i \in \mathcal{N}$ 均有定义, 则局部插值算子定义为

$$I_K v := \sum_{i=1}^k N_i(v) \phi_i. \quad (3.3.2)$$

例 3.3.3: 令 K 为图 3.12 中的三角形, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N} = \{N_1, N_2, N_3\}$ 如例 3.2.1, 且 $f = e^{xy}$. 求 $I_K f$. 由定义, $I_K f = N_1(f)\phi_1 + N_2(f)\phi_2 + N_3(f)\phi_3$. 直线 L_1 为 $y = 1 - x$, 故 $\phi_1 = c(1 - x - y)$.




图 3.12: 线性插值的坐标

条件 $N_1\phi_1 = 1$ 给出 $c = 1$. 同理, $\phi_2 = x$, $\phi_3 = y$. 因此

$$I_K f = N_1(f)(1 - x - y) + N_2(f)x + N_3(f)y = 1.$$

命题 3.3.4: I_K 是线性的.

证明: 见练习 3.x.2. ■

命题 3.3.5: 对所有 $1 \leq i \leq d$,

$$N_i(I_K(f)) = N_i(f).$$

证明: 由 I_K 的定义、 N_i 的线性及两组基的对偶性,

$$N_i(I_K(f)) = N_i\left(\sum_{j=1}^k N_j(f)\phi_j\right) = \sum_{j=1}^k N_j(f)N_i(\phi_j) = N_i(f).$$

注 3.3.6: 命题 3.3.5 表明, $I_K(f)$ 是与 f 具有相同节点值的唯一形函数.

命题 3.3.7: 若 $f \in \mathcal{P}$, 则 $I_K(f) = f$. 特别地, I_K 是幂等的, 即 $I_K^2 = I_K$.

证明: 由命题 3.3.5, 对所有 i 有 $N_i(f - I_K(f)) = 0$, 这证明第一项. 又因 $I_K f \in \mathcal{P}$,

$$I_K^2 f = I_K(I_K f) = I_K f.$$

下面把各单元拼接起来.

定义 3.3.8: 区域 Ω 的一个剖分是有限个单元区域的集合 $\{K_i\}$, 满足:

1. $\text{int } K_i \cap \text{int } K_j = \emptyset$, 若 $i \neq j$;
2. $\bigcup_i K_i = \overline{\Omega}$.

定义 3.3.9: 设区域 Ω 有剖分 $\mathcal{T}$. 假设剖分中的每个单元区域 K 配有形函数 $\mathcal{P}$ 与节点变量 $\mathcal{N}$, 且 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元. 令 m 为节点变量中出现的最高阶偏导数阶数. 对 $f \in C^m(\overline{\Omega})$, 全局插值算子由

$$I_{\mathcal{T}} f|_{K_i} = I_{K_i} f \quad \forall K_i \in \mathcal{T} \quad (3.3.10)$$

定义.

若不对剖分作进一步假设, 就无法断言全局插值函数的连续性. 下面给出保证连续性的条件. 此处仅详细讨论使用三角形单元的二维情形; 高维和其他剖分可以类似处理.

定义 3.3.11: 多边形区域 Ω 的三角剖分是由三角形构成的剖分, 并且任何一个三角形的顶点都不位于另一个三角形某条边的内部.

例 3.3.12: 图 3.13 左侧是给定区域的三角剖分, 右侧则不是.




图 3.13: 两个剖分: 左侧为三角剖分, 右侧不是

例 3.3.13: 令 Ω 为图 3.14 中的正方形, $\mathcal{T}$ 由 T_1, T_2 两个三角形组成. 每个三角形采用例 3.2.1 的 Lagrange 单元. T_1 上的对偶基为 $\{1 - x - y, x, y\}$, T_2 上的对偶基为 $\{1 - x, 1 -$

$y, x + y - 1\}$. 令 $f = \sin(\pi(x + y)/2)$, 则

$$I_{\mathcal{T}}f = \begin{cases} x + y, & \text{于 } T_1, \\ 2 - x - y, & \text{于 } T_2. \end{cases}$$




图 3.14: 由两个三角形构成的简单三角剖分

注 3.3.14: 为逼近零边界条件的 Dirichlet 问题, 在每个三角剖分 $\mathcal{T}$ 上使用满足边界条件的分片多项式有限维空间

$$V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m(\bar{\Omega}), f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

这将在第 5 章进一步讨论.

定义 3.3.15: 若对所有 $f \in C^m(\bar{\Omega})$ 都有 $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$, 则称插值算子具有连续阶 r , 简称为 C^r . 空间 $V_{\mathcal{T}} = \{I_{\mathcal{T}}f : f \in C^m\}$ 称为 C^r 有限元空间.

注 3.3.16: 能按上述方式构成 C^r 空间的有限元或单元族通常称为 C^r 单元. 并非任意节点选择都能给出 C^r 连续性, 还必须施加某种正则性. 对目前研究的单元, 关键在于节点的放置应当不依赖坐标, 并且关于边中点对称.

命题 3.3.17: Lagrange 与 Hermite 单元都是 C^0 单元, Argyris 单元是 C^1 单元. 更准确地说, 给定 Ω 的三角剖分 $\mathcal{T}$, 可以为相应单元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 选择边节点, 使全局插值满足 $I_{\mathcal{T}}f \in C^r$, 其中 Lagrange 与 Hermite 情形 $r = 0$, Argyris 情形 $r = 1$; 相应地 $f \in C^m$, 其中 $m = 0, 1, 2$. 特别地, 对每条边 xx' 取节点 $\xi_i(x' - x) + x$, 其中固定的 $\{\xi_i : i = 1, \dots, k - 1 - 2m\}$ 关于 $\xi = 1/2$ 对称, 即已足够. 此外, 在这些假设下 $I_{\mathcal{T}}f \in W_{\infty}^{r+1}$.

证明: 只需证明跨越每条边的连续性. 设 $T_i, i = 1, 2$, 是共享边 e 的两个三角形. 节点以不依赖坐标且对称的方式选取, 因而两单元在 e 上的边节点位于空间中的同一点. 令 $w = I_{T_1}f - I_{T_2}f$, 并把两个多项式延拓到各三角形外. 则 w 是 k 次多项式, 其在边 e 上的一维 Lagrange、Hermite 或 Argyris 节点均为零, 故 $w|_e = 0$, 插值函数跨每条边连续.

$I_{\mathcal{T}}f$ 的 Lipschitz 连续性可由下列 $r + 1$ 阶弱导数得到:

$$(D_w^{\alpha} I_{\mathcal{T}}f)|_T = D^{\alpha} I_T f \quad \forall T \in \mathcal{T}, \quad |\alpha| \leq r + 1.$$

右端显然属于 L^∞ . 对检验函数 ϕ 分片积分并利用边界项因插值函数的连续性而相消, 得

$$\int_{\Omega} (D^\alpha \phi)(I_{\mathcal{T}} f) dx = \sum_{T \in \mathcal{T}} \int_T (D^\alpha \phi)(I_T f) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} \phi \sum_{T \in \mathcal{T}} \chi_T (D^\alpha I_T f) dx.$$

3.4 单元的等价性

在使用全局插值算子时, 必须为局部插值算子 I_T 的范数找到独立于 $T \in \mathcal{T}$ 的一致界. 因此需要比较不同单元上的局部插值算子. 为此可使用下列等价概念 (Ciarlet & Raviart 1972a).

定义 3.4.1: 令 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 为有限元, $F(x) = Ax + b$ 为仿射映射, 其中 A 非奇异. 若有限元 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 满足

- (i) $F(K) = \hat{K}$;
- (ii) $F^* \hat{\mathcal{P}} = \mathcal{P}$;
- (iii) $F_* \mathcal{N} = \hat{\mathcal{N}}$,

则称其与 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 仿射等价, 记为 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_F (\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$.

注 3.4.2: 回忆拉回 F^* 定义为 $F^*(\hat{f}) = \hat{f} \circ F$, 推前 F_* 定义为 $(F_* \mathcal{N})(\hat{f}) = \mathcal{N}(F^*(\hat{f}))$.

命题 3.4.3: 仿射等价是等价关系.

证明: 见练习 3.x.4.

例 3.4.4 (若干仿射等价与不等价的情形): 有以下情形:

1. 任意三角形 K , $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1$, $\mathcal{N}$ 为在 K 的顶点求值. 所有这些单元均仿射等价.
2. 任意三角形 K , $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$, $\mathcal{N}$ 为在顶点及边中点求值. 所有这些单元均仿射等价.
3. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2$. 图 3.15 中 $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$ 与 $(T_2, \mathcal{P}, \mathcal{N}_2)$ 不仿射等价, 但 $(T_1, \mathcal{P}, \mathcal{N}_1)$ 与 $(T_3, \mathcal{P}, \mathcal{N}_3)$ 仿射等价.
4. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.16 中的两个单元因方向导数的方向不同而不仿射等价.
5. 令 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_3$. 图 3.17 中的两个单元因方向导数的强度不同而不仿射等价.




图 3.15: 不等价的二次单元: 节点位置不相容




图 3.16: 不等价的三次 Hermite 单元: 方向不相容




图 3.17: 不等价的三次 Hermite 单元: 导数强度不相容

命题 3.4.5: 存在一种节点放置方式, 使给定次数的所有 Lagrange 单元仿射等价.

证明: 对每个三角形使用重心坐标 (b_1, b_2, b_3) . 点 (x, y) 的第 i 个重心坐标定义为第 i 个线性 Lagrange 基函数在该点的值, 即 $b_i(x, y) = \phi_i(x, y)$. 每个重心坐标自然对应一个顶点, 并等于该点到对边的成比例距离. 因为它们给出常数 1 的插值, 所以三者之和为 1. 映射 $(x, y) \mapsto b(x, y)$ 把三角形可逆地映到

$$\{b \in [0, 1]^3 : b_1 + b_2 + b_3 = 1\}$$

的一个子集. 对 k 次 Lagrange 单元, 取重心坐标为

$$\left(\frac{i}{k}, \frac{j}{k}, \frac{l}{k}\right), \quad 0 \leq i, j, l \leq k, \quad i + j + l = k$$

的点作为节点.

■

定义 3.4.6: 若有限元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$ 满足

$$I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f \quad \forall f \text{ 足够光滑},$$

则称二者插值等价, 记为 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}) \sim_I (K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$. 这里 $I_{\mathcal{N}}$ 与 $I_{\tilde{\mathcal{N}}}$ 分别按式 (3.3.2) 定义.

命题 3.4.7: 设 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(K, \mathcal{P}, \tilde{\mathcal{N}})$ 为有限元. 把节点变量视为 $C^m(K)'$ 的子集时, $\mathcal{N}$ 中每个节点变量都是 $\tilde{\mathcal{N}}$ 中节点变量的线性组合, 当且仅当二者插值等价.

证明: 先证“仅当”. 对 $N_i \in \mathcal{N}$, 写成 $N_i = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j$. 则

$$N_i(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(I_{\tilde{\mathcal{N}}}f) = \sum_{j=1}^k c_j \tilde{N}_j(f) = N_i(f).$$

由节点值唯一性, $I_{\mathcal{N}}f = I_{\tilde{\mathcal{N}}}f$. 反向证明留作练习 3.x.26. ■

例 3.4.8: 图 3.8、图 3.16 与图 3.17 中的 Hermite 单元插值等价, 见练习 3.x.29.

定义 3.4.9: 若 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 仿射等价, 而后者与 $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$ 插值等价, 则称 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\tilde{K}, \tilde{\mathcal{P}}, \tilde{\mathcal{N}})$ 仿射-插值等价.

例 3.4.10: 所有仿射等价单元都仿射-插值等价; 适当选取边节点与内部节点的 Hermite 单元也仿射-插值等价; Argyris 单元则不仿射-插值等价 (Ciarlet 1978).

命题 3.4.11: 若 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 与 $(\hat{K}, \hat{\mathcal{P}}, \hat{\mathcal{N}})$ 仿射-插值等价, 则

$$I \circ F^* = F^* \circ \hat{I},$$

其中 $F: K \rightarrow \hat{K}$ 是仿射映射.

3.5 矩形单元

本节考虑定义在矩形上的有限元. 令

$$\mathcal{Q}_k = \left\{ \sum_j c_j p_j(x) q_j(y) : p_j, q_j \text{ 为次数不超过 } k \text{ 的多项式} \right\}.$$

可以证明

$$\dim \mathcal{Q}_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2, \quad (3.5.1)$$

其中 $\mathcal{P}_k^1$ 表示一元次数不超过 k 的多项式空间, 见练习 3.x.6.

张量积单元

例 3.5.2 ($k=1$): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_1$, $\mathcal{N}$ 如图 3.18. 若 $P \in \mathcal{Q}_1$ 在 z_1, z_2, z_3, z_4 处为零, 则 P 在矩形任一边上的限制是一元一次多项式. 因而 $P = cL_1L_2$. 又

$$0 = P(z_4) = cL_1(z_4)L_2(z_4) \implies c = 0.$$




图 3.18: 双线性 Lagrange 矩形




图 3.19: 双二次 Lagrange 矩形

例 3.5.3 ($k = 2$): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_2$, $\mathcal{N}$ 如图 3.19. 若 $P \in \mathcal{Q}_2$ 在 z_i , $i = 1, \dots, 9$ 处为零, 则 $P = cL_1L_2L_3L_4$. 由内部点 z_9 得 $c = 0$.

例 3.5.4 (任意 k): 令 K 为任意矩形, $\mathcal{P} = \mathcal{Q}_k$, 并令 $\mathcal{N}$ 为在 $\{(t_i, t_j) : i, j = 0, 1, \dots, k\}$ 处的点求值, 其中 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = 1$. $k = 3$ 的情形见图 3.20. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 见练习 3.x.7.




图 3.20: 双三次 Lagrange 矩形

Serendipity 单元

例 3.5.5 (二次情形): 为定义形函数, 先用下列引理; 记号见图 3.21.




图 3.21: 引理 3.5.6 的记号

引理 3.5.6: 存在常数 $c_1, \dots, c_8$, 使得对 $\phi \in \mathcal{P}_2$,

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i).$$

证明: 在 $z_1, \dots, z_6$ 取值构成 $\mathcal{P}_2$ 的节点基. 设 $\{\phi_1, \dots, \phi_6\}$ 为其对偶基. 若 $\phi \in \mathcal{P}_2$, 则 $\phi = \sum_{i=1}^6 N_i(\phi) \phi_i$, 因而

$$\phi(z_9) = \sum_{i=1}^6 \phi(z_i) \phi_i(z_9) = \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i),$$

其中取 $c_7 = c_8 = 0$. ■

令 K 为任意矩形,

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_2 : \sum_{i=1}^8 c_i \phi(z_i) - \phi(z_9) = 0 \right\},$$

$\mathcal{N}$ 如图 3.22. 若 $\phi \in \mathcal{P}$ 在 $z_1, \dots, z_8$ 处为零, 则 $\phi = cL_1L_2L_3L_4$, 而定义关系给出 $\phi(z_9) = 0$, 故 $c = 0$.




图 3.22: 二次 Serendipity 单元

例 3.5.7 (三次情形): 令 K 为任意矩形. 存在常数 c_j^i , 使得对 $\phi \in \mathcal{P}_3$ 及 $i = 1, 2, 3, 4$,

$$\phi(w_i) = \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j),$$

其中 w_i, z_j 如图 3.23. 取

$$\mathcal{P} = \left\{ \phi \in \mathcal{Q}_3 : \phi(w_i) - \sum_{j=1}^{12} c_j^i \phi(z_j) = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4 \right\}$$

及图示 $\mathcal{N}$, 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元, 见练习 3.x.8.

注 3.5.8: C^r 矩形单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明, 本节所有矩形单元均为 C^0 . 一个 C^1 矩形单元见练习 3.x.16.

注 3.5.9: Serendipity 单元的节点变量并不唯一确定形函数空间 $\mathcal{P}$. 第 4.6 节还将给出另一种选择.

3.6 高维单元

高维单元可以像二维情形那样, 以一维单元的性质为构件归纳构造. 以三维四面体单元为例, k 次 Lagrange 单元按如下方式定义: 在四个顶点取节点; 在六条边各取 $k-1$ 个内部点;




图 3.23: 三次 Serendipity 单元

在四个面各取 $(k-2)(k-1)/2$ 个内部点. $k \geq 3$ 时出现的面节点应选得能够确定面内的二元 $k-3$ 次多项式. 当 $k \geq 4$ 时, 还在四面体内部选点, 使其确定三元 $k-4$ 次多项式.

若这些节点值对 $v \in \mathcal{P}_k$ 均为零, 则 v 在每个面 F_i 上的限制恒为零. 令 L_i 为在 F_i 上为零的非平凡线性函数. 四次使用引理 3.1.10, 得 $v = L_1 L_2 L_3 L_4 R$, 其中 R 的次数为 $k-4$. $k \leq 3$ 时这给出 $v = 0$; 一般情形由内部节点确定 $R = 0$.

上述节点数为

$$C(k) := 4 + 6(k-1) + 2(k-2)(k-1) + \dim \mathcal{P}_{k-4}. \quad (3.6.1)$$

三元 k 次多项式的维数可由唯一分解

$$P(x, y, z) = p(x, y) + zq(x, y, z) \quad (3.6.2)$$

计算, 其中 p 的次数为 k , q 的次数为 $k-1$. 因此

$$\dim \mathcal{P}_k = \frac{(k+1)(k+2)}{2} + \dim \mathcal{P}_{k-1} = \sum_{j=0}^k \frac{(j+1)(j+2)}{2}. \quad (3.6.3)$$

前几个维数见表 3.3. 式 (3.6.3) 表明 $\dim \mathcal{P}_k$ 是首项系数为 $1/6$ 的 k 的三次多项式. $C(k)$ 也是三次多项式, 且二者在 $k = 1, 2, 3, 4$ 时相等, 故恒等.

表 3.3: 三维 k 次多项式空间 $\mathcal{P}_k$ 的维数

k	$\dim \mathcal{P}_k$
1	4
2	10
3	20
4	35

上述论证还表明, 可以安排节点使 Lagrange 单元为 C^0 . 如命题 3.3.17 的证明所示, 只需使全局插值函数在相邻四面体的公共面上限制相同. 面节点必须以对称且不依赖坐标的方式选取. 特别地, 若每个面上节点的重心坐标集合 B 满足

$$(b_1, b_2, b_3) \in B \implies (b_{\sigma(1)}, b_{\sigma(2)}, b_{\sigma(3)}) \in B$$

对指标的任意置换 σ 都成立, 即已足够.

注 3.6.4: C^r 四面体单元可按定义 3.3.15 类似定义. 沿用命题 3.3.17 的证明可知, 本节定义的四面体单元都是 C^0 .

3.7 特殊单元

迄今研究的所有单元 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 都以多项式作为形函数, 但这并非必要. 此处简要考察宏有限元, 其形函数本身是分片多项式. 也有人提出其他形函数, 例如有理函数 (Wachspress 1975).

令 K 为三角形, 连接边中点将其分成图 3.24 所示的四个子三角形. 令 $\mathcal{P}$ 为该子剖分上的连续分片线性函数集合. 若 $\mathcal{N}$ 由 K 的顶点及边中点处的点求值构成, 则得到一个定义良好的 C^0 有限元.




图 3.24: 宏分片线性三角形

更复杂的是 Clough 和 Tocher 的单元 (Ciarlet 1978). 将三角形 K 分成图 3.25 所示的三个子三角形. 令 $\mathcal{P}$ 为该子剖分上的 C^1 分片三次函数集合, $\mathcal{N}$ 由顶点处的函数值与梯度求值以及 K 的边中点处的法向导数求值构成. 则 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是定义良好的 C^1 有限元 (Ciarlet 1978).




图 3.25: Clough-Tocher C^1 宏分片三次三角形

习题

习题 3.x.1: 设 m, k 为非负整数, P 为次数 $2m + k + 1$ 的一元多项式. 假设对 $a = 0, 1$ 及 $j = 0, \dots, m$ 有 $P^{(j)}(a) = 0$, 并且对 $0 < \xi_1 < \dots < \xi_k < 1$ 有 $P(\xi_j) = 0$. 证明 $P \equiv 0$.

习题 3.x.2: 证明局部插值算子是线性的, 参见命题 3.3.4.

习题 3.x.3: 求例 3.3.13 中三角形 T_2 的对偶基.

习题 3.x.4: 证明仿射等价是等价关系, 参见命题 3.4.3.

习题 3.x.5: 证明插值等价是等价关系.

习题 3.x.6: 证明 $\dim Q_k = (\dim \mathcal{P}_k^1)^2$, 其中 $\mathcal{P}_k^1$ 为一元次数不超过 k 的多项式空间, 并证明 $\{x^i y^j : i, j = 0, \dots, k\}$ 是 Q_k 的一组基.

习题 3.x.7: 证明例 3.5.4 中的 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元.

习题 3.x.8: 证明例 3.5.7 中的 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元.

习题 3.x.9: 设 K 为顶点 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 构成的矩形, $\mathcal{P} = Q_1$, $\mathcal{N}$ 为顶点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.10: 设 K 为顶点 $(0, 0)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 构成的三角形, $\mathcal{P} = P_2$, $\mathcal{N}$ 为顶点与边中点处求值. 构造节点基函数.

习题 3.x.11: 证明节点变量集合

$$\Sigma_n = \{P(a), P'(a), P^{(3)}(a), \dots, P^{(2n-1)}(a) : a = 0, 1\}$$

唯一确定次数 $2n + 1$ 的一元多项式. 当 $n = 1$ 时, 这就是 Hermite 插值, 参见练习 3.x.1.

习题 3.x.12: 证明例 3.2.11 所述 Argyris 单元的节点变量确定 $\mathcal{P}_7$. 对任意次数 $k \geq 5$ 给出 Argyris 单元的一般描述.

习题 3.x.13: 证明若 $\mathcal{P} = Q_1$, 则图 3.26 所示节点变量不能确定 $\mathcal{P}$.




图 3.26: 一个非有限元

习题 3.x.14: [非协调分片线性单元] 证明三角剖分中的边中点可用于参数化分片线性函数空间, 这些函数一般不连续, 但在每条边的中点处连续. 能否推广到二次情形, 即为在每条边上两个点连续的分片二次函数求节点基?

习题 3.x.15: [旋转非协调双线性单元] 令 $K = [-1, 1] \times [-1, 1]$, $\mathcal{P}$ 为由 $1, x, y, x^2 - y^2$ 张成的形函数空间, $\mathcal{N}$ 由形函数在四条边中点处的值组成, 参见图 3.26. 证明 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ 是有限元. 令

$$a_j(v) = \frac{1}{|e_j|} \int_{e_j} v ds$$

为 v 在 K 的边 e_j 上的平均值, 并令 $\mathcal{N}^* = \{a_1, \dots, a_4\}$. 证明 $(K, \mathcal{P}, \mathcal{N}^*)$ 也是有限元. 这两个单元是否插值等价?

习题 3.x.16: [双三次 Hermite (Bogner–Fox–Schmit) 单元] 证明二元张量积三次多项式由下列量唯一确定:

$$\Sigma = \left\{ P(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_1}(a_i), \frac{\partial P}{\partial x_2}(a_i), \frac{\partial^2 P}{\partial x_1 \partial x_2}(a_i) : i = 1, \dots, 4 \right\},$$

其中 a_i 是矩形的顶点. 这是否在矩形剖分上生成 C^1 分片三次函数?

习题 3.x.17: 设 I 是三角形上连续分片线性函数对应的插值算子, 即在顶点处 $Iu = u$. 证明 $\|I\|_{C^0 \rightarrow C^0} = 1$, 即对任意连续函数 u , $\|Iu\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^\infty}$. 提示: $|Iu|$ 在三角形上的最大值出现在哪里? 对分片二次函数是否仍然成立?

习题 3.x.18: 令“斜线”表示沿图中线段所示两个方向依次取方向导数所得的二阶导数. 证明 $\mathcal{P}_4$ 由下列数据确定: 每个顶点处的函数值、梯度和该“斜线”二阶导数, 以及每条边中点处的函数值. 每个顶点用于该二阶导数的方向是相交于该点的两条边, 如图 3.27.




图 3.27: 一个四次有限元

习题 3.x.19: 假设 Lagrange 单元的节点取为命题 3.4.5 证明中引入的重心格点. 证明 $\mathcal{P}_k$ 的相应节点基函数可写成 k 个线性函数的乘积. 提示: 对每个节点找出包含所有其他节点的 k 条直线.

习题 3.x.20: 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到三维.

习题 3.x.21: 把命题 3.4.5 与练习 3.x.19 推广到 n 维.

习题 3.x.22: 证明双四次多项式不存在 Serendipity 单元的类似物. 提示: 证明不能去掉所有内部点.

习题 3.x.23: 证明分解 (3.6.2) 是唯一的.

习题 3.x.24: 构造三维 Hermite 与 Argyris 单元. 后者是否为 C^1 ?

习题 3.x.25: 构造四维 Lagrange 单元.

习题 3.x.26: 证明命题 3.4.7 中的“如果”部分.

习题 3.x.27: 证明 Hermite 单元不是 C^1 .

习题 3.x.28: 对任意三角形, Hermite 单元的导数节点能否选成一个仿射等价族?

习题 3.x.29: 使用命题 3.4.7 证明例 3.4.8.

习题 3.x.30: 令 $\mathcal{P}_k^n$ 表示 n 元 k 次多项式空间. 证明

$$\dim \mathcal{P}_k^n = \binom{n+k}{k}.$$

提示: 证明分解 (3.6.2) 在 n 维成立, 并用它证明 $\dim \mathcal{P}_k^n$ 构成 Pascal 三角形.

习题 3.x.31: 构造三维张量积单元与 Serendipity 单元.

习题 3.x.32: 给出使张量积单元为 C^0 的矩形剖分条件.

习题 3.x.33: 给出使双三次 Hermite 单元为 C^1 的矩形剖分条件, 参见练习 3.x.16. 这些条件是否与练习 3.x.32 相同?

习题 3.x.34: 单纯形剖分应满足什么条件, 才能使三维 Lagrange 单元为 C^0 ?

习题 3.x.35: 设 T 为顶点 p_k , $1 \leq k \leq 3$, 构成的三角形, $\lambda_j \in \mathcal{P}_1$ 满足 $\lambda_j(p_k) = \delta_{jk}$, $1 \leq j \leq 3$. 证明

$$\frac{1}{2|T|} \int_T \lambda_1^\ell \lambda_2^m \lambda_3^n dx = \frac{\ell!m!n!}{(\ell+m+n+2)!},$$

其中 ℓ, m, n 为非负整数. 四面体的对应公式是什么?

4 Sobolev 空间中的多项式逼近理论

现在发展适用于第 3 章所构造有限元的逼近理论. 我们采用构造性方法, 定义微积分中熟知的 Taylor 多项式的平均版本. 关键估计来自 Riesz 位势理论中的若干简单引理, 本章将给出这些引理. 作为推论, 还将以接近 Sobolev 原始方法的方式证明 Sobolev 不等式.

首先导出适用于单个单元区域的估计. 随后说明如何组合这些估计, 为定义在构成较大区域剖分的一组单元区域上的全局插值算子提供误差估计. 讨论主要集中于多面体区域, 但最后还将推广到“等参”单元. 这类单元在逼近曲边区域上的问题时非常方便有效.

4.1 平均 Taylor 多项式

我们考察 Sobolev 空间中函数的 m 阶多项式逼近. 令 $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| < \rho\}$. 若 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 (i) $\text{supp } \phi = \bar{B}$ 以及 (ii) $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) dx = 1$, 则称其为截断函数. 例如, 令

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-(1-(|x-x_0|/\rho)^2)^{-1}}, & |x - x_0| < \rho, \\ 0, & |x - x_0| \geq \rho. \end{cases}$$

再令 $c = \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx > 0$, 则 $\phi(x) = c^{-1}\psi(x)$ 满足 (i) 与 (ii), 并且 $\max |\phi| \leq C\rho^{-n}$.

先假设 $u \in C^{m-1}(\mathbb{R}^n)$.

定义 4.1.1: 在 y 处求值的 m 阶 Taylor 多项式定义为

$$T_y^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha, \quad (4.1.2)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 是非负整数 n 元组, $x \in \mathbb{R}^n$,

$$x^\alpha = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}, \quad \alpha! = \prod_{i=1}^n \alpha_i!, \quad |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i.$$

一般地, 若 u 属于 Sobolev 空间, $D^\alpha u$ 未必有通常的逐点意义. 下述定义通过对 y 平均 $T_y^m u(x)$ 解决这一问题.

定义 4.1.3: 设 u 在区域 Ω 中具有所有阶数严格小于 m 的弱导数, 且 $B \Subset \Omega$. u 在 B 上平均的相应 m 阶 Taylor 多项式定义为

$$Q^m u(x) = \int_B T_y^m u(x) \phi(y) dy, \quad (4.1.4)$$

其中 $T_y^m u(x)$ 由式 (4.1.2) 定义, B 是以 x_0 为中心、半径为 ρ 的球, ϕ 是支于 B 的截断函数.

式 (4.1.4) 对 $u \in W_p^{m-1}(\Omega)$ 确有意义, 因为典型项为

$$\int_B \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha \phi(y) dy, \quad (4.1.5)$$

而 $D^\alpha u \in L_{\text{loc}}^1(\Omega)$. 写成

$$(x - y)^\alpha = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)^{\alpha_i} = \sum_{\gamma+\beta=\alpha} a_{(\gamma,\beta)} x^\gamma y^\beta, \quad (4.1.6)$$

其中 $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ 与 $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ 为非负整数 n 元组, $a_{(\gamma, \beta)}$ 为常数, 则式 (4.1.5) 可写成

$$\sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{1}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B D^\alpha u(y) y^\beta \phi(y) dy. \quad (4.1.7)$$

因此

$$Q^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{1}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B D^\alpha u(y) y^\beta \phi(y) dy. \quad (4.1.8)$$

命题 4.1.9: $Q^m u$ 是关于 x 的次数小于 m 的多项式.

事实上, $Q^m u$ 也可对 $L^1(B)$ 中的函数定义. 只需在式 (4.1.8) 中分部积分, 得

$$Q^m u(x) = \sum_{|\alpha| < m} \sum_{\gamma+\beta=\alpha} \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} a_{(\gamma, \beta)} x^\gamma \int_B u(y) D^\alpha (y^\beta \phi(y)) dy. \quad (4.1.10)$$

注 4.1.11: 若 u 在 Ω 中具有所有阶数小于 m 的弱导数, 则由弱导数的定义, 式 (4.1.8) 与式 (4.1.10) 等价.

命题 4.1.12: $Q^m u$ 对所有 $u \in L^1(B)$ 均有定义, 且

$$Q^m u(x) = \sum_{|\lambda| < m} x^\lambda \int_B \psi_\lambda(y) u(y) dy, \quad (4.1.13)$$

其中 $\psi_\lambda \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp } \psi_\lambda \subset \overline{B}$.

证明: 由式 (4.1.10), 定义

$$\psi_\lambda(y) = \sum_{\lambda \leq \alpha, |\alpha| < m} \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} a_{(\lambda, \alpha-\lambda)} D^\alpha (y^{\alpha-\lambda} \phi(y)). \quad (4.1.14)$$

■

推论 4.1.15: 若 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, 则对任意 k ,

$$\|Q^m u\|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\rho,\Omega} \|u\|_{L^1(B)}. \quad (4.1.16)$$

证明: 这直接来自式 (4.1.13), 因为 $\sup_{y \in B} |\psi_\lambda(y)|$ 和 $\sup_{x \in \Omega} |D^\alpha x^\lambda|$ 都有界.

■

由推论 4.1.15, Q^m 是从 L^1 到 W_∞^k 的有界映射.

命题 4.1.17: 对任意满足 $|\alpha| \leq m-1$ 的 α ,

$$D^\alpha Q^m u = Q^{m-|\alpha|} D^\alpha u \quad \forall u \in W_1^{|\alpha|}(B). \quad (4.1.18)$$

证明: 若 $u \in C^\infty(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} D_x^\alpha Q^m u(x) &= \int_B D_x^\alpha T_y^m u(x) \phi(y) dy \\ &= \int_B T_y^{m-|\alpha|} D^\alpha u(x) \phi(y) dy = Q^{m-|\alpha|} D^\alpha u(x), \end{aligned}$$

其中第二个等号见练习 4.x.1. 一般情形由稠密性论证得到.

注 4.1.19: 多项式 Q^m 可以称为 Sobolev 多项式, 因为 Sobolev 在研究以其姓名命名的空间时构造并使用过类似多项式 (Sobolev 1963 & 1991). 由于截断函数 ϕ 的选择并不唯一, 该多项式也不唯一. 此外, Sobolev 1963 & 1991 中的实际构造显然不满足式 (4.1.18), 而这一恒等式将在后文带来若干简化.

4.2 误差表示

我们需要 Taylor 定理的如下形式 (参见练习 4.x.2). 对 $f \in C^m([0, 1])$, 有

$$f(1) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0) + m \int_0^1 \frac{1}{m!} s^{m-1} f^{(m)}(1-s) ds. \quad (4.2.1)$$

定义 4.2.2: 若对所有 $x \in \Omega$, 集合 $\{x\} \cup B$ 的闭凸包都是 Ω 的子集, 则称 Ω 关于 B 是星形的.

例 4.2.3: 图 4.28 所示区域关于球 B 是星形的, 但关于球 B' 不是星形的. 图 4.29 给出了一个不关于任何球为星形的区域.




图 4.28: 关于 B 为星形但关于 B' 不为星形的区域




图 4.29: 不关于任何球为星形的区域

从现在起, 假设 Ω 关于 B 是星形的. 令 u 是 Ω 上的 C^m 函数. 对 $x \in \Omega$ 和 $y \in B$, 定义 $f(s) = u(y + s(x - y))$. 由链式法则,

$$\frac{1}{k!} f^{(k)}(s) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y + s(x - y)) (x - y)^\alpha. \quad (4.2.4)$$

结合式 (4.2.1) 与式 (4.2.4), 得

$$\begin{aligned} u(x) &= \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x - y)^\alpha + \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \int_0^1 \frac{m}{\alpha!} s^{m-1} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds \\ &= T_y^m u(x) + m \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \int_0^1 \frac{1}{\alpha!} s^{m-1} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds. \end{aligned} \quad (4.2.5)$$

定义 4.2.6: m 阶余项定义为

$$R^m u(x) = u(x) - Q^m u(x).$$

利用定义 4.2.6、截断函数定义的 (ii)、式 (4.2.4) 和式 (4.2.5), 得

$$\begin{aligned} R^m u(x) &= \int_B u(x) \phi(y) dy - \int_B T_y^m u(x) \phi(y) dy \\ &= \int_B (u(x) - T_y^m u(x)) \phi(y) dy \\ &= \int_B \phi(y) m \sum_{|\alpha|=m} (x - y)^\alpha \left[\int_0^1 \frac{s^{m-1}}{\alpha!} D^\alpha u(x + s(y - x)) ds \right] dy. \end{aligned} \quad (4.2.7)$$

令 C_x 表示 $\{x\} \cup B$ 的凸包.

命题 4.2.8: 余项 $R^m u := u - Q^m u$ 满足

$$R^m u(x) = m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \quad (4.2.9)$$

其中 $z = x + s(y - x)$, $k_\alpha(x, z) = \frac{1}{\alpha!} (x - z)^\alpha k(x, z)$, 且

$$|k(x, z)| \leq C \left(1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n |z - x|^{-n}. \quad (4.2.10)$$

证明: 首先将 (y, s) 空间中的变量换为 (z, s) , 其中

$$z = x + s(y - x). \quad (4.2.11)$$

由变量替换公式,

$$ds dy = s^{-n} ds dz. \quad (4.2.12)$$

(y, s) 空间中的积分域为 $B \times (0, 1]$, 它在 (z, s) 空间中的对应区域为

$$A = \left\{ (z, s) : s \in (0, 1], \left| \frac{1}{s} (z - x) + x - x_0 \right| < \rho \right\}.$$

注意

$$(z, s) \in A \implies \frac{|z - x|}{|x - x_0| + \rho} < s. \quad (4.2.13)$$

此外, 当 $|\alpha| = m$ 时,

$$(x - y)^\alpha = s^{-m}(x - z)^\alpha. \quad (4.2.14)$$

令 χ_A 为 A 的特征函数. 由式 (4.2.7) 和式 (4.2.14),

$$R^m u(x) = \sum_{|\alpha|=m} \iint \chi_A(z, s) \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) \frac{m}{\alpha!} s^{-n-1} (x - z)^\alpha D^\alpha u(z) ds dz. \quad (4.2.15)$$

A 在 z 空间上的投影为 C_x . 因此, 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} R^m u(x) &= m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(z) (x - z)^\alpha \\ &\quad \times \left[\int_0^1 \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) \chi_A(z, s) s^{-n-1} ds \right] dz \\ &= m \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \end{aligned}$$

其中

$$k(x, z) = \int_0^1 \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) \chi_A(z, s) s^{-n-1} ds, \quad k_\alpha(x, z) = \frac{1}{\alpha!} (x - z)^\alpha k(x, z).$$

只需证明 $k(x, z)$ 的估计 (4.2.10).

令 $t = |z - x|/(|x - x_0| + \rho)$. 则

$$\begin{aligned} |k(x, z)| &= \left| \int_0^1 \chi_A(z, s) \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) s^{-n-1} ds \right| \\ &\leq \int_t^1 \left| \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) \right| s^{-n-1} ds \quad (\text{由式 (4.2.13)}) \\ &\leq \|\phi\|_{L^\infty(B)} \frac{s^{-n}}{n} \Big|_1^t \leq \frac{1}{n} \|\phi\|_{L^\infty(B)} t^{-n} \\ &= \frac{1}{n} \|\phi\|_{L^\infty(B)} (\rho + |x - x_0|)^n |z - x|^{-n} \\ &\leq C \rho^{-n} (\rho + |x - x_0|)^n |z - x|^{-n} = C \left(1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n |z - x|^{-n}. \end{aligned}$$

上面使用 Fubini 定理可由下式保证:

$$\begin{aligned} &\int_{C_x} \int_0^1 \left| \phi \left(x + \frac{z - x}{s} \right) \right| \chi_A(z, s) s^{-n-1} |x - z|^m \frac{m}{\alpha!} |D^\alpha u(z)| ds dz \\ &\leq \int_{C_x} |D^\alpha u(z)| \frac{1}{\alpha!} |x - z|^{m-n} C \left(1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0| \right)^n dz < \infty. \end{aligned}$$

■

定义 4.2.16: 设 Ω 的直径为 d , 且它关于某个球 B 是星形的. 令

$$\rho_{\max} = \sup\{\rho : \Omega \text{ 关于某个半径为 } \rho \text{ 的球是星形的}\}.$$

Ω 的粗壮度参数定义为

$$\gamma = \frac{d}{\rho_{\max}}. \quad (4.2.17)$$

推论 4.2.18: 球 B 可选得使命题 4.2.8 中的函数 $k(x, z)$ 满足

$$|k(x, z)| \leq C(\gamma + 1)^n |z - x|^{-n}, \quad \forall x \in \Omega, \quad (4.2.19)$$

其中 γ 是 Ω 的粗壮度参数.

证明: 选择一个球 B , 使得 Ω 关于 B 是星形的, 且其半径 $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$. 则

$$\begin{aligned} |k(x, z)| &\leq C \left(1 + \frac{1}{\rho} |x - x_0|\right)^n |z - x|^{-n} && \text{(由式 (4.2.10))} \\ &\leq C \left(1 + \frac{2d}{\rho_{\max}}\right)^n |z - x|^{-n} \\ &\leq C 2^n \left(1 + \frac{d}{\rho_{\max}}\right)^n |z - x|^{-n} = C(1 + \gamma)^n |z - x|^{-n}. \end{aligned}$$

4.3 Riesz 位势的界

我们已经用一种 “Riesz 位势” 给出了余项 R^m 的界. 本节将导出这类位势的若干估计.

引理 4.3.1: 若 $f \in L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$, 且 $m > n/p$, 则

$$\int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz \leq C_p d^{m-n/p} \|f\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall x \in \Omega.$$

当 $p = 1$ 且 $m \geq n$ 时, 此不等式也成立.

证明: 先设 $1 < p < \infty$ 且 $m > n/p$. 令 $1/p + 1/q = 1$. 则

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz &\leq \left(\int_{\Omega} |x - z|^{(-n+m)q} dz \right)^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} && \text{(Hölder 不等式)} \\ &\leq C \left(\int_0^d r^{(-n+m)q+n-1} dr \right)^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} && \text{(使用极坐标)} \\ &= C (d^{(-n+m)q+n})^{1/q} \|f\|_{L^p(\Omega)} \\ &= C d^{m-(n/p)} \|f\|_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

最后一步使用了 $1/q - 1 = -1/p$. 再设 $p = 1$ 且 $m \geq n$. 此时

$$\int_{\Omega} |x - z|^{-n+m} |f(z)| dz \leq \| |x - z|^{-n+m} \|_{L^\infty(\Omega)} \|f\|_{L^1(\Omega)} \leq d^{-n+m} \|f\|_{L^1(\Omega)}.$$

命题 4.3.2: 对 $u \in W_p^m(\Omega)$,

$$\|R^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,p} d^{m-n/p} |u|_{W_p^m(\Omega)}, \quad (4.3.3)$$

其中假设 $1 < p < \infty$ 且 $m > n/p$, 或 $p = 1$ 且 $m \geq n$.

证明: 先设 $u \in C^m(\Omega) \cap W_p^m(\Omega)$, 从而可以使用命题 4.2.8 中 $R^m u(x)$ 的逐点表示:

$$\begin{aligned} |R^m u(x)| &= m \left| \sum_{|\alpha|=m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz \right| \quad (\text{由式 (4.2.9)}) \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |D^\alpha u(z)| dz \quad (\text{由式 (4.2.19)}) \\ &\leq C_{m,n,\gamma,p} d^{m-n/p} \|u\|_{W_p^m(\Omega)} \quad (\text{由引理 4.3.1}). \end{aligned}$$

最后用稠密性论证完成证明 (练习 4.x.18). ■

作为命题 4.3.2 的推论, 得到 Sobolev 引理的如下特殊情形.

引理 4.3.4 (Sobolev 不等式): 设 Ω 的直径为 d , 且关于球 B 是星形的. 若 $u \in W_p^m(\Omega)$, 并且 (i) $1 < p < \infty$ 且 $m > n/p$, 或 (ii) $p = 1$ 且 $m \geq n$, 则 u 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}.$$

证明: 先证明不等式:

$$\begin{aligned} \|u\|_{L^\infty(\Omega)} &\leq \|u - Q^m u\|_{L^\infty(\Omega)} + \|Q^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \|u\|_{W_p^m(\Omega)} + C_{m,n,\rho} \|u\|_{L^1(\Omega)} \\ &\leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

其中第二行使用了式 (4.3.3) 和式 (4.1.16). 还需证明 u 在 $\bar{\Omega}$ 上连续. 取 $u_j \in C^\infty(\bar{\Omega}) \cap W_p^m(\Omega)$, 使得当 $j \rightarrow \infty$ 时 $\|u_j - u\|_{W_p^m(\Omega)} \rightarrow 0$. 上述不等式于是给出 $\|u - u_j\|_{L^\infty(\Omega)} \rightarrow 0$. 换言之, $u_j \rightarrow u$ 一致收敛, 故 u 在 $\bar{\Omega}$ 上连续. ■

令式 (4.3.3) 中的 $p \rightarrow \infty$, 则

$$\|R^m u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^m \|u\|_{W_\infty^m(\Omega)}. \quad (4.3.5)$$

事实上, 同一个不等式对一般 L^p 空间也成立. 这就是 Bramble-Hilbert 引理, 下面将给出证明. 不过首先还需要一个关于 Riesz 位势的结果.

引理 4.3.6: 设 $f \in L^p(\Omega)$, $p \geq 1$, $m \geq 1$, 并令

$$g(x) = \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz.$$

则

$$\|g\|_{L^p(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^p(\Omega)}. \quad (4.3.7)$$

证明: 先设 $1 < p < \infty$. 则

$$\begin{aligned}
\|g\|_{L^p(\Omega)}^p &= \int_{\Omega} |g(x)|^p dx = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz \right)^p dx \\
&\leq \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |f(z)|^p |x-z|^{m-n} dz \right) \left(\int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dz \right)^{p/q} dx \\
&\leq C_{m,n} d^{mp/q} \int_{\Omega} \int_{\Omega} |f(z)|^p |x-z|^{m-n} dz dx \\
&\leq C_{m,n} d^{mp/q} \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dx \right) |f(z)|^p dz \\
&\leq C_{m,n} d^{(1+p/q)m} \|f\|_{L^p(\Omega)}^p = C_{m,n} d^{mp} \|f\|_{L^p(\Omega)}^p.
\end{aligned}$$

这里先使用 $1/p + 1/q = 1$ 的 Hölder 不等式, 再使用 Fubini 定理. 因而

$$\|g\|_{L^p(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p = 1$ 时,

$$\begin{aligned}
\|g\|_{L^1(\Omega)} &= \int_{\Omega} |g(x)| dx = \int_{\Omega} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |f(z)| dz dx \\
&= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dx \right) |f(z)| dz \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^1(\Omega)}.
\end{aligned}$$

当 $p = \infty$ 时,

$$|g(x)| \leq \|f\|_{L^\infty(\Omega)} \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} dz \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

因此 $\|g\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n} d^m \|f\|_{L^\infty(\Omega)}$. ■

引理 4.3.8 (Bramble–Hilbert): 设 B 是 Ω 中的一个球, Ω 关于 B 是星形的, 且 B 的半径 $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$. 令 $Q^m u$ 为 u 在 B 上平均所得的 m 阶 Taylor 多项式, 其中 $u \in W_p^m(\Omega)$ 且 $p \geq 1$. 则

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} |u|_{W_p^m(\Omega)}, \quad k = 0, 1, \dots, m, \quad (4.3.9)$$

其中 $d = \text{diam}(\Omega)$.

证明: 只需假设 $\text{diam}(\Omega) = 1$, 并对 $u \in C^m(\Omega) \cap W_p^m(\Omega)$ 证明

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall k = 0, 1, \dots, m. \quad (4.3.10)$$

一般情形由标准齐次性论证得到.

当 $k = m$ 时,

$$|u - Q^m u|_{W_p^m(\Omega)} = |u|_{W_p^m(\Omega)}.$$

当 $k = 0$ 时,

$$\begin{aligned}
\|u - Q^m u\|_{L^p(\Omega)} &= \|R^m u\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq m \sum_{|\alpha|=m} \left\| \int_{\Omega} k_{\alpha}(x, z) D^{\alpha} u(z) dz \right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq C_{m,n} (1 + 1/\rho)^n \sum_{|\alpha|=m} \left\| \int_{\Omega} |x-z|^{m-n} |D^{\alpha} u(z)| dz \right\|_{L^p(\Omega)} \\
&\leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)}.
\end{aligned}$$

这里使用了式 (4.2.10)、引理 4.3.6 以及 $1/\rho < 2\gamma$.

当 $0 < k < m$ 时,

$$\begin{aligned} |u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} &= |R^m u|_{W_p^k(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha|=k} \|R^{m-k} D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p} \\ &\leq C_{m,n,\gamma} \left(\sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u|_{W_p^{m-k}(\Omega)}^p \right)^{1/p} \leq C_{m,n,\gamma} |u|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

第一行使用了式 (4.1.18), 第二行使用了上面的 $k = 0$ 情形.

对一般区域 Ω , 定义

$$\widehat{\Omega} = \{d^{-1}x : x \in \Omega\}. \quad (4.3.11)$$

若 $u \in W_p^m(\Omega)$, 令 $\widehat{u}(y) := u(dy)$. 显然 $\widehat{u} \in W_p^m(\widehat{\Omega})$. 变量替换给出

$$|\widehat{u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} = d^{k-n/p} |u|_{W_p^k(\Omega)}, \quad 0 \leq k \leq m. \quad (4.3.12)$$

$Q^m u(x)$ 的定义 (参见式 (4.1.4)) 给出

$$\widehat{Q^m u} = \widehat{Q^m u} \quad (4.3.13)$$

(参见练习 4.x.3). 因此

$$\begin{aligned} |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} &\leq C_{m,n,\gamma} |\widehat{u}|_{W_p^m(\widehat{\Omega})} \\ &= C_{m,n,\gamma} d^{m-n/p} |u|_{W_p^m(\Omega)}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} &= |\widehat{u} - \widehat{Q^m u}|_{W_p^k(\widehat{\Omega})} \\ &= d^{k-n/p} |u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)}. \end{aligned}$$

合并两式便证明, 对 $0 \leq k \leq m$,

$$|u - Q^m u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} |u|_{W_p^m(\Omega)}.$$

■

作为 Bramble–Hilbert 引理的一个应用, 下面证明 Friedrichs 不等式.

引理 4.3.14 (Friedrichs 不等式): 设 Ω 关于球 B 是星形的. 则对所有 $u \in W_p^1(\Omega)$,

$$\|u - \bar{u}\|_{W_p^1(\Omega)} \leq C_{n,\gamma} |u|_{W_p^1(\Omega)}, \quad (4.3.15)$$

其中 $\bar{u} = |\Omega|^{-1} \int_{\Omega} u(x) dx$.

证明: 由 Hölder 不等式,

$$\|\bar{\phi}\|_{L^p(\Omega)} \leq \|\phi\|_{L^p(\Omega)} \quad \forall \phi \in L^p(\Omega).$$

因此, 对任意常数 c ,

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)} = \|(u - c) - \overline{(u - c)}\|_{L^p(\Omega)} \leq 2\|u - c\|_{L^p(\Omega)}.$$

于是由式 (4.3.9),

$$\|u - \bar{u}\|_{L^p(\Omega)} \leq 2 \inf_{c \in \mathbb{R}} \|u - c\|_{L^p(\Omega)} \leq C^* |u|_{W_p^1(\Omega)},$$

其中常数 C^* 仅依赖于维数 n 和区域的粗壮度常数 γ . 因而式 (4.3.15) 成立, 其中 $C_{n,\gamma} = 1 + C^*$. ■

注 4.3.16: 第 5 章将使用 Friedrichs 不等式证明 Laplace 算子的 Neumann 问题的强制性.

Dupont and Scott (1980) 说明了如何将上述结果推广到有限个星形区域之并. 例如, 图 4.29 中的区域满足此条件. Dechevski & Quak (1990) 和 Verfürth (1999) 建立了更一般的结果.

4.4 插值误差的界

至此我们估计了 $R^m u = u - Q^m u$, 这是一个局部估计. 现在估计插值误差. 首先估计插值算子的范数.

引理 4.4.1: 设 (K, P, N) 是有限元, 满足 $\text{diam } K = 1$, $P \subset W_\infty^m(K)$ 且 $N \subset (C^l(K))'$ (即 N 中的节点变量涉及至多 l 阶导数). 则对 $1 \leq p \leq \infty$, 插值算子从 $C^l(K)$ 到 $W_p^m(K)$ 有界.

证明: 令 $N = \{N_1, \dots, N_k\}$, 并令 $\{\phi_1, \dots, \phi_k\} \subset P$ 为对偶基. 插值函数定义为 $Iu = \sum_{i=1}^k N_i(u) \phi_i$, 且由假设每个 $\phi_i \in W_\infty^m(K) \subset W_p^m(K)$. 因此

$$\begin{aligned} \|Iu\|_{W_p^m(K)} &\leq \sum_{i=1}^k |N_i(u)| \|\phi_i\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq \left(\sum_{1 \leq i \leq k} \|N_i\|_{(C^l(K))'} \|\phi_i\|_{W_p^m(K)} \right) \|u\|_{C^l(K)} = C \|u\|_{C^l(K)}. \end{aligned}$$
■

定义 4.4.2: 若 (K, P, N) 满足引理 4.4.1 的条件, 则定义 $\sigma(K)$ 为 $I : C^l(K) \rightarrow W_p^m(K)$ 的算子范数.

定义 4.4.3: 对任意有界区域 K , 定义

$$\hat{K} := \{(\text{diam } K)^{-1} x : x \in K\}.$$

令 P_k 表示 n 个变量的次数不超过 k 的多项式集合.

定理 4.4.4: 设有限元 (K, P, N) 满足:

- (i) K 关于某个球是星形的;
- (ii) $P_{m-1} \subset P \subset W_\infty^m(K)$;
- (iii) $N \subset (C^l(K))'$.

设 $1 \leq p \leq \infty$, 且当 $p > 1$ 时 $m - l - n/p > 0$, 或当 $p = 1$ 时 $m - l - n \geq 0$. 则对

$$0 \leq i \leq m \text{ 和 } v \in W_p^m(K),$$

$$|v - Iv|_{W_p^i(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}(\text{diam } K)^{m-i} |v|_{W_p^m(K)}, \quad (4.4.5)$$

其中 $\hat{K} = \{(\text{diam } K)^{-1}x : x \in K\}$, γ 是 K 的粗壮度参数.

证明: 只需取 $\text{diam } K = 1$, 此时 $K = \hat{K}$. 一般情形由齐次性论证得到 (参见练习 4.x.5). 此外, 由 Sobolev 引理 4.3.4, 插值算子在 $W_p^m(K)$ 上有定义.

取球 $B \subset K$, 使 K 关于 B 是星形的, 且其半径 $\rho > \frac{1}{2}\rho_{\max}$. 令 $Q^m v$ 为 v 在 B 上平均所得的 m 阶 Taylor 多项式. 因为 $Iv = v$ 对 $v \in P$ 成立,

$$IQ^m v = Q^m v, \quad \text{因为 } Q^m v \in P_{m-1} \subset P. \quad (4.4.6)$$

于是

$$\begin{aligned} \|v - Iv\|_{W_p^m(K)} &\leq \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \|Q^m v - Iv\|_{W_p^m(K)} \\ &= \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \|I(Q^m v - v)\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} + \sigma(K) \|Q^m v - v\|_{C^l(K)} \\ &\leq (1 + \sigma(K)) C_{m,n,\gamma} \|v - Q^m v\|_{W_p^m(K)} \\ &\leq (1 + \sigma(K)) C_{m,n,\gamma} |v|_{W_p^m(K)} = C_{m,n,\gamma,\sigma(K)} |v|_{W_p^m(K)}. \end{aligned}$$

这里依次使用式 (4.4.6)、Sobolev 引理 4.3.4 和 Bramble–Hilbert 引理 4.3.8. ■

推论 4.4.7: 在与定理 4.4.4 相同的假设下, 若 $i \leq l$, 则

$$|v - Iv|_{W_\infty^i(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}(\text{diam } K)^{m-i-n/p} |v|_{W_p^m(K)}. \quad (4.4.8)$$

证明: 取 $\text{diam } K = 1$. 则

$$|v - Iv|_{W_\infty^l(K)} \leq C_{m,n,\gamma} \|v - Iv\|_{W_p^m(K)} \leq C_{m,n,\gamma,\sigma(K)} |v|_{W_p^m(K)}.$$

这里使用 Sobolev 引理 4.3.4 和定理 4.4.4. 一般情形由齐次性论证得到. ■

我们的目标是当 K 遍历一族单元时, 找到 $C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{K})}$ 的一致界. 因此必须研究 $\sigma(\hat{K})$ 对仿射变换的依赖性.

设参考元 (K, P, N) 通过变换 $Ax = ax + b$, $a = (a_{ij})$, 与 $(\tilde{K}, \tilde{P}, \tilde{N})$ 仿射等价 (参见定义 3.4.1), 并以 $(a^{-1})_{ij}$ 表示 a^{-1} 的系数. 仿射等价的定义给出

$$\tilde{I}\tilde{v}(\tilde{x}) = \sum_{N \in \tilde{\mathcal{N}}} (A_* N) \tilde{v} \cdot (A^{-1})^* \phi_N(\tilde{x}). \quad (4.4.9)$$

回忆 $(A_* N) \tilde{v} = N(A^* \tilde{v})$, 其中 $(A^* \tilde{v})(x) = \tilde{v}(Ax)$. 因此

$$|(A_* N) \tilde{v}| \leq C_N \|A^* \tilde{v}\|_{C^l(K)} \leq C_{N,n,l} \left(1 + \max_{1 \leq i,j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \|\tilde{v}\|_{C^l(\tilde{K})}.$$

此外,

$$\|(A^{-1})^* \phi_N\|_{W_p^m(\tilde{K})} \leq C_{N,n,m} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m \|\phi_N\|_{W_p^m(K)} |\det a|^{1/p}.$$

由于 $\|\phi_N\|_{W_p^m(K)}$ 在参考元上有界,

$$\begin{aligned} \|\tilde{I}\tilde{v}\|_{W_p^m(\tilde{K})} &\leq C_{\text{ref}} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m \\ &\quad \times |\det a|^{1/p} \|\tilde{v}\|_{C^l(\tilde{K})}, \end{aligned}$$

其中

$$C_{\text{ref}} = |N| \max_{N \in \mathcal{N}} \{C_{N,n,l}\} \max_{N \in \mathcal{N}} \{C_{N,n,m}\} \max_{N \in \mathcal{N}} \{\|\phi_N\|_{W_p^m(K)}\},$$

$|N|$ 表示节点变量个数, 即 $\dim P$. 因而

$$\sigma(\tilde{K}) \leq C_{\text{ref}} \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m |\det a|^{1/p}. \quad (4.4.10)$$

命题 4.4.11: 给定参考元 (K, P, N) 以及通过仿射映射 $Ax = ax + b$ 与之仿射等价的单元 $(\tilde{K}, \tilde{P}, \tilde{N})$, 有

$$\sigma(\tilde{K}) \leq C_{\text{ref}} \chi(a), \quad (4.4.12)$$

其中 χ 是 $GL(\mathbb{R}^n)$ 上的连续函数. 例如可取

$$\chi(a) := \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|\right)^l \left(1 + \max_{1 \leq i, j \leq n} |(a^{-1})_{ij}|\right)^m |\det a|^{1/p}.$$

定义 4.4.13: 设 Ω 是给定区域, $\{\mathcal{T}^h\}$, $0 < h \leq 1$, 是一族剖分, 满足

$$\max\{\text{diam } T : T \in \mathcal{T}^h\} \leq h \text{diam } \Omega. \quad (4.4.14)$$

若存在 $\rho > 0$, 使对所有 $h \in (0, 1]$,

$$\min\{\text{diam } B_T : T \in \mathcal{T}^h\} \geq \rho h \text{diam } \Omega, \quad (4.4.15)$$

则称该族是拟一致的, 其中 B_T 是包含于 T 且使 T 关于 B_T 为星形的最大球. 若存在 $\rho > 0$, 使对所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 和所有 $h \in (0, 1]$,

$$\text{diam } B_T \geq \rho \text{diam } T, \quad (4.4.16)$$

则称该族非退化或正则.

注 4.4.17:

- (i) $\{\mathcal{T}^h\}$ 非退化, 当且仅当所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 和所有 $h \in (0, 1]$ 的粗壮度参数一致有界.
- (ii) 拟一致族必非退化, 反之不然 (参见练习 4.x.6).
- (iii) 从二维中的任意三角剖分出发, 连接各边中点作细分, 可得到拟一致三角剖分族. 三维中也有类似但更复杂的构造 (Zhang 1995).

回忆定义 3.3.15, 若 r 是使得

$$V^h = I^h(C^l(\bar{\Omega})) \subset C^r(\Omega) \cap W_\infty^{r+1}(\Omega) \quad (4.4.18)$$

成立的最大非负整数, 则称参考元 (K, P, N) 为 C^r 元. 这里 $I^h : C^l(\bar{\Omega}) \rightarrow L^1(\Omega)$ 是全局插值算子, 定义为

$$I^h u|_T := I_{T^h} u, \quad T \in \mathcal{T}^h, \quad h \in (0, 1], \quad (4.4.19)$$

其中 I_{T^h} 是仿射等价元 (T, P_T, N_T) 的插值算子.

定理 4.4.20: 设 $\{\mathcal{T}^h\}$, $0 < h \leq 1$, 是 $\mathbb{R}^n$ 中多面体区域 Ω 的非退化剖分族. 设参考元 (K, P, N) 对某些 l, m, p 满足定理 4.4.4 的条件. 对所有 $T \in \mathcal{T}^h$, $0 < h \leq 1$, 令 (T, P_T, N_T) 为相应的仿射等价元. 则存在正常数 C , 只依赖于参考元、 n, m, p 以及式 (4.4.16) 中的 ρ , 使对 $0 \leq s \leq m$,

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_p^s(T)}^p \right)^{1/p} \leq C h^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.21)$$

对所有 $v \in W_p^m(\Omega)$ 成立. 当 $p = \infty$ 时, 左端应解释为 $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)}$. 对 $0 \leq s \leq l$,

$$\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)} \leq C h^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall v \in W_p^m(\Omega). \quad (4.4.22)$$

证明: 先证

$$\sup\{\sigma(\hat{T}) : T \in \mathcal{T}^h, 0 < h \leq 1\} = C(\rho, m, n, p, K) < \infty. \quad (4.4.23)$$

由于 $(\hat{T}, \hat{P}_T, \hat{N}_T)$ 也通过某个仿射映射 $Ax = ax + b$ 与 (K, P, N) 仿射等价, 由命题 4.4.11, $\sigma(\hat{T}) \leq C_{\text{ref}} \chi(a)$, 其中 χ 在 $GL(\mathbb{R}^n)$ 上连续. 只需说明非退化性蕴含 a 属于 $GL(\mathbb{R}^n)$ 的某个紧子集.

由非退化性, 存在 $B \subset \hat{T}$, 使 $\text{diam } B \geq \rho > 0$. 因而

$$\text{meas } B \leq \text{meas } \hat{T} = \int_{\hat{T}} d\hat{x} = |\det a| \int_K dx \leq |\det a| \text{meas } K.$$

另一方面, $\text{meas } B \geq C_n \rho^n$, 故 $|\det a| \geq \varepsilon > 0$, 其中 ε 只依赖于 ρ, K, n . 不失一般性, 可设 $\{(x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i \leq t_0, x_i > 0\} \subset K$, 其中 t_0 只依赖于 K . 令 e_i 为第 i 个单位向量. 当 $0 \leq t \leq t_0$ 时, $A(te_i) = tae_i + b \in \hat{T}$. 因而 $|ae_i| \leq \text{diam } \hat{T}/t_0 = 1/t_0$, 从而 $|a_{ij}| \leq 1/t_0$. 所以 a 属于紧集 $\{b : |\det b| \geq \varepsilon > 0, |b_{ij}| \leq 1/t_0\}$. 式 (4.4.23) 得证.

为证明式 (4.4.21), 注意

$$\begin{aligned} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_p^s(T)}^p &\leq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{T})}^p \sum_{i=0}^s (\text{diam } T)^{p(m-i)} |v|_{W_p^m(T)}^p \\ &\leq \sum_{T \in \mathcal{T}^h} C_{m,n,\gamma,\sigma(\hat{T})}^p \sum_{i=0}^s (h \text{diam } \Omega)^{p(m-i)} |v|_{W_p^m(T)}^p \\ &\leq C h^{p(m-s)} \sum_{T \in \mathcal{T}^h} |v|_{W_p^m(T)}^p = C h^{p(m-s)} |v|_{W_p^m(\Omega)}^p. \end{aligned}$$

其中依次使用式 (4.4.5)、式 (4.4.14)、式 (4.4.23) 以及 $h \leq 1$. 式 (4.4.22) 可类似地由式 (4.4.8) 证明 (参见练习 4.x.7).

■

推论 4.4.24: 设 $\{\mathcal{T}^h\}$, $0 < h \leq 1$, 是多面体区域 Ω 的非退化剖分族. 设参考元 (K, P, N) 对某些 l, m, p 满足定理 4.4.4 的条件. 假设对所有 $T \in \mathcal{T}^h$, $0 < h \leq 1$, 元 (T, P_T, N_T) 均与 (K, P, N) 仿射插值等价. 则存在正常数 C , 只依赖于参考元、 l, m, n, p 和式 (4.4.16) 中的 ρ , 使对 $0 \leq s \leq m$,

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_p^s(T)}^p \right)^{1/p} \leq Ch^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.25)$$

对所有 $v \in W_p^m(\Omega)$ 成立. 当 $p = \infty$ 时, 左端解释同定理 4.4.20. 对 $0 \leq s \leq l$,

$$\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(T)} \leq Ch^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad \forall v \in W_p^m(\Omega). \quad (4.4.26)$$

注 4.4.27: 若上述结果中的单元对某个 $r \geq 0$ 构成 C^r 元, 则对 $0 \leq s \leq r+1$,

$$\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_p^s(T)}^p = \|v - I^h v\|_{W_p^s(\Omega)}^p, \quad \max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v - I_{T^h} v\|_{W_\infty^s(T)} = \|v - I^h v\|_{W_\infty^s(\Omega)}.$$

将这些表达式代入左端, 得到

$$\|v - I^h v\|_{W_p^s(\Omega)} \leq Ch^{m-s} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.28)$$

对所有 $v \in W_p^m(\Omega)$ 和 $0 \leq s \leq \min\{m, r+1\}$ 成立, 且

$$\|v - I^h v\|_{W_\infty^s(\Omega)} \leq Ch^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(\Omega)} \quad (4.4.29)$$

对所有 $v \in W_p^m(\Omega)$ 和 $0 \leq s \leq \min\{l, r+1\}$ 成立.

4.5 逆估计

本节讨论有限元空间上各种范数之间的关系.

设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域. 若 v 是定义在 K 上的函数, 则在 $\hat{K} = \{(\text{diam } K)^{-1}x : x \in K\}$ 上定义 $\hat{v}$ 为

$$\hat{v}(\hat{x}) = v((\text{diam } K)\hat{x}) \quad \forall \hat{x} \in \hat{K}. \quad (4.5.1)$$

显然 $v \in W_r^k(K)$ 当且仅当 $\hat{v} \in W_r^k(\hat{K})$, 且

$$|\hat{v}|_{W_r^k(\hat{K})} = (\text{diam } K)^{k-n/r} |v|_{W_r^k(K)}. \quad (4.5.2)$$

若 P 是定义在 K 上的函数构成的向量空间, 令 $\hat{P} := \{\hat{v} : v \in P\}$.

引理 4.5.3: 设 $\rho h \leq \text{diam } K \leq h$, 其中 $0 < h \leq 1$, 且 P 是 $W_p^l(K) \cap W_q^m(K)$ 的有限维子空间, 其中 $1 \leq p, q \leq \infty$ 且 $0 \leq m \leq l$. 则存在 $C = C(\hat{P}, \hat{K}, l, p, q, \rho)$, 使对所有 $v \in P$,

$$\|v\|_{W_p^l(K)} \leq Ch^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(K)}. \quad (4.5.4)$$

证明: 以下以 C 表示仅依赖于 $\widehat{P}, \widehat{K}, l, p, q, \rho$ 的一般常数. 先证 $m = 0$ 的情形. 由有限维空间上的范数等价性,

$$\|\widehat{v}\|_{W_p^l(\widehat{K})} \leq C \|\widehat{v}\|_{L^q(\widehat{K})} \quad \forall v \in P. \quad (4.5.5)$$

因而式 (4.5.2) 蕴含

$$|v|_{W_p^j(K)} (\text{diam } K)^{j-n/p} \leq C \|v\|_{L^q(K)} (\text{diam } K)^{-n/q}, \quad (4.5.6)$$

其中 $0 \leq j \leq l$. 由此得到

$$|v|_{W_p^j(K)} \leq C h^{-j+n/p-n/q} \|v\|_{L^q(K)}, \quad 0 \leq j \leq l. \quad (4.5.7)$$

因为 $h \leq 1$,

$$\|v\|_{W_p^j(K)} \leq C h^{-j+n/p-n/q} \|v\|_{L^q(K)}, \quad 0 \leq j \leq l, \quad (4.5.8)$$

取 $j = l$ 即得 $m = 0$ 时的式 (4.5.4).

对一般的 $m \leq l$, 当 $l - m \leq k \leq l$ 且 $|\alpha| = k$ 时, 可写 $D^\alpha v = D^\beta D^\gamma v$, 其中 $|\beta| = l - m$, $|\gamma| = k + m - l$. 因而

$$\begin{aligned} \|D^\alpha v\|_{L^p(K)} &\leq \|D^\gamma v\|_{W_p^{l-m}(K)} \\ &\leq C h^{-(l-m)+n/p-n/q} \|D^\gamma v\|_{L^q(K)} \\ &\leq C h^{-(l-m)+n/p-n/q} |v|_{W_q^{k+m-l}(K)}. \end{aligned}$$

因此

$$|v|_{W_p^k(K)} \leq C h^{-(l-m)+n/p-n/q} |v|_{W_q^{k+m-l}(K)}, \quad (4.5.9)$$

其中 $l - m \leq k \leq l$. 特别地,

$$|v|_{W_p^k(K)} \leq C h^{-(l-m)+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(K)}. \quad (4.5.10)$$

结合 $j = l - m$ 时的式 (4.5.8) 与式 (4.5.10), 即得式 (4.5.4). ■

下面给出引理 4.5.3 的全局版本.

定理 4.5.11: 设 $\{\mathcal{T}^h\}$, $0 < h \leq 1$, 是多面体区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的拟一致剖分族. 设参考有限元 (K, P, N) 满足 $P \subset W_p^l(K) \cap W_q^m(K)$, 其中 $1 \leq p, q \leq \infty$ 且 $0 \leq m \leq l$. 对 $T \in \mathcal{T}^h$, 令 (T, P_T, N_T) 为仿射等价元, 并令

$$V^h = \{v : v \text{ 可测且 } v|_T \in P_T \ \forall T \in \mathcal{T}^h\}.$$

则存在 $C = C(l, p, q, \rho)$, 使

$$\left[\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_p^l(T)}^p \right]^{1/p} \leq C h^{m-l+\min(0, n/p-n/q)} \left[\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right]^{1/q} \quad (4.5.12)$$

对所有 $v \in V^h$ 成立. 当 $p = \infty$ 或 $q = \infty$ 时, 相应的和式分别解释为 $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_\infty^l(T)}$ 或 $\max_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_\infty^m(T)}$.

证明: 首先, 引理 4.5.3 与 $\{\mathcal{T}^h\}$ 的拟一致性蕴含

$$\|v\|_{W_p^l(T)} \leq C(\hat{P}_T, \hat{T}, l, p, q, \rho) h^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(T)} \quad (4.5.13)$$

对所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 和 $v \in P_T$ 成立. 与命题 4.4.11 的证明相似的论证表明

$$C(\hat{P}_T, \hat{T}, l, p, q, \rho) \leq \zeta(a_T) C(l, p, q, \rho), \quad (4.5.14)$$

其中 $Ax = a_T x + b_T$ 是从 $\hat{K}$ 到 $\hat{T}$ 的仿射变换, ζ 是连续依赖于 $a_T \in GL(\mathbb{R}^n)$ 的正函数. 由于 $\{\mathcal{T}^h\}$ 非退化, 定理 4.4.20 证明中的论证表明 $\{a_T : T \in \mathcal{T}^h, 0 < h \leq 1\}$ 是 $GL(\mathbb{R}^n)$ 的紧子集. 因而

$$\|v\|_{W_p^l(T)} \leq C(l, p, q, \rho) h^{m-l+n/p-n/q} \|v\|_{W_q^m(T)} \quad (4.5.15)$$

对所有 $T \in \mathcal{T}^h$ 和 $v \in P_T$ 成立 (另见练习 4.x.15). 以下以 C 表示仅依赖于 l, p, q, ρ 的一般常数.

当 $p = \infty$ 时, 式 (4.5.12) 直接由式 (4.5.15) 得到. 设 $p < \infty$. 则

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_p^l(T)}^p \right)^{1/p} \leq C h^{m-l+n/p-n/q} \left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.5.16)$$

若 $p \geq q$, 则 (参见练习 4.x.8)

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right)^{1/q}, \quad (4.5.17)$$

此时结论直接由式 (4.5.16) 和式 (4.5.17) 得到.

若 $p < q$, 则 Hölder 不等式给出 (参见练习 4.x.9)

$$\left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} 1 \right)^{1/p-1/q} \left(\sum_{T \in \mathcal{T}^h} \|v\|_{W_q^m(T)}^q \right)^{1/q}. \quad (4.5.18)$$

由 $\{\mathcal{T}^h\}$ 的拟一致性,

$$\sum_{T \in \mathcal{T}^h} 1 \leq C h^{-n}. \quad (4.5.19)$$

此时式 (4.5.12) 由式 (4.5.16)、式 (4.5.18) 和式 (4.5.19) 得到. ■

注 4.5.20: 定理 4.5.11 对协调和非协调有限元都适用. 对协调有限元, 可将式 (4.5.12) 中的和式替换为全局定义的范数.

4.6 张量积多项式逼近

前面已经说明, 只要使用 $m-1$ 次多项式, 就能达到 h^m 阶逼近. 这些结果同时适用于标准张量积多项式空间和 Serendipity 单元. 然而, 张量积多项式空间中次数不低于 m 的额外项既然不改变逼近阶 h^m , 它们究竟提供了什么? 其影响很显著, 但只有在误差项所用范数中才能看出.

定义 $A = \{me_i : i = 1, \dots, n\}$, 其中多重指标 e_i 是标准基向量, $(e_i)_j$ 为 Kronecker delta. 令 A_0 表示与各变量次数均小于 m 的张量积多项式相应的多重指标集合. 它可刻画为

$$A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \quad \forall \alpha \in A\}. \quad (4.6.1)$$

定义

$$Q_A u(x) = \int_B \sum_{\alpha \in A_0} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x-y)^\alpha \phi(y) dy. \quad (4.6.2)$$

与前面一样,

$$\|Q_A u\|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,p} \|u\|_{L^1(B)}. \quad (4.6.3)$$

命题 4.6.4: 余项 $R_A u := u - Q_A u$ 满足

$$R_A u(x) = \sum_{\alpha \in A} \int_{C_x} \tilde{k}_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz, \quad (4.6.5)$$

其中

$$\left| \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \frac{\partial^\gamma}{\partial y^\gamma} \tilde{k}_\alpha(x, y) \right| \leq C |x - y|^{|\alpha| - n - |\beta| - |\gamma|}. \quad (4.6.6)$$

证明: 可写成

$$\begin{aligned} u(x) &= Q^{n \times m} u(x) + R^{n \times m} u(x) \\ &= Q_A u(x) + \int_B \sum_{\substack{\alpha \notin A_0 \\ |\alpha| < n \times m}} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha u(y) (x-y)^\alpha \phi(y) dy \\ &\quad + n \times m \sum_{|\alpha| = n \times m} \int_{C_x} k_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz. \end{aligned} \quad (4.6.7)$$

注意 $|\alpha| = n \times m$ 蕴含 $\alpha \notin A_0$. 对任意 $\alpha \notin A_0$, 可写 $\alpha = \beta + \gamma$, 其中 $\beta \in A$, γ 是多重指标. 分部积分得到

$$u(x) = Q_A u(x) + \sum_{\alpha \in A} \int_{C_x} \tilde{k}_\alpha(x, z) D^\alpha u(z) dz. \quad (4.6.8)$$

估计 (4.6.6) 来自

$$\left| \frac{\partial^\beta}{\partial x^\beta} \frac{\partial^\gamma}{\partial y^\gamma} k_\alpha(x, y) \right| \leq C |x - y|^{|\alpha| - n - |\beta| - |\gamma|},$$

它可按命题 4.2.8 的证明导出. ■

由引理 4.3.1, 若 $p > 1$ 时 $m - k - n/p > 0$, 或 $p = 1$ 时 $m - k - n \geq 0$, 则

$$|u - Q_A u|_{W_\infty^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k-n/p} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.9)$$

其中 d 是 Ω 的直径. 由引理 4.3.6, 对 $0 \leq k < m$,

$$|u - Q_A u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma} d^{m-k} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.10)$$

因此, 定理 4.4.4 的证明给出如下结论.

定理 4.6.11: 设 (K, P, N) 是 $m-1$ 阶张量积有限元, $h = \text{diam } K$, I 为相应插值算子. 对 $u \in W_p^m(K)$, 若 $p > 1$ 时 $m - k - n/p > 0$, 或 $p = 1$ 时 $m - k - n \geq 0$, 则

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C_{m,n} h^{m-k-n/p} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.12)$$

且对 $0 \leq k < m$,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C_{m,n} h^{m-k} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.13)$$

张量积有限元生成 C^0 元, 因而有如下全局插值估计.

定理 4.6.14: 设 I^h 是 Ω 的最大网格尺寸为 h 的矩形剖分上 $m-1$ 阶张量积有限元的插值算子. 对 $u \in W_p^m(\Omega)$, 若 $p > 1$ 时 $m - n/p > 0$, 或 $p = 1$ 时 $m - n \geq 0$, 则

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n} h^{m-n/p} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, \quad (4.6.15)$$

且对 $0 \leq k \leq 1$,

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C_{m,n} h^{m-k} \left(\sum_{i=1}^n \left\| \frac{\partial^m u}{\partial x_i^m} \right\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}. \quad (4.6.16)$$

上述估计对普通多项式逼近显然不成立. 例如取 $m = 2$ 和 $u(x, y) = xy$. 以上估计右端均为零, 从而将有 $u = I^h u$. 但线性插值不可能做到这一点, 必须加入双线性逼近中的额外项.

Serendipity 单元由于其定义具有自由度而更复杂. 考虑二维二次 Serendipity 单元. 合适的形函数空间 P 可以是任意包含所有二次多项式、且可由边节点唯一确定的集合. 一种定义方式是令

$$A = \{(3, 0), (0, 3), (2, 2)\}, \quad (4.6.17)$$

并令 P 的基为

$$A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \ \forall \alpha \in A\} = \{1, x, y, x^2, xy, y^2, x^2y, xy^2\},$$

其中没有 x^2y^2 项.

先验证 P 是二次 Serendipity 单元的有效形函数空间. 设单元区域 K 是单位正方形, 并设 $P \in P$ 的所有 Serendipity 边节点值均为零. 则 $P = cx(1-x)y(1-y) = cx^2y^2 + \dots$, 故必有 $c = 0$. 因此, 图 3.22 所示 Serendipity 节点变量 N 确定 P , (K, N, P) 是定义良好的有限元. 使用上述 A_0 , 可按式 (4.6.3) 定义 Q_A , 并得到与定理 4.6.11 和定理 4.6.14 相同形式的误差估计.

定理 4.6.18: 设 (K, P, N) 是用式 (4.6.17) 中的 A 定义的二维二次 Serendipity 有限元,

I 为相应插值算子. 则对 $u \in W_p^4(K)$,

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p},$$

其中 $p > 1$ 时要求 $3 - k - 2/p > 0$, $p = 1$ 时要求 $k \leq 1$. 此外, 对 $0 \leq k \leq 2$,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}.$$

定理 4.6.19: 设 I^h 是 Ω 的最大网格尺寸为 h 的矩形剖分上, 用式 (4.6.17) 中 A 定义的二次 Serendipity 有限元插值算子. 则对 $u \in W_p^4(\Omega)$,

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} h^{p|\alpha|-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

且对 $0 \leq k \leq 1$,

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} h^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

对三次 Serendipity 单元可取

$$A = \{(4, 0), (0, 4), (3, 3), (3, 2), (2, 3), (2, 2)\}, \quad (4.6.20)$$

得到类似结果, 只是定理 4.6.18 的对应结论中 k 的范围增加一, 并要求 u 有更高的光滑性. 令 P 的基为 $\{x^\beta : \beta \in A_0\}$, 其中 $A_0 = \{\beta : D^\alpha x^\beta = 0 \ \forall \alpha \in A\}$. 为验证 P 是三次 Serendipity 单元的有效形函数空间, 设 $P \in P$ 的所有 Serendipity 边节点值 (图 3.23) 均为零. 则 $P = x(1-x)y(1-y)B(x, y)$, 其中 B 是双线性的. 因为对所有 $\alpha \in A$ 必有 $D^\alpha P = 0$, 可从 $\alpha = (3, 3)$ 开始按 $|\alpha|$ 递减, 得出 $B \equiv 0$.

定理 4.6.21: 设 (K, P, N) 是用式 (4.6.20) 中的 A 定义的二维三次 Serendipity 有限元, I 为相应插值算子. 则对 $u \in W_p^6(K)$,

$$|u - Iu|_{W_\infty^k(K)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p},$$

其中 $p > 1$ 时要求 $4 - k - 2/p > 0$, $p = 1$ 时要求 $k \leq 2$. 此外, 对 $0 \leq k \leq 3$,

$$|u - Iu|_{W_p^k(K)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} (\text{diam } K)^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(K)}^p \right)^{1/p}.$$

若 I^h 是 Ω 的最大网格尺寸为 h 的矩形剖分上的相应插值算子, 则

$$|u - I^h u|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} h^{p|\alpha|-2} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p},$$

$$|u - I^h u|_{W_p^k(\Omega)} \leq C \left(\sum_{\alpha \in A} h^{p(|\alpha|-k)} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}.$$

对 $0 \leq k \leq 1$ 成立.

4.7 等参多项式逼近

对曲边界问题使用高阶元时, 必须以某种方式准确逼近边界条件. 工程实践中最有效的方法之一是使用等参元. 在逼近空间的定义中, 等参元采用比前面更一般的分片多项式变量替换. 在这种方法中, 给定单元区域 $\tilde{K}$ 上的单元基函数 $\tilde{\phi}_N$, 通过从参考元区域 K 到 $\tilde{K}$ 的多项式映射 $\xi \mapsto F(\xi)$, 与参考基函数联系为

$$\tilde{\phi}_N(x) = \phi_N(F^{-1}(x)). \quad (4.7.1)$$

这与仿射等价元类似, 只是现在允许映射更一般. 若映射 F 来自同一个有限元空间, 就称这种单元为“等参的”.

更准确地说, 设基础多面体区域 $\tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n$, 基础有限元空间 $\tilde{V}^h$ 定义在 $\tilde{\Omega}$ 上. 构造一个一一连续映射 $\tilde{F} : \tilde{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使每个分量 $\tilde{F}_i \in \tilde{V}^h$. 所得空间

$$V^h := \{v(\tilde{F}^{-1}(x)) : x \in \tilde{F}(\tilde{\Omega}), v \in \tilde{V}^h\} \quad (4.7.2)$$

称为等参等价有限元空间.

等参等价空间的逼近理论很简单, 只需使用链式法则. 因此, 本章至此导出的所有结果仍然成立, 唯一变化是常数现在依赖于映射 $\tilde{F}$ 的 Jacobian $J_{\tilde{F}}$. 为得到具有正则 Jacobian 的映射必须谨慎 (Ciarlet & Raviart 1972b), 而二维和三维中的具体构造见 Lenoir (1986).

例如, 设 Ω 是二维或三维光滑区域, Ω_h 是其多面体逼近, 比如可由边界的分片线性插值定义, 其面片尺寸至多为 h . 令 $\mathcal{T}^h$ 是相应的三角剖分, 由尺寸至多为 h 的单纯形组成. 可以构造 $k-1$ 次分片多项式映射 F^h , 使其:

1. 在远离 Ω_h 边界处等于恒等映射;
2. 满足 $\partial\Omega$ 上任一点到 $\partial F^h(\Omega_h)$ 最近点的距离至多为 Ch^k ;
3. $\|J_{F^h}\|_{W_\infty^k(\Omega_h)} \leq C$, 且 $\|J_{F^h}^{-1}\|_{W_\infty^k(\Omega_h)} \leq C$, 其中 C 与 h 无关.

注意 $F^h(\Omega_h)$ 只是逼近 Ω , 并不等于 Ω . 不过利用定理 1.4.5 的延拓结果, 可以把所有待逼近函数视为按需要定义在 $F^h(\Omega_h)$ 上. 使用第 4.4 节的方法容易证明如下结论.

定理 4.7.3: 设 $\{\mathcal{T}^h\}$, $0 < h \leq 1$, 是 Lipschitz 区域 Ω 的一族多面体逼近 Ω_h 上的非退化剖分族. 假设存在满足上述性质 1-3 的 $m-1$ 次分片多项式映射 F^h . 设 (K, P, N) 是 C^0 参考元, 对某些 m, p 满足定理 4.4.4 的条件. 假设对所有 $T \in \mathcal{T}^h$, $0 < h \leq 1$, 元

(T, P_T, N_T) 均与 (K, P, N) 仿射插值等价. 则存在正常数 C , 只依赖于参考元、 n, m, p 以及式 (4.4.16) 中的 ρ , 使对 $0 \leq s \leq 1$,

$$\|v - I^h v\|_{W_p^s(F^h(\Omega_h))} \leq Ch^{m-s} |v|_{W_p^m(F^h(\Omega_h))}, \quad (4.7.4)$$

并且当 $m > s + n/p$ ($p = 1$ 时为 $m \geq s + n$) 时,

$$\|v - I^h v\|_{W_\infty^s(F^h(\Omega_h))} \leq Ch^{m-s-n/p} |v|_{W_p^m(F^h(\Omega_h))}. \quad (4.7.5)$$

这里 $I^h v$ 表示等参插值函数, 定义为 $(I^h v)(F^h(x)) = \tilde{I}^h \tilde{v}(x)$, $x \in \Omega_h$, 其中 $\tilde{v}(x) = v(F^h(x))$, $x \in \Omega_h$, $\tilde{I}^h$ 是基础有限元空间 $\tilde{V}^h$ 的全局插值算子.

需要指出, $r \geq 1$ 的等参 C^r 元实际价值不大. 问题不在于单元经过 C^r 映射后不再保持 C^r (它们仍会保持), 而在于将多面体区域映到光滑区域时, C^1 映射并不合适. 因此上述结果限于 $r = 0$ 的情形.

4.8 非光滑函数的插值

前几节的插值算子要有定义, 都要求被逼近函数具有一定光滑性. 第 14 章将介绍一种利用 Banach 空间插值理论推广此类逼近结果的方法. 这里说明一种基于 Clement (1975) 以及 Scott & Zhang (1990 & 1992) 思想的构造性方法. 我们不讨论这种方法最一般的形式, 而只给出最简单版本; 更多结果见 Scott & Zhang (1990 & 1992) 以及 Girault & Scott (2002).

首先如下重新解释全局插值算子 I^h . 对每个节点 z , 有相应节点变量 N_z . 它可以是点值、导数值、边上的积分等. 对光滑函数可写成

$$I^h u = \sum_z N_z(u) \Phi_z, \quad (4.8.1)$$

其中 Φ_z 是全局基函数, 定义为

$$\Phi_z|_K = \phi_{N_z}^K,$$

$\phi_{N_z}^K$ 是 K 上的局部节点基函数; 若 z 不是与 K 关联的节点, 则令 $\Phi_z|_K := 0$.

若 N_z 是以单元区域 K 为基础的单元节点变量之一, 就说 “ K 包含 z ”. 稍微滥用记号, 我们把 z 既看作节点变量的位置, 也看作它的某种描述符. 例如, Hermite 节点在同一 “位置” (如一个顶点) 有多个节点 z .

现在对每个节点 z 选择一个包含 z 的特定单元区域 K_z , 再选取子集 $\tilde{K}_z \subset K_z$. K_z 和 $\tilde{K}_z$ 的选择都有很大自由度. 区域 $\tilde{K}_z$ 将用于构造新插值算子; N_z 的作用将表示为 $\tilde{K}_z$ 上的积分.

为简化论证, 假设所考虑单元具有层次性, 即以 K_z 为基础的单元中的函数限制到 $\tilde{K}_z$ 后, 本身是具有 K_z 上节点子集的一个单元的适当函数. 更准确地, 设基本单元为 (K_z, P_z, N_z) , 并令 $\tilde{P}_z$ 表示 P_z 中单元函数在 $\tilde{K}_z$ 上的限制:

$$\tilde{P}_z = \{f|_{\tilde{K}_z} : f \in P_z\}.$$

假设 $(\tilde{K}_z, \tilde{P}_z, \tilde{N}_z)$ 对某个 $\tilde{N}_z \subset N_z$ 是定义良好的有限元. 后一条件蕴含

$$\phi_N^{K_z}|_{\tilde{K}_z} = \phi_{\tilde{N}}^{\tilde{K}_z} \quad \forall N \in \tilde{N}_z, \quad \phi_N^{K_z}|_{\tilde{K}_z} \equiv 0 \quad \forall N \in N_z \setminus \tilde{N}_z. \quad (4.8.2)$$

以下对基本单元为单纯形的情形给出细节, 此时术语较简单. 对每个 z , 令 K_z 是包含 z 的单纯形, 并选 $\tilde{K}_z$ 为 K_z 的一个闭单纯子复形, 即 K_z 的顶点、边、面等. 允许 $\tilde{K}_z$ 具有任意维数:

$$0 \leq \dim(\tilde{K}_z) \leq d,$$

其中 d 是底层区域 Ω 的维数. 只要求 $z \in \tilde{K}_z$. 因而

$$z \in \tilde{K}_z \subset K_z, \quad 0 \leq \dim(\tilde{K}_z) \leq \dim(K_z).$$

有三个值得注意的例子. 第一个是式 (4.8.1) 的标准 Lagrange、Hermite、Argyris 等插值算子, 此时对每个 z , $\dim(\tilde{K}_z) = 0$, 即 $\tilde{K}_z = \{z\}$. 第二个例子对每个 z 取 $\tilde{K}_z = K_z$, 从而 $\dim(\tilde{K}_z) = d$, 这允许最大程度的光滑化 (Clement 1975). 这仍不能唯一确定 $\tilde{K}_z$, 因为还需从包含 z 的单元中选一个. 最后, 当 $z \in \partial\Omega$ 时, 取 $\tilde{K}_z \subset \partial\Omega$ 往往很有用 (Scott & Zhang 1990).

对每个节点 z , 考虑 $\tilde{P}_z$ 的相应局部节点基 $\{\phi_N^{\tilde{K}_z} : N \in \tilde{N}_z\}$. 令

$$\{\psi_N^{\tilde{K}_z} : N \in \tilde{N}_z\} \quad (4.8.3)$$

表示 $\tilde{P}_z$ 的 $L^2(\tilde{K}_z)$ 对偶基:

$$\int_{\tilde{K}_z} \phi_N^{\tilde{K}_z}(x) \psi_M^{\tilde{K}_z}(x) dx = \delta_{MN} \quad \forall M, N \in \tilde{N}_z. \quad (4.8.4)$$

等价地, $\{\psi_N : N \in \tilde{N}_z\}$ 是由 Riesz 表示定理 2.4.2 保证的 $\{N \in \tilde{N}_z\}$ 在 $L^2(\tilde{K}_z)$ 中的表示. 对 $N \in N_z \setminus \tilde{N}_z$ 令 $\psi_N \equiv 0$, 可将式 (4.8.3) 中的函数集扩充到 $\{\psi_N^{\tilde{K}_z} : N \in N_z\}$. 由式 (4.8.2),

$$\int_{\tilde{K}_z} \phi_N^{K_z}(x) \psi_M^{\tilde{K}_z}(x) dx = \delta_{MN} \quad \forall M, N \in N_z. \quad (4.8.5)$$

现在可对更一般的函数定义全局插值算子, 比如对所有节点 z 都有 $u \in L^1(\tilde{K}_z)$ 时, 令

$$\tilde{I}^h u = \sum_z \left(\int_{\tilde{K}_z} \psi_{N_z}^{\tilde{K}_z}(x) u(x) dx \right) \Phi_z. \quad (4.8.6)$$

定理 4.8.7: $\tilde{I}^h$ 是投影, 且在由 $\{\Phi_z\}$ 张成的空间 V^h 上等于 I^h :

$$\tilde{I}^h v = v \quad \forall v \in V^h.$$

证明: 这由式 (4.8.5) 得到, 因为它蕴含

$$\int_{\tilde{K}_z} \psi_{N_z}^{\tilde{K}_z}(x) v(x) dx = N_z(v) \quad \forall v \in V^h.$$

$\tilde{I}^h$ 的另一个关键性质是可构造得满足边界条件. 下面对 Lagrange 元和简单 Dirichlet 边界条件叙述结果. Hermite 元和涉及导数的 Dirichlet 边界条件见 Girault & Scott (2002).

定理 4.8.8: 假设对所有 $z \in \partial\Omega$ 都有 $\tilde{K}_z \subset \partial\Omega$, 且所有单元均为 Lagrange 元. 只要 $v = 0$ 于 $\partial\Omega$, 就有 $\tilde{I}^h v = 0$ 于 $\partial\Omega$.

现在概述逼近误差 $v - \tilde{I}^h v$ 的估计. 完整细节对 Lagrange 元见 Scott & Zhang (1990), 对 Hermite 元见 Girault & Scott (2002). 假设所有单元的形函数空间 P_K 都包含 P_{m-1} . 与引理 4.4.1 相应, 对任意 $K \in \mathcal{T}^h$ 和 $1 \leq p \leq \infty$,

$$\|\widehat{\tilde{I}^h v}\|_{W_p^m(\hat{K})} \leq C \|\widehat{v}\|_{L^1(\hat{S}_K)},$$

其中 S_K 是由 $\mathcal{T}^h$ 中与 K 相邻的单元组成的区域,

$$S_K = \text{interior} \left(\bigcup \{K_i : K_i \cap K \neq \emptyset, K_i \in \mathcal{T}^h\} \right), \quad (4.8.9)$$

上标尖号表示按 K 的直径缩放后的相应区域和函数, 参见式 (4.3.11). 对任意 $0 \leq s \leq k \leq m$, 使用定理 4.4.4 证明中的方法以及 Scott & Zhang (1990), 有

$$\begin{aligned} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)} &\leq \|v - Q^{k-1} v\|_{W_p^s(K)} + \|\tilde{I}^h(v - Q^{k-1} v)\|_{W_p^s(K)} \\ &\leq Ch_K^{k-s} |v|_{W_p^k(S_K)}, \end{aligned} \quad (4.8.10)$$

其中 $h_K := \text{diam } K$; 当 $s = k = 0$ 时, 令 $Q^{-1} \equiv 0$, 该式仍成立. 若 $\mathcal{T}^h$ 非退化, 则

$$\sup \{\text{cardinality}\{K \in \mathcal{T}^h : \text{interior } K \subset S_{\tilde{K}}\} : \tilde{K} \in \mathcal{T}^h\} \leq C, \quad (4.8.11)$$

其中 C 只依赖于式 (4.4.16) 中的 ρ . 因而有以下结论.

定理 4.8.12: 假设所有单元的形函数集合包含所有次数小于 m 的多项式, 且 $\mathcal{T}^h$ 非退化. 设 $v \in W_p^k(\Omega)$, 其中 $0 \leq k \leq m$, $1 \leq p \leq \infty$. 则

$$\left(\sum_{K \in \mathcal{T}^h} h_K^{p(s-k)} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)}^p \right)^{1/p} \leq C |v|_{W_p^k(\Omega)}, \quad (4.8.14)$$

其中 $0 \leq s \leq k$, $\tilde{I}^h$ 由式 (4.8.6) 定义.

令 $s = k$ 并应用三角不等式, 得到如下推论.

推论 4.8.15: 在定理 4.8.12 的条件下,

$$\left(\sum_{K \in \mathcal{T}^h} \|\tilde{I}^h v\|_{W_p^k(K)}^p \right)^{1/p} \leq C |v|_{W_p^k(\Omega)}. \quad (4.8.16)$$

回忆 $h = \max_{K \in \mathcal{T}^h} \text{diam } K$, 定理 4.8.12 可简化为

$$\left(\sum_{K \in \mathcal{T}^h} \|v - \tilde{I}^h v\|_{W_p^s(K)}^p \right)^{1/p} \leq Ch^{k-s} |v|_{W_p^k(\Omega)}, \quad (4.8.17)$$

其中 $0 \leq s \leq k \leq m$.

4.9 离散 Sobolev 不等式

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的多边形区域, $\mathcal{T}^h$ 是 Ω 的正则三角剖分, 满足

$$|\ln h_T| \approx |\ln h| \quad \forall T \in \mathcal{T}^h, \quad (4.9.1)$$

其中 $h_T = \text{diam } T$, $h = \max_{T \in \mathcal{T}^h} h_T$. 许多分级网格都满足条件 (4.9.1) (参见 Apel (1999)). 以 $V_h \subset H^1(\Omega)$ 表示与 $\mathcal{T}^h$ 关联的 P_m Lagrange 有限元空间. 一方面, 例 1.4.3 表明一般而言 $H^1(\Omega) \not\subset L^\infty(\Omega)$; 另一方面, V_h 中的函数按构造在 $\bar{\Omega}$ 上连续. 离散 Sobolev 不等式调和了这一矛盾. 以下证明实质上与 Bramble, Pasciak & Schatz (1986) 相同.

引理 4.9.2 (离散 Sobolev 不等式): 有估计

$$\|v\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C(1 + |\ln h|)^{1/2} \|v\|_{H^1(\Omega)} \quad \forall v \in V_h, \quad (4.9.3)$$

其中正常数 C 与 h 无关.

证明: 首先注意 Ω 具有锥性质, 即每个点 $x \in \Omega$ 都是某个锥 K_x 的顶点, K_x 与极坐标下定义的锥 (或扇形)

$$K = \{(r, \theta) : 0 < r < d < \infty, 0 < \theta < \omega < 2\pi\}$$

全等.

设 T 是 $\mathcal{T}^h$ 的一个三角形, c 是 T 的重心. 不失一般性, 可假设 $h_T = \text{diam } T < d/2$ (参见练习 4.x.19). 为简单起见, 可取 c 为原点且 $K_c = K$. $\mathcal{T}^h$ 的正则性蕴含存在与 T 无关的数 η , $0 < \eta < 1$, 使锥

$$K_\eta = \{(r, \theta) : 0 < r < \eta h_T, 0 < \theta < \omega\}$$

是 T 的子集.

任取 $v \in V_h$, 令 $\alpha = v(c)$. 由微积分基本定理,

$$\alpha = v(r, \theta) - \int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \quad \text{当 } d/2 < r < d,$$

从而

$$\alpha^2 \leq 2v^2(r, \theta) + 2 \left(\int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \right)^2 \quad \text{当 } d/2 < r < d. \quad (4.9.4)$$

右端的积分可估计为

$$\begin{aligned} \int_0^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho &= \int_0^{\eta h_T} \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho + \int_{\eta h_T}^r \frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) d\rho \\ &\leq \eta h_T |v|_{W_\infty^1(T)} + \left(\int_{\eta h_T}^r \left(\frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) \right)^2 \rho d\rho \right)^{1/2} (\ln(d/(\eta h_T)))^{1/2}. \end{aligned} \quad (4.9.5)$$

结合式 (4.9.4) 和式 (4.9.5), 得

$$\begin{aligned} \alpha^2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d r dr d\theta &\leq 2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d v^2(r, \theta) r dr d\theta \\ &\quad + 4(\eta h_T)^2 |v|_{W_\infty^1(T)}^2 \int_0^\omega \int_{d/2}^d r dr d\theta \\ &\quad + 4 \ln(d/(\eta h_T)) \int_0^\omega \int_{d/2}^d \left[\int_{\eta h_T}^r \left(\frac{\partial v}{\partial \rho}(\rho, \theta) \right)^2 \rho d\rho \right] r dr d\theta. \end{aligned}$$

由逆估计 (4.5.4), 这蕴含

$$|v(c)| \leq C_1(1 + |\ln h_T|)^{1/2} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad (4.9.6)$$

其中 C_1 与 h, c 无关.

任取 $x \in T$. 逆估计 (4.5.4) 蕴含

$$|v(x) - v(c)| \leq h_T |v|_{W_\infty^1(T)} \leq C_2 |v|_{H^1(T)}, \quad (4.9.7)$$

其中正常数 C_2 与 h, x 无关. 由式 (4.9.1)、式 (4.9.6)、式 (4.9.7) 以及 T, x 的任意性, 得到式 (4.9.3). ■

注 4.9.8: 有限差分网格函数情形的离散 Sobolev 不等式证明见 Bramble (1966).

注 4.9.9: 引理 4.9.2 中的估计是尖锐的 (参见 Brenner & Sung 2000a).

习题

习题 4.x.1: 证明对 $|\alpha| \leq m - 1$,

$$D_x^\alpha T_y^m u(x) = T_y^{m-|\alpha|} D_x^\alpha u(x) \quad \forall u \in C^{|\alpha|}(B).$$

参见命题 4.1.17 的证明.

习题 4.x.2: 证明式 (4.2.1) 给出的 Taylor 定理形式.

习题 4.x.3: 验证式 (4.3.12) 和式 (4.3.13) 中的断言. 提示: 证明 $T_{d\hat{y}}^m u(d\hat{x}) = \hat{T}_{\hat{y}}^m \hat{u}(\hat{x})$, 其中

$$\hat{T}_{\hat{y}}^m \hat{u}(\hat{x}) = \sum_{|\alpha| < m} \frac{1}{\alpha!} D_{\hat{y}}^\alpha \hat{u}(\hat{y}) (\hat{x} - \hat{y})^\alpha.$$

习题 4.x.4: 证明式 (4.3.15) 等价于

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \left(\left| \int_\Omega u \, dx \right| + |u|_{W_p^1(\Omega)} \right) \quad \forall u \in W_p^1(\Omega),$$

其中常数 C 只依赖于维数 n 和 Ω 的粗壮度参数 γ . 提示: 参见式 (5.3.3) 的证明.

习题 4.x.5: 利用齐次性论证完成定理 4.4.4 一般情形的证明.

习题 4.x.6: 证明三角剖分族 $\{\mathcal{T}^h\}$ 是拟一致的, 当且仅当它非退化, 且存在与 h 无关的正常数 c, C , 使对任意 $K_1, K_2 \in \mathcal{T}^h$,

$$c \operatorname{diam} K_1 \leq \operatorname{diam} K_2 \leq C \operatorname{diam} K_1.$$

习题 4.x.7: 证明不等式 (4.4.22).

习题 4.x.8: 设 $\{a_m\}_{m=1}^\infty$ 是非负数列. 证明若 $1 \leq q \leq p$, 则

$$\left(\sum_{m=1}^\infty a_m^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{m=1}^\infty a_m^q \right)^{1/q}.$$

习题 4.x.9: 设 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 是有限非负数列. 证明若 $p < q \leq \infty$, 则当 $q < \infty$ 时

$$\left(\sum_{m=1}^M a_m^p \right)^{1/p} \leq M^{1/p-1/q} \left(\sum_{m=1}^M a_m^q \right)^{1/q},$$

而当 $q = \infty$ 时

$$\left(\sum_{m=1}^M a_m^p \right)^{1/p} \leq M^{1/p} \max_{1 \leq m \leq M} a_m.$$

习题 4.x.10: [最小角条件] 设 $\{\mathcal{T}^h\}$ 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的一族三角剖分. 证明 $\{\mathcal{T}^h\}$ 非退化, 当且仅当 $\{\mathcal{T}^h\}$ 中所有三角形的各个角都以某个正常数为下界.

习题 4.x.11: 令 $\hat{K}$ 为顶点 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 构成的参考三角形, $\zeta \in W_p^m(\hat{K})$, 其中 $m \geq 2$, $1 \leq p \leq \infty$. 证明

$$\left\| \frac{\partial}{\partial x_j} (\zeta - I\zeta) \right\|_{L^p(\hat{K})} \leq C \left| \frac{\partial \zeta}{\partial x_j} \right|_{W_p^m(\hat{K})},$$

其中 $I\zeta$ 是 P_{m-1} Lagrange 有限元中 ζ 的插值函数. 其他各向异性插值估计见 Apel (1999).

习题 4.x.12: [最大角条件] 设 $\mathcal{T}$ 是多边形区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的三角剖分, $V_h = \{v \in C^0(\bar{\Omega}) : v|_T \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T} \text{ 都是线性的}\}$. 设 $u \in H^2(\Omega)$, $Iu \in V_h$ 是 u 的线性插值函数. 证明

$$\|u - Iu\|_{L^2(\Omega)} + h|u - Iu|_{H^1(\Omega)} \leq \zeta(\theta)h^2|u|_{H^2(\Omega)},$$

其中 $h = \max_{T \in \mathcal{T}} \text{diam } T$, θ 是 $\mathcal{T}$ 中的最大角, ζ 是定义在 $[\pi/3, \pi)$ 上的递增正函数. 提示: 使用练习 4.x.10.

习题 4.x.13: 对三维 Serendipity 单元导出与第 4.6 节中估计类似的估计.

习题 4.x.14: 证明如下 Sobolev 不等式:

$$\|v\|_{L^q(\Omega)} \leq \|v\|_{W_p^m(\Omega)} \quad \text{当 } m + \frac{n}{q} \geq \frac{n}{p},$$

其中要求 $q < \infty$. 提示: 证明 m 阶 Riesz 位势在 $m + n/q \geq n/p$ 时把 $L^p(\Omega)$ 映到 $L^q(\Omega)$, 参见引理 4.3.4 的证明以及 Sobolev (1963 & 1991).

习题 4.x.15: 设 P 是有限维多项式空间, K 是任意包含半径为 $\rho \text{diam } K$ 的球的开集, 其中 $\rho > 0$. 证明式 (4.5.4) 成立, 且 C 与 K 无关. 提示: 取球 $B_{\rho h} \subset K \subset B_h$, 并将式 (4.5.5) 替换为

$$\|v\|_{W_p^l(B_h)} \leq C \|v\|_{L^q(B_{\rho h})} \quad \forall v \in P.$$

习题 4.x.16: 证明在二维或更高维中, 非退化三角剖分族 $\{\mathcal{T}^h\}$ 局部拟一致. 提示: 相邻单元都可以通过一系列具有公共面的单元彼此连接.

习题 4.x.17: 考虑第 0.5 节中一维拟一致网格上的分片线性函数刚度矩阵 K . 证明 K 的条件数 (Isaacson & Keller 1966) 以 $O(h^{-2})$ 为界. 提示: 使用逆估计.

习题 4.x.18: 完成命题 4.3.2 证明中的稠密性论证. 提示: 按构造以及推论 4.1.15, R^m 是从 W_p^m 到 L^p 的连续算子. 对 W_p^m 中的光滑函数 Cauchy 序列, R^m 作用后的序列在 L^∞ 和 L^p 中都是 Cauchy 序列. 证明两个极限相同.

习题 4.x.19: 证明若 $h \geq d/2$, 则引理 4.9.2 中的估计显然成立. 提示: 应用逆估计 (4.5.4).

习题 4.x.20: 证明若 Ω 满足线段条件, 则引理 4.3.4 中的函数 u 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且

$$\|u\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{m,n,\gamma,d} \|u\|_{W_p^m(\Omega)}.$$

提示: 使用注 1.3.5 中所述 $C^\infty(\bar{\Omega})$ 的稠密性以及引理 4.3.4 证明中的论证.

习题 4.x.21: 令 $\hat{K}$ 为单位正方形, K 为凸四边形. 证明存在微分同胚 $F: \hat{K} \rightarrow K$, 使 F 的各分量属于 Q_1 .

习题 4.x.22: 设 $\{\mathcal{T}^h\}$ 是凸四边形对多边形区域 Ω 的非退化剖分族, V_h 是与 $\mathcal{T}^h$ 关联的 Q_1 等参有限元空间 (参见第 4.7 节和练习 4.x.20), $I^h: H^2(\Omega) \rightarrow V_h$ 是节点插值算子. 证明

$$\|u - I^h u\|_{L^2(\Omega)} + h|u - I^h u|_{H^1(\Omega)} \leq Ch^2|u|_{H^2(\Omega)} \quad \forall u \in H^2(\Omega).$$

关于四边形单元的更多内容见 Girault & Raviart (1979) 以及 Arnold, Boffi & Falk (2000).