

Genetic correlation matrix (LDSC, 13 skeletal phenotypes)
OA (knee)
OA (self-rep)
Fracture
BMD total
BMD femoral neck
BMD femoral total
BMD lumbar
BMD spine
BMD arms
BMD legs
BMD pelvis
BMD rib
BMD trunk
1.00 +0.84*** +0.15 +0.15*** +0.17*** +0.15*** +0.14*** +0.16*** +0.16*** +0.19*** +0.14*** +0.15*** +0.16***
+0.84*** 1.00 +0.21 +0.14*** +0.23*** +0.25*** +0.17*** +0.20*** +0.12*** +0.12*** +0.18*** +0.19*** +0.20***
+0.15 +0.21 1.00 -0.53*** -0.58*** -0.57*** -0.50*** -0.50*** -0.60*** -0.45*** -0.50*** -0.54*** -0.54***
+0.15*** +0.14*** -0.53*** 1.00 +0.82*** +0.82*** +0.84*** +0.86*** +0.87*** +0.90*** +0.90*** +0.81*** +0.92***
+0.17*** +0.23*** -0.58*** +0.82*** 1.00 +0.92*** +0.71*** +0.71*** +0.75*** +0.82*** +0.79*** +0.71*** +0.80***
+0.15*** +0.25*** -0.57*** +0.82*** +0.92*** 1.00 +0.71*** +0.74*** +0.75*** +0.81*** +0.80*** +0.74*** +0.81***
+0.14*** +0.17*** -0.50*** +0.84*** +0.71*** +0.71*** 1.00 +0.96*** +0.74*** +0.69*** +0.86*** +0.76*** +0.92***
+0.16*** +0.20*** -0.50*** +0.86*** +0.71*** +0.74*** +0.96*** 1.00 +0.78*** +0.73*** +0.86*** +0.84*** +0.96***
+0.16*** +0.12*** -0.60*** +0.87*** +0.75*** +0.75*** +0.74*** +0.78*** 1.00 +0.82*** +0.77*** +0.80*** +0.83***
+0.19*** +0.12*** -0.45*** +0.90*** +0.82*** +0.81*** +0.69*** +0.73*** +0.82*** 1.00 +0.79*** +0.69*** +0.80***
+0.14*** +0.18*** -0.50*** +0.90*** +0.79*** +0.80*** +0.86*** +0.86*** +0.77*** +0.79*** 1.00 +0.77*** +0.96***
+0.15*** +0.19*** -0.54*** +0.81*** +0.71*** +0.74*** +0.76*** +0.84*** +0.80*** +0.69*** +0.77*** 1.00 +0.89***
+0.16*** +0.20*** -0.54*** +0.92*** +0.80*** +0.81*** +0.92*** +0.96*** +0.83*** +0.80*** +0.96*** +0.89*** 1.00
OA (knee)
OA (self-rep)
Fracture
BMD total
BMD femoral neck
BMD femoral total
BMD lumbar
BMD spine
BMD arms
BMD legs
BMD pelvis
BMD rib
BMD trunk
Genetic correlation (r_g)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
Asterisks: BH-FDR q < 0.05 (*), < 0.01 (**), < 0.001 (***). Black lines separate the three phenotype blocks (OA / fracture / BMD).