
a Endpoint-specific colocalisation at 31 BMD instrument loci
knee OA: 0/31 | fracture: 9/31 (≥ PP.H4 0.8)
paired Wilcoxon signed-rank (exact): one-sided p = 0.0043, two-sided p = 0.0086
rs3779381 (7:120966790)
rs12600549 (17:41776686)
rs4974056 (3:41068497)
rs12568930 (1:22702231)
rs6956946 (7:38110032)
rs17212655 (11:86901237)
rs7938055 (11:16253187)
rs10931982 (2:202832130)
rs3020333 (6:152010254)
rs11228269 (11:68289796)
rs1262476 (6:126986996)
rs17150506 (5:122943848)
rs3929244 (11:27355031)
rs6040061 (20:10640306)
rs9594759 (13:43032593)
rs10808100 (7:96130553)
rs6846509 (4:88840386)
rs10048146 (16:86710660)
rs876701 (11:46370767)
rs930900 (12:53727545)
rs3755955 (4:994414)
rs2414095 (15:51524292)
rs884205 (18:60054857)
rs2566755 (1:68635390)
rs9515218 (13:111109859)
rs6679677 (1:114303808)
rs7277076 (21:37836973)
rs7010267 (8:119946656)
rs9293511 (5:88416354)
rs777355 (2:166554037)
rs4846607 (1:220093188)
PP.H4 (BMD ↔ knee OA)
PP.H4 (BMD ↔ fracture)
PP.H4 = 0.8
(shared variant)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Posterior probability of shared causal variant (PP.H4)