Relazione di Spettroscopia

Camera di Bragg

Francesco Forcher

Università di Padova, Facoltà di Fisica francesco. forcher@studenti.unipd.it Matricola: 1073458


Enrico Lusiani

Università di Padova, Facoltà di Fisica enrico.lusiani@studenti.unipd.it
Matricola: 1073300

Laura Buonincontri

Università di Padova, Facoltà di Fisica laura.buonincontri@studenti.unipd.it Matricola:1073131

3 luglio 2016




Sommario

Studio della camera di Bragg, in particolare risoluzione energetica, misura del background e funzione range:pressione

INDICE

Ι	Schema camera						
II Parte I							
	I	Prima misura delle particelle alfa	3				
	II	Risoluzione energetica	9				
III	Part	e II	11				
	I	Misure a pressione 650mb	11				
	II	Misure a pressione 550mb					
	III	Misure a pressione 500mb	19				
	IV	Misure a pressione 450mb					
	V	Misure a pressione 400mb					
	VI	Misure a pressione 380mb					
	VII	Curve in funzione della pressione					
IV Tabelle							
V	V Discussioni e conclusioni						
VI	VI Codice						

I. SCHEMA CAMERA



II. PARTE I

II.I Prima misura delle particelle alfa


Sono stati settati gli strumenti, a pressione 600~mb. Si è mantenuto lo Shaping Time a $0.25\text{-}0.5~\mu\text{s}$, dopo aver osservato il comportamento. E' stata regolata l'amplificazione in modo da mantenere il picco attorno ai 3V. E' stato impostato il trigger in modo tale che fosse circa a metà altezza del picco sull'oscilloscopio.

Si è verificato che il numero di segnali spuri fosse inferiore al 30% del totale, facendo il grafico dei picchi e calcolando l'integrale dei segnali a bassa energia.

E' stato quindi acquisito il primo set di dati (circa 3000 eventi)

E' stato acquisito anche un set di dati con meno eventi per stimare la baseline. In particolare, è stato calcolato il centroide del picco della baseline, da inserire nella macro al posto del valore di default.

Grafico 1 Grafico segnali a 600mb in funzione del tempo (μ s)



E' stato fatto il grafico degli integrali ed è stato calcolato il centroide del picco della baseline, da inserire nella macro al posto del valore di default.

L'analisi dei dati che segue è stata effettuata utilizzando la macro fornite dal laboratorio, modificando il limite dei campioni da integrare e inserendo il valore della baseline appena stimato. Il limite dei campioni a 600 mb è stato posto uguale a 90.

Grafico 2 Grafico segnali baseline in funzione del tempo (μ s)




Grafico 3 Picco della baseline




Grafico 4 Grafico integral




Grafico 5 Grafico integral:ev

integral:ev






Grafico 6 Grafico integral:vmax









Grafico 8 Grafico vmax:ev

vmax:ev



II.II Risoluzione energetica

Per il calcolo della risoluzione energetica, abbiamo per prima cosa trovata la relazione tra integrale ed energia, ipotizzandola lineare. Per fare ciò abbiamo calcolato l'energia teorica di ciscun picco, facendo la media delle energie dei decadimenti alfa, pesate sulla loro probabilità. Poi abbiamo calcolato l'integrale relativo a ciascun picco, come centroide del picco nell'istogramma degli integrali, e il suo errore, l'RMS del picco. Da questi dati abbiamo proceduto ad un interpolazione dell'integrale in funzione dell'energia, ricavando così la funzione energia:integrale. Usando la funzione, abbiamo riscalato l'asse delle ascisse nell'istogramma degli integrali, in modo che mostrasse l'energia. Da questo nuovo istogramma abbiamo ricavato la risoluzione energetica, misurando l'RMS dei picchi e usandola per la formula

TODO fatemela bene voi la formula qui, non so fare le equazioni

$$risoluzione = \frac{2.335 \cdot \sigma_E}{F}$$

TODO fate voi anche qui

$$q = 19.6792 \pm 19.5559$$

$$m = 1.2469 \pm 0.00354684$$

Grafico 9 Grafico Energia:Integrale





Grafico 10 Risoluzioni energetiche, grafico Energia(keV):conteggio




III. PARTE II

L'analisi dei dati che segue è stata effettuata utilizzando la macro fornite dal laboratorio, modificando il limite dei campioni e inserendo il valore della baseline stimato in precedenza.

III.I Misure a pressione 650mb

Grafico 11 Grafico segnali a 650mb








Grafico 13 Grafico integral:ev

integral:ev





Grafico 14 Grafico integral:vmax

integral:vmax










Grafico 16 Grafico vmax:ev

vmax:ev



III.II Misure a pressione 550mb

Grafico 17 Grafico segnali a 550mb








Grafico 19 Grafico integral:ev





Grafico 20 Grafico integral:vmax










Grafico 22 Grafico vmax:ev


vmax:ev



III.III Misure a pressione 500mb

Grafico 23 Grafico segnali a 500mb








Grafico 25 Grafico integral:ev







Grafico 26 Grafico integral:vmax







vmax



III.IV Misure a pressione 450mb

Grafico 29 Grafico segnali a 450mb








Grafico 31 Grafico integral:ev

integral:ev




Grafico 32 Grafico integral:vmax

integral:vmax




Grafico 33 Grafico vmax






Grafico 34 Grafico vmax:ev



III.V Misure a pressione 400mb

Grafico 35 Grafico segnali a 400mb








Grafico 37 Grafico integral:ev









Grafico 38 Grafico integral:vmax

integral:vmax








III.VI Misure a pressione 380mb

Grafico 41 Grafico segnali a 380mb








Grafico 43 Grafico integral:ev









Grafico 44 Grafico integral:vmax

integral:vmax







III.VII Curve in funzione della pressione

Sono state registrate le posizioni dei centroidi e l'RMS dei picchi in energia e dei picchi di vmax delle alfa delle sorgenti.

In seguito sono stati riportati in grafico i centroidi delle energie e i centroidi dei massimi in funzione della pressione:

Come si può vedere dai grafici TODO INSERIRE LABEL QUI, l'integrale dei picchi, ovvero l'energia della particella alfa, rimane costante al variare della pressione, almeno finche non si arriva a pressioni troppo basse. Questo cambiamento a pressioni basse è dovuto al fatto che a bassa pressione le particelle riescono ad arrivare oltre la lunghezza della camera, e la restante carica non viene più rivelata. Addirittura, il terzo picco sparisce a basse pressioni, confondendosi con il secondo a causa dell'energia mancante.

Nel grafico di vmax invece si può chiaramente notare un andamento lineare (TODO perché?).

Tabella 1: Dati picchi in energia e RMS

p(mb)	posizione centroide	RMS
650	6552 ± 5.583	81.1 ± 3.948
600	6531 ± 1.483	43.93 ± 1.049
550	$6542 \!\pm 1.816$	56.46 ± 1.284
500	6531 ± 2.147	65.45 ± 1.518
450	$6547 {\pm}~1.982$	60.51 ± 1.402
400	6524 ± 1.963	61.52 ± 1.388
380	6495 ± 3.929	63.11 ± 2.778

Tabella 2: Dati picchi in energia e RMS

p(mb)	posizione centroide	RMS
650	6969 ± 4.194	61.64 ± 2.966
600	6951 ± 1.737	48.47 ± 1.228
550	6968 ± 2.171	62.44 ± 1.535
500	6946 ± 1.848	54.53 ± 1.306
450	6966 ± 2.233	64.44 ± 1.579
400	6903 ± 2.473	86.79 ± 1.748
380	6770 ± 5.797	84.21 ± 4.099

Tabella 3: Dati picchi in energia e RMS

p(mb)	posizione centroide	RMS
650	7372 ± 5.264	61.62 ± 3.722
600	7352 ± 1.823	44.06 ± 1.289
550	7370 ± 2.256	55.5 ± 1.595
500	7336 ± 2.197	54.31 ± 1.554
450	7350 ± 2.715	65.39 ± 1.92

Tabella 4: Dati vmax in emergia e RMS

p(mb)	posizione centroide	RMS
650	189.3 ± 0.1142	$2.697 \!\pm 0.08075$
600	$176.8 \!\pm 0.0564$	$2.692 \!\pm 0.03988$
550	$156.4 \!\pm 0.0616$	$3.04\; {\pm}0.0435$
500	$144.2 \!\pm 0.05632$	$2.803\; {\pm}0.03983$
450	133.2 ± 0.0983	5.124 ± 0.0694
400	124 ± 0.06664	$3.285 \pm\! 0.04712$
380	122.9 ± 0.1359	3.119 ± 0.09609

Grafico 47 Andamento integrale del picco 1 in funzione della pressione [mb]

Picchi integral 1




Grafico 48 Andamento integrale del picco 2 in funzione della pressione [mb]




Grafico 49 Andamento integrale del picco 3 in funzione della pressione [mb]





Grafico 50 Andamento integrale di vmax [V] in funzione della pressione [mb]



E' stata implementata la macro *AnaBragg.C* per misurare la larghezza temporale dei segnali. Sono stati presi come riferimenti temporali i valori per i quali il segnale passa per il (EEEEEE BOH 40 0 45 per cento) del valore massimo. Utilizzando la misura della larghezza temporale dei segnali a 400 mb (NON SO, ANCHE A 380 ALLA FINE?) è stata calcolata la velocità di drift, tramite la formula per il calcolo della velocità:

 $\nu = \frac{lunghezzacamera}{rangetemporale}$

La lunghezza della camera di Bragg è 120 mm.

Infine, ad alte pressioni, è stato verificato che il range spaziale fosse inversamente proporzionale alla pressione.

IV. TABELLE

Non credo ce ne siano Magari le tabelle dei decadimenti?

V. DISCUSSIONI E CONCLUSIONI

Da fare

VI. CODICE

É presentata qua la parte fondamentale del codice in c++ usato per i calcoli numerici.

```
1 #include <Riostream.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <TROOT.h>
4 #include <TSystem.h>
5 #include "TNtuple.h"
6 #include "TFile.h"
7 #include "TTree.h"
8 #include "TCanvas.h"
9 #include "TGraph.h"
10 #include "TGraphErrors.h"
11 #include "TF1.h"
12
13 struct bragg_signal {
14
    short int s[128];
15 };
16
17 int AnaBraggWidth(char *filename, int intto=80, float blfix=13, int
      nsig=0) {
18
19
    bragg_signal signal;
20
21
    TFile *fin=new TFile(filename);
22
    if (!fin->IsOpen()) {
23
       std::cout << "file not found! " << std::endl;</pre>
24
       return -1;
25
    }
26
27
    TTree *tree = (TTree*)fin->Get("bragg");
28
    if (!tree) {
29
       std::cout << "Bragg tree not found! " << std::endl;</pre>
30
       return -2;
31
     }
32
33
    TBranch *br = tree->GetBranch("signals");
34
    if (!br) {
35
       std::cout << "Signal branch not found! " << std::endl;</pre>
36
       return -3;
37
    }
38
39
    br->SetAddress(&signal);
40
    int nev = br->GetEntries();
    std::cout << "Number of events in file : " << nev << std::endl;</pre>
41
42
43
    // ANALIZZA EVENTO x EVENTO
44
45
    // altri parametri iniziali
```

```
float thr_frac = 0.4; // soglia rispetto al vmax per il calcolo
      della larghezza
47
     int intfrom = 0;// regione di integrazione da 0 a intto
48
     if (intto>128) intto=128;
49
     int blfrom = 108, blto = 128; // regione per il calcolo della
      baseline
50
51
52
     float bl; // baseline evento x evento
53
     float integral;
54
     float vmax; // massimo relativo alla bl
55
     float width; // larghezza dei segnali
56
57
58
    char outfilename[200];
59
    strcpy(outfilename, "anabragg_");
60
    char *cc=strrchr(filename,'/');
61
     if (cc) {cc++; strcat(outfilename,cc);}
62
     else strcat(outfilename, filename);
63
64
    TFile *fout=new TFile(outfilename, "RECREATE"); // output file
65
66
    TNtuple *nt=new
      TNtuple("nt","","ev:vmax:width:integral:baseline");
67
68
     int maxev=nev;
69
     if (nsig && nsig<nev) maxev=nsig;</pre>
70
71
    // LOOP SUGLI EVENTI
72
    for (int i=0; i < maxev; i++) {
73
74
       // recupera l'evento
75
       br->GetEntry(i);
76
77
       // inizializza a zero
78
       b1=0;
79
       integral=0;
80
       vmax=0;
81
       width=0;
82
83
       // calcolo baseline
84
       for (int j=blfrom; j<blto; j++)</pre>
85
         bl += signal.s[j]; bl /= (blto-blfrom);
86
87
       // calcolo integrali e vmax
88
       for (int j=intfrom; j<intto; j++) {</pre>
89
         integral += (signal.s[j] - blfix);
90
         if ((signal.s[j] - blfix) > vmax) vmax = (signal.s[j] -
      blfix);
91
92
93
       // CALCOLO DELLA LARGHEZZA DEL SEGNALE A UNA CERTA PERCENTUALE
```

```
DEL VMAX
94
       // ...
        float ratio = 0.4;
95
96
        for (int j = 0; j < 128; ++ j)
97
98
            if (signal.s[j] \rightarrow ratio*vmax) ++width;
99
        }
100
        /* alternativamente
101
       int start = 0;
102
        int end = 0;
103
        for (int j = 0; j < 128; ++j){
104
         if (!start && signal.s[j] > ratio*vmax) ++width;
105
         if (start && !end && signal.s[j] \rightarrow ratio*vmax) ++width;
106
        }*/
107
108
109
       nt->Fill(i,vmax,width,integral,bl);
110
     }
111
     std::cout << maxev << " events analyzed..." << std::endl;</pre>
112
113
     fout->Write();
114
     fout->Close();
115
116
     fin->Close();
117
118
     new TFile(outfilename); // riapre il file dei risultati
119
120
     return 0;
121 }
                              ../src/AnaBraggWidth.C
 1 #include < Riostream.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 #include <TROOT.h>
 4 #include <TSystem.h>
 5 #include "TNtuple.h"
 6 #include "TFile.h"
 7 #include "TTree.h"
 8 #include "TCanvas.h"
 9 #include "TGraph.h"
10 #include "TGraphErrors.h"
11 #include "TF1.h"
12
13 struct bragg_signal {
14 short int s[128];
15 };
16
17 int plotSignal(bragg_signal sig, int same) {
18
   float x[128]; for (int i=0; i<128; i++) x[i]=i*0.1;
19
20 float y[128]; for (int i=0; i<128; i++) y[i]=sig.s[i];
```

```
21
    TGraph *g = new TGraph(128,x,y); // crea il grafico
22
    g->SetMarkerStyle(7); // imposta alcuni attributi
23
    g->SetLineColor(4);
24
    g->SetLineWidth(2);
25
26
    TCanvas *csig = (TCanvas*)gROOT->FindObject("csig"); // cerca
      l'oggetto "csig" (canvas)
27
    if (!csig) {
      csig=new TCanvas("csig"); // se non c'e' la crea nuova
28
29
      csig->SetGridy();
      g->Draw("apl"); // disegna il grafico e anche il frame con gli
      assi
31
    }
32
    else {
      csig \rightarrow cd(); // se c'e' si posiziona sulla canvas "csig"
33
34
       if (same)
35
         g->Draw("pl"); // disegna nel frame esistente
36
       else {
37
        csig->Clear();
38
         g->Draw("apl"); // disegna in un nuovo frame
39
         gSystem->Sleep(200); // aspetta 200 ms
40
       }
     }
41
42
    csig->Modified(); // aggiorna la canvas
43
    csig->Update();
44
    gSystem->ProcessEvents(); // aggiorna la grafica
45
46
    return 0;
47 }
48
49 int PlotSignals(char *filename, int plfrom=0, int plto=100, int
      same=1) {
50
51
    bragg_signal signal;
52
53
    TFile *fin=new TFile(filename);
54
    if (!fin->IsOpen()) {
55
      std::cout << "file not found! " << std::endl;</pre>
56
       return -1;
57
    }
58
59
    TTree *tree = (TTree*)fin->Get("bragg");
60
     if (!tree) {
61
       std::cout << "Bragg tree not found! " << std::endl;</pre>
62
       return -2;
63
    }
64
65
    TBranch *br = tree->GetBranch("signals");
66
    if (!br) {
67
       std::cout << "Signal branch not found! " << std::endl;</pre>
68
      return -3;
69
     }
```

```
70
71
    br->SetAddress(&signal);
72
    int nev = br->GetEntries();
    \verb|std::cout| << "Number of events in file : " << nev << std::endl;|\\
73
74
75
    for (int i=plfrom; i < plto; i++) {
76
      br->GetEntry(i);
77
      plotSignal(signal, same);
78
   }
79
80
    return 0;
81 }
```

../src/PlotSignals.C