

# 1-3 常用的证明方法

魏恒峰

hfwei@nju.edu.cn

2017 年 10 月 23 日

# 习题选讲

- UD (第五章) 反证法 (Contradiction)
- UD (第十七章) 数学归纳法 (Mathematical Induction)
- ES (第二十四章) 鸽笼原理 (Pigeonhole Principle)

# 习题选讲

- UD (第五章) 反证法 (Contradiction)
- UD (第十七章) 数学归纳法 (Mathematical Induction)
- ES (第二十四章) 鸽笼原理 (Pigeonhole Principle)



## UD 题目 17.14: 第二数学归纳法

使用 (第一) 数学归纳法证明第二数学归纳法。

### Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*

## UD 题目 17.14: 第二数学归纳法

使用 (第一) 数学归纳法证明第二数学归纳法。

### Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*



## UD 题目 17.14: 第二数学归纳法

使用 (第一) 数学归纳法证明:

### Theorem (Second Principle of Mathematical Induction)

*For an integer  $n$ , let  $Q(n)$  denote an assertion. Suppose that*

- (i)  $Q(1)$  is true and*
- (ii) for all positive integers  $n$ , if  $Q(1), \dots, Q(n)$  are true, then  $Q(n+1)$  is true.*

*Then  $Q(n)$  holds for all positive integers  $n$ .*

## Theorem (第二数学归纳法)

$$\left[ Q(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N}^+ \left( (Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)) \rightarrow Q(n+1) \right) \right] \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^+ Q(n).$$

## Theorem (第二数学归纳法)

$$\left[ Q(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N}^+ \left( (Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)) \rightarrow Q(n+1) \right) \right] \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^+ Q(n).$$

## Theorem ((第一) 数学归纳法)

$$\left[ P(1) \wedge \forall n \in \mathbb{N}^+ (P(n) \rightarrow P(n+1)) \right] \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}^+ P(n).$$



“标准” 证明示例。

$$P(n) \triangleq Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)$$

用(第一) 数学归纳法证明  $P(n)$  对一切正整数都成立。

“标准” 证明示例。

$$P(n) \triangleq Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)$$

用(第一) 数学归纳法证明  $P(n)$  对一切正整数都成立。

Proof.

By mathematical induction on  $\mathbb{N}^+$ .

Basis  $P(1)$

Inductive Step  $P(n) \rightarrow P(n+1)$

Therefore,  $P(n)$  holds for all positive integers. □

“标准” 证明示例。

$$P(n) \triangleq Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)$$

用(第一) 数学归纳法证明  $P(n)$  对一切正整数都成立。

Proof.

By mathematical induction on  $\mathbb{N}^+$ .

Basis  $P(1)$

Inductive Hypothesis  $P(n)$

Inductive Step  $P(n) \rightarrow P(n+1)$

Therefore,  $P(n)$  holds for all positive integers. □

Proof.

能不能“算一算”呢？

$$P(n) \triangleq Q(1) \wedge \cdots \wedge Q(n)$$



*Let us calculate [calculemus].*

## 数学归纳法

(第一) 数学归纳法与第二数学归纳法等价。

## 数学归纳法

(第一) 数学归纳法与第二数学归纳法等价。

*Q* : 为什么第二数学归纳法也被称为“强” (strong) 数学归纳法?

## Theorem (Cantor Theorem (1891))

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*



Georg Cantor (1845 – 1918)

## Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*



## Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.


If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.



## Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*

Understanding this problem:

## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Understanding this problem:

$$2^A \text{ } A = \{1, 2, 3\},$$

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Understanding this problem:

$$2^A \quad A = \{1, 2, 3\},$$

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Onto

$$\forall B \in 2^A \exists a \in A (f(a) = B).$$

## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Understanding this problem:

$$2^A \quad A = \{1, 2, 3\},$$

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Onto

$$\forall B \in 2^A \exists a \in A (f(a) = B).$$

Not Onto

$$\exists B \in 2^A \neg (\exists a \in A (f(a) = B)).$$



## Theorem (Cantor Theorem)

*Let  $A$  be a set.*

*If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.*

Proof.



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Proof.

- ▶ Constructive proof:

$$B = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}.$$



## Theorem (Cantor Theorem)


Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Proof.

- ▶ Constructive proof:

$$B = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}.$$



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.


Proof.

- ▶ Constructive proof:

$$B = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}.$$

- ▶ By contradiction:

$$\exists a \in A : f(a) = B.$$



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

Proof.


- ▶ Constructive proof:

$$B = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}.$$

- ▶ By contradiction:

$$\exists a \in A : f(a) = B.$$

$$Q : a \in B (= f(a))?$$



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

对角线论证 (Cantor's diagonal argument) (以下仅适用于可数集合  $A$ ).

$a$	$f(a)$					
	1	2	3	4	5	...
1	1	1	0	0	1	...
2	0	0	0	0	0	...
3	1	0	0	1	0	...
4	1	1	1	1	1	...
5	0	1	0	1	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

对角线论证 (Cantor's diagonal argument) (以下仅适用于可数集合  $A$ ).

$a$	$f(a)$					
	1	2	3	4	5	...
1	1	1	0	0	1	...
2	0	0	0	0	0	...
3	1	0	0	1	0	...
4	1	1	1	1	1	...
5	0	1	0	1	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...



## Theorem (Cantor Theorem)

Let  $A$  be a set.

If  $f : A \rightarrow 2^A$ , then  $f$  is not onto.

对角线论证 (Cantor's diagonal argument) (以下仅适用于可数集合  $A$ ).

$a$	$f(a)$					
	1	2	3	4	5	...
1	1	1	0	0	1	...
2	0	0	0	0	0	...
3	1	0	0	1	0	...
4	1	1	1	1	1	...
5	0	1	0	1	0	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...

$$B = \{0, 1, 1, 0, 1\}$$





# 补充题目

## 存在性证明 (Existence Proof)

1. 构造性证明 (Constructive proof)
2. 反证法 (By contradiction)
3. 概率法 (Probabilistic Method)

## Theorem (Dov Jarden (1953))

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a^b \in \mathbb{Q}.$$

## Theorem (Dov Jarden (1953))

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a^b \in \mathbb{Q}.$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (\text{Theorem 5.2})$$

## Theorem (Dov Jarden (1953))

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a^b \in \mathbb{Q}.$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (\text{Theorem 5.2})$$

Proof.

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

## Theorem (Dov Jarden (1953))

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a^b \in \mathbb{Q}.$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (\text{Theorem 5.2})$$

Proof.

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$$



## Theorem (Dov Jarden (1953))

$$\exists a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} : a^b \in \mathbb{Q}.$$

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \quad (\text{Theorem 5.2})$$

Proof.

$$\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$$

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$$



Q: 这是构造性证明吗？这是反证法吗？



# Lossless Compression



# 补充思考题

## Theorem (Tiling Theorem)

*For any positive integer  $k$ , a  $2^k \times 2^k$  checkerboard with any one square removed can be tiled using right triominoes.*



Thank  
You!